

LIB. II.

	$s = 70^\circ$	$s = 80^\circ$	$s = 84^\circ$	$s = 85^\circ$
$l.s =$	1,8450980	1,9030900	1,9242793	1,9294189
subtrahe	1,7581226	1,7581226	1,7581226	1,7581226
	0,0869754	0,1449674	0,1661567	0,1712963
$l.sm. \frac{1}{2} s =$	9,7585913	9,8080675	9,8255109	9,8296833
	9,8455667	9,9530349	9,9916676	0,0009796
Error +	0,1544332	0,0469650	+ 83223	— 9796

Unde  $s$  continetur intra limites  $84^\circ$ ,  $53'$  &  $84^\circ$ ,  $54'$ 

Sit ergo

$s = 84^\circ, 53'$	$s = 84^\circ, 54'$
feu	feu
$s = 5093'$	$s = 5094'$
$\frac{1}{2} s = 42^\circ, 26 \frac{1}{2}'$	$\frac{1}{2} s = 42^\circ, 27'$
$l.s =$	3,7069737
subtrahe	3,5362739
	0,1706998
$l.sm. \frac{1}{2} s =$	9,8292003
	0,9999001
Error	+ 998

Hincque oritur

Arcus  $s = AE = 84^\circ, 53', 38'', 51'''$ ,

&amp;

Arcus  $BE = 50^\circ, 6', 21'', 9'''$ . Q. E. I.

539. Quanquam in primo quadrante omnes Arcus sunt suis Tangentibus minores, tamen in sequentibus quadrantibus dantur ejusmodi Arcus qui sint æquales suis Tangentibus, quos in sequenti Problemate methodo ex seriebus petita investigemus.

## PROBLEMA IX.

Invenire omnes Arcus, qui Tangentibus suis sint æquales.

## SOLUTIO.

Primus Arcus hac proprietate præditus est infinite parvus.  
Tum

Tum in secundo quadrante, quia hic Tangentes sunt negati-  
væ, datur nullus istiusmodi Arcus; in tertio vero quadrante (A P.  
dabitur unus  $270^\circ$  aliquanto minor; porro dabuntur ejusmodi XXXI.  
Arcus in quinto, septimo, &c. Ponatur quarta Peripheriæ pars  
 $= q$ , & Arcus quæsitus contineantur in hac forma  $(2n+1)q - s$ ,

ita ut sit  $(2n+1)q - s = \cot.s = \frac{1}{\tan.s}$ . Sit  $\tan.s = x$ ; erit

$$s = x - \frac{1}{2} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \&c., \text{ ideoque } (2n+1)q$$

$= \frac{1}{x} + x - \frac{1}{3} x^3 + \frac{1}{5} x^5 - \frac{1}{7} x^7 + \&c.$  Patet au-  
tem, ob  $s$  Arcum eo minorem, quo major fuerit numerus  $n$ ,  
fore  $x$  quantitatem valde parvam ideoque proxime  $x =$

$\frac{1}{(2n+1)q}$ ; seu  $\frac{1}{x} = (2n+1)q$ ; propius autem invenitur

$$\frac{1}{x} = (2n+1)q - s = (2n+1)q - \frac{1}{(2n+1)q} - \frac{2}{3(2n+1)^3 q^3} -$$

$$\frac{13}{15(2n+1)^5 q^5} - \frac{146}{105(2n+1)^7 q^7} - \frac{2343}{945(2n+1)^9 q^9} - \&c.$$

Cum ergo sit  $q = \frac{\pi}{2} = 1,5707963267948$ , erit Arcus quæ-

$$\text{situs} = (2n+1) 1,57079632679 - \frac{1}{2n+1} 0,63661977 -$$

$$\frac{0,17200817}{(2n+1)^3} - \frac{0,09062596}{(2n+1)^5} - \frac{0,05892834}{(2n+1)^7} - \frac{0,04258543}{(2n+1)^9} -$$

&c. Vel si isti termini, qui in partibus Radii exprimuntur,  
ad mensuram Arcuum reducantur, erit Arcus quæsitus in ge-

$$\text{nere consideratus} = (2n+1)90^\circ - \frac{131313''}{2n+1} - \frac{35479''}{(2n+1)^3} -$$

$$\frac{18692''}{(2n+1)^5} - \frac{12155''}{(2n+1)^7} - \frac{8784''}{(2n+1)^9}. \text{ Arcus ergo quæstioni sa-}$$

tisfacientes ordine sunt.

LIB. II.

I.	1. 90°	—	90°
II.	3. 90°	—	12°, 32', 48"
III.	5. 90°	—	7, 22, 32
IV.	7. 90°	—	5, 14, 22
V.	9. 90°	—	4, 3, 59
VI.	11. 90°	—	3, 19, 24
VII.	13. 90°	—	2, 48, 37
VIII.	15. 90°	—	2, 26, 5
IX.	17. 90°	—	2, 8, 51
X.	19. 90°	—	1, 55, 16

TAB.  
XXIX.  
Fig. 116.

540. Hujusmodi quæstiones plures non propono, cum methodus eas resolvendi ex his exemplis clare perspiciatur. Ceterum hæc Problemata in hunc finem potissimum sunt excogitata, ut Circuli natura, cujus quadratura omnibus methodis adhuc usitatis frustra fuit tentata, penitus inspiciatur. Si enim accidisset, ut in solutione cujuspiam Problematis, vel Arcus cum tota Circumferentia commensurabilis, vel ejus Sinus Tangensve per Radium construibilis prodiret, tum utique species quædam quadraturæ Circuli haberetur. Scilicet, si in solutione Problematis VI. Sinus *DE*, qui prodit  $= 0,6665578$ , inventus fuisset  $= 0,6666666 = \frac{2}{3}$ , elegans certe Circuli proprietas innotesceret, Arcus quippe *AE* construi posset Lineæ rectæ  $AD + DE = 1 + \frac{2}{3} + \sqrt{\frac{5}{9}}$  æqualis. Nulla vero etiamnum ratio patet, quæ hujusmodi Circuli quadraturam impossibilem esse evincat: atque, si talis detur, nulla alia via, præter hanc, quam hoc Capite aperuimus, ad eam investigandam magis apta videtur.

## FINIS LIBRI SECUNDI.

# APPENDIX

*D E*

SUPERFICIEBUS.



## C A P U T I.

## C A P. I.

*De Superficiebus Corporum in genere.*

1. **Q**Uæ in superiori Sectione de Lineis curvis sunt tradita earumque ad æquationes revocandarum ratione, latissimè quidem patent, atque ad omnes Lineas curvas, quarum cuncta puncta in eodem plano sint posita, extenduntur. Verum, si tota Linea curva non fuerit in eodem plano sita, tum præcepta supra data non sufficiunt ad proprietates ejusmodi Curvarum eruendas. Hujus generis Curvæ duplicem habent curvaturam; hocque nomine de iis eximium scripsit tractatum Acutissimus Geometra CLAIRAUT. Cum autem hæc materia maxime sit connexa cum natura Superficierum, de qua hac sectione exponere constitui, seorsim eam non pertractabo, sed ejus explicationem cum sequenti de Superficiebus doctrina jungam.

2. Quemadmodum Lineæ sunt vel rectæ vel curvæ, ita Superficies sunt vel planæ, vel non planæ. Non planas autem voco, quæ vel convexæ sunt vel concavæ, vel utriusque naturæ participes. Sic, Superficies externa Globi, Cylindri, & Coni, exceptis basibus, est convexa; interna autem catini Superficies concava. Quemadmodum porro Linea recta est, cujus terna quæque puncta in directum sunt posita; ita Superficies plana est cujus quaterna quæque puncta in eodem plano sunt posita; ex quo perspicuum est Superficiem non planam, hoc est sive convexam sive concavam, esse cujus non omnia quaterna puncta in eodem plano sunt sita.

3. Superficies igitur non plana qualis sit facillime intelligitur si, quantum a Superficie plana ubique discrepet, cognoverimus. Simili scilicet modo, quo indolem Linearum curvarum ex distantis, quibus ejus quæque puncta a Linea recta pro Axe assumpta distant, colligimus; ita naturam Superficierum

APPEND. æstinari conveniet ex singulorum ejus punctorum distantis a Superficie plana pro lubitu assumta. Proposita ergo quacunque Superficie, cujus indolem definiri oporteat, pro arbitrio eligatur Superficies plana, ad quam ex singulis Superficiei propositæ punctis perpendiculara ducta concipiantur: quo factò, si cujusvis horum perpendicularorum longitudo per æquationem determinari queat, naturam Superficiei hac ipsa æquatione exprimi censebimus. Ex tali enim æquatione vicissim omnia Superficiei puncta assignari poterunt, atque ideo ipsa Superficies determinabitur.

T A B. 4. Repræsentet planum tabulæ eam Superficiem planam,   
 x x x. ad quam singula cujusque Superficiei propositæ puncta referamus. Sit  $M$  punctum quodcunque Superficiei propositæ, quod   
 Fig. 119. extra planum tabulæ situm concipiatur, unde ad hoc planum perpendicularis demittatur  $MQ$ , plano in puncto  $Q$  occurrens. Jam, ad situm hujus puncti  $Q$  calculo exprimendum, assumatur in plano tabulæ recta quæpiam  $AB$  pro Axe, ad quem ex puncto  $Q$  recta normalis ducatur  $QP$ . Denique in ipso Axe  $AB$  sumatur punctum quodvis  $A$  pro initio Abscissarum: quo factò, situs puncti  $M$  innotescet si noverimus longitudines trium istarum Linearum  $AP$ ,  $PQ$  &  $QM$ ; sicque tribus Coordinatis inter se normalibus situs cujusque Superficiei puncti  $M$  simili modo determinabitur, quo Linearum curvarum in plano sitarum singula puncta per duas Coordinatas inter se normales exhiberi solent.

5. Cum igitur habeamus tres Coordinatas  $AP$ ,  $PQ$  &  $QM$ , ponamus  $AP = x$ ,  $PQ = y$ , &  $QM = z$ ; ex hisque indolem Superficiei propositæ intelligemus, si, sumtis pro lubitu binis  $x$  &  $y$ , noverimus quanta futura sit tertia  $z$ ; hoc enim modo omnia Superficiei puncta  $M$  determinare poterimus. Natura ergo cujusvis Superficiei exprimitur æquatione, qua Coordinata  $z$  definitur per binas reliquas  $x$  &  $y$  una cum constantibus. Hinc pro quavis Superficie proposita variabilis  $z$  æquabitur Functioni cuidam binarum variabilium  $x$  &  $y$ . Atque vicissim, si  $z$  æqualis fuerit Functioni cui-  
 cunque