

ipsum dd' siue $\Delta\Delta$, et mm' ipsum Δ . Hinc ex sex vltimis aequationibus pro BPP etc. sequitur, mm' metiri ipsum Bkk , adeoque (quum etiam ipsos Akk , Ckk metiatur) etiam ipsum Mkk . Quoties igitur F ex f , f' composita est, metietur mm' ipsum M . Quando itaque in hoc casu vtraque f , f' est proprie primitiua vel ex proprie primitiua deriuata siue $mm' = mm' = M$, erit $M = M$, siue F similis forma. Quando vero, in eadem suppositione, aut vtraque f , f' aut alterutra saltem est improprie primitiua vel ex improprie primitiua deriuata, e. g. forma f ; ex aequationibus fundamentalibus sequitur, aa' , $2ab'$, ac' , ba' , $2bb'$, bc' , ca' , $2cb'$, cc' per M diuisibiles esse adeoque etiam am' , bm' , cm' et hinc quoque $mm' = \frac{1}{2} mm' = \frac{1}{2} M$; vnde necessario in hoc casu erit $M = \frac{1}{2} M$, siue etiam forma F vel impr. prim. vel ex impr. prim. deriuata. Quae efficiunt CONCLUSIONEM SEXTAM.

Tandem obseruamus, si nouem aequationes $an' = P$, $2bn' = R - S$, $cn' = U$, $a'n = Q$, $2b'n = R + S$, $c'n = T$, $Ann' = q'q'' - qq'''$, $2Bnn' = pq''' + qp''' - p'q'' - q'p''$, $Cnn' = p'p'' - pp'''$ (quas, quoniam in sequentibus saepius ad ipsas reuenire oportebit, per Ω designabimus) locum habere *supponantur*, spectatis adeo ipsis n , n' tamquam incognitis, quarum tamen neutra $= 0$: per substitutionem facile confirmari; etiam aequationes fundamentales 1 — 9 necessario veras esse siue formam (A, B, C) per substitutionem p, p', p'', p''' ; q, q', q'', q''' in productum e formis (a, b, c) (a', b', c') transire; praetereaque esse $bb - ac = nn$ ($BB - AC$),

$b'b' - a'c' = n'n' (BB - AC)$. Calculum quem hic apponere nimis prolixum foret lectorum industriae committimus.

236. PROBLEMA. *Propositis duabus formis quarum determinantes aut aequales sunt aut saltem rationem quadratorum inter se habent: inuenire formam ex illis compositam.*

Sol. Sint formae componendae $(a, b, c) \dots f, (a', b', c') \dots f'$; harum determinantes d, d' ; diuisores communes maximi numerorum $a, 2b, c; a', 2b', c'$ resp. m, m' ; diuisor comm. maximus numerorum $dm'm', d'mm$ eodem signo ut d, d' affectus D . Tunc $\frac{dm'm'}{D}, \frac{d'mm}{D}$ erunt numeri positiui inter se primi ipsorumque productum, quadratum; quare ipsi erunt quadrata (art. 21). Hinc $\sqrt{\frac{d}{D}}, \sqrt{\frac{d'}{D}}$ erunt quantitates rationales quas ponemus $= n, n'$, et quidem accipiemus pro n valorem positium vel negatium, prout forma f in compositionem vel directe vel inuerse ingredi debet, similiterque signum ipsius n ex ratione qua f' in compositionem ingredi debet determinabimus. Erunt itaque $mn', m'n$ numeri integri inter se primi; n et n' autem etiam fractiones esse possunt. His ita factis, obseruamus, $an', cn', a'n, c'n, bn' + b'n, bn' - b'n$ esse integros, quod de quatuor prioribus per se manifestum est (quum $an' = \frac{a}{m} mn'$ etc.); de duobus reliquis eodem modo probatur ut in art. praec. demonstratum fuit R et S per e diuisibiles esse.

Iam accipiantur quatuor numeri integri Ω , Ω' , Ω'' , Ω''' ad libitum, ea sola conditione ut quatuor quantitates in aequatione sequente (I) ad laeuam positae non omnes simul $= 0$ fiant, ponaturque ... (I)

$$\begin{aligned}\Omega'an' + \Omega''a'n + \Omega'''(bn' + b'n) &= \mu q \\ - \Omega an' + \Omega'''c'n - \Omega''(bn' - b'n) &= \mu q' \\ \Omega'''cn' - \Omega a'n + \Omega'(bn' - b'n) &= \mu q'' \\ - \Omega''cn' - \Omega'c'n - \Omega(bn' + b'n) &= \mu q'''\end{aligned}$$

ita ut q, q', q'', q''' fiant integri diuisorem communem non habentes, quod obtinetur accipiendo pro μ diuisorem communem maximum quatuor numerorum qui in his aequationibus sunt ad laeuam. Tunc igitur per art. 40 inueniri poterunt quatuor numeri integri P, P', P'', P''' tales ut fiat $Pq + P'p' + P''q'' + P'''q''' = 1$. Quo facto determinentur numeri p, p', p'', p''' per aequationes sequentes ... (II):

$$\begin{aligned}P'an' + P''a'n + P'''(bn' + b'n) &= p \\ - Pan' + P'''c'n - P''(bn' - b'n) &= p' \\ P'''cn' - Pa'n + P'(bn' - b'n) &= p'' \\ - P''cn' - P'c'n - P(bn' + b'n) &= p'''\end{aligned}$$

Tandem ponatur $q'q'' - qq''' = Ann'$, $pq''' + qp''' - p'q'' - q'p'' = 2Bnn'$, $p'p'' - pp''' = Cnn'$. Tunc A, B, C erunt numeri integri formae $(A, B, C) \dots F$ ex formis f, f' composita.

Dem. I. Ex aequatt. I et II nullo negotio confirmantur sequentes quatuor aequationes ... (III):

$$\begin{aligned}0 &= q'cn' - q''c'n - q'''(bn' - b'n) \\ 0 &= qcn' + q'''a'n - q''(bn' + b'n)\end{aligned}$$