

6. cvičení z PSt — 26. 3. 2026

Podmíněná střední hodnota

$$\mathbb{E}(X \mid B) = \sum_{x \in \text{Im}(X)} x \cdot P(X = x \mid B)$$

$$\mathbb{E}(X) = \sum_i P(B_i) \cdot \mathbb{E}(X \mid B_i)$$

$B_1, B_2, \dots$ je rozklad Ω

1. V kvízu je 20 otázek s volbami a,b,c,d. Za správnou odpověď (vždy je jen jedna odpověď správná) je 1 bod, za špatnou $-1/4$ bodu, za nevyplněnou otázku nula. Každá otázka je s pravděpodobností q jednou z těch, co se Kvído naučil a tedy zná správnou odpověď. Pokud správnou odpověď nezná, ví o tom, a může se rozhodnout, zda tipovat.

(a) Jaká je střední hodnota počtu bodů, které Kvído získá, pokud bude odpovídat jenom otázky, u kterých zná odpověď?

(b) A co když bude tipovat, když nezná správnou odpověď?

(c) Jak by se musela změnit penalizace za chybnou odpověď, aby byly odpovědi v částech (a), (b) stejné?

2. Můj počítač občas zlobí: každý den s pravděpodobností p zamrzne. Když se to stane dva dny po sobě, začnu to řešit. Jaký je střední počet dnů, než se to stane?

Rozptyl

Definice 1. *Rozptyl* náhodné veličiny X je

$$\text{var}(X) = \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))^2).$$

Dále definujeme *směrodatnou odchylku* $\sigma_X = \sqrt{\text{var}(X)}$ a *variační koeficient* $CV_X = \sigma_X / \mathbb{E}(X)$ (pokud $\mathbb{E}(X) > 0$).

Věta 2. *Platí následující vztahy:*

$$\begin{aligned} \text{var}(X) &= \mathbb{E}(X^2) - \mathbb{E}(X)^2 \\ \text{var}(aX + b) &= a^2 \text{var}(X) \\ \text{var}(X + Y) &= \text{var}(X) + \text{var}(Y) \end{aligned} \quad (\text{pokud } X \perp Y)$$

3. Spočtete přímo z definice rozptyl $\text{Uni}(a, b)$ – stačí pro $a = -2$, $b = 2$.

4. Buď $X \sim \text{Geo}(0.1)$ a $Y \sim \text{Geo}(0.01)$. Zvolte konstantu c tak, aby veličiny X a $Z = cY$ měly stejnou střední hodnotu. Porovnejte rozptyl, směrodatnou odchylku a variační koeficient pro X , Y , Z .

Náhodné vektory

Připomeňte si následující vztahy z přednášky:


$$\begin{aligned} p_{X,Y}(x, y) &:= P(X = x \ \& \ Y = y) && (\text{sdužená pravděpodobnostní funkce}) \\ p_{X|Y}(x|y) &:= P(X = x \mid Y = y) && (\text{sdužená pravděpodobnostní funkce}) \\ p_X(x) &= \sum_{y \in \text{Im}(Y)} p_{X,Y}(x, y) && (\text{marginalizace}) \end{aligned}$$

5. Označme X, Y výsledky dvou nezávislých hodů čtyřstěnnou kostkou (s čísly $1, \dots, 4$).
- Jaká je pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny $Z_1 = \max(X, Y)$?
 - Jaká je pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny $Z_2 = X + Y$?
 - Jaká je pravděpodobnostní funkce náhodné veličiny $Z_3 = XY$? (*Hint dole*)¹
6. (a) V předchozím příkladu: je větší $\mathbb{E}(Z_2)$ nebo $\mathbb{E}(X) + \mathbb{E}(Y)$? Spočtete obojí podle definice.
 (b) V předchozím příkladu: je větší $\mathbb{E}(Z_3)$ nebo $\mathbb{E}(X^2)$? Spočtete obojí podle definice.
7. Nezávislé náhodné veličiny $X_1, \dots, X_n$ mají geometrické rozdělení s parametry $p_1, \dots, p_n$. Jaké je rozdělení náhodné veličiny $M = \min(X_1, \dots, X_n)$?
8. Na kostce padne číslo i s pravděpodobností p_i pro $i = 1, \dots, k$. Hodíme n -krát a označíme X_i počet hodů, kdy padlo i .
- Najděte sdruženou pravděpodobnostní funkci pro náhodné veličiny $X_1, \dots, X_k$. (Bylo na přednášce!)
 - Jaké je marginální rozdělení, tj. rozdělení jednotlivých náhodných veličin X_i ?
 - V téhle části je $k = 3, n = 10, p_1 = p_2 = p_3 = 1/3$. Určete $p_{X_1|X_3}(4|4)$.

Kovariance a korelace

- $\text{cov}(X, Y) \stackrel{\text{def}}{=} \mathbb{E}((X - \mathbb{E}(X))(Y - \mathbb{E}(Y))) \stackrel{\text{věta}}{=} \mathbb{E}(XY) - \mathbb{E}(X)\mathbb{E}(Y)$
- $\text{cov}(X, X) = \text{var}(X)$
- $\text{cov}(X, Y)$ je lineární v obou složkách, tj. např. $\text{cov}(X, a_1 Y_1 + a_2 Y_2) = a_1 \text{cov}(X, Y_1) + a_2 \text{cov}(X, Y_2)$

9. Nezávislé náhodné veličiny X, Y mají střední hodnotu 0 a rozptyl 1. Položíme $Z_0 = Y, Z_1 = X + 0.3Y$ a $Z_2 = 0.4X + Y$. Spočtete $\text{cov}(X, Z_i)$ a také korelaci $\rho(X, Z_i)$. Který obrázek odpovídá kterému vzorci?



Distribuční funkce

Připomeňte si, že distribuční funkce F_X je definována vztahem

$$F_X(x) = P(X \leq x).$$

10. Pro náhodnou veličinu X s distribuční funkcí F_X vyjádřete
- $P(X \in (0, 1])$
 - $P(X > 0)$
 - $P(X < 0)$
 - $P(X \in [0, 1])$
11. Necht X splňuje $P(X = x) = 0$ pro každé x . Vyjádřete pomocí F_X distribuční funkci náhodných veličin
- $-X$.
 - $X^+ = \max(0, X)$,
 - $|X|$.

¹Jakých hodnot nabývá vektor (X, Y) , pokud $\max(X, Y) = k$? Resp. v dalších částech, pokud $X + Y = k$, resp. $XY = k$?

Exponenciální rozdělení

Říkáme, že X má exponenciální rozdělení, $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, pokud

$$F_X(x) = 1 - e^{-\lambda x} \quad \text{pro } x \geq 0, \text{ jinak } 0.$$

Na přednášce si ukážeme, že $\mathbb{E}(X) = 1/\lambda$.

12. Střední doba života harddisku je 4 roky. Přepokládejme, že tato doba je popsána náhodnou veličinou s exponenciálním rozdělením. (To není realistický předpoklad, viz např. <https://www.backblaze.com/blog/how-long-do-disk-drives-last/>.)

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že disk selže během prvních tří let?
- (b) Jaká je pravděpodobnost, že vydrží alespoň 10 let?
- (c) Po jaké době se rozbije 10 % disků?

13. Sledujeme noční oblohu a vyhlížíme meteory. Pro dnešní noc víme, že pravděpodobnost spatření meteoru během časového úseku dt je (pro malá dt) rovna $c \cdot dt$, situace v disjunktních časových intervalech považujeme za nezávislé. Jaká je pravděpodobnost, že během doby t nic neuvidíme? [Klidně předpokládejte, že t/dt je celé číslo. Taky zkuste napsat $dt = 1/n$ a vzpomenout si na limity z analýzy.]

Bonus

14. Necht $X \sim \text{Bin}(m, p)$, $Y \sim \text{Bin}(n, p)$, veličiny jsou nezávislé. Napřed si ujasněte, že $X + Y$ má rozdělení $\text{Bin}(m+n, p)$ (kvůli „pohádce“ o významu binomického rozdělení). Pak to ověřte pomocí konvolučního vzorce a sečení sumy.

K procvičení

15. Necht F_X je dána předpisem $F_X(x) = x/3$ pro $x \in [0, 3]$, $F_X(x) = 0$ pro $x < 0$ a $F_X(x) = 1$ pro $x > 3$. Necht $Y = 1/X$ a $Z = X^2$. Spočtete

- (a) $P(1 \leq X \leq 2)$
- (b) $P(X \leq Y)$
- (c) $P(X \leq Z)$
- (d) hustotu f_X .
- (e) dist. F_Y, F_Z .

16. Plutonium-238 má poločas rozpadu 87.7 let. Jeho rozpad budeme modelovat pomocí exponenciálního rozdělení: pro každý atom budeme čas, za který se rozpadne, považovat za nezávislou náhodnou veličinu s rozdělením $\mathbb{E}(\lambda)$.

- (a) Jaké je λ ?
- (b) Jaká je střední doba života atomu plutonia-238?
- (c) Po jaké době se rozpadne 90 % atomů?
- (d) Kolik procent atomů se rozpadne po 50 letech? (Některé kardiostimulátory používají plutonium-238 jako zdroj energie. https://en.wikipedia.org/wiki/Plutonium-238#Nuclear_powered_pacemakers)

17. Doba, za kterou uvidíme meteor, je exponenciálně rozdělená se střední hodnotou 1 (minuta).

- (a) Jaká je pravděpodobnost, že budeme muset čekat více než 5 minut?
- (b) Jaká je pravděpodobnost, že se dočkáme za nejvýše jednu minutu?
- (c*) Jaké je rozdělení času, kdy uvidíme druhý meteor? Třetí, ... (Předpokládáme, že jednotlivé meteory jsou navzájem nezávislé.)

18. Necht $U \sim U(0, 1)$ a $p \in [0, 1]$. Uvažme funkci

$$g(t) = \begin{cases} 0 & \text{pro } x > p \\ 1 & \text{pro } x \leq p \end{cases}$$

Co můžete říct of n.v. $X = g(U)$? Spočtete její střední hodnotu dvěma způsoby.

19. Bublifikem vyfoukneme bublinu o poloměru $R \sim U(1, 5)$. Jaká je střední hodnota povrchu bubliny?