3.Keyingi yillarda mamlakatimizda takroriy ekinlardan mahsulot yetishtirish hajmi va uni eksport qilish salohiyati qanday darajada?
4.Insonlarning ibtidoiy jamiyatda yashagan davrlarida qishloq xo‘jaligi bo‘yicha ilk tushunchalari qanday bo‘lgan?
5.Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish bo‘yicha dastlabki ilmiy tushunchalar qachon va kimlar tomonidan ishlab chiqilgan?
6.Almashlab ekish sohasi fan sifatida qachon to‘liq shakllangan?
7.Almashlab ekish sohasini fan sifatida shakllanishi hamda uni qishloq xo‘jalik sohasining ajralmas bir bo‘lagiga aylanishiga xissa qo‘shgan qaysi olimlarni bilasiz?
8.Respublikamiz zamonaviy dehqonchiligida, mustaqillik yillarida yangi qisqa navbatli almashlab ekish yo‘nalishida qaysi olimlar tomonidan qanday ishlar amalga oshirilgan?

2-MAVZU: QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING TUPROQ UNUMDORLIGI, EKINLARNI HOSILDORLIGINI OSHIRISH VA SIFATINI YAXSHILASHDAGI AHAMIYATI

REJA:

1. Respublikada mavjud tuproqlar va ularning unumdorlik xolati
2. Agronomiyada almashlab ekishning zarurati va strategiyasi

Tayanch tushunchalar: Tuproq turlari, sahro tuproqlari,tuproq sho‘rlanishi,ball bonitet (tuproq sifati ko‘rsatkichi), degumifikatsiya

2.1. Respublikada mavjud tuproqlar va ularning unumdorlik xolati

O‘zbekistonni relefi jihatidan ikkiga bo‘lish mumkin: tekislik (sahro zonasi) va tog‘oldi tog‘ tekislik. Bu yerlarda sahro qum, taqir, taqirsimon, sur tusli qo‘ng‘ir, sho‘rxoklar, introzonal shaklida o‘tloqi allyuvial, o‘tloqi soz va o‘tloqi botqoq tuproqlari, tog‘oldi va tog‘ qismida esa bo‘z tuproqlar (och tusli, tipik, to‘q tusli), ko‘ng‘ir, och qo‘ng‘ir, to‘q qo‘ng‘ir va boshqalar tarqalgan. Taqir va taqirsimon tuproqlar Amudaryo, Qashqadaryo, Sheroboddaryo va bu daryolarning qadimgi allyuvial tekisliklarida, Zarafshon vohasi va Surxondaryo viloyatlarida keng tarqalgan. Bu

tuproqlarning tarkibida karbonatlar miqdori 8-10, chirindi 0,56-0,8 foizni tashkil etib, turli darajada sho‘rlangan, sug‘oriladigan taqirsimon tuproqlardagi agroirrigatsiya qatlami dehqonchilikda suv bilan oqib kelgan loyqa, o‘g‘itlash, almashlab ekish, meliorativ ishlarni olib borishda hosil bo‘lib, ularning qatlami 30-40 sm. dan 1,0-1,5 m. atrofidadir.

Sahro qum tuproqlari. Ushbu tuproqlar Qizilqum va boshqa qumli sahrolarda tarqalgan bo‘lib, uning usti (gumusli qatlami) 5-7 sm. ni tashkil etadi, u yumshoq bo‘lib, pastki qatlamlar namini himoyalashga yordam beradi. Bu tuproqlarda gumus miqdori 0,4-0,5 foiz atrofida bo‘lib, tuproqning ustki qatlamining mexanik tarkibi nihoyatda yengil bo‘lganligi uchun kapillyarlar (naychalar) kam rivojlangan va shuning uchun ham ular unchalik sho‘r emas, lekin pastki qatlamlari sho‘r bo‘lganligi sababli melioratsiyaga muhtoj.

Sahro o‘tloqi allyuvial tuproqlarda sizob suvlar chuqurligi 1-3 metr atrofida bo‘lib, asosan daryolarning atrofi va deltasida tarqalgan. Bu tuproqlarda chim hosil bo‘lib, rangi suv keltirmalar rangiga o‘xshash, gumus miqdori 1,5-2,0 foizni tashkil etadi. Tuproqlarning aksariyati sho‘rlangan, tog‘ va tog‘ oldi qismi esa sho‘rlanmagan.

O‘tloqi soz tuproqlari ham ikkiga bo‘linib, sahro qismida rivojlangani sho‘r, bo‘z tuproqlar tarqalgan qismida sho‘rlanmagan, sahro zonasida joylashganida gumus 1,0-1,5 foiz, bo‘z tuproqli qismida 1,5-2,0 foiz bo‘lib, dehqonchilik hududlarida tegishlicha 0,7-0,8, 0,8-1,5 foizgachadir.

So‘r tusli qo‘ng‘ir tuproqlar asosan Buxoro, Qashqadaryo viloyatlari, qisman Farg‘ona vodiysi hududlarida joylashgan Namangan, Farg‘ona viloyatlari, Qoraqalpog‘iston Respublikasida tarqalgan. Bu tuproqlar sho‘r bo‘lib, pastki qatlamlar gips (ganch) bilan qoplangan. Gumus 0,5-1,0 foiz atrofida, sug‘organda gips erib, pastki qatlamlarda bo‘shliq hosil bo‘ladi, bu o‘z navbatida ekinni, xususan daraxt ildizlarini o‘sish va rivojlanishiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi. Masalan, Malik cho‘li bog‘laridagi daraxtlar shu hodisa tufayli qurib qolgan (1, 2-jadvallar).

Hozirda respublikaning 44892,4 ming gektar umumiy maydonidan qishloq xo‘jaligida foydalanadigan qismi 27521,6 ming gektarni tashkil etadi. Ular turli tabiiy tuproq-iqlimga ega bo‘lgan qishloq xo‘jalik

hududlarida joylashgan bo‘lib, jadal dehqonchilik asosan meliorativ, ekologik holati hamda tuproqlarining unumdorlik darajasi bir-biridan keskin ajralib turadigan 4278,0 ming gektar sug‘oriladigan yerlarda olib borilmoqda. Afsuski, ana shu maydonlarning qariyb 66 % ida meliorativ holat qoniqarsiz, 1,5 mln. gektardan oshiqrog‘i deflyatsiyaga, shu jumladan 0,7 mln. gektari kuchli deflyatsiyaga uchragan, 660 ming gektar yerda irrigatsiya eroziyasi, 40 ming gektar maydonda jar eroziyasi mavjud bo‘lib, sug‘orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarda tuproq unumdorligini muttasil pasayish tendensiyasi kuzatilmoqda.

Ta’kidlash kerakki, keyingi yillarda respublika tuproqlarini fosfor va kaliy bilan ta’minlanganlik darajasi ham tushib ketgan. Keyingi 40 yil davomida fosfor bilan “juda kam” ta’minlangan maydonlar 170,6 ming, “kam” ta’minlangan maydonlar 149,4 ming gektarga ko‘paygan bo‘lsa, ta’minlanganligi “yuqori” darajadagi maydonlar 26 ming, “juda yuqori”ga mansub maydonlar 97 ming gektarga kamaygan. Tuproqlardagi kaliy miqdori bo‘yicha ta’minlanganlik darajasi “juda kam” bo‘lgan maydonlar 140 ming gektarga, “kam” darajada ta’minlangan maydonlar 215 ming gektarga, “o‘rtacha” ta’minlangan maydonlar 89 ming gektarga ko‘paygan bo‘lsa, ta’minlanganlik darajasi “yuqori” va “juda yuqori” bo‘lgan maydonlar tegishli ravishda 63,3 ming gektarga kamaygan.

1-jadval

O‘zbekistonning asosiy tuproqlari maydoni

Tuproqlar	Maydoni, ming/ga	Hamma maydondan, %	Dengiz sathidan balandligi, m
Sahro-tekislik zonasi[x)]			
Bo‘z-qo‘ng‘ir	11488	25,3	150-250
Sahro qum tuproqlar	1372	3,04	120-150
Taqirsimon va taqirlar	1784	3,96	120-180
O‘tloqlashgan taqirsimon	465	1,02	120-150
O‘tloqi va botqoq o‘tloqi	1854	4,12	80-100
Sho‘rxoklar	1272	2,81	80-100
Bekitilmagan qumlar	12114	17,54	120-150
Suv havzasi	1118	3,14	
Tog‘ oldi va tog‘ zonasi			
Och tusli bo‘z	2592	5,74	250-500

Tipik bo‘z	3051	6,77	500-750
To‘q tusli bo‘z	1055	2,33	750-1200
O‘rta tog‘da tarqalgan jigar rang va qo‘ng‘ir	1662	3,68	1200-2800
Och tusli qo‘ng‘ir baland tog‘	540	1,19	2800-3500
O‘tloqlashgan bo‘z	781	1,72	250-500
O‘tloqi va botqoq o‘tloqi	748	1,64	250-500
Qoyali yerlar	2992	6,0	-
Jami	44892[x)]	100	

Talipov G.A “Земелные ресурсы Узбекистана и проблемы роционального исползования», Tashkent, 1992, b. 23. professor K.Mirzajanov taxriri ostida.

[x)] Ba’zi, raqamlarda unchalik katta bo‘lmagan o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.

2-jadval

Sug‘oriladigan tuproqlarning asosiy agrokimyoviy xossalari (0-50 sm)[x)]

Tuproqlar	Fizik loy, %	Singdirish qobiliyati, m-ekv/100 g tuproqda	Gumus, %	Azot, %	Fosfor, %	Kaliy, %
Taqirsimon va bo‘z-qo‘ng‘ir	48-62	11-16	0,5-1,1	0,64-0,09	0,11-0,16	1,6-2,0
Och tusli bo‘z	33-48	8-13	0,6-1,3	0,05-0,11	0,12-0,18	1,6-2,3
Qadimdan sug‘orib kelinayotgan bo‘z	45-51	9-14	1,2-2,5	0,9-0,14	0,16-0,29	1,9-2,7
O‘tloqlashib borayotgan bo‘z	37-53	10-14	0,8-1,7	0,05-0,12	0,13-0,18	1,5-1,9
O‘tloqi	28-46	7-13	1,8-2,6	0,05-0,18	0,013-0,17	1,4-2,2
Qadimdan sug‘oriladigan o‘tloqi	36-55	9-13	2,2-2,9	0,10-0,16	0,15-0,2	0,8-1,8
Botqoq o‘tloqi	46-64	15-20	3,0-4,0	0,15-0,20	0,17-0,2	1.5-1,6

Talipov G.A. “Земелные ресурсы Узбекистана и проблемы роционального исползования”. Tashkent, 1992, b. 25. professor K.Mirzajanov taxriri ostida.

[x)] Raqamlarda unchalik katta bo‘lmagan o‘zgarishlar bo‘lishi mumkin.

Ko‘rinib turibdiki, keyingi 30-40 yil davomida respublikadagi mavjud sug‘oriladigan maydonlar tuproqlarining asosiy unumdorlik ko‘rsatkichlari, gumus, azot, fosfor va kaliy miqdorlari kamaygan va tobora kamayib bormoqda.

Keyingi 40 yilda respublikamiz tuproqlarining 0-30 sm. qatlamida gumus miqdori 0,15 % ga, ya’ni gektariga 5,61 tonnaga kamayganligi, ayniqsa ushbu ko‘rsatkichlar Toshkent viloyatida 0,42 % ga (16,25 tonna), Buxoro viloyatida 0,23 % ga (8,77 tonna), Surxondaryo viloyatida 0,21 % ga (8,25 tonna), Andijon viloyatida 0,20 % ga (7,70 tonna), Qashqadaryo viloyatida 0,16 % ga (6,44 tonna) kamayganligi, sug‘oriladigan tuproqlardagi umumiy azot miqdori o‘tgan davr mobaynida respublika bo‘yicha o‘rtacha 0,010 % ga, ya’ni gektariga 380 kg miqdorida kamayganligi, ayniqsa, ushbu ko‘rsatkichlar Farg‘ona viloyatida gektariga 0,019 % ga (740 kg), Buxoro, Surxondaryo va Sirdaryo viloyatlarida 0,017 % dan (660 kg.dan), Toshkent viloyatida 0,016 % (620 kg), Andijon, Namangan va Qashqadaryo viloyatlarida esa 0,010 % (390 kg) ni tashkil etmoqda.

Respublikaning sug‘oriladigan tuproqlarining sifat bahosi tahlil etilganda respublikadagi mavjud tuproqlarning o‘rtacha ball boniteti 55 ballni tashkil etmoqda. Viloyatlar kesimida tuproqlarda eng yuqori ball boniteti Namangan viloyatida 60,0 ballni, Samarqand viloyatida 59,3 ballni, Toshkent viloyatida 59,0 ballni, Andijon viloyatida 57,5 ballni, Surxondaryo va Farg‘ona viloyatlarida 56,0 ballni tashkil etadi. Mazkur ko‘rsatkichlar respublikadagi o‘rtacha ball boniteti ko‘rsatkichlaridan yuqori hisoblanadi. Nisbatan past ko‘rsatkichlar Qoraqalpog‘iston Respublikasida 41,3 ball, Buxoro va Jizzax viloyatlarida 51,0 ball, Qashqadaryo viloyatida 52,5 ball, Navoiy viloyatida 53,2 ball, Xorazm viloyatida 54 ballni ko‘rsatmoqda.

Yuqorida keltirilgan ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, tuproqning meliorativ holatini yomonlashishi, tuproq unumdorligini oshiruvchi asosiy omillar, xususan almashlab ekish tizimlarini amaliyotga keng, to‘liq joriy etilmayotganligi, deflyatsiya-eroziya jarayonlarini kuchayishi, tuproqqa asosiy ishlov berish tizimiga to‘liq amal qilmaslik, haydov va haydov osti

qatlamlarida tuproq zichlanishini ortishi, har xil kimyoviy vositalar bilan ifloslanishi, o‘simliklarni oziqlantirish tartiblari hamda biomassa bilan tuproqdan chiqib ketayotgan oziqalarning tuproqqa qaytarilishi kabi tabiat qonunining to‘liq ishlamayotganligi respublikada tuproq unumdorligini pasayishiga hamda agroekologiyasini yomonlashishiga sabab bo‘lmoqda.

2.2. Agronomiyada almashlab ekishning zarurati va strategiyasi

Mazkur mavzuni boshlashdan oldin qishloq xo‘jaligida ekinlarni almashlab ekishning zarurati to‘g‘risida qisqacha to‘htalib o‘tamiz.

Bugungi kunda dunyo bo‘yicha zamonaviy dehqonchilikning mahsuldorligi asosan mineral o‘g‘itlar, pestitsidlar, o‘sishni sozlovchi moddalar, meliorantlar va boshqa kimyoviy vositalarga bog‘liq bo‘lib qolganligi hech kimga sir emas. Bu bilan dunyoda mineral o‘g‘itlar ishlab chiqaruvchi kimyo sanoati har qancha maqtansa arziydi. Manbalarga ko‘ra, keyingi 50-60 yilda mineral o‘g‘itlarning mahsulot ishlab chiqarishdagi samaradorligi 40-45 % ni tashkil etmoqda. Agar bu xaqiqatga yaqin bo‘lsa, unda akademik Yu.Libixning “...tuproq agrotsenozidagi mahsuldorlik va hosilning sifati tuproqning o‘simliklar organizmida doimo uchraydigan hamda ma’lum bir biologik jarayonlarni bajaradigan elementlar (biofil elementlar) miqdoriga bog‘liq” degan nazariyasi shubha ostiga qoladi.

Adabiyotlarga nazar tashlansa, o‘tgan asrning ikkinchi yarmidan boshlab butun dunyo ilm ahli yer sharida tuproq resurslarining holati hamda ekologik tizimning tobora yomonlashib borayotganligidan tashvishga tushgan va 90-yillardan boshlab mazkur salbiy holatni oldini olish bo‘yicha tegishli tadbirlar amalga oshirilgan.

Tuproqlar holatini yomonlashishiga sabab bo‘layotgan omillar sirasiga-tuproq degradatsiyasi, eroziyasi, sho‘rlanishi, degumifikatsiya, iste’mol va ishlab chiqarish chiqindilari, parazit va toksik moddalar hamda boshqa xavfli biologik moddalar bilan ifloslanishi va buni bir so‘z bilan tuproq patologiyasi deb atash mumkin. Masalan, birgina pestitsid qoldiqlari tuproq, suv va yerusti havo qatlamiga hamda o‘simlik mahsulotlari sifatiga zarar etkazsa, ishlab chiqarish zonalari va magistral yo‘l bo‘yida joylashgan dalalar doimiy ravishda toksik og‘ir metallar bilan ifloslanadi. Bu esa tuproqda kasallik qo‘zg‘atuvchi fitopatogenlarni ko‘payishiga olib keladi,

fitopatogenlarni ko‘payishi esa o‘simliklarni mineral o‘g‘itlardan foydalanish samaradorligini keskin pasaytirib yuboradi.

FAO ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda dunyo bo‘yicha degradatsiyaga uchragan va nosog‘lom yerlar maydoni 1,2 mlrd. gektarni yoki dunyo bo‘yicha jami ekin ekiladigan maydonni 22 % ini tashkil etmoqda. Bu esa har yili qishloq xo‘jaligi ekinlaridan olinadigan hosilni 25 %ini yo‘qotish demakdir.

Ma’lumki, aholi sonini o‘sib borishi bilan insonlarni oziq-ovqat va moddiy boyliklarga bo‘lgan talabi ham oshib boraveradi. Bundan kelib chiqib, mahsulot ishlab chiqarish hajmini oshirish, qishloq xo‘jalik ekinlaridan yanada ko‘proq hosil olishga bo‘lgan intilish o‘z-o‘zidan paydo bo‘ladi.

Manbalarga ko‘ra, birgina Orol dengizining qurib borishi natijasida Orolning qurigan tubidan ko‘tarilayotgan tuzli chang 300-400 km radiusda atrofga yoyilmoqda. Bundan tashqari, qishloq xo‘jaligi ekinlarini parvarishida yo‘l qo‘yilayotgan ba’zi bir nuqsonlar (yerga ishlov berish, noto‘g‘ri sug‘orish, va x.k), yerlarning ifloslanishi, sanoat chiqindilari kabi tabiiy va antropogen omillar ham cho‘llanishni ortib borishi hamda tuproqlar unumdorligini pasayib borishiga bosh omil bo‘lib qolmoqda.

Buni tahlillar orqali olingan ushbu ma’lumotlarda ko‘rish mumkin. Keyingi 40 yilda respublikadagi mavjud sug‘orib dehqonchilik qilinadigan maydonlarning haydov qatlamida gektariga 5 tonna gumus, 0,4 tonna azot moddasi kamaygan, ta’minlanganlik darajasiga ko‘ra fosfor va kaliy bilan o‘rta hamda yuqori darajada ta’minlangan maydonlar hajmi qisqargan.

Fikrimizga dalil sifatida Paxta seleksiyasi, urug‘chiligi va yetishtirish agrotexnologiyalari ilmiy tadqiqot institutida qariyb 100 yildan buyon o‘tkazib kelinayotgan “Muttasil g‘o‘za va g‘o‘za-beda almashlab ekish dalalarida tuproqning unumdorlik qobiliyati” noyob tajribasidan olingan ma’lumotlarga ko‘ra, har yili kuzgi shudgor ostiga gektariga 30 tonna go‘ng qo‘llanilib, muttasil g‘o‘za parvarish qilib kelingan bo‘lakda o‘tgan 100 yilda gumus miqdori dastlabki miqdoriga nisbatan 36 tonnaga (dastlabki miqdori gektariga 68 tonna bo‘lgan) kamaygan, ya’ni har yili paxtadan o‘rtacha 29,0-31,0 s/ga hosil olingan xolda har yili gektariga o‘rtacha 367 kg. gumus turli omillar ta’sirida tuproqdan chiqib ketgan. Yoki ma’dan

o‘g‘itlarning NPK 250:175:125 kg/ga me’yori qo‘llanilgan bo‘lakda har yili o‘rtacha 36,0-38,0 s/ga paxta hosili olingan xolda gumus 22 tonnaga kamayib (dastlabki miqdori 53 tonna bo‘lgan), har yili o‘rtacha 225 kg.dan kamayib borgan. 100 yil davomida g‘o‘zani parvarish qilishda o‘g‘itlarning hech qanday turi qo‘llanilmagan (absolyut variant) bo‘lakda esa har yili paxtadan o‘rtacha 8,0-9,0 s/ga hosil olingan xolda gumus miqdori 24 tonnaga kamayib, har yili o‘rta hisobda 245 kg.dan kamayib borgan.

Ma’lumotlardan ko‘rinadiki, hech qanday o‘g‘itlar qo‘llamagan xolda respublikamiz tuproqlarining tabiiy unumdorligi 8,0-9,0 s/ga paxta hosili olishga imkon beradi hamda har yili shu miqdordagi paxta hosilini olish uchun tuproqdan o‘rta hisobda gektariga 245-250 kg miqdorida, ma’dan o‘g‘itlarning NPK 250:175:125 kg/ga me’yori qo‘llanilgan xolatda gektariga o‘rtacha 220-225 kg, har yili shudgor ostiga 30 tonna go‘ng qo‘llanilgan sharoitda esa 365-370 kg miqdorida gumus sarflanadi.

Demak, respublikamiz tuproqlarida g‘o‘zani parvarish qilishda qo‘llanilgan har qanday agrotexnik xolatda ham olingan hosil miqdoriga qarab har yili tuproqdan o‘rta hisobda gektariga 220 kg.dan 370 kg.gacha gumus sarflanadi degan xulosaga kelishimiz mumkin.

Tuproq ifloslanishini yana bir turi-bu uning og‘ir, toksik metallar bilan ifloslanishidir. Bunday ifloslanish turi ko‘pincha sanoat zonalari va avtomagistral bo‘ylarida joylashgan dalalarda kuzatiladi. Biz yuqorida keltirgan mazkur dala tajribasi ham ikkinchi darajali avtomobil yo‘li bo‘yida joylashgan bo‘lib, tuproqdagi toksik og‘ir metallar miqdori aniqlanganda, kobalt (Co) va xrom (Cr) miqdorlari o‘sha xudud uchun belgilangan me’yordan 2-3 barobar past ekanligi, ammo kadmiy (Cd), mis (Cu) va nikel (Ni) miqdorlari gektariga mos ravishda mahalliy o‘g‘it qo‘llanilgan bo‘lakda belgilangan me’yordan 26,8; 353,0; 146,0 %, ma’dan o‘g‘itlarni yuqori me’yori qo‘llanilgan bo‘lakda 4,2; 286,0; 142 %, o‘g‘it qo‘llanilmagan bo‘lakda esa 28,6; 291,0; 134 %ga yuqori bo‘lgan. Ushbu toksik moddalarni tuproqda belgilangan me’yordan yuqori bo‘lishi tuproqdagi mikrobiologik jarayonlarga (masalan gumifikatsiya), o‘simliklarni tuproqdagi kerakli oziqa moddalarni o‘zlashtirish samaradorligiga va eng muhimi iste’mol qilinadigan mahsulotlar orqali inson organizmiga salbiy ta’sir etadi. Demak, tuproqlarni toksik, og‘ir

metallar bilan ifloslanishi bevosita tuproqlarda unumdorlikni pasayib borishiga sabab bo‘luvchi yana bir salbiy omil hisoblanadi.

Yuqorida keltirilgani kabi tuproq unumdorligini pasaytiruvchi, tuproqda nosog‘lom muhitni paydo qiluvchi omillar tabiatda juda ko‘p uchraydi, ular to‘g‘risida ko‘plab misollar keltirish mumkin. Shuning uchun ham dehqonchilikda, u qaerda va qaysi sharoitda olib borilmasin birinchi navbatda ekinlarni ilmiy asosda almashlab ekish bosh va muhim omil hamda zarurat hisoblanadi.

Xo‘sh, shunday ekan qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekishda strategiyani qanday belgilash kerak?. Asosan nimalarga e’tibor qaratish talab etiladi?.

Ma’lumki, qishloq xo‘jaligida ekinlardan yuqori va sifatli hosil olish va mehnat unumdorligini oshirish dehqonchilik madaniyatiga bog‘liqdir. Tuproq unumdorligi esa dehqonchilik madaniyatiga qarab o‘zgarib turadi. Dehqonchilik madaniyati qanchalik yuqori bo‘lsa, tuproq unumdorligi ham oshib boraveradi, aksincha tuproqqa beparvolarcha munosabatda bo‘lish, dehqonchilikda zamonaviy bo‘lmagan usullarni qo‘llash tuproq unumdorligini pasayishiga olib keladi. Agarda qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish uzoq yillarga mo‘ljallangan strategiya asosida olib borilsa, yuqorida keltirilgan salbiy xolatlarni oldi olingan bo‘ladi.

Chunki, aksariyat mamlakatlarda qishloq xo‘jaligini rivojlantirishdagi asosiy masala tuproq unumdorligini saqlash va oshirish bo‘lib, mazkur masala ishlab chiqilgan ma’lum bir strategiya asosida muntazam ravishda ilmiy-tadqiqot ishlari olib boriladi va maqbul natijalar ishlab chiqarishda joriy etiladi.

Shuning uchun ham qishloq xo‘jaligi rivojlangan davlatlarda ilmiy asoslangan almashlab ekish tizimlari orqali ekinlardan ekologik sof, mo‘l va sifatli hosil olishga, tuproq unumdorligini saqlash va oshirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar dolzarb hisoblanadi.

Qishloq xo‘jaligi ekinlarini almashlab ekish strategiyasi uzoq yillik muddatga belgilangan bo‘lib, uni tuzishda birinchi navbatda tuproq-iqlim sharoiti, tuproq unumdorligidagi jiddiy o‘zgarishlar, aholini nisbatan ko‘proq kundalik iste’mol qiladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari turi, mahsulot olinadigan ekinlar biologiyasi hamda dunyo mamlakatlarining

mamlakatimizda ishlab chiqarilayotgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlariga bo‘lgan talabi bo‘yicha eksport hajmiga e’tibor qaratiladi.

Masalan, mamlakatimiz aholisini un va un mahsulotlariga bo‘lgan talabini o‘zimizda yetishtirilgan don hisobiga to‘la ta’minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 1994 yil 12 dekabrdagi №597-sonli qarori qabul qilindi. Qarorning asosiy mohiyati paxta yakkaxokimligiga barham berish, paxtadan bo‘shagan maydonlarga kuzgi boshoqli don ekinlari joylashtirish, ularning maydonini kengaytirish va qisqa fursatlarda don mustaqilligiga erishishdan iborat edi. Ana shu zarurat sababli respublikadagi qishloq xo‘jaligi ekinlari strukturasiga paxtadan va bedadan bo‘shagan maydonlarga kuzgi boshoqli-don ekinlarini kiritish uchun har tomonlanma ilmiy asoslangan strategiya ishlab chiqildi va bu strategiya bo‘yicha keng qamrovli ilmiy tadqiqot ishlari ishlari olib borildi, olingan maqbul ilmiy natijalar ishlab chiqarishda o‘z samarasini berib, mamlakatimiz don mustaqilligini (2003 yilda) ta’minlashda zamin bo‘lib xizmat qildi.

Nazorat va muhokama uchun savollar.

1. Respublikamizda dehqonchilik qilinadigan xududlarida necha xil tuproq turi mavjud?
2. Hozirga vaqtda ularning unumdorlik xolati qanday?
3. Tuproqlar unumdorligini pasaytiruvchi omillarga nimalar kiradi?
4. Qishloq xo‘jaligi ekinlarini alamashlab ekishning zaruriyligi nimalarga bog‘liq?
5. Qishloq xo‘jaligi ekinlarining strategiyasini belgilashda nimalarga e’tibor berish kerak?

3-MAVZU: QISHLOQ XO‘JALIGI EKINLARINI ALMASHLAB EKISHNING ILMIY ASOSLARI

REJA:

1. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekish to‘g‘risida umumiy tushunchalar
2. Qishloq xo‘jalik ekinlarini almashlab ekishning klassifikatsiyalari
3. Almashlab ekishning kimyoviy, fizik va biologik asoslari