

1 数理统计的基本概念

1.1 总体，样本，统计量

总体: 研究对象全体, 可以用一个随机变量 X 及其分布 F 表示

个体: 总体中的每一个成员

抽样: 按照一定法则, 从总体中抽取部分个体观测的过程, 常用有不放回抽样和放回抽样, 在样本容量相对总体过小时这两个方法可以视为等同

样本: 抽样选中的部分个体, 用 n 个随机变量来表示

样本容量: 样本中个体的数量

样本观测值: 由样本中的 n 个随机变量观察得到的 n 个数据

简单随机抽样满足: 1) 代表性: 总体中每个个体都有相同的被抽到的概率, 则样本中 n 个随机变量和总体 X 有相同的分布

2) 独立性: n 个随机变量相互独立

简单随机样本: 由简单随机抽样得到的样本

统计量: 设 X_1, X_2, \dots, X_n 是总体 X 的一个样本, 若 $T = T(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 是样本的函数, 且不含任意未知参数, 则称 T 是一个统计量

常见统计量: 样本均值:

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

样本方差:

$$S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$$

样本标准差:

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

样本 k 阶原点矩:

$$A_k = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$$

极大次序统计量:

$$X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

极小次序统计量:

$$X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$$

1.2 常用统计量的分布

1.2.1 标准正态

1.2.2 χ^2 分布

1. χ^2 分布: 设 X_1, X_2, \dots, X_n 相互独立且服从标准正态分布, 则

$$\chi^2 = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_n^2$$

服从自由度为 n 的 χ^2 分布, 记为 $\chi^2(n)$, 其密度函数为:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2^{(n/2)}\Gamma(\frac{n}{2})} e^{-\frac{x}{2}} x^{\frac{n}{2}-1} & x > 0, \\ 0 & x \leq 0 \end{cases}$$

2. 性质 1) 可加性: 若 $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 则 $X + Y \sim \chi^2(n + m)$

2) $E[\chi^2(n)] = n, D[\chi^2(n)] = 2n$

1.2.3 t 分布

1. 设 $X \sim N(0, 1), Y \sim \chi^2(n)$, 且 X 和 Y 相互独立, 则

$$t = \frac{X}{\sqrt{Y/n}}$$

服从自由度为 n 的 t 分布, 记为 $t(n)$, 其密度函数为

$$f(X) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\sqrt{n\pi}\Gamma(\frac{n}{2})} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{n+1}{2}}$$

当 n 充分大时, t 分布可以看作标准正态

1.2.4 F 分布

1. $X \sim \chi^2(n), Y \sim \chi^2(m)$, 且 X, Y 相互独立, 则

$$F = \frac{X/n}{Y/m}$$

服从自由度为 n, m 的 F 分布, 记为 $F(n, m)$

2. 性质: 1) $X \sim F(n, m)$, 则 $\frac{1}{X} \sim F(m, n)$

2) 若 $t \sim t(n)$, 则 $t^2 \sim F(1, n)$