

Lois de probabilité et estimation

FX Jollois

TC - 2ème année - 2021/2022

Rappels de probabilités : Définitions

- Expérience aléatoire : expérience dont le résultat ne peut pas être déterminé *a priori*
- Univers de l'expérience : ensemble des résultats possibles (noté Ω)
- Résultat élémentaire : résultat possible de l'expérience (noté ω)
- Ensemble des parties : ensemble constitué de tous les sous-ensembles possibles de Ω (noté $\mathcal{P}(\Omega)$)
- Événement (aléatoire) : partie (sous-ensemble) de Ω (noté A)
 - On parle de *réalisation* lorsque l'événement se produit (i.e le résultat ω appartient au sous-ensemble A)
 - $A = \Omega$ se réalise toujours
 - $A = \emptyset$ ne se réalise jamais
 - $A = \{\omega\}$ s'appelle donc un événement élémentaire

Exemple simple

Lancer d'un dé à 6 faces (non pipé), avec un jeu où on doit faire un nombre pair

- $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$
- $\mathcal{P}(\Omega)$: ensemble des 64 sous-ensembles possibles
 - \emptyset et Ω
 - $\{1\}, \{2\}, \dots$
 - $\{1, 2\}, \{1, 3\}, \dots$
 - $\{1, 2, 3\}, \{1, 2, 4\}, \dots$
 - \dots
- $A = \{2, 4, 6\}$

Rappels de probabilités : Evènements

- Complémentaire de A : évènement constitué des éléments de Ω non inclus dans A
 - $\bar{A} = \{\omega \in \Omega, \omega \notin A\}$
- Réunion de A et B : évènement constitué des éléments de A et des éléments de B (ou aux deux donc)
 - $A \cup B = \{\omega \in \Omega, \omega \in A \text{ ou } \omega \in B\}$
- Intersection de A et B : évènement constitué des éléments de Ω étant à la fois dans A et dans B
 - $A \cap B = \{\omega \in \Omega, \omega \in A \text{ et } \omega \in B\}$

Rappels de probabilités : Evènements

- Inclusion : A est inclus dans B si tous les éléments de A sont dans B
 - $A \subset B \Leftrightarrow (\omega \in A \implies \omega \in B)$
- Disjonction (ou incompatibilité) : A et B sont disjoints s'il n'y a aucun élément commun entre les deux
 - A et B disjoints $\Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$
- Système complet d'évènements : (A_1, A_2, \dots, A_n) constitue un système complet s'ils forment une partition de Ω
 - Ils sont 2 à 2 incompatibles : $\forall p \neq q, A_p \cap A_q = \emptyset$
 - Leur réunion est égale à Ω : $\bigcup_{p=1}^n A_p = \Omega$

Rappels de probabilités

Probabilité : fonction permettant de mesurer la chance de réalisation d'un évènement

Quelques opérations :

- $P(\emptyset) = 0$
- $0 \leq P(A) \leq 1$
- $P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i)$
- $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$
- $P(A) \leq P(B)$ si $A \subset B$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- $P(\bigcup_i A_i) \leq \sum_i P(A_i)$

Rappels de probabilités

- Probabilité conditionnelle de A sachant B

$$P(A/B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

- Indépendance de 2 évènements A et B

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

$$P(A/B) = P(A)$$

$$P(B/A) = P(B)$$

- 2 évènements disjoints ne sont pas considérés comme indépendant
- Théorème de Bayes

$$P(A/B) = \frac{P(B/A)P(A)}{P(B)}$$

Variable aléatoire

Variable aléatoire

Mesure d'un phénomène (*variable*) dont le résultat est déterminée par une expérience *aléatoire* (i.e. dépendant du hasard)

- Exemples classiques : Pile/Face ou Lancer de dé
- Chaque résultat d'une expérience : **issue**
- Ensemble de toutes les issues possibles : **univers des possibles Ω**
- Sous-ensemble de Ω : **événement**
 - Si ensemble à une seule issue *événement élémentaire*
- Possibilité d'associer une valeur réelle à chaque issue
 - Notion de gain par exemple

Définition

Une **variable aléatoire** (ou *v.a.*) **X** est une fonction définie sur Ω et à valeur dans \mathbb{R} , à laquelle on associe une **loi de probabilité** (ou *distribution de probabilité*) dont la masse totale est égale à 1

- V.a. *quantitative* si les valeurs de X sont quantitatives
- V.a. *discrète* si le nombre de résultats est faible ou si c'est qualitatif

Variable aléatoire

Fonction de masse

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs x_i discrètes.

La *fonction de masse* de la v.a. associe une probabilité $P(X \leq x_i)$ à chaque résultat élémentaire x_i

Densité de probabilité

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs x réelles.

La *fonction de densité* permet de calculer la probabilité d'appartenance à un domaine $P(a \leq X \leq b)$ (c'est la dérivée de la fonction de répartition).

Fonction de répartition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs x réelles ou discrètes.

La *fonction de répartition* F_X de la v.a. est la fonction qui associe une probabilité $P(X \leq x)$ à tout x .

Exemple de cas discret

On lance un dé (à 6 faces), et on calcule notre gain avec

- +1 si c'est pair
- -2 si c'est ≤ 3
- +5 si c'est 2


x	1	2	3	4	5	6
gain	-2	4	-2	1	0	1

A noter

- V.a. **X** *discrète* : gain d'un lancer
- $\Omega : 1, \dots, 6$
- **Issues** : -2, 0, 1, 4
- Loi de probabilité :

gain	-2	0	1	4
p	2	1	2	1

Fonction de masse



Cas discret

Cas qualitatif

- **Loi uniforme discrète** (résultats équi-probables)
- **Loi de Bernoulli**
- **Loi Binomiale**

Cas quantitatif discret

- **Loi de Poisson**

Loi uniforme discrète

Définition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs k discrètes (avec $k = 1, \dots, n$).
 \mathbf{X} suit une **loi discrète** si pour chaque i , $P(X = k) = \frac{1}{n}$.

Exemple



Dé à 6 faces (non pipé) $\rightarrow P(X = k) = \frac{1}{6}$ (avec $k = 1, \dots, 6$).

Espérance et variance

$$E(X) = \frac{n+1}{2} \text{ et } V(X) = \frac{n^2-1}{12}$$

Loi uniforme discrète

→ Simulation avec 6 valeurs possibles, et 10^4 tirages.



Loi de Bernouilli

Définition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant deux valeurs 0 ou 1

\mathbf{X} suit une **loi de Bernouilli** si $P(X = 1) = p$ et $P(X = 0) = q = 1 - p$.

Exemple



Pile ou face avec une pièce équilibrée

Espérance et Variance

$$E(X) = p \text{ et } V(X) = pq$$

Loi de Bernouilli

→ Simulation avec une urne avec 100 boules oranges et 50 boules vertes. On considère qu'on veut des boules oranges, donc $P(X = 1) = \frac{100}{150}$. On fait toujours 10^4 tirages, avec remise ici.



Loi Binomiale

C'est la loi de la somme de n v.a. indépendants de loi de Bernoulli.

Définition

Soit X une v.a. prenant les valeurs 0 (avec une probabilité p) ou 1 (avec une probabilité $1 - p$), et n le nombre de tirages réalisés.

X suit une **loi Binomiale** lorsque $P(X = k) = C_k^n p^k (1 - p)^{n-k}$.

$C_k^n = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ se nomme le coefficient binomiale, et représente le nombre d'ensemble à k éléments qu'on peut obtenir dans l'ensemble des n éléments.

Exemple



Avec 100 tirages à pile ou face, on se pose la question de savoir combien de fois on aura pile.

Espérance et Variance

$$E(X) = np \text{ et } V(X) = np(1 - p)$$

Loi Binomiale

→ Simulation avec notre urne avec 100 boules oranges et 50 boules vertes. Chaque essai comportera 100 tirages avec remise. On fait toujours 10^4 essais. On cherche à savoir combien on aura de boules oranges dans ces 100 tirages.



Loi de Poisson

Définition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs k discrètes (avec $k = 1, 2, \dots$).

\mathbf{X} suit une **loi de Poisson** $Pois(\lambda)$ si pour chaque i , $P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}$ où

- e est la base de l'exponentielle
- λ représente le nombre moyen d'occurences dans un intervalle de temps fixé

Exemple



Nombre de personnes à l'arrêt d'un bus après une certaine durée

Espérance et Variance

$$E(X) = \lambda \text{ et } V(X) = \lambda$$

Loi de Poisson

→ Simulation en considérant un arrêt de bus. On considère que 2 personnes viennent toutes les minutes. On étudie le nombre de personnes sur une durée de 5 minutes. On choisit donc $\lambda = 10$.



- Loi uniforme
- Loi Normale

Loi uniforme continue

Définition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs x réelles dans $[a; b]$.

\mathbf{X} suit une **loi uniforme continue** $U(a, b)$ si tous les intervalles de même longueur ont la même probabilité

Exemple

Espérance, Variance

$$E(X) = \frac{a + b}{2} \text{ et } V(X) = \frac{(b - a)^2}{12}$$

Loi uniforme continue


Densité de probabilité

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{pour } x \in [a; b] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$




Fonction de répartition

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{pour } x < a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{pour } x \in [a; b] \\ 1 & \text{pour } x > b \end{cases}$$



Loi uniforme continue

→ Simulation sur l'intervalle $[1; 5]$



Loi Normale

Définition

Soit \mathbf{X} une v.a. prenant des valeurs x réelles.

\mathbf{X} suit une **loi Normale** $N(\mu, \sigma^2)$ de moyenne μ et de variance σ^2 .

Exemple

Mesure de la taille d'une population

Espérance et Variance

$$E(X) = \mu \text{ et } V(X) = \sigma^2$$

Loi Normale


Densité de probabilité

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right)$$





Fonction de répartition

$$F(x) = \frac{1}{2} \left(1 + \operatorname{erf} \frac{x-\mu}{\sigma\sqrt{2}} \right)$$



Loi Normale

→ Simulation d'une loi Normale de moyenne $\mu = 170$ et d'écart-type 10



Exercices

Plus grand nombre tiré

On joue à un jeu avec deux dés (non pipés), pendant lequel on note le plus grand chiffre obtenu. Quelle est la loi de la variable aléatoire ?

Pile ou face à répétition

On joue à pile (p) ou face (f), 4 fois de suite ($I_i, \forall i = 1, 2, 3, 4$). Et on note les résultats (dans l'ordre).

- ❶ Déterminer la loi de probabilité
- ❷ Calculer les probabilités des 2 évènements suivants :
 - $A : \{n_p > n_f\}$ et $B : \{I_1 = p\}$

De l'utilité des probabilités dans les choix stratégiques d'un étudiant

Un test comporte 10 questions, avec chacune 4 choix possibles et une seule réponse juste.

- ❶ Combien y a t'il de grilles de réponses possibles ?
- ❷ Quelle est la probabilité de répondre au hasard 6 fois correctement ?

Exercices - Loi uniforme continue

Exercice 1

X est une v.a. de loi uniforme sur l'intervalle I . Déterminer pour chaque intervalle ci-dessous la fonction de densité et calculer $P(4 \leq X \leq 5)$.

- 1 $I = [4; 6]$
- 2 $I = [0; 5]$

Exercice 2

X est une v.a. de loi uniforme sur $[-3; 3]$.

- 1 Calculer $P(X < 1)$, et $P(X \geq 0.5)$
- 2 Donner l'espérance de X

Exercice 3

Antoine doit venir voir Jean entre 14h45 et 16h30. Quelle est la probabilité qu'il arrive pendant la réunion de Jean qui a lieu entre 15h30 et 16h00 ?