应 用 线 性 回 归

Applied Linear Regression



学习网站：https://fxt-gw-pb.github.io/public-health-statistics-notes/

2026 年 10 月

目录

第 1 章矩阵知识简介 1
1.1 矩阵和向量 1
1.2 矩阵运算 4
1.3 随机变量的线性组合 8
习题与解析 矩阵知识简介 10

第 2 章多重线性回归：模型构建 17
2.1 线性回归模型概述 17
2.2 理论偏回归系数的估计 20
2.3 方程的假设检验 25
2.4 自变量的相对重要性 30
2.5 模型评价 30
2.6 自变量筛选 33
习题与解析 多重线性回归与相关：模型构建 42

第 3 章多重线性回归：模型诊断与相关分析 62
3.1 考察模型是否满足 LINE 假设 62
3.2 考察自变量间有无严重共线性 68
3.3 岭回归分析 71
3.4 诊断离群值和强影响点 72
3.5 多重线性相关分析 75
习题与解析 多重线性回归与相关：模型诊断 78

第 4 章一般线性模型 115
4.1 一般线性模型概述 115
4.2 完全随机设计方差分析 116
4.3 随机区组设计方差分析 120
4.4 析因设计方差分析 124
4.5 协方差分析 129
习题与解析 一般线性模型 139

第 5 章重复测量资料的方差分析 174
5.1 重复测量资料 174
5.2 单组重复测量资料 176

5.3 协方差阵的特殊结构 178
5.4 球形与广义球形检验 181
5.5 单组重复测量方差分析 184
5.6 多组重复测量资料 187
习题与解析 重复测量资料的方差分析 196

附录 易错表述与更正 222

来源与选编依据 225

第 1 章

矩阵知识简介

回归分析中的参数估计、方差分析、杠杆值与共线性诊断均以矩阵形式表述，本章先整理后续各章所需的矩阵知识。本章将数据矩阵视为一张数据表及其运算规则：每一行对应一个观察对象，每一列对应一个变量。

本章的重点有以下三项：

- 均数向量、协方差阵与相关阵分别描述数据的集中位置、变量间的共同变化，以及消除量纲后的共同变化；
- 线性组合的方差 $a^{\top}\Sigma a$。回归系数的标准误、预测区间与方差分析的期望均方均由该式导出；
- 特征值与特征向量的统计含义：特征向量表示一个方向，特征值为数据在该方向上的方差。第 3 章的共线性诊断与多元分析中的主成分分析均以此为基础。

1.1 矩阵和向量

例 1.1　某地 12 名 16 岁中学生的身高、体重、胸围资料

编号	身高（cm，x_1）	体重（kg，x_2）	胸围（cm，x_3）
1	171.0	58.5	81.0
2	175.0	65.0	87.0
3	159.0	38.0	71.0
4	155.3	45.0	74.0
5	152.0	35.0	63.0
6	158.3	44.5	75.0
7	154.8	44.5	74.0
8	164.0	51.0	72.0
9	165.2	55.0	79.0
10	164.5	46.0	71.0
11	159.1	48.0	72.5
12	164.2	46.5	73.0

36 个元素 x_{ij} 组成维度是 12 行 3 列的矩阵 X，其中每列元素组成一个向量。

```
x1 <- c(171,175,159,155.3,152,158.3,154.8,164,165.2,164.5,159.1,164.2)
```

```r
x2 <- c(58.5,65,38,45,35,44.5,44.5,51,55,46,48,46.5)
x3 <- c(81,87,71,74,63,75,74,72,79,71,72.5,73)
X <- cbind(x1,x2,x3)
```

批注 12×3 的矩阵。

以下各节的数值可由下列命令一并求得，其结果列于此处，供阅读各节公式时对照。

```r
colMeans(X)                          # 均数向量，等价于 apply(X,2,mean)
S <- cov(X); round(S,3)              # 样本协方差阵，分母 n-1
L <- crossprod(scale(X,scale=FALSE))  # 离差阵：中心化后的 X'X
all.equal(L, 11*S)                   # 验证 L=(n-1)S
round(cor(X),4)                      # 样本相关阵
```

```
      x1        x2        x3
161.86667  48.08333  74.37500
      x1     x2     x3
x1 45.722 50.362 32.232
x2 50.362 69.629 45.466
x3 32.232 45.466 35.324
[1] TRUE
      x1     x2     x3
x1 1.0000 0.8926 0.8020
x2 0.8926 1.0000 0.9168
x3 0.8020 0.9168 1.0000
```

1.1.1 均数向量

用均数向量反映资料的平均水平：总体均数向量记为 μ（参数），样本均数向量记为 $\bar{X}$（由样本算得的估计值）。均数向量默认是列向量，有时用行向量表示；本书统一用 $\bar{X}^{\top}$ 表示转置（transpose），其他资料中的 $\bar{X}'$ 与 $\bar{X}^{T}$ 同义。

$$\mu = \begin{bmatrix} \mu_1 \\ \mu_2 \\ \mu_3 \end{bmatrix}, \qquad \bar{X} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \\ \bar{x}_3 \end{bmatrix}, \qquad \bar{X}^{\top} = \begin{bmatrix} \bar{x}_1 & \bar{x}_2 & \bar{x}_3 \end{bmatrix}.$$

$$\texttt{apply(X,2,mean)} \longrightarrow \bar{X}^{\top} = (161.86667 \quad 48.08333 \quad 74.37500).$$

批注 按列求平均。

1.1.2 协方差阵

方差-协方差矩阵（variance-covariance matrix）简称协方差阵，反映 p 个变量间的线性共变关系。它是方阵和对称矩阵，有时只给出右上半或左下半（上三角或下三角阵）。须区分两类对象：

- 总体协方差阵 Σ：$\sigma_{ij} = \mathrm{Cov}(X_i, X_j) = E[(X_i - \mu_i)(X_j - \mu_j)]$，$\sigma_{ii}$ 为第 i 个变量的总体方差，是未知参数。
- 样本协方差阵 S：$s_{ij} = l_{ij}/(n-1)$，由样本计算，是 Σ 的无偏估计。命令 `cov(X)` 给出的是 S。

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \sigma_{13} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \sigma_{23} \\ \sigma_{31} & \sigma_{32} & \sigma_{33} \end{bmatrix}, \qquad S = \begin{bmatrix} s_{11} & s_{12} & s_{13} \\ s_{21} & s_{22} & s_{23} \\ s_{31} & s_{32} & s_{33} \end{bmatrix}.$$

对例 1.1，

$$\texttt{cov(X)} \longrightarrow S = \begin{bmatrix} 45.722 & 50.362 & 32.232 \\ 50.362 & 69.629 & 45.466 \\ 32.232 & 45.466 & 35.324 \end{bmatrix}.$$

协方差数值的解释

$s_{12} = 50.362 > 0$ 表示身高高于平均水平的学生，其体重也倾向于高于平均水平。协方差的数值大小依赖于测量单位：s_{12} 的单位为 cm·kg，若身高改以米为单位记录，该值缩小为原来的 1/100，而变量间的关系并未改变。因此，协方差的符号可以解释，其绝对大小不宜直接用于判断关联强度。

比较关联强度时需消除量纲，即计算相关系数：

$$r_{12} = \frac{s_{12}}{\sqrt{s_{11}s_{22}}} = \frac{50.362}{\sqrt{45.722 \times 69.629}} = 0.8926.$$

第 2 章的标准化偏回归系数，以及多元分析中基于协方差阵或相关阵提取主成分的选择，所涉及的都是同一问题：各变量单位不同时，应根据分析目的决定是否消除量纲。

1.1.3 离均差平方和与离均差积和矩阵

简称离差阵，用 L 表示，$L = (n-1)S$。

$$l_{ii} = \sum_{k=1}^{n} (x_{ki} - \bar{x}_i)^2, \qquad l_{ij} = \sum_{k=1}^{n} (x_{ki} - \bar{x}_i)(x_{kj} - \bar{x}_j), \quad i, j = 1, 2, 3, \quad i \neq j.$$

$$L = \begin{bmatrix} l_{11} & l_{12} & l_{13} \\ l_{21} & l_{22} & l_{23} \\ l_{31} & l_{32} & l_{33} \end{bmatrix}.$$

1.1.4 相关系数矩阵

相关系数矩阵（correlation matrix）简称相关阵，反映 p 个变量间线性相关的方向与程度，也是方阵和对称矩阵。总体相关阵记为 R（元素 ρ_{ij}），样本相关阵记为 $\widehat{R}$（元素 r_{ij}），命令 `cor(X)` 给出 $\widehat{R}$。

$$R=\begin{bmatrix}1 & \rho_{12} & \rho_{13}\\ \rho_{21} & 1 & \rho_{23}\\ \rho_{31} & \rho_{32} & 1\end{bmatrix},\qquad \widehat{R}=\begin{bmatrix}1 & r_{12} & r_{13}\\ r_{21} & 1 & r_{23}\\ r_{31} & r_{32} & 1\end{bmatrix}.$$

$$r_{ij}=\frac{l_{ij}}{\sqrt{l_{ii}l_{jj}}}=\frac{\sum_{k=1}^{n}(x_{ki}-\bar{x}_i)(x_{kj}-\bar{x}_j)}{\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{ki}-\bar{x}_i)^2}\sqrt{\sum_{k=1}^{n}(x_{kj}-\bar{x}_j)^2}}=\frac{s_{ij}}{\sqrt{s_{ii}s_{jj}}}.$$

1.1.5 单位阵和迹

方阵主对角线元素之和称为迹（trace），记为 $\mathrm{tr}(\cdot)$。协方差阵的迹 $\mathrm{tr}(\Sigma)=\sum\sigma_{ii}$（样本为 $\mathrm{tr}(S)=\sum s_{ii}$）是各分量方差之和，常称“总变异”；它只汇总方差，不含协方差信息。迹受量纲影响：例 1.1 中 $\mathrm{tr}(S)=45.72+69.63+35.32=150.68$，把 cm^2 与 kg^2 直接相加，换用 mm 或 g 会改变各项的相对比重，因此只有在各变量量纲相同或已标准化时才便于解释。相关阵是标准化变量的协方差阵，其迹恒为 p。

单位阵 I 是指主对角线为 1，其余所有元素均为 0 的 p 行 p 列矩阵。

$$I=\begin{bmatrix}1 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{bmatrix}.$$

如果总体相关阵是单位阵，只能说明 p 个指标两两不相关（线性相关系数为 0），一般不能推出相互独立。

- 若 $(X_1,\dots,X_p)$ 服从多元正态分布，则两两不相关等价于相互独立，因为此时联合密度可分解为各边缘密度之积。
- 非正态反例：$X\sim N(0,1)$，$Y=X^2$。$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(X^3)-E(X)E(X^2)=0$，故 $\rho_{XY}=0$；但 Y 完全由 X 决定，二者并不独立。

1.2 矩阵运算

1.2.1 矩阵加（减）法与数乘

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{bmatrix},\quad B=\begin{bmatrix}5 & 6\\ 7 & 8\end{bmatrix},\quad C=A+B=\begin{bmatrix}6 & 8\\ 10 & 12\end{bmatrix}.$$

$$A \cdot 2 = 2 \cdot A = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 6 & 8 \end{bmatrix}.$$

1.2.2 矩阵乘法

$$A_{m\times p} B_{p\times n} = C_{m\times n}.$$

要求 A 的列数等于 B 的行数。

向量内积：

$$a = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}, \quad a^\top b = \begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix} = 1 \times 5 + 2 \times 7 = 19.$$

矩阵相乘：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix}, \quad AB = \begin{bmatrix} 19 & 22 \\ 43 & 50 \end{bmatrix}, \quad BA = \begin{bmatrix} 23 & 34 \\ 31 & 46 \end{bmatrix}.$$


矩阵乘法一般不满足交换律，通常 $AB \neq BA$。$B = I$ 只是可交换的一个特例：$B = cI$、$B = A^{-1}$、B 为 A 的多项式（如 $A^2 + 2A$），或 A, B 同为对角阵时，也都有 $AB = BA$。转置满足 $(AB)^\top = B^\top A^\top$。

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos 2\pi & \sin 2\pi \\ -\sin 2\pi & \cos 2\pi \end{bmatrix}, \qquad AI = IA = A.$$

1.2.3 矩阵乘法的几何意义

AT 的几何意义：将坐标轴顺时针旋转 90°（$90\pi/180$ 弧度）后数据点的新坐标。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \qquad T = \begin{bmatrix} \cos(\pi/2) & \sin(\pi/2) \\ -\sin(\pi/2) & \cos(\pi/2) \end{bmatrix}, \qquad AT = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ -4 & 3 \end{bmatrix}.$$



1.2.4 矩阵求逆

求矩阵 A 的逆矩阵，使 $AA^{-1} = I$。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} -2 & 1.0 \\ 1.5 & -0.5 \end{bmatrix}, \quad AA^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

1.2.5 特征值与特征向量

对方阵 A 求特征值 λ 和特征向量 e，使 $Ae = \lambda e$。

$$A = \begin{bmatrix} 1 & .941 \\ .941 & 1 \end{bmatrix}, \qquad e = \begin{bmatrix} .707 \\ .707 \end{bmatrix}, \qquad \lambda = 1.941.$$

对相关矩阵求特征值和特征向量。特征向量 e_i 为标准化向量：

$$e_i^\top e_i = 1, \quad i = 1, 2, \ldots, m.$$

向量 e_i 和 e_j 之间正交：

$$e_i^\top e_j = 0, \quad i, j = 1, 2, \ldots, m, \quad i \neq j.$$

> **批注** 标准化：向量的长度调整为 1；正交：内积为 0。

特征值的统计含义

上例中 A 为两个变量的相关阵，相关系数为 0.941。以第一特征向量为权重组合两个标准化变量 X_1^*, X_2^*，得 $Z = 0.707X_1^* + 0.707X_2^*$，由第1.3节的公式，

$$\mathrm{Var}(Z) = e^\top Ae = \lambda e^\top e = \lambda = 1.941.$$

第二特征向量为 $(-0.707, 0.707)^\top$，对应 $Z_2 = 0.707(X_2^* - X_1^*)$，其方差仅为 0.059。两变量高度相关时，数据点集中分布于“两者之和”方向的对角线附近，在“两者之差”方向上变异很小。特征向量表示方向，特征值为数据在该方向上的方差。

由此可得两点结论：

- 若某一特征值接近 0，则存在一个几乎没有变异的线性组合，即变量间近似线性相关。第 3 章据此诊断多重共线性。
- 最大特征值对应的方向为数据变异最大的方向。主成分分析按特征值由大到小依次取这些方向。

例 1.1 中三个指标相关阵的特征值如下：

```
e <- eigen(cor(X)); e$values; sum(e$values)
```

```
[1] 2.74182093 0.19930442 0.05887465
[1] 3
```

三个特征值之和等于 $\mathrm{tr}(\widehat{R}) = 3$，其中第一个特征值占 $2.742/3 = 91\%$。第一特征向量约为 $(0.567, 0.592, 0.573)$，三个权重接近相等，可解释为反映 “体格大小” 的综合指标。身高、体重、胸围三项指标所含的信息主要集中在这一个方向上。

1.2.6 相关矩阵的谱分解

$m\times m$ 的相关矩阵 R 有 m 对特征值和特征向量。用它们表示相关矩阵称为相关矩阵的谱分解：

$$R = \sum_{i=1}^{m} \lambda_i e_i e_i^\top = \lambda_1 e_1 e_1^\top + \lambda_2 e_2 e_2^\top + \cdots + \lambda_m e_m e_m^\top.$$

任意实对称矩阵都有这种分解，且特征值均为实数、特征向量可取为两两正交的单位向量。记 $P = (e_1, \ldots, e_m)$，$\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_m)$，则 $R = P\Lambda P^\top$，$P^\top P = I$。

1.2.7 秩、可逆性与正定性

秩　矩阵 A 中线性无关的列（等价地，行）的最大个数，记为 $\mathrm{rank}(A)$。$n\times p$ 矩阵 X 满足 $\mathrm{rank}(X) = p$ 时称为列满秩，即没有一列能由其他列线性表出。

可逆　$p \times p$ 方阵 A 可逆 $\iff$ $\mathrm{rank}(A) = p$ $\iff$ $|A| \neq 0$ $\iff$ 特征值均不为 0。对 $n \times p$ 矩阵 X，$X^\top X$ 可逆 $\iff$ X 列满秩（因为 $X^\top X a = 0 \Rightarrow a^\top X^\top X a = \|Xa\|^2 = 0 \Rightarrow Xa = 0$）。

正定与半正定　对称矩阵 A 若对一切 $a \neq 0$ 有 $a^\top A a > 0$，称为正定；若 $a^\top A a \geq 0$，称为半正定。由谱分解 $a^\top A a = \sum_i \lambda_i (e_i^\top a)^2$，正定 $\iff$ 全部 $\lambda_i > 0$，半正定 $\iff$ 全部 $\lambda_i \geq 0$。正定阵必可逆。

协方差阵是半正定矩阵

条件　随机向量 $X = (X_1, \ldots, X_p)^\top$ 的二阶矩存在，$E(X) = \mu$，$\mathrm{Cov}(X) = \Sigma$。

结论　Σ 对称且半正定；Σ 正定当且仅当不存在非零 a 使 $a^\top X$ 几乎必然为常数。

推导　对任意常数向量 a，$a^\top X - a^\top \mu = a^\top (X - \mu)$，故

$$\mathrm{Var}(a^\top X) = E[a^\top (X-\mu)(X-\mu)^\top a] = a^\top \Sigma a \geq 0.$$

等号成立 $\iff$ $\mathrm{Var}(a^\top X) = 0$ $\iff$ $a^\top X$ 几乎必然为常数。样本协方差阵同理：$a^\top S a$ 是数值 $a^\top x_1, \ldots, a^\top x_n$ 的样本方差，故 S 也半正定。

统计解释　若某一线性组合的方差为 0（如三个变量中有一个等于另两个之和），Σ 或 S 奇异、不可逆。第 3 章的完全共线性就是设计矩阵中出现了这种线性依赖。

1.3 随机变量的线性组合

设 m 个随机变量 $X=(X_1,X_2,\dots,X_m)^\top$ 的均数向量为 μ，协方差阵为 Σ，其线性组合 $a^\top X$ 的均数为 $a^\top\mu$，方差为 $a^\top\Sigma a$。

$$a_1x_1+a_2x_2+\cdots+a_mx_m=\begin{bmatrix}a_1 & \cdots & a_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ \vdots\\ x_m\end{bmatrix}=a^\top x,$$

$$\begin{bmatrix}a_1 & \cdots & a_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\mu_1\\ \vdots\\ \mu_m\end{bmatrix}=a^\top\mu,$$

$$\begin{bmatrix}a_1 & \cdots & a_m\end{bmatrix}\begin{bmatrix}\sigma_{11} & \cdots & \sigma_{1m}\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \sigma_{m1} & \cdots & \sigma_{mm}\end{bmatrix}\begin{bmatrix}a_1\\ \vdots\\ a_m\end{bmatrix}=a^\top\Sigma a.$$

多个线性组合的均数向量与协方差阵

条件　X 为 m 维随机向量，$E(X)=\mu$，$\mathrm{Cov}(X)=\Sigma$；A 为 $q\times m$ 常数矩阵，c 为 q 维常数向量。

结论

$$E(AX+c)=A\mu+c,\qquad \mathrm{Cov}(AX+c)=A\Sigma A^\top.$$

推导　期望是线性运算，逐个分量可得 $E(AX+c)=A\mu+c$。又 $AX+c-E(AX+c)=A(X-\mu)$，故

$$\mathrm{Cov}(AX+c)=E[A(X-\mu)(X-\mu)^\top A^\top]=A\,E[(X-\mu)(X-\mu)^\top]A^\top=A\Sigma A^\top.$$

$q=1$、$A=a^\top$ 时即为上面的 $a^\top\mu$ 与 $a^\top\Sigma a$。$\mathrm{Cov}(AX,BX)=A\Sigma B^\top$ 可同理得到。若 X 服从多元正态分布，则 $AX+c$ 仍服从多元正态分布。

统计解释　第 2 章的回归系数估计量 $\hat\beta=(X^\top X)^{-1}X^\top Y$、拟合值 HY 和残差 $(I-H)Y$ 都是 Y 的线性变换，其均数与协方差阵都由这两个公式直接得到。

问　将中学生的身高、体重、胸围三个指标标准化后，设 $a=(1/3,1/3,1/3)^\top$，求线性组合 $a^\top X^*$ 的均数和方差。

答　标准化后各变量均数为 0、方差为 1，X^* 的协方差阵就是相关阵 $\widehat R$。故均数 $a^\top\mathbf{0}=0$，方差

$$a^\top\widehat R a=\frac{1}{9}\big[3+2(r_{12}+r_{13}+r_{23})\big]=\frac{1}{9}[3+2(0.8926+0.8020+0.9168)]=0.9136.$$

R 验证：`a <- rep(1/3,3); t(a)%*%cor(X)%*%a`，或 `var(scale(X)%*%a)`，结果均为 0.9136。三个指标高度正相关，平均后的方差仍接近 1；若三者互不相关，方差会降为 1/3。

相关指标之和的方差

将 $a^\top \Sigma a$ 按分量展开，两个变量时为

$$\mathrm{Var}(a_1X_1 + a_2X_2) = a_1^2\sigma_{11} + a_2^2\sigma_{22} + 2a_1a_2\sigma_{12}.$$

式中最后一项为协方差的贡献。正相关的指标相加时，其和的方差大于各自方差之和，取平均后方差的下降也有限。因此，当若干测量高度相关时，增加测量项目对降低误差的作用有限，因为这些测量反映的是同一特征。若为同一指标的独立重复测量（协方差为 0），取 k 次测量的均数，方差降为单次的 $1/k$。

后续各章中 $\mathrm{Var}(\hat{\beta}) = \sigma^2(X^\top X)^{-1}$、$\mathrm{Var}(\hat{y}_0) = \sigma^2 x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0$ 等公式，均为线性组合方差公式的具体形式。

本章要点

1) 区分总体与样本：μ, Σ, R 为总体参数，$\bar{X}, S, \widehat{R}$ 为样本估计。R 中 `cov()`、`cor()` 给出的是样本量，分母为 $n-1$。
2) 三个矩阵的关系：$L = (n-1)S$；$r_{ij} = s_{ij}/\sqrt{s_{ii}s_{jj}} = l_{ij}/\sqrt{l_{ii}l_{jj}}$。相关阵就是标准化变量的协方差阵，对角线全为 1，迹为 p。
3) 协方差有单位，受量纲影响；相关系数无单位。$\mathrm{tr}(S)$ 将不同单位的方差相加，仅在量纲相同时便于解释。
4) 不相关不等同于独立，二者仅在多元正态分布下等价。$Y = X^2$ 为常用反例。
5) 矩阵乘法一般不可交换；$(AB)^\top = B^\top A^\top$；$X^\top X$ 可逆当且仅当 X 列满秩。
6) 两个常用公式：$\mathrm{Var}(a^\top X) = a^\top \Sigma a$，$\mathrm{Cov}(AX + c) = A\Sigma A^\top$。
7) 特征值为数据在对应特征向量方向上的方差；全部特征值之和等于矩阵的迹；存在接近 0 的特征值，表示变量间近似线性相关。

第 1 章　习题与解析

矩阵知识简介

单项选择题

每题只有一个最佳答案，请从 A—E 中选择。

题 1.1　相关阵的可行性

对同一批完整观测的三个变量，某研究者报告的相关阵为

$$R=\begin{pmatrix}1 & 0.8 & 0.8\\ 0.8 & 1 & -0.8\\ 0.8 & -0.8 & 1\end{pmatrix}.$$

下列判断正确的是（　）。

A. 它是对称矩阵且对角线元素为 1，因此必为合法相关阵

B. 三个非对角线元素都在 $[-1,1]$ 内，因此必为合法相关阵

C. 只要增加样本量，就可以使该矩阵成为合法相关阵

D. 该矩阵不是半正定矩阵，不能是所述完整样本的相关阵

E. 只要三个变量不服从正态分布，就允许出现该相关阵

题 1.2　两个线性组合的协方差

设随机向量 $(X_1,X_2)^{\top}$ 的协方差阵为 $\Sigma=\begin{pmatrix}4 & 3\\ 3 & 9\end{pmatrix}$。令 $U=2X_1-X_2+5$、$V=X_1+X_2-3$，则 $\mathrm{Cov}(U,V)$ 为（　）。

A. -7

B. 2

C. 5

D. 13

E. 19

题 1.3　矩阵逆的运算顺序

已知 A, B 均为 p 阶可逆矩阵，X, C 均为 $p \times q$ 矩阵，且 $ABX = C$。在不附加 $AB = BA$ 等条件时，X 应为（　）。

A. $B^{-1}A^{-1}C$

B. $A^{-1}B^{-1}C$

C. $CB^{-1}A^{-1}$

D. $(A^{-1}B^{-1})^{\top}C$

E. $A^{-1}CB^{-1}$

题 1.4　正交变换的性质

设 X 为 p 维随机向量，协方差阵为 Σ；Q 为 p 阶正交矩阵，令 $Y = Q^{\top}X$。考察以下命题：

I. $\mathrm{Cov}(Y) = Q^{\top}\Sigma Q$，且 $\mathrm{tr}\{\mathrm{Cov}(Y)\} = \mathrm{tr}(\Sigma)$；

II. 只要 Q 正交，Y 的各分量就必定两两不相关；

III. 对任意两个观测向量 x_i, x_j，变换前后的欧氏距离相同。

正确命题的组合为（　）。

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. II、III

E. I、III

题 1.5　均数差的方差

从某总体独立抽取 25 名受试者，对每人测量同一指标的治疗前值 X_1 和治疗后值 X_2。已知单个受试者的协方差阵为 $\Sigma = \begin{pmatrix} 25 & 15 \\ 15 & 36 \end{pmatrix}$，不同受试者之间相互独立。则 $\mathrm{Var}(\bar{X}_2 - \bar{X}_1)$ 为（　）。

A. 0.04

B. 0.44

C. 1.24

D. 2.44

E. 31

题 1.6　样本协方差阵的秩

对 4 名研究对象分别测量 5 个连续变量，数据无缺失，且每个变量的样本方差均大于 0。用通常的中心化公式计算 5×5 样本协方差阵 S。下列说法一定正确的是（　）。

A. S 一定是正定矩阵

B. S 的秩至多为 3，因此不可逆

C. S 的秩恰好为 4

D. 只要任意两个变量的相关系数都不等于 ± 1，S 就可逆

E. 改用分母 n 计算协方差即可使 S 可逆

简答、计算与案例分析

题 1.7　不相关、独立与可逆

设随机变量 U 等概率取 $-1,0,1$，定义 $V=\mathbf{1}(U=0)$。

(1) 求 $(U,V)^{\top}$ 的均数向量和协方差阵；

(2) 判断 U,V 是否不相关、是否独立，并给出依据；

(3) 该协方差阵是否可逆？据此说明“两个变量之间存在确定的函数关系”是否必然使协方差阵奇异。

题 1.8　由原始数据填写矩阵输出

某材料的 5 次观测如下。三个变量依次表示长度、宽度和高度，数据取自 NIST 统计手册的小型示例。

观测编号	x_1	x_2	x_3
1	4.0	2.0	0.60
2	4.2	2.1	0.59
3	3.9	2.0	0.58
4	4.3	2.1	0.62
5	4.1	2.2	0.63

(1) 求样本均数向量 $\bar{X}$ 与离差阵 L；

(2) 求以 $n-1$ 为分母的样本协方差阵 S，并计算 r_{12},r_{13},r_{23}；

(3) 某同学在 R 中直接运行 `crossprod(X)`，把它当作 L。指出其错误，并写出正确命令；

(4) 若先对每列作标准化，所得样本协方差阵是什么？是否为单位阵？

题 1.9　特征值、线性组合与逆矩阵

两个已标准化指标的总体相关阵为

$$R=\begin{pmatrix}1 & 0.96\\ 0.96 & 1\end{pmatrix}.$$

(1) 求 R 的特征值和相应的单位特征向量，判断其是否可逆；

(2) 令 $U=(X_1+X_2)/\sqrt{2}$、$V=(X_1-X_2)/\sqrt{2}$，求 $\mathrm{Var}(U),\mathrm{Var}(V),\mathrm{Cov}(U,V)$；

(3) 求 R^{-1}，并解方程 $Rb=c$，其中 $c=(1,1)^{\top}$；

(4) 若 c 改为 $c^{*}=(1.01,0.99)^{\top}$，求新的解 b^{*}。用特征值解释为何 c 的很小改变可以造成 b 较大的改变。

题 1.10　学生体格资料的分析报告评析

沿用本章例 1.1 的 12 名学生资料。原变量为身高（cm）、体重（kg）和胸围（cm），所给样本协方差阵已保留三位小数：

$$S = \begin{pmatrix} 45.722 & 50.362 & 32.232 \\ 50.362 & 69.629 & 45.466 \\ 32.232 & 45.466 & 35.324 \end{pmatrix}.$$

某同学将身高和胸围改用米记录，体重仍用千克，并写下以下结论：

“单位转换后，协方差阵的迹从 150.675 下降到约 69.637，说明这 12 名学生的总体变异减小了约 54%。身高与体重的协方差也显著缩小，说明二者关联变弱；再把各列减去各自均值，就能消除三个变量之间的相关性。”

(1) 写出转换矩阵 D 并计算新协方差阵 S^*；

(2) 逐项评析上述三项结论，并说明为什么迹在这里不宜直接作跨单位比较；

(3) 若目的只是比较两两线性关联强弱，应报告什么量？给出单位转换前后身高与体重相关系数的关系。

参考答案与解析

解析　题 1.1　相关阵的可行性

返回题目

选 D。对任何系数向量 a，相关阵应满足 $a^{\top}Ra \geq 0$。取 $a = (-1, 1, 1)^{\top}$，得 $a^{\top}Ra = -1.8 < 0$；其特征值也可算得为 $1.8, 1.8, -0.6$。相关阵要求整体半正定；逐个检查相关系数的范围还不够。增加样本量或放弃正态性都不能消除这个矛盾。题干限定同一批完整观测，未涉及缺失资料的逐对计算。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析　题 1.2　两个线性组合的协方差

返回题目

选 B。常数平移不改变协方差。用矩阵式计算：

$$\operatorname{Cov}(U, V) = (2, -1)\Sigma(1, 1)^{\top} = 2(4 + 3) - (3 + 9) = 2.$$

也可展开为 $2\operatorname{Var}(X_1) + \operatorname{Cov}(X_1, X_2) - \operatorname{Var}(X_2)$。13 与 19 分别是 U 和 V 的方差，不能当作二者的协方差。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]、[2]。

解析　题 1.3　矩阵逆的运算顺序

返回题目

选 A。依次从左侧乘 A^{-1} 和 B^{-1}，得 $BX = A^{-1}C$，故 $X = B^{-1}A^{-1}C$。这里 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$。矩阵乘法通常不可交换；C、E 项在一般 $p \neq q$ 时甚至不满足乘法的维数条件。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析　题 1.4　正交变换的性质

返回题目

选 E。I 由线性变换的协方差公式以及迹的循环性质成立：$\operatorname{tr}(Q^{\top}\Sigma Q) = \operatorname{tr}(\Sigma QQ^{\top}) = \operatorname{tr}(\Sigma)$。III 由 $QQ^{\top} = I$ 成立。II 错误：任意正交变换只保证旋转或反射，未必使协方差阵成为对角阵；若 Q 的列为 Σ 的一组标准正交特征向量，则可以实现对角化。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析　题 1.5　均数差的方差

返回题目

选 C。先在同一受试者内求差值方差：$\operatorname{Var}(X_2 - X_1) = 36 + 25 - 2 \times 15 = 31$。25 名受试者彼此独立，所以样本平均差的方差为 $31/25 = 1.24$。若忽略同一个体内的协方差，会误得 $(25 + 36)/25 = 2.44$；31 是个体差值的方差。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]、[2]。

解析　题 1.6　样本协方差阵的秩

返回题目

选 B。设中心化数据矩阵为 X_c，则 $S = X_c^{\top}X_c/(n - 1)$。中心化使各列之和为 0，因此 $\operatorname{rank}(X_c) \leq n - 1 = 3$，并且 $\operatorname{rank}(S) = \operatorname{rank}(X_c) \leq 3 < 5$。每列方差为正并不能排除多列之间的线性依赖；把分母从 $n - 1$ 换为 n 只会整体缩放，不改变秩。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析　题 1.7　不相关、独立与可逆

返回题目

（1）$E(U)=0$、$E(V)=1/3$、$E(U^2)=2/3$，且 UV 恒为 0。故

$$\mu=\begin{pmatrix}0\\1/3\end{pmatrix},\qquad \Sigma=\begin{pmatrix}2/3&0\\0&2/9\end{pmatrix}.$$

（2）协方差为 0，因此二者不相关。但 $P(V=1\mid U=0)=1$，而 $P(V=1)=1/3$，故不独立。

（3）$\det(\Sigma)=4/27>0$，因此可逆。虽然 V 是 U 的确定函数，但该关系是非线性的；协方差阵奇异对应存在某个非零系数向量 a，使 $a^{\top}(U,V)^{\top}$ 几乎处处为常数，不能把任意非线性函数关系都等同于线性依赖。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析　题 1.8　由原始数据填写矩阵输出

返回题目

（1）均数向量及离差阵为

$$\bar{X}=\begin{pmatrix}4.10\\2.08\\0.604\end{pmatrix},\quad L=\begin{pmatrix}0.100&0.030&0.00700\\0.030&0.028&0.00540\\0.00700&0.00540&0.00172\end{pmatrix}.$$

（2）$S=L/4$，即

$$S=\begin{pmatrix}0.025&0.0075&0.00175\\0.0075&0.0070&0.00135\\0.00175&0.00135&0.00043\end{pmatrix}.$$

按 $r_{ij}=s_{ij}/\sqrt{s_{ii}s_{jj}}$ 计算，得到 $r_{12}=0.5669$、$r_{13}=0.5337$、$r_{23}=0.7781$。

（3）`crossprod(X)` 给出未中心化的 $X^{\top}X$。二者满足 $X^{\top}X=L+n\bar{X}\bar{X}^{\top}$。例如未中心化结果的 $(1,1)$ 元为 84.15，而 L 的 $(1,1)$ 元为 0.10。正确命令为

```
Xc <- scale(X, center = TRUE, scale = FALSE)
L <- crossprod(Xc)
S <- L / (nrow(X) - 1)
```

（4）按样本标准差标准化后的协方差阵就是原数据的样本相关阵：

$$\widehat{R}=\begin{pmatrix}1&0.5669&0.5337\\0.5669&1&0.7781\\0.5337&0.7781&1\end{pmatrix}.$$

它的对角线为 1，但非对角线不为 0，因此不是单位阵。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[1]、[3]。

解析 题 1.9　特征值、线性组合与逆矩阵

返回题目

（1）特征值为 $\lambda_1 = 1.96$、$\lambda_2 = 0.04$，对应的一组单位特征向量为 $q_1 = (1,1)^\top/\sqrt{2}$、$q_2 = (1,-1)^\top/\sqrt{2}$。两特征值均为正，所以 R 正定且可逆，但第二个方向的方差很小。

（2）U, V 正是沿两个特征向量的线性组合，故 $\mathrm{Var}(U) = 1.96$、$\mathrm{Var}(V) = 0.04$、$\mathrm{Cov}(U,V) = 0$。未假设联合正态，不能仅据此断言独立。

（3）由二阶逆矩阵公式，

$$R^{-1} = \frac{1}{1-0.96^2}\begin{pmatrix} 1 & -0.96 \\ -0.96 & 1 \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} 12.7551 & -12.2449 \\ -12.2449 & 12.7551 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 0.5102 \\ 0.5102 \end{pmatrix}.$$

（4）$c^* - c = (0.01, -0.01)^\top$ 沿 q_2 方向；逆矩阵在该方向放大 $1/0.04 = 25$ 倍。因此

$$b^* - b = (0.25, -0.25)^\top, \qquad b^* \approx (0.7602, 0.2602)^\top.$$

这说明“可逆”不等于“数值稳定”。第三章讨论高度共线性时，正规方程中很小的特征值同样会放大相应方向上的扰动。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[1]。

解析 题 1.10　学生体格资料的分析报告评析

返回题目

（1）$D = \mathrm{diag}(0.01, 1, 0.01)$，所以

$$S^* = DSD^\top = \begin{pmatrix} 0.0045722 & 0.50362 & 0.0032232 \\ 0.50362 & 69.629 & 0.45466 \\ 0.0032232 & 0.45466 & 0.0035324 \end{pmatrix}.$$

两迹的数值确为 150.675 和 69.6371046，但数值下降约 53.78% 不表示研究对象发生了任何变化。

（2）第一项错误：原来相加的是以 cm^2 与 kg^2 计量的方差，转换后又混入 m^2；各项数值受单位选择影响，不能解释成可直接比较的物理“总变异”。第二项错误：s_{12} 由 50.362 变为 0.50362 只是身高缩放为原来的 1/100，并非关联变弱。这里也未进行统计检验，不能把数值缩小说成“显著”缩小。第三项错误：减去均值只改变位置，不改变协方差与相关系数。

（3）可报告相关系数。由于两次缩放因子均为正，

$$r_{12}^* = \frac{0.01 s_{12}}{\sqrt{0.01^2 s_{11} s_{22}}} = r_{12} \approx 0.8926.$$

若要合成不同量纲的指标，应先依据分析目的规定尺度和权重，并解释合成量的含义。不能仅凭任意单位下的迹给样本“更均匀”的结论。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[1]。

第 2 章

多重线性回归：模型构建

本章内容按回归分析的一般步骤展开：建立模型（对数据产生机制的假定），估计参数，对估计的抽样误差作推断（检验与区间估计），评价模型并筛选变量。各步骤的任务与主要工具见下表。

步骤	任务	主要工具
建模	描述 Y 的条件均数与 x 的关系	$E(Y \mid x) = x^{\top}\beta$ 及 LINE 假设
估计	求参数 β 的估计值	最小二乘 = 正态下的最大似然
推断	度量估计值的抽样误差	$\mathrm{Cov}(\hat{\beta}) = \sigma^2(X^{\top}X)^{-1}$，$t$、$F$ 检验，区间
评价	评价模型的拟合程度	R^2、R^2_{adj}、s、AIC、C_p
筛选	确定模型中保留的自变量	最优子集、逐步法

回归系数、R^2 与 P 值均由一份样本计算得到，随样本不同而变化。统计推断的任务，是依据一份样本估计这些统计量在重复抽样中的变异程度。

2.1 线性回归模型概述

回归是研究因变量与自变量间在数量上共变关系的方法。线性回归中的“线性”指模型对参数 β 线性，不要求对自变量线性：设计矩阵的列可以是变量变换（如 $\ln x$、x^2）、分类变量的哑变量编码，也可以是交互项 x_1x_2。例如 $\mu = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 x^2$ 仍是线性回归，而 $\mu = \beta_0 e^{\beta_1 x}$ 不是。

线性回归要求 Y 为数值变量；自变量可以是数值变量，也可以是经编码的分类变量，在实验研究中还可以是人为设定的取值。理论模型以给定自变量时 Y 的条件分布表述：

$$\mu_{y|x} = E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_m x_m, \qquad Y = \mu_{y|x} + \varepsilon.$$

写成矩阵形式为

$$Y = X\beta + \varepsilon, \qquad Y, \varepsilon \in \mathbb{R}^n, \quad X \in \mathbb{R}^{n\times p}, \quad \beta \in \mathbb{R}^p, \quad p = m + 1,$$

其中 X 为设计矩阵（第 1 列全为 1，对应截距）。**本书回归部分约定：m 为自变量个数，$p = m+1$ 为含截距的回归参数个数，残差自由度为 $n - p = n - m - 1$；并要求 $\mathrm{rank}(X) = p$。x_{ij} 表示第 i 个观察对象的第 j 个自变量（$i = 1, \ldots, n$；$j = 1, \ldots, m$），$x_i = (1, x_{i1}, \ldots, x_{im})^{\top}$ 为第 i 个观察对象的设计向量，即 X 第 i 行的转置。**

记号约定：β_j、σ^2 为总体参数；$\hat{\beta}_j$ 为估计量（随样本变化的随机变量），由某一具体样本算得的数值 b_j 为估计值；$\varepsilon_i = y_i - x_i^{\top}\beta$ 为不可观测的随机误差，$e_i = y_i - \hat{y}_i$ 为可计算的残差。模型假设及其作用如下：

1) 零条件均值：$E(\varepsilon \mid X) = 0$，即均值结构 $E(Y \mid X) = X\beta$ 设定正确。它保证最小二乘估计无偏；若遗漏了与 x 相关的重要变量或函数形式错误，则估计有偏。
2) 同方差且不相关：$\mathrm{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I_n$。它用于推出 $\mathrm{Cov}(\hat{\beta} \mid X) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$、$s^2$ 的无偏性及 Gauss–Markov 最优性；若不成立，$\hat{\beta}$ 仍无偏，但常规标准误、检验与区间不再可靠。
3) 正态性：$\varepsilon \mid X \sim N(0, \sigma^2 I_n)$。它使 t、F 统计量在有限样本下有精确分布，置信区间与预测区间严格成立；样本量较大时，系数的推断可依中心极限定理近似成立，但个体预测区间仍依赖误差分布形状。


三条合称 LINE 假设（Linear、Independent、Normal、Equal variance），第 3 章逐项诊断。

表 3.1　某地 29 名 13 岁男童身高、体重、肺活量的实测数据

编号	身高（cm） x_1	体重（kg） x_2	肺活量（L） y	编号	身高（cm） x_1	体重（kg） x_2	肺活量（L） y
1	135.1	32.0	1.75	2	139.9	30.4	2.00
3	163.6	46.2	2.75	4	146.5	33.5	2.50
5	156.2	37.1	2.75	6	156.4	35.5	2.00
7	167.8	41.5	2.75	8	149.7	31.0	1.50
9	145.0	33.0	2.50	10	148.5	37.2	2.25
11	165.5	49.5	3.00	12	135.0	27.6	1.25
13	153.3	41.0	2.75	14	152.0	32.0	1.75
15	160.5	47.2	2.25	16	153.0	32.0	1.75
17	147.6	40.5	2.00	18	157.5	43.3	2.25
19	155.1	44.7	2.75	20	160.5	37.5	2.00
21	143.0	31.5	1.75	22	149.4	33.9	2.25
23	160.8	40.4	2.75	24	159.0	38.5	2.50
25	158.2	37.5	2.00	26	150.0	36.0	1.75
27	144.5	34.7	2.25	28	154.6	39.5	2.50
29	156.5	32.0	1.75				

资料来源：陈峰主编，《现代医学统计方法与 Stata 应用》，中国统计出版社，2000，109 页。

2.1.1 模型的几何意义（例 3.1）



响应曲面（response surface）与残差（error）　$x = 135,\ y = 27.6,\ z = 1.603655$

2.1.2 样本回归方程

从总体中随机抽取 n 个观察对象，利用样本数据估计出以下方程：

$$\hat{\mu}_{y|x} = \widehat{Y} = b_0 + b_1 x_1 + b_2 x_2 + \cdots + b_m x_m, \qquad Y = \widehat{Y} + e.$$

式中 b_i 称为 x_i 的样本偏回归系数，意义是其他自变量取值固定时，x_i 每增加一个单位，Y 的条件均数平均改变量的估计。它描述的是模型内的条件关联；能否解释为因果效应取决于研究设计与混杂控制。e 为残差。

“控制其他变量”的含义

观察性研究中，其他变量的取值并未被实际固定。“控制其他变量”指统计上的扣除：先从 x_1 和 Y 中分别扣除可由 x_2 线性解释的部分，再考察二者剩余部分之间的关系。以下用例 3.1（下一节）的数据验证：

```
coef(lm(v~h))                    # 只用身高：简单回归
rv <- resid(lm(v~w))             # 肺活量中去掉体重能解释的部分
rh <- resid(lm(h~w))             # 身高中去掉体重能解释的部分
coef(lm(rv~rh))                  # 两组残差之间的斜率
```

```
(Intercept)           h
-2.60854008  0.03156093
 (Intercept)          rh
1.331210e-17 5.016538e-03
```

两组残差之间的回归斜率为 0.005017，与多重回归中身高的偏回归系数 b_1 相等，这一结论称为 Frisch–Waugh 定理。仅以身高为自变量时，斜率为 0.0316，约为前者的 6 倍。二者的含义不同：0.0316 描述身高不同的儿童肺活量平均相差多少，其中包含了身高较高者体重通常也较大的作用；0.0050 描述体重相同的儿童中，身高每增加 1 cm，肺活量平均增加多少。

因此，偏回归系数的含义取决于模型中同时纳入的其他变量。增加或删除一个与 x_1 相关的变量，b_1 的大小乃至符号都可能改变。

2.2 理论偏回归系数的估计

2.2.1 最小二乘法

最小二乘（least squares，LS）法要求残差平方和 Q 达到最小：

$$
\begin{aligned}
\widehat{Y}_i &= b_0 + b_1 x_{i1} + b_2 x_{i2} + \cdots + b_m x_{im}, \\
Q &= \sum_{i=1}^{n} e_i^2 = \sum_{i=1}^{n} (y_i - \hat{y}_i)^2 \\
&= \sum_{i=1}^{n} \left[y_i - (b_0 + b_1 x_{i1} + b_2 x_{i2} + \cdots + b_m x_{im}) \right]^2 .
\end{aligned}
$$

分别对各 b_j 求偏导并联立方程组：

$$
\frac{\partial Q}{\partial b_0} = 0, \quad \frac{\partial Q}{\partial b_1} = 0, \quad \cdots, \quad \frac{\partial Q}{\partial b_m} = 0.
$$

$$
\begin{cases}
n b_0 + \sum x_{i1} b_1 + \sum x_{i2} b_2 + \cdots + \sum x_{im} b_m = \sum y_i, \\
\sum x_{i1} b_0 + \sum x_{i1}^2 b_1 + \sum x_{i1} x_{i2} b_2 + \cdots + \sum x_{i1} x_{im} b_m = \sum x_{i1} y_i, \\
\sum x_{i2} b_0 + \sum x_{i1} x_{i2} b_1 + \sum x_{i2}^2 b_2 + \cdots + \sum x_{i2} x_{im} b_m = \sum x_{i2} y_i, \\
\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad\qquad \vdots \\
\sum x_{im} b_0 + \sum x_{i1} x_{im} b_1 + \sum x_{i2} x_{im} b_2 + \cdots + \sum x_{im}^2 b_m = \sum x_{im} y_i.
\end{cases}
$$

求解得：

$$
b = \hat{\beta} = (X^{\top} X)^{-1} X^{\top} Y.
$$

正规方程的矩阵推导及解的唯一性

条件　$Y = X\beta + \varepsilon$，X 为 $n \times p$ 设计矩阵，$\operatorname{rank}(X) = p$。

结论　使 $Q(b) = (Y - Xb)^{\top}(Y - Xb)$ 最小的 b 满足正规方程 $X^{\top} X b = X^{\top} Y$，且唯一解为 $\hat{\beta} = (X^{\top} X)^{-1} X^{\top} Y$。

推导　展开 $Q(b) = Y^\top Y - 2b^\top X^\top Y + b^\top X^\top X b$。利用矩阵求导法则 $\partial(b^\top a)/\partial b = a$、对称阵 A 有 $\partial(b^\top A b)/\partial b = 2Ab$，得

$$\frac{\partial Q}{\partial b} = -2X^\top Y + 2X^\top X b = 0 \quad \Longrightarrow \quad X^\top X b = X^\top Y.$$

上面按分量写出的 p 个方程组正是 $X^\top X b = X^\top Y$ 的展开。列满秩时 $X^\top X$ 可逆（第1.2.7节），解唯一。再说明它是最小值点：对任意 b，

$$Q(b) = Q(\hat\beta) + (b-\hat\beta)^\top X^\top X (b-\hat\beta) \geq Q(\hat\beta),$$

交叉项为 $-2(b-\hat\beta)^\top X^\top (Y - X\hat\beta) = 0$；等号仅当 $X(b-\hat\beta) = 0$ 即 $b = \hat\beta$ 时成立。若 X 不满秩，正规方程有无穷多解，但拟合值 $X\hat\beta$ 仍唯一（见第 3、4 章）。

统计解释　最小二乘只用到“使 Q 最小”，不需要正态假设；正态假设只在推断（检验、区间）时用到。

$\hat\beta$ 的无偏性与协方差阵

条件　$E(\varepsilon \mid X) = 0$，$\mathrm{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$，$\mathrm{rank}(X) = p$。

结论　$E(\hat\beta \mid X) = \beta$，$\mathrm{Cov}(\hat\beta \mid X) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}$。

推导　代入 $Y = X\beta + \varepsilon$：

$$\hat\beta = (X^\top X)^{-1} X^\top (X\beta + \varepsilon) = \beta + (X^\top X)^{-1} X^\top \varepsilon.$$

由第一个条件得 $E(\hat\beta \mid X) = \beta$。令 $A = (X^\top X)^{-1} X^\top$，由 $\mathrm{Cov}(A\varepsilon) = A\,\mathrm{Cov}(\varepsilon) A^\top$（第1.3节），

$$\mathrm{Cov}(\hat\beta \mid X) = (X^\top X)^{-1} X^\top (\sigma^2 I) X (X^\top X)^{-1} = \sigma^2 (X^\top X)^{-1}.$$

统计解释　记 c_{jj} 为 $(X^\top X)^{-1}$ 的第 j 个对角元，则 $\mathrm{Var}(\hat\beta_j \mid X) = \sigma^2 c_{jj}$。无偏性只需第一个条件；方差公式还需要同方差、不相关。

Gauss–Markov 定理

条件　$E(\varepsilon \mid X) = 0$，$\mathrm{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$，$\mathrm{rank}(X) = p$；不要求正态。

结论　在所有关于 Y 线性、且对一切 β 都无偏的估计量 $\tilde\beta = CY$ 中，最小二乘估计的协方差阵最小：$\mathrm{Cov}(\tilde\beta) - \mathrm{Cov}(\hat\beta)$ 半正定。因而对任意 c，$\mathrm{Var}(c^\top \tilde\beta) \geq \mathrm{Var}(c^\top \hat\beta)$。称 $\hat\beta$ 为最优线性无偏估计（BLUE）。

推导　$E(CY) = CX\beta = \beta$ 对一切 β 成立 $\iff$ $CX = I$。记 $C = (X^\top X)^{-1} X^\top + D$，则 $DX = 0$。于是

$$\begin{aligned}\mathrm{Cov}(\tilde\beta) = \sigma^2 CC^\top &= \sigma^2 [(X^\top X)^{-1} + (X^\top X)^{-1} X^\top D^\top + DX(X^\top X)^{-1} + DD^\top] \\ &= \sigma^2 (X^\top X)^{-1} + \sigma^2 DD^\top,\end{aligned}$$

而 $DD^\top$ 半正定。

统计解释　“最优”只在“线性且无偏”的范围内比较。允许偏倚的估计（如第 3 章的岭回归）或非线性估计可能有更小的均方误差；误差异方差或相关时，最小二乘不再最优，应考虑加权或广义最小二乘。

2.2.2 最大似然法

最大似然（maximum likelihood，ML）法把正态假设施加于误差：$\varepsilon \mid X \sim N(0, \sigma^2 I)$，则

$$Y_i \mid x_i \sim N(\mu_{y|x_i}, \sigma^2) \text{ 且相互独立}, \qquad \mu_{y|x} = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \cdots + \beta_m x_m.$$

将 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 的概率密度 $f(y_i)$ 连乘得到似然函数 $L(\beta, \sigma^2)$，对数似然为

$$\ln L(\beta, \sigma^2) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{1}{2\sigma^2}(Y - X\beta)^{\top}(Y - X\beta) = -\frac{n}{2}\ln(2\pi) - \frac{n}{2}\ln\sigma^2 - \frac{Q(\beta)}{2\sigma^2}.$$

对任意固定的 σ^2，$\ln L$ 只通过 $-Q(\beta)/(2\sigma^2)$ 依赖 β，故使 $\ln L$ 最大等价于使残差平方和 $Q(\beta)$ 最小，$\hat\beta_{\mathrm{ML}} = \hat\beta_{\mathrm{LS}}$。再对 σ^2 求导：

$$\frac{\partial \ln L}{\partial \sigma^2} = -\frac{n}{2\sigma^2} + \frac{Q}{2\sigma^4} = 0 \quad \Longrightarrow \quad \hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = \frac{Q}{n},$$

这里 $Q = Q(\hat\beta)$。其中 $\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = Q/n$ 是最大似然估计，常用的无偏估计为

$$s^2 = Q/(n-p).$$

分母不同的原因：残差满足 $X^{\top}e = 0$ 这 p 个线性约束，只有 $n-p$ 个自由度，$E(Q) = (n-p)\sigma^2$（见第2.2.4节），故 $E(Q/n) = \frac{n-p}{n}\sigma^2$ 偏小，s^2 无偏。对例 3.1，$Q = 2.5579$，$n = 29$，$p = 3$：$\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}} = 0.0882$，$s^2 = 0.0984$。将 $\hat\sigma^2_{\mathrm{ML}}$ 代回得最大对数似然

$$\ln L_{\max} = -\frac{n}{2}\Big[\ln(2\pi) + \ln\frac{Q}{n} + 1\Big],$$

第2.5节的 AIC 由它构造。

2.2.3 例 3.1 的矩阵计算

$$X = \begin{bmatrix} 1 & 135.1 & 32.0 \\ 1 & 139.9 & 30.4 \\ 1 & 163.6 & 46.2 \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & 156.5 & 32.0 \end{bmatrix}, \quad Y = \begin{bmatrix} 1.75 \\ 2.00 \\ 2.75 \\ \vdots \\ 1.75 \end{bmatrix}, \quad X^{\top} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 135.1 & 139.9 & 163.6 & \cdots & 156.5 \\ 32.0 & 30.4 & 46.2 & \cdots & 32.0 \end{bmatrix}.$$

$$X^\top X = \begin{bmatrix} 29.00 & 4424.70 & 1076.70 \\ 4424.70 & 677060.37 & 165239.80 \\ 1076.70 & 165239.80 & 40832.39 \end{bmatrix}, \quad X^\top Y = \begin{bmatrix} 64.000 \\ 9826.650 \\ 2427.325 \end{bmatrix}.$$

$$(X^\top X)^{-1} = \begin{bmatrix} 15.63235900 & -0.12610946 & 0.09813142 \\ -0.12610946 & 0.00113681 & -0.00127508 \\ 0.09813142 & -0.00127508 & 0.00259687 \end{bmatrix}.$$

$$b = \begin{bmatrix} -0.565664 \\ 0.005017 \\ 0.054061 \end{bmatrix}, \qquad \hat{y} = -0.5657 + 0.005017x_1 + 0.05406x_2.$$

```r
h <- c(135.1,139.9,163.6,146.5,156.2,156.4,167.8,149.7,145.0,148.5,165.5,135.0,
       153.3,152.0,160.5,153.0,147.6,157.5,155.1,160.5,143.0,149.4,160.8,159.0,
       158.2,150.0,144.5,154.6,156.5)                          # 身高x1
w <- c(32.0,30.4,46.2,33.5,37.1,35.5,41.5,31.0,33.0,37.2,49.5,27.6,41.0,32.0,
       47.2,32.0,40.5,43.3,44.7,37.5,31.5,33.9,40.4,38.5,37.5,36.0,34.7,39.5,
   32.0)
v <- c(1.75,2.00,2.75,2.50,2.75,2.00,2.75,1.50,2.50,2.25,3.00,1.25,2.75,1.75,
       2.25,1.75,2.00,2.25,2.75,2.00,1.75,2.25,2.75,2.50,2.00,1.75,2.25,2.50,
   1.75)
X <- cbind(1,h,w); Y <- v
b <- solve(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%Y     # 与coef(lm(v~h+w))相同
```

上述矩阵计算用于说明公式的含义，实际分析使用 `lm()`。例 3.1 的完整输出如下，后续各节的数值均可在其中找到。

```r
fit <- lm(v~h+w)
summary(fit)
```

```
Residuals:
     Min       1Q   Median       3Q      Max
-0.54117 -0.25524 -0.00266  0.22039  0.55425

Coefficients:
             Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
(Intercept) -0.565664   1.240127  -0.456  0.65208
h            0.005017   0.010575   0.474  0.63920
w            0.054061   0.015984   3.382  0.00228 **
---
Residual standard error: 0.3137 on 26 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.546,        Adjusted R-squared:  0.511
F-statistic: 15.63 on 2 and 26 DF,  p-value: 3.485e-05
```

输出各部分与前述公式的对应关系如下：

- `Estimate`：b_j，即 $(X^\top X)^{-1}X^\top Y$。
- `Std. Error`：$s_{b_j} = s\sqrt{c_{jj}}$。例如身高 $0.31366 \times \sqrt{0.00113681} = 0.010575$。
- `t value`：b_j / s_{b_j}，检验 $H_0 : \beta_j = 0$（其他变量保留在模型中）；`Pr(>|t|)` 为双侧 P 值，自由度 $n - p = 26$。
- `Residual standard error`：剩余标准差 $s = \sqrt{Q/(n-p)} = \sqrt{2.5579/26} = 0.3137$，即 $\hat{\sigma}$。
- `Multiple R-squared` 与 `Adjusted R-squared`：见第2.5节。
- 最后一行为整体 F 检验（表 3.3），H_0 为全部斜率等于 0。

截距 -0.566 按字面为身高、体重均为 0 时的肺活量，该取值远在数据范围（身高 135–168 cm）之外，没有实际意义，其作用在于确定回归面的位置。截距的 t 检验通常不作解释。

2.2.4 残差的估计和性质

$$\widehat{Y} = Xb = X(X^\top X)^{-1}X^\top Y = HY,$$
$$e = Y - \widehat{Y} = (I - H)Y, \qquad H = X(X^\top X)^{-1}X^\top.$$

$$Y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix}_{n\times 1}, \quad X = \begin{bmatrix} 1 & x_{11} & \cdots & x_{1m} \\ 1 & x_{21} & \cdots & x_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & x_{n1} & \cdots & x_{nm} \end{bmatrix}_{n\times p}, \quad e = \begin{bmatrix} e_1 \\ e_2 \\ \vdots \\ e_n \end{bmatrix}, \quad b = \begin{bmatrix} b_0 \\ b_1 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}.$$

（有的资料以 E、B 表示残差向量与系数向量，为避免与期望 $E(\cdot)$ 混淆，这里改记为 e、b。）

残差的性质：$Q = \sum e_i^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2$ 在所有可能的系数中最小；模型含截距时各残差之和为 0。

> **批注** H 是 $n \times n$ 的帽子矩阵，将观测值 y 转换为拟合值。`diag(H)` 提取主对角线元素 h_{ii}，称为杠杆值。

帽子矩阵与残差的性质

条件　$\operatorname{rank}(X) = p$, $H = X(X^\top X)^{-1}X^\top$；后两条结论另需 $E(\varepsilon \mid X) = 0$, $\operatorname{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$。

结论　(1) $H^\top = H$，$H^2 = H$，$\operatorname{tr}(H) = p$；$I - H$ 也对称幂等，$\operatorname{tr}(I - H) = n - p$。(2) $X^\top e = 0$，$\widehat{Y}^\top e = 0$；若 X 含全 1 列，则 $\sum e_i = 0$，$\sum \hat{y}_i = \sum y_i$。(3) $E(e \mid X) = 0$，$\operatorname{Cov}(e \mid X) = \sigma^2(I - H)$。(4) $E(Q \mid X) = (n-p)\sigma^2$，故 $s^2 = Q/(n-p)$ 无偏。

推导　(1) $(X^\top X)^{-1}$ 对称，故 $H^\top = H$；$H^2 = X(X^\top X)^{-1}X^\top X(X^\top X)^{-1}X^\top = H$；由 $\operatorname{tr}(AB) = \operatorname{tr}(BA)$，$\operatorname{tr}(H) = \operatorname{tr}((X^\top X)^{-1}X^\top X) = \operatorname{tr}(I_p) = p$。$H$ 是向 X 列空间的正交投影：$HX = X$，$(I - H)X = 0$。

(2) $X^\top e = X^\top (I - H)Y = (X^\top - X^\top H)Y = 0$，这就是正规方程。于是 $\widehat{Y}^\top e = b^\top X^\top e = 0$，拟合值与残差正交，且 $Y^\top Y = \widehat{Y}^\top \widehat{Y} + e^\top e$。若 X 第 1 列为 $\mathbf{1}$，$X^\top e = 0$ 的第 1 个分量即 $\mathbf{1}^\top e = \sum e_i = 0$。不含截距的模型没有这条约束，残差和一般不为 0。

(3) $e=(I-H)(X\beta+\varepsilon)=(I-H)\varepsilon$，故 $E(e\mid X)=0$，

$$\operatorname{Cov}(e\mid X)=(I-H)\,\sigma^2 I\,(I-H)^{\top}=\sigma^2(I-H).$$

(4) $E(Q)=E(e^{\top}e)=\operatorname{tr}(\operatorname{Cov}(e))=\sigma^2\operatorname{tr}(I-H)=(n-p)\sigma^2$。

统计解释　即使误差独立同方差，残差也不再独立同方差：$\operatorname{Var}(e_i)=\sigma^2(1-h_{ii})$，$\operatorname{Cov}(e_i,e_j)=-\sigma^2 h_{ij}$。杠杆值 h_{ii} 满足 $0\le h_{ii}\le 1$、$\sum h_{ii}=p$，平均为 p/n。h_{ii} 大的点把拟合值拉向自己，其残差方差反而小，所以第 3 章用 $e_i/(s\sqrt{1-h_{ii}})$（学生化残差）统一尺度，并用 h_{ii} 度量 x 方向的异常程度。

2.3　方程的假设检验

2.3.1　方差分析法

方差分析法检验全部斜率是否同时为 0，即全部自变量合起来与 Y 的条件均数有无线性关联（截距不在检验之内）：

$$H_0:\beta_1=\beta_2=\cdots=\beta_m=0;\qquad H_1:\text{至少一个}\beta_j\neq 0\ (j=1,\dots,m),\qquad \alpha=0.05.$$

全部 y 值的总变异被分解为 U 和 Q 两部分（含截距时由 $\hat{Y}-\bar{y}\mathbf{1}$ 与 e 正交得到），总自由度被分解为 m 和 $n-p=n-m-1$ 两部分，进而得出回归均方和残差均方。无论 H_0 是否成立都有 $E(\mathrm{MS}_{\text{剩余}})=\sigma^2$；而

$$E(\mathrm{MS}_{\text{回归}})=\sigma^2+\frac{\beta_{(1)}^{\top}X_c^{\top}X_c\beta_{(1)}}{m},$$

其中 $\beta_{(1)}=(\beta_1,\dots,\beta_m)^{\top}$，$X_c$ 为中心化的自变量矩阵。H_0 成立时两者期望都等于 σ^2，否则回归均方的期望更大，所以用右侧检验：

$$F=\frac{\mathrm{MS}_{\text{回归}}}{\mathrm{MS}_{\text{剩余}}}\overset{H_0}{\sim}F(m,n-m-1).$$

表 3.3　回归方程的方差分析表

变异来源	SS	自由度	MS	F
总	$l_{yy}=\sum(y-\bar{y})^2$	$n-1$		
回归	$U=\sum(\hat{y}-\bar{y})^2$	m	U/m	$\dfrac{n-m-1}{m}\dfrac{U}{Q}$
剩余	$Q=\sum(y-\hat{y})^2$	$n-m-1$	$Q/(n-m-1)$	

批注　m 为自变量个数，$p=m+1$。部分资料以 p 表示自变量个数，以 N 表示总例数，与本书的约定不同。

对例 3.1，$U = 3.0757$，$Q = 2.5579$，$F = (3.0757/2)/(2.5579/26) = 15.63$，$\nu = (2, 26)$，$P = 3.5 \times 10^{-5}$。

2.3.2 t 检验法

t 检验法推断单个自变量 x_i 对应的 β_i 是否为 0（其他自变量保留在模型中）：

$$H_0 : \beta_i = 0, \qquad H_1 : \beta_i \neq 0, \qquad \alpha = 0.05, \quad i = 1, \dots, m.$$

若模型假设（含正态性）成立，无论 H_0 是否成立，估计量 $\hat{\beta}$ 都服从均数为 β、协方差阵为 $\sigma^2(X^\top X)^{-1}$ 的正态分布。用 s 估计 σ 并构造 t 统计量：

$$t_i = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{s_{b_i}} \sim t(n - m - 1), \qquad s_{b_i} = s_{y \cdot 12 \cdots m} \sqrt{c_{ii}}.$$

H_0 只在计算统计量时用于代入 $\beta_i = 0$，即 $t_i = b_i / s_{b_i} \overset{H_0}{\sim} t(n - m - 1)$。$s_{b_i}$ 是 b_i 的标准误的估计值，c_{ii} 是矩阵 $(X^\top X)^{-1}$ 的对角线上对应于 x_i 的元素。

正态模型下 t 与 F 分布的来源

条件　$\varepsilon \mid X \sim N(0, \sigma^2 I_n)$，$\operatorname{rank}(X) = p$。

结论　(1) $\hat{\beta} \sim N(\beta, \sigma^2 (X^\top X)^{-1})$；(2) $Q/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$；(3) $\hat{\beta}$ 与 Q 相互独立；(4) 由此 $t_i \sim t(n - p)$，下文的 F 统计量服从 F 分布。

推导　(1) $\hat{\beta} = \beta + (X^\top X)^{-1} X^\top \varepsilon$ 是正态向量的线性变换，均数与协方差阵见第2.2.1节。

(2) $I - H$ 对称幂等、秩为 $n - p$，其特征值只有 $n - p$ 个 1 和 p 个 0，可写成 $I - H = \sum_{k=1}^{n-p} u_k u_k^\top$，$u_k$ 为两两正交的单位向量。于是

$$Q = e^\top e = \varepsilon^\top (I - H) \varepsilon = \sum_{k=1}^{n-p} (u_k^\top \varepsilon)^2,$$

而 $u_k^\top \varepsilon$ $(k = 1, \dots, n - p)$ 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$（其协方差为 $\sigma^2 u_k^\top u_l$），故 $Q/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$。

(3) $\operatorname{Cov}(\hat{\beta}, e) = (X^\top X)^{-1} X^\top \, \sigma^2 I \, (I - H) = \sigma^2 (X^\top X)^{-1} (X^\top - X^\top H) = 0$。$\hat{\beta}$ 与 e 联合正态且不相关，因而独立；$Q = e^\top e$ 是 e 的函数，故与 $\hat{\beta}$ 独立。

(4) $Z = (\hat{\beta}_i - \beta_i)/(\sigma \sqrt{c_{ii}}) \sim N(0, 1)$，与 $Q/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p}$ 独立，按 t 分布的定义

$$t_i = \frac{Z}{\sqrt{Q/[\sigma^2 (n - p)]}} = \frac{\hat{\beta}_i - \beta_i}{s \sqrt{c_{ii}}} \sim t(n - p).$$

统计解释　未知的 σ 在比值中约去，所以 t、F 统计量可直接计算。t_i 检验的是“在其他自变量都在模型中时” x_i 的系数，结论依赖模型中还放了哪些变量。

对例 3.1 有：

$$C = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.00113681 & -0.00127508 \\ -0.00127508 & 0.00259686 \end{bmatrix}.$$

$$t_1 = \frac{0.00501684}{0.313655722\sqrt{0.00113681}} = 0.4744, \quad \nu = 29-2-1 = 26, \quad P = 0.6392,$$
$$t_2 = \frac{0.05406059}{0.313655722\sqrt{0.00259686}} = 3.3822, \quad \nu = 26, \quad P = 0.0023.$$

$P = 0.639$ 的含义

该 P 值对应的假设是：在体重已纳入模型的条件下，身高与肺活量之间不存在额外的线性关联。检验结果不拒绝这一假设，并不意味着身高与肺活量无关。身高与肺活量的简单相关系数为 0.588，简单回归的检验结果有统计学意义；身高与体重的相关系数为 0.742，身高所含的信息大部分已由体重反映，因此其在模型中的额外贡献很小。

此外，应区分“未发现关联的证据”与“存在无关联的证据”。β_1 的 95% 置信区间为 $(-0.0167,\ 0.0268)$ L/cm，按身高相差 10 cm 折算，-0.17 至 $+0.27$ L 之间的效应均与数据相容，其上限对 13 岁男童而言并不小。样本仅 29 例，检验无统计学意义首先反映信息量不足，不能作为效应为 0 的证据。解释 P 值时应同时报告置信区间，这一原则同样适用于广义线性模型和生存分析。

另一种常见情形是整体 F 检验有统计学意义，而各个 t 检验均无统计学意义。这通常是由于自变量间高度相关（共线性），各变量的额外贡献均较小，而合并后的作用明显，详见第 3 章。

2.3.3　一般线性假设与嵌套模型的增量 F 检验

整体 F 检验、单个系数的 t 检验以及第2.6节的偏 F 检验，都是一般线性假设的特例：

$$H_0 : L\beta = c, \qquad L \text{ 为 } q \times p \text{ 常数矩阵, } \operatorname{rank}(L) = q.$$

例如 $L = (0\ I_m)$、$c = 0$ 即全部斜率为 0 $(q = m)$；$L = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0)$ 即单个系数为 0 $(q = 1)$；$L = (0, 1, -1)$ 即 $\beta_1 = \beta_2$。检验统计量为

$$F = \frac{(L\hat\beta - c)^\top [L(X^\top X)^{-1}L^\top]^{-1}(L\hat\beta - c)/q}{s^2} \overset{H_0}{\sim} F(q, n-p).$$

它的来源与上面的推导相同：$L\hat\beta - c \sim N(L\beta - c,\ \sigma^2 L(X^\top X)^{-1}L^\top)$，$H_0$ 下分子的二次型除以 σ^2 服从 χ^2_q，且与 Q 独立。

等价的模型比较形式：把 H_0 代入得到简化模型（reduced），其残差平方和为 Q_R；不加约束的完整模型（full）残差平方和为 Q_F，残差自由度 $n-p$。则

$$F = \frac{(Q_R - Q_F)/q}{Q_F/(n-p)} \overset{H_0}{\sim} F(q, n-p).$$

整体检验中简化模型只含截距，$Q_R = l_{yy}$，$Q_R - Q_F = U$，即表 3.3 的 F。R 中`anova(fit_reduced, fit_full)` 给出这一检验；两模型必须用同一批观测拟合，且简化模型须嵌套于完整模型之中。

`anova(fit)` 的输出。对单个模型调用 `anova()` 时，R 给出序贯平方和（Type I），即按公式中变量的顺序，依次计算每个变量进入模型时残差平方和的减少量。变量顺序不同，结果也不同：

```r
anova(lm(v~h+w))      # 先身高后体重
anova(lm(v~w+h))      # 先体重后身高
```

```
          Df Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
h          1 1.9503 1.95030  19.824 0.0001426 ***
w          1 1.1254 1.12543  11.440 0.0022847 **
Residuals 26 2.5579 0.09838

          Df  Sum Sq Mean Sq F value    Pr(>F)
w          1 3.05360 3.05360  31.039 7.493e-06 ***
h          1 0.02214 0.02214   0.225    0.6392
Residuals 26 2.55789 0.09838
```

两张表的回归平方和合计均为 $3.0757 = U$，残差行完全相同；而身高在第一张表中有统计学意义，在第二张表中无统计学意义。原因在于：第一张表中身高先进入模型，其平方和 1.9503 包含了与体重共有的信息；第二张表中身高后进入，平方和仅为其独有部分 0.0221。每张表最后一行的 F 值等于该变量 t 值的平方（$11.44 = 3.382^2$，$0.225 = 0.474^2$），与 `summary()` 一致；前一行的 F 值与 `summary()` 中的任何检验均不对应。

因此，若方差分析表与回归系数表对同一变量给出不同结论，应首先确认方差分析表是否为序贯平方和。

单自由度时 $F = t^2$

条件　正态线性模型，$H_0 : \beta_i = 0$，即 $q = 1$、$L = \ell_i^{\top}$（第 i 个分量为 1 的单位行向量）。

结论　增量 F 统计量等于 t_i^2，且 $F(1, \nu)$ 分布与 $t(\nu)$ 平方的分布相同，两检验的 P 值相同。

推导　$L(X^{\top}X)^{-1}L^{\top} = c_{ii}$，$L\hat{\beta} = \hat{\beta}_i$，代入一般公式：

$$F = \frac{\hat{\beta}_i \, c_{ii}^{-1} \, \hat{\beta}_i}{s^2} = \Big(\frac{\hat{\beta}_i}{s\sqrt{c_{ii}}}\Big)^2 = t_i^2 .$$

又若 $T \sim t(\nu)$，$T = Z/\sqrt{V/\nu}$，则 $T^2 = (Z^2/1)/(V/\nu)$，$Z^2 \sim \chi_1^2$，故 $T^2 \sim F(1, \nu)$，$P(|T| > |t_i|) = P(F > t_i^2)$。

统计解释　例 3.1 中 $t_1 = 0.4744$，$t_1^2 = 0.225$，正是第2.6.2节前进法表中引入 x_1 的偏 F 值；$t_2^2 = 3.3822^2 = 11.44$。

2.3.4　区间估计：回归系数、均值响应与个体预测

回归系数的置信区间。由 $t_i \sim t(n-p)$，β_i 的 $1-\alpha$ 置信区间为

$$b_i \pm t_{\alpha/2}(n-p)\, s\sqrt{c_{ii}}.$$

例 3.1 中 $t_{0.025}(26) = 2.0555$，β_1（身高）的 95% 置信区间为 $(-0.0167,\ 0.0268)$，β_2（体重）为 $(0.0212,\ 0.0869)$。R：`confint(fit)`。

给定 x_0 时均值响应与新个体的区间。记 $x_0 = (1, x_{01}, \dots, x_{0m})^\top$，

$$h_0 = x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0, \qquad \hat{\mu}_0 = \hat{y}_0 = x_0^\top b.$$

$s\sqrt{h_0}$ 与 $s\sqrt{1+h_0}$ 的来源

条件　正态线性模型；新个体 $Y_0 = x_0^\top \beta + \varepsilon_0$，$\varepsilon_0 \sim N(0, \sigma^2)$ 且与建模样本独立；x_0 所处的范围内模型形式仍成立。

结论

均值响应 $\mu_0 = x_0^\top \beta$：$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-p)\, s\sqrt{h_0}$；　　新个体 Y_0：$\hat{y}_0 \pm t_{\alpha/2}(n-p)\, s\sqrt{1+h_0}$.

推导　$\hat{y}_0 - \mu_0 = x_0^\top(\hat{\beta} - \beta)$，由第1.3节公式 $\operatorname{Var}(\hat{y}_0) = x_0^\top \sigma^2 (X^\top X)^{-1} x_0 = \sigma^2 h_0$。预测新个体时

$$Y_0 - \hat{y}_0 = \varepsilon_0 - x_0^\top(\hat{\beta} - \beta),$$

ε_0 与 $\hat{\beta}$ 独立，两项方差相加得 $\sigma^2(1+h_0)$。两种情形均以 s 代替 σ，并利用 $\hat{\beta}$、ε_0 与 Q 的独立性得到 $t(n-p)$ 分布。

统计解释　均值响应的区间只反映参数估计误差，随 n 增大趋于 0；预测区间还包含新个体自身的随机误差 σ^2，即使 $n \to \infty$ 宽度也不小于 $2t\sigma$。h_0 在自变量均数附近最小，离数据中心越远越大。外推到数据范围以外时，不仅 h_0 变大，更重要的是线性形式未必成立，而区间公式并不反映这种模型设定误差。

例 3.1 中取身高 150 cm、体重 36 kg：$\hat{y}_0 = 2.1330$，$h_0 = 0.03792$，$s = 0.31366$，

$$s\sqrt{h_0} = 0.0611, \qquad s\sqrt{1+h_0} = 0.3195.$$

- 均值响应的 95% 置信区间：$2.1330 \pm 2.0555 \times 0.0611 = (2.0075,\ 2.2586)$；
- 新个体的 95% 预测区间：$2.1330 \pm 2.0555 \times 0.3195 = (1.4762,\ 2.7899)$。

```r
fit <- lm(v~h+w)              # v: 肺活量, h: 身高, w: 体重
new <- data.frame(h=150,w=36)
predict(fit,new,interval="confidence")    # 均值响应
predict(fit,new,interval="prediction")    # 新个体
```

```
       fit      lwr      upr
1 2.133016 2.007467 2.258565
       fit      lwr      upr
1 2.133016 1.476176 2.789856
```

置信区间与预测区间的选用

两种区间的选用取决于推断对象是总体均数还是个体。估计身高 150 cm、体重 36 kg 的 13 岁男童的平均肺活量，应使用置信区间 (2.01, 2.26)；估计该条件下某一男童肺活量的可能

> 范围，应使用预测区间 $(1.48, 2.79)$。后者明显较宽，因为个体围绕均数存在约 $\sigma \approx 0.31\,\mathrm{L}$ 的变异，这部分变异不随样本量增大而减小。制定个体参考值范围时，应采用预测区间。

2.4 自变量的相对重要性

在多重回归方程中，偏回归系数间不能直接比较大小，因为偏回归系数有单位。例 3.1 中 b_1 的单位为 L/cm，b_2 的单位为 L/kg。将它们按标准差换算为无单位的标准化偏回归系数 $\tilde{b}_i$（也常记为 b'_i，此处为避免与转置混淆改记）：

$$\tilde{b}_i = b_i \sqrt{\frac{l_{ii}}{l_{yy}}} = b_i \frac{s_{x_i}}{s_y}, \qquad i = 1, 2, \ldots, m.$$

l_{ii} 是变量 x_i 的离差平方和。$\tilde{b}_i$ 的含义是：其他自变量固定时，x_i 增加 1 个样本标准差，Y 的条件均数平均改变 $\tilde{b}_i$ 个样本标准差。对例 3.1：

$$\tilde{b}_1 = 0.005017 \sqrt{\frac{1957.9532}{5.6336}} = 0.0935215,$$

$$\tilde{b}_2 = 0.0540611 \sqrt{\frac{857.1192}{5.6336}} = 0.6668242.$$

在这一样本和这一模型中，按标准差换算后，体重与肺活量的条件关联明显强于身高。解释时须注意：

- $\tilde{b}_i$ 依赖样本中 x_i 的标准差。样本取值范围窄（如只纳入同龄儿童）时 s_{x_i} 小，$\tilde{b}_i$ 随之变小，换一个人群结论可能不同。
- 它是“控制模型中其他变量后”的系数。本例身高与体重的相关系数为 0.742，身高的单变量相关为 0.588，但在体重固定时其系数很小；这说明身高的信息大部分已被体重包含，不说明身高与肺活量无关。
- 自变量相关时，“相对重要性”没有唯一的定义；$\tilde{b}_i$ 的大小也不能直接解释为因果作用的大小。

标准化偏回归系数的矩阵计算（R_{XX} 为自变量的相关阵，r_y 为各自变量与 y 的相关系数向量）：

$$\tilde{b} = R_{XX}^{-1} r_y = \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 \\ \vdots \\ \tilde{b}_m \end{bmatrix}.$$

2.5 模型评价

评价所估计的样本回归方程能否很好地拟合数据，常用指标有决定系数 R^2、调整决定系数、剩余标准差 s、AIC、C_p 等。

1）决定系数：

$$R^2=\frac{\mathrm{SS}_{\text{回归}}}{\mathrm{SS}_{\text{总}}}=1-\frac{\mathrm{SS}_{\text{残}}}{\mathrm{SS}_{\text{总}}},\qquad 0\le R^2\le 1.$$

$x_1,x_2,\dots,x_m$ 的线性组合解释了部分 y 的变异，R^2 为其在 y 的总变异中所占比重（含截距时 $R^2=[\mathrm{cor}(y,\hat{y})]^2$）。同一份数据、同一因变量下，$R^2$ 越大表示样本内拟合越好，但它随自变量增多而不会下降，不宜单独用于比较不同大小的模型。

> **增加自变量时训练集 R^2 不下降**
>
> **条件**　两个含截距的模型用同一批观测拟合，模型 1 的自变量是模型 2 的子集。
>
> **结论**　$Q_2\le Q_1$，从而 $R_2^2\ge R_1^2$。
>
> **推导**　模型 2 的最小二乘在更大的参数集合上最小化 Q：把模型 1 的系数补上“新增变量的系数为 0”，就是模型 2 的一个可行解，其残差平方和为 Q_1。最小值不超过任一可行值，故 $Q_2\le Q_1$。两模型的 $\mathrm{SS}_{\text{总}}=l_{yy}$ 相同，$R^2=1-Q/l_{yy}$ 随之不减。
>
> **统计解释**　即使新增的是纯噪声变量，R^2 也几乎总会略增。这是样本内拟合的性质，不代表对新样本的预测更好。

2）调整 R^2：用自由度对残差平方和和总平方和分别校正，对增加参数加以“惩罚”。

$$R^2_{\text{adj}}=1-\frac{n-1}{n-p}(1-R^2)=1-\frac{n-1}{n-p}\frac{\mathrm{SS}_{\text{残}}}{\mathrm{SS}_{\text{总}}}=1-\frac{\mathrm{MS}_{\text{残}}}{\mathrm{MS}_{\text{总}}},\qquad p=m+1.$$

新增变量的偏 F 值大于 1 时 R^2_{adj} 才上升。
以下示例在例 3.1 的模型中加入 5 个与肺活量无关的随机变量：

```r
set.seed(2026)
Z <- matrix(rnorm(29*5),29,5)          # 5列纯噪声
f0 <- summary(lm(v~h+w)); f5 <- summary(lm(v~h+w+Z))
c(f0$r.squared, f0$adj.r.squared)
c(f5$r.squared, f5$adj.r.squared)
```

```
[1] 0.5459604 0.5110343
[1] 0.5869857 0.4493142
```

R^2 由 0.546 增至 0.587，调整 R^2 则由 0.511 降至 0.449，后者扣除了由无关变量带来的虚假改善。R^2_{adj} 可以为负：当 $R^2<(p-1)/(n-1)$ 时，$\mathrm{MS}_{\text{残}}>\mathrm{MS}_{\text{总}}$。例如 $n=29$、$p=3$ 时，$R^2<0.0714$ 即得负值。

3）剩余标准差：

$$s=\hat{\sigma}=\sqrt{\mathrm{MS}_{\text{残}}}=\sqrt{\frac{\sum(y-\hat{y})^2}{n-p}}.$$

其值越小越好。它与 y 同单位，可直接说明个体围绕回归面的典型离散程度。

4）赤池信息准则（AIC）：一般定义为

$$\mathrm{AIC} = -2\ln L_{\max} + 2K,$$

K 为估计的参数个数，值越小越好。正态线性模型代入 $\ln L_{\max}$（第2.2.1节）并计入 σ^2（$K = p+1$）：

$$\mathrm{AIC} = n\ln\frac{Q}{n} + n[\ln(2\pi)+1] + 2(p+1).$$

R 的 `AIC(model)` 按此式计算。手算公式及 `step()`、`extractAIC()` 使用的是去掉常数后的形式

$$\mathrm{AIC} = n\ln\left(\frac{n-p}{n}s^2\right) + 2p = n\ln\frac{Q}{n} + 2p,$$

两者只差 $n[\ln(2\pi)+1]+2$，对同一份数据的所有模型都相同，因此模型排序不变。例 15-1 全模型中 $n=27$，二者之差为 $27\times 2.8379 + 2 = 78.62$，即 $120.78 - 42.16$（见第2.6节）。

5）C_p 统计量：

$$C_p = \frac{\mathrm{SSE}_p}{\mathrm{MSE}_{\text{全}}} - (n-2p).$$

$\mathrm{MSE}_{\text{全}}$（也记为 MSE_m）是全部候选变量都在方程中时的均方误差，SSE_p 是含 p 个参数（含截距）的子模型的残差平方和。若子模型的均值结构正确，$E(\mathrm{SSE}_p) = (n-p)\sigma^2$，于是 $C_p \approx p$；若遗漏了重要变量，SSE_p 含偏倚平方项，C_p 明显大于 p。

使用这些准则时须注意：

- 参数计数与自由度要统一：本书 p 含截距，残差自由度为 $n-p$；软件中 AIC 是否计入 σ^2 会使数值整体平移，但不改变比较结果。
- 模型比较须基于相同的观测和相同的响应变量。不同变量的缺失会使各模型实际使用的 n 不同；y 与 $\ln y$ 的模型，其似然不在同一尺度上，AIC 不能直接比较。
- C_p 以全模型的 MSE 作为 σ^2 的无偏估计，前提是全模型已包含正确的均值结构且自由度充足；候选变量很多而 n 不大时，这一估计本身不稳定。全模型的 C_p 恒等于其 p，不提供信息。
- 不应机械地选“C_p 最接近 p”的模型。表 3.7 中 $\{X_1, X_4\}$ 的 $C_p = 3.82$（$p=3$），$\{X_1, X_2, X_4\}$ 的 $C_p = 3.93$（$p=4$）：按“最接近 p”会选后者，但前者 C_p 更小、参数更少，两者差异也在随机波动范围内。一般在 $C_p \le p$ 左右的模型中，结合简洁性与专业意义选择。
- R^2、R^2_{adj}、s、AIC、C_p 都在建模数据上计算，衡量样本内拟合或其校正。评价预测能力应使用样本外的数据，例如交叉验证。留一交叉验证的预测残差平方和为 $\mathrm{PRESS} = \sum_i [e_i/(1-h_{ii})]^2$：例 15-1 模型 `y~x2+x3+x4` 的 $R^2 = 0.598$，而由 PRESS 换算的预测 R^2 只有 $1 - 141.42/222.55 = 0.365$。

2.6 自变量筛选

问　软件认为的“最优”方程是怎样的?

最优子集（best subset）法：m 较小时，遍历所有可能的自变量组合（共 $2^m - 1$ 个），基于模型评价指标，如 R^2_{adj} 进行筛选。

逐步回归法：m 较大时采用，包括前进法、后退法和逐步法。应选择对 y 贡献大（如偏回归平方和大）的自变量。

2.6.1 最优子集法

例 3.2 资料选自史乘章、杨琦《医用多重分析》102–103 页。试进行所有可能回归分析。

表 3.6　模拟数据

X_1	X_2	X_3	X_4	Y	X_1	X_2	X_3	X_4	Y
13	7	26	19	11.5	16	6	19	14	10.2
15	11	40	34	19.8	24	10	32	26	19.8
21	8	29	17	13.7	22	11	39	38	25.3
19	12	15	33	21.6	10	7	17	20	9.7
27	11	13	27	22.3	18	8	34	22	14.8
32	10	21	15	19.1	29	11	28	21	20.7
17	8	18	16	11.7	18	11	16	32	19.6
26	10	35	23	19.4	16	10	15	34	20.3
14	6	14	18	10.6	18	7	23	14	11.1
28	13	21	34	25.5	23	11	29	29	20.7
19	9	13	29	18.7	25	13	41	40	28.9
12	10	19	38	19.3	32	9	12	15	18.3
23	8	25	17	15.6	36	11	37	18	21.5
28	11	33	32	24.7	31	9	25	14	17.7
21	9	18	19	15.3	29	13	14	38	28.3
35	14	24	34	29.8	18	10	11	35	21.6

表 3.7　例 3.2 资料的一切可能回归（$2^4-1=15$ 个）

参数个数	方程中变量	R^2	R^2_{adj}	$s^2_{y\cdot x_1\cdots x_p}$	C_p	AIC
2	X_1	.36529	.34413	19.78741	2834.00	97.45623
	X_2	.91512	.91229	2.64619	354.74	33.07465
	X_3	.05189	.02029	29.55757	4247.00	110.29764
	X_4	.58600	.57220	12.90669	1839.00	83.78262
3	X_1, X_2	.92078	.91532	2.55491	331.22	32.86640
	X_1, X_3	.37596	.33292	20.12570	2788.00	98.91384
	X_1, X_4	.99339	.99293	.21328	3.82	−46.59486
	X_2, X_3	.91601	.91021	2.70887	352.74	34.73893
	X_2, X_4	.92213	.91676	2.51133	325.12	32.31589
	X_3, X_4	.60907	.58211	12.60780	1737.00	83.94802
4	X_1, X_2, X_3	.92123	.91279	2.63099	331.17	34.68250
	X_1, X_2, X_4	.99381	**.99314**	**.20689**	**3.93**	**−46.69119**
	X_1, X_3, X_4	.99360	.99292	.21369	4.85	−45.65645
	X_2, X_3, X_4	.92348	.91528	2.55590	321.03	33.75590
5	X_1, X_2, X_3, X_4	**.99401**	.99313	.20742	5.00	−45.77377

> **批注** 调整 R^2 越大越好；AIC 越小越好。

2.6.2 前进法和后退法

前进法最初方程仅含截距项，$\text{SS}_{\text{回归}}=0$。将 x_i 选入方程后引起的 $\text{SS}_{\text{回归}}$ 的增加量称为 x_i 的偏回归平方和，用 $\text{SS}_{\text{回}}(X_i)$ 表示。

后退法最初方程含 m 个自变量。将贡献最小的 x_i 删除后所引起的 $\text{SS}_{\text{回归}}$ 的减少量称为 x_i 的偏回归平方和。

做偏 F 检验以推断 β_i 是否为 0，如前进法时：

$$F^*=\frac{\text{SS}_{\text{回}}(X_i)/1}{\text{SS}_{\text{残}}/(n-m-1)}\sim F(1,n-m-1),$$

式中 m 为引入 x_i 后方程中的自变量个数。F^* 就是第2.3.3节增量 F 检验在 $q=1$ 时的形式，等于该变量 t 统计量的平方。

例 3.1 前进法的过程

步骤	引入变量	变量个数	偏回归平方和	残差平方和	F	$P(>F)$
1	x_2	1	3.05360	2.5800	31.956	5.3×10^{-6}
2	x_2, x_1	2	.02214	**2.558**	.225	.6392

例 3.1 后退法的过程

步骤 (i)	去除变量	变量个数	偏回归平方和	残差平方和 ($i-1$)	F	$P(>F)$
0		2	3.07573			
1	x_1	1	.02214	2.5579	.225	.6392
2	x_2	0	3.05360	2.5800	31.956	5.3×10^{-6}

2.6.3 逐步前进法

前进法、后退法都是单向筛选。逐步前进法按 $\alpha_{入}=0.05$ 水准引入自变量后，对方程中每一个自变量按 $\alpha_{出}=0.10$ 水准作偏 F 检验，看是否需要去除退化为“不显著的自变量”，反复地双向筛选。

小样本时，$\alpha_{入}$ 和 $\alpha_{出}$ 可设为 0.10 和 0.15，被选入的自变量个数会相对较多。但要注意 $\alpha_{入}\le\alpha_{出}$。

《医学统计学》例 15-1：27 名糖尿病患者的血清总胆固醇 x_1、甘油三脂 x_2、空腹胰岛素 x_3、糖化血红蛋白 x_4 和空腹血糖 y 的测量值，试用最优子集法或逐步前进法（$\alpha_{入}=0.10,\alpha_{出}=0.15$）筛选自变量并评价最终模型。

表 15-7　例 15-1 的逐步回归过程

步骤	引入	剔除	变量数 m	R^2	$SS_{偏}(X_j)$	$SS_{残}$	F	P
1	X_4		1	.372	82.714	139.837	14.79	.0007
2	X_1		2	.484	25.076	114.762	5.24	.0311
3	X_3		3	.547	13.958	100.804	3.19	.0875
4	X_2		4	.601	11.963	88.841	2.96	.0993
5		X_1	3	.598	.613	88.841	.15	.7006

问　如果设定 $\alpha_{入}=0.05,\alpha_{出}=0.10$，会得到什么分析结果？

答　前两步与上表相同：第 1 步引入 X_4（$P=0.0007$）；第 2 步引入 X_1（$P=0.0311<0.05$），此时方程中 X_4 的 $P=0.0092<0.10$，不剔除。第 3 步候选变量中 P 最小的是 X_3（$P=0.0875$），已大于 $\alpha_{入}=0.05$，筛选停止。最终模型为 `y~x1+x4`（$R^2=0.484$），与 $\alpha_{入}=0.10,\alpha_{出}=0.15$ 时的 `y~x2+x3+x4`（$R^2=0.598$）完全不同。可见阈值的小幅改变即可改变入选变量，逐步法的结果应视为探索性的。

最优子集法（基于 adjr2）、基于 AIC 的逐步前进/后退法、基于偏回归平方和的逐步前进法（$\alpha_{入}=0.10,\alpha_{出}=0.15$），最终模型均为：

```
lm(y~x2+x3+x4).
```

> **批注**　偏回归平方和的筛选和 P 值有关。

2.6.4 最优子集法的 R 输出

以下 R 输出均针对例 15-1。数据（$n = 27$）及对象定义如下：

```
x1 <- c(5.68,3.79,6.02,4.85,4.60,6.05,4.90,7.08,3.85,4.65,4.59,4.29,7.97,6.19,
        6.13,5.71,6.40,6.06,5.09,6.13,5.78,5.43,6.50,7.98,11.54,5.84,3.84)
x2 <- c(1.90,1.64,3.56,1.07,2.32,0.64,8.50,3.00,2.11,0.63,1.97,1.97,1.93,1.18,
        2.06,1.78,2.40,3.67,1.03,1.71,3.36,1.13,6.21,7.92,10.89,0.92,1.20)
x3 <- c(4.53,7.32,6.95,5.88,4.05,1.42,12.60,6.75,16.28,6.59,3.61,6.61,7.57,1.42
  ,
        10.35,8.53,4.53,12.79,2.53,5.28,2.96,4.31,3.47,3.37,1.20,8.61,6.45)
x4 <- c(8.2,6.9,10.8,8.3,7.5,13.6,8.5,11.5,7.9,7.1,8.7,7.8,9.9,6.9,
        10.5,8.0,10.3,7.1,8.9,9.9,8.0,11.3,12.3,9.8,10.5,6.4,9.6)
y  <- c(11.2,8.8,12.3,11.6,13.4,18.3,11.1,12.1,9.6,8.4,9.3,10.6,8.4,9.6,
        10.9,10.1,14.8,9.1,10.8,10.2,13.6,14.9,16.0,13.2,20.0,13.3,10.4)
da <- data.frame(x1,x2,x3,x4,y)
```

数据来源：孙振球主编《医学统计学》例 15-1（x_1 总胆固醇，x_2 甘油三酯，x_3 空腹胰岛素，x_4 糖化血红蛋白，y 空腹血糖）。用此数据可复现本节全部输出，如全模型 RSS $= 88.841$。

```
library(leaps)
fit <- regsubsets(y~.,data=da,nbest=6)
summary(fit)
which.max(summary(fit)$adjr2)
# [1] 11
```

4 个变量及截距；选择算法为 exhaustive；每种大小保留 6 个子集，最大为 4。第 11 行（大小 3、次序 1）即 `x2+x3+x4`，其 $R^2_{\text{adj}} = 0.546$ 为全部 15 个子集中最大。

	Forced in	Forced out
x1	FALSE	FALSE
x2	FALSE	FALSE
x3	FALSE	FALSE
x4	FALSE	FALSE

大小	次序	x1	x2	x3	x4
1	1				*
1	2	*			
1	3			*	
1	4		*		
2	1	*			*
2	2			*	*
2	3		*		*
2	4	*		*	
2	5	*	*		
2	6		*	*	
3	1		*	*	*
3	2	*		*	*
3	3	*	*		*
3	4	*	*	*	
4	1	*	*	*	*

2.6.5 基于 AIC 的后退法

```
model <- lm(y~x1+x2+x3+x4,data=da)
AIC(model)          # -2logL+2K, K=6 (5个回归参数+sigma^2)
# [1] 120.78
extractAIC(model)   # step()所用: n*log(RSS/n)+2p, p=5
# [1]  5.00000 42.15736
step(model)
```

`AIC(model)=120.78` 与下面 `Start: AIC=42.16` 不矛盾：前者含常数 $n[\ln(2\pi)+1]$ 并把 σ^2 计为参数，后者不含，二者之差 78.62 对所有模型相同（第2.5节）。

Start：AIC=42.16，`y~x1+x2+x3+x4`。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$-x1$	1	.6129	89.454	40.343
none			88.841	42.157
$-x2$	1	11.9627	100.804	43.568
$-x3$	1	20.0635	108.905	45.655
$-x4$	1	27.7939	116.635	47.507

Step：AIC=40.34，y~x2+x3+x4。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
none			89.454	40.343
$-x3$	1	25.690	115.144	45.159
$-x2$	1	26.530	115.984	45.356
$-x4$	1	32.269	121.723	46.660

$$(\text{Intercept}, x2, x3, x4) = (6.4996, .4023, -.2870, .6632).$$

2.6.6 基于 AIC 的逐步前进法

```
model_initial <- lm(y~1,data=da)
model_full <- lm(y~x1+x2+x3+x4,data=da)
step(model_initial,scope=list(lower=~1,upper=model_full),
     direction="both")
```

Start：AIC=58.95，y~1。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$+x4$	1	82.714	139.84	48.405
$+x1$	1	69.425	153.13	50.857
$+x3$	1	57.913	164.64	52.814
$+x2$	1	46.787	175.76	54.579
none			222.55	58.952

Step：AIC=48.41，y~x4。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$+x1$	1	25.076	114.76	45.070
$+x2$	1	24.693	115.14	45.159
$+x3$	1	23.854	115.98	45.356
none			139.84	48.405
$-x4$	1	82.714	222.55	58.952

Step：AIC=45.07，y~x4+x1。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$+x3$	1	13.958	100.80	43.568
none			114.76	45.070
$+x2$	1	5.857	108.91	45.655
$-x1$	1	25.076	139.84	48.405
$-x4$	1	38.365	153.13	50.857

Step：AIC=43.57，`y~x4+x1+x3`。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$+x2$	1	11.963	88.841	42.157
none			100.804	43.568
$-x3$	1	13.958	114.762	45.070
$-x1$	1	15.180	115.984	45.356
$-x4$	1	27.546	128.349	48.091

Step：AIC=42.16，`y~x4+x1+x3+x2`。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
$-x1$	1	.6129	89.454	40.343
none			88.841	42.157
$-x2$	1	11.9627	100.804	43.568
$-x3$	1	20.0635	108.905	45.655
$-x4$	1	27.7939	116.635	47.507

Step：AIC=40.34，`y~x4+x3+x2`。

操作	Df	Sum of Sq	RSS	AIC
none			89.454	40.343
$+x1$	1	.613	88.841	42.157
$-x3$	1	25.690	115.144	45.159
$-x2$	1	26.530	115.984	45.356
$-x4$	1	32.269	121.723	46.660

$$(\text{Intercept}, x4, x3, x2) = (6.4996, .6632, -.2870, .4023).$$

2.6.7 筛选方法的局限

- 不稳定：入选变量对阈值、准则和个别观测都敏感。上面的问答中，阈值由 0.10/0.15 改为 0.05/0.10，最终模型由 `x2+x3+x4` 变为 `x1+x4`。自变量相关时尤其明显：x_1 与 x_2 可相互替代。可用自助法（bootstrap）重复筛选，观察各变量的入选频率。
- 筛选后的常规推断偏乐观：最终模型的 t 检验、P 值和置信区间是按“模型事先给定”计算的，没有计入“用同一批数据挑选变量”这一步。入选变量的系数倾向于被高估，P 值偏小，区间偏窄，R^2 偏高。逐步法中各步的 P 值也不是严格意义上的检验。
- 以预测为目的时，应把整个筛选过程放进交叉验证：在每个训练折内重新执行筛选与拟合，再在对应的验证折上计算预测误差。只对最终模型做交叉验证，会低估预测误差。
- 以解释或因果推断为目的时，协变量应根据专业知识（如混杂结构）事先确定，不宜交由逐步法决定。

第一条所述的不稳定性可通过自助法考察。对例 15-1 有放回地抽取 27 例，重复 500 次，每次用基于 AIC 的后退法筛选，并记录各变量的入选比例：

```r
set.seed(1)
sel <- t(replicate(500, {
  db <- da[sample(nrow(da), replace=TRUE), ]
  m  <- step(lm(y~x1+x2+x3+x4, data=db), trace=0)
  c("x1","x2","x3","x4") %in% attr(terms(m),"term.labels")
}))
colnames(sel) <- c("x1","x2","x3","x4")
colMeans(sel)                                   # 各变量入选比例
mods <- apply(sel,1,function(r) paste(colnames(sel)[r],collapse="+"))
head(sort(table(mods),decreasing=TRUE)/500,5)   # 最常见的几个模型
```

```
   x1    x2    x3    x4
0.410 0.674 0.856 0.822
mods
   x2+x3+x4 x1+x2+x3+x4       x3+x4       x2+x3    x1+x3+x4
      0.340       0.188       0.110       0.086       0.072
```

原数据上选出的 `x2+x3+x4`，在重抽样中仅约三分之一被再次选中。x_1 在原数据中被剔除，但在 41% 的重抽样中入选，这与 x_1 和 x_2 相关（$r = 0.632$）、二者可相互替代有关。逐步法得到的最终模型，应视为若干拟合程度相近的模型之一。

本章要点

1) 记号：m 个自变量，$p = m + 1$ 个参数，残差自由度为 $n - p$。β 为参数，b 为估计值；ε 不可观测，e 可由数据计算。
2) LINE 假设的作用：零条件均值保证无偏性；同方差与独立性保证标准误正确；正态性保证小样本下 t、F 分布精确成立。最小二乘估计本身不要求正态。
3) 三个基本公式：$b = (X^{\top}X)^{-1}X^{\top}Y$；$\mathrm{Cov}(b) = \sigma^2(X^{\top}X)^{-1}$；$s^2 = Q/(n-p)$ 为无偏估计，ML 估计 Q/n 偏小。
4) 帽子矩阵 H 对称幂等，$\mathrm{tr}(H) = p$；$\mathrm{Var}(e_i) = \sigma^2(1 - h_{ii})$，各残差的方差不等。
5) 偏回归系数是控制模型中其他变量后的系数，其含义随模型中纳入的变量而变化。比较相对作用大小可用标准化系数，但其数值依赖于样本中变量的离散程度。
6) 整体 F 检验与单个 t 检验的假设不同；$q = 1$ 时增量 $F = t^2$。`anova(fit)` 给出序贯平方和，结果依赖变量顺序。
7) 置信区间针对均值响应，预测区间针对新个体，后者的方差多一项 σ^2。两种区间均随远离数据中心而变宽；外推时模型形式本身也不再可靠。
8) R^2 随自变量增加而不减；R^2_{adj}、AIC、C_p 对参数个数施加惩罚。这些均为样本内指标，预测能力应以样本外数据评价。
9) 逐步法的结果不稳定，筛选后的 P 值与置信区间偏于乐观；以解释为目的的研究，协变量应依据专业知识事先确定。

常见错误表述

- “$P > 0.05$，故身高与肺活量无关。”应表述为：控制体重后，未发现身高与肺活量之间有统计学意义的线性关联。
- “$R^2 = 0.546$，说明模型有 54.6% 的把握是正确的。”应表述为：两个自变量的线性组合解释了样本中肺活量总变异的 54.6%。
- “标准化系数大的变量对 Y 的影响大，是主要病因。”标准化系数仅描述本样本、本模型下的条件关联强度，不构成因果结论。
- “逐步回归选入的变量是重要变量，未选入的变量不重要。”未选入的变量可能是被与其相关的变量所替代。

第 2 章　习题与解析

多重线性回归与相关：模型构建

往年题

单项选择题

题 2.1　偏相关与简单相关

关于偏相关分析以下错误的说法是

A. 偏相关分析可以克服其他变量的混杂影响

B. 同一组变量, 偏相关系数的绝对值小于等于其简单相关系数的绝对值

C. 偏相关分析可以帮助检查多重线性回归模型的线性假设是否成立

D. 即使简单相关系数为正, 偏相关系数也可能为负

E. 对于多重线性回归, 标准化偏回归系数一般不等于相应的偏相关系数

题 2.2　协方差阵与相关阵

关于协方差矩阵和相关矩阵以下说法正确的是 I 协方差矩阵和相关矩阵均为多变量的信息矩阵 II 协方差矩阵是中心化的信息矩阵 III 相关矩阵为中心化且单位化的信息矩阵 IV 相关矩阵以对角线为中心对称, 协方差矩阵无此特点

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I II III

E. I II III IV

题 2.3　分层与合并后的相关方向

对于分层资料, 如果各层内两变量相关系数均大于 0, 合并层后相关系数小于 0, 且均有统计学意义, 以下说法合理者为

A. 两变量为正相关, 分层变量为混杂因子

B. 两变量为负相关, 分层变量为混杂因子

C. 两变量相关不确定, 分层变量为混杂因子

D. 两变量为正相关, 分层变量不是混杂因子

E. 两变量为负相关, 分层变量不是混杂因子

题 2.4　模型筛选指标

多重线性回归模型建模时, 寻找最优模型宜使用的方法是

A. 决定系数最大化
B. 剩余标准差最小化
C. 调整决定系数最大化
D. 方差分析的 F 值最大化
E. 假设检验 P 值最小化

题 2.5　同量纲变量的贡献大小

多重线性回归模型考察各自变量贡献大小时, 如果各自变量同量纲, 适宜的指标是

A. 偏回归系数
B. 标准化偏回归系数
C. 此问题存在争议
D. Y 与各 X 的简单相关系数
E. 偏相关系数

题 2.6　如何理解统计模型

关于统计模型的理解, 合理的是

A. 优化建模方法, 寻找唯一正确的模型
B. 如果方法正确, 则模型的形式和参数估计结果都是唯一的
C. 建模时需科学严谨客观, 不可依照主观意愿选择模型
D. 没有正确的模型, 只有有用的模型
E. 统计模型只是估计工具, 其结果不可信

题 2.7　不同尺度变量的效应比较

多重线性回归模型考察自变量贡献大小时, 适宜的指标

A. 偏回归系数
B. 标准偏回归系数
C. 偏回归系数的 P 值
D. Y 与 X 的简单相关系数
E. 偏相关系数

题 2.8　最佳模型的筛选方法

多重线性回归模型建模时, 寻找最佳模型的方法不含

A. 决定系数最大化

B. 调整决定系数最大化

C. 按专业要求筛选

D. CP 法

E. Sterpwise 法

题 2.9　辛普森反转的解释

对于分层资料, 如果各层内两变量相关系数均大于 0, 合并层后相关系数小于 0, 且均有统计学意义, 以下说法合理者为

A. 两变量为正相关, 分层变量为混杂因子

B. 两变量为负相关, 分层变量为混杂因子

C. 两变量相关不确定, 分层变量为混杂因子

D. 两变量为正相关, 分层变量不是混杂因子

E. 两变量为负相关, 分层变量不是混杂因子

题 2.10　简单与复相关的取值范围

简单相关系数和复相关系数说法错误的是:

A. 复相关系数按通常定义取非负值。

B. 简单相关系数可以为负。

C. 复相关系数为决定系数的非负平方根。

D. 同一样本上的含截距 OLS 模型加入变量后，训练 R 平方不下降。

E. 简单相关系数与复相关系数的取值范围相同。

题 2.11　预测区间与均值置信区间

同一 X 水平和同一置信度下，新个体 Y 的预测区间与条件均值的置信区间比较，通常:

A. 预测区间更宽。

B. 预测区间更窄。

C. 必完全相同。

D. 只要 R^2 大于 0.8，两者宽度为 0。

E. 均无法计算。

题 2.12　OLS 残差的正交性

满列秩含截距 OLS 拟合后，哪项成立？

A. $X^T e = 0$。

B. e_i 都等于 0。

C. 每个自变量都服从正态。

D. 所有斜率都相等。

E. 所有残差相互独立。

题 2.13　决定系数的定义

含截距且总平方和非零的 OLS 中，R^2 等于：

A. $1 - SSE/SST$。

B. SSE/SST。

C. SST/SSE。

D. 斜率的 P 值。

E. 样本量的倒数。

题 2.14　自变量改变单位

令 $X^* = 10X$ 并保持同一线性模型，原斜率 b 在新尺度下变为：

A. $10b$。

B. $b/10$。

C. $b + 10$。

D. b 必不变。

E. 无法等价转换。

题 2.15　偏相关的计算思路

欲控制 Z 后考察 X 与 Y 的线性关联，通常可：

A. 分别把 X 与 Y 对 Z 回归，求两组残差的相关。

B. 只求 X 和 Y 的简单相关。

C. 先删除 Z 最大的所有样本。

D. 只看 Z 的均值。

E. 把 X 与 Y 都除以 Z，不作其他判断。

题 2.16　偏回归系数的单位效应

无交互且模型形式正确时，偏回归系数 b_j 表示：

A. 其他变量保持不变，X_j 增 1 单位时条件均值的改变量。

B. X_j 对 Y 的唯一因果贡献。

C. Y 必然增加的数值。

D. X_j 与 Y 的简单相关。

E. 所有样本个体都相同的真实变化。

题 2.17　均值标准误中的杠杆项

经典线性模型在新设计向量 x_0 处的均值预测方差估计为：

A. $s^2 x_0^T (X^T X)^{-1} x_0$。

B. s^2 且与 x_0 无关。

C. s^2/n 在任意 x_0 都成立。

D. 恒为 0。

E. 只由 R^2 决定。

题 2.18　等权中亲值的约束

用 $Z = (X_f + X_m)/2$ 的单一斜率模型预测 Y，相当于对父母两个斜率施加：

A. 相等的约束。

B. 一正一负的约束。

C. 均为 0。

D. 一个为 1 另一个为 0。

E. 不施加任何约束。

共用资料：生命质量文章的分组均数

随附《首发原发性脑肿瘤患者生命质量现状及其影响因素研究》使用便利抽样的 133 名首次确诊住院患者，报告总分均值 66.9。其文化程度分组表如下（原数值保留）：

文化程度	人数	平均总分
小学	62	63.3
初中	21	64.1
高中或中专	35	66.8
大专及以上	15	69.6

题 2.19　分组均数的加权一致性

按生命质量文化程度分组的人数和均数计算，总均数约为：

A. 65.06。

B. 66.90。

C. 69.60。

D. 63.30。

E. 133.00。

共用资料：生命质量文章的回归结果

同文以生命质量总分为结局，报告如下最终多元回归。焦虑/抑郁用原始得分，病程用月，癫痫 0 否 1 是，病理分级与文化程度分别按 1—4 有序编码。

变量	B	SE	标准化 β	t	P
截距	74.033	1.543	—	47.974	<.01
焦虑	-0.884	0.204	-0.385	-4.326	<.01
抑郁	-0.655	0.225	-0.263	-2.906	<.01
病程	0.056	0.022	0.158	2.518	<.05
癫痫	-4.902	1.301	-0.233	-3.768	<.01
病理分级	-0.987	0.412	-0.156	-2.396	<.05
文化程度	0.905	0.393	0.148	2.302	<.05

文中报告 $F = 22.554$、$R^2 = .539$、调整 $R^2 = .517$。

题 2.20　焦虑系数的条件解释

根据生命质量模型，在其他变量固定时，焦虑得分每增加 1 分，预测总分平均：

A. 降低 0.884 分。

B. 降低 0.385 分。

C. 增加 0.884 分。

D. 每个人都必降低 0.884 分。

E. 证明降低焦虑治疗可使总分必增 0.884 分。

简答题

题 2.21　高尔顿的中亲身高与多重回归

Galton（高尔顿，原稿拼作 Gelton）为什么用父母身高之和或平均值预测儿子身高？这种做法与多重线性回归各有什么优劣？

计算与分析题

共用资料：数学、语文与智商数据

以智商为 y，数学为 x1，语文为 x2。原卷 data1 未独立附上，本包补入同课程“语文数学智商.sav”（18 人）作数值复算；若原卷数据有改动，需重新代入。

题 2.22　建立智商的多重线性回归

以 data1 的 y 为因变量，x1、x2 为自变量，建立多重线性回归方程并简要评价。该大题共 20 分。

共用资料：父母与子女身高数据

y 为子女身高，x1 为父亲身高，x2 为母亲身高。正文同名数据与附带 2023 data1 逐值一致；以下保留原数据单位，不擅自转换为厘米。

观测	父 x1	母 x2	子 y
1	5.2	4.9	6.2
2	5.4	5.1	5.9
3	6.2	5.5	6.6
4	5.8	5.4	6
5	5.6	5.1	6.2
6	5	4.9	5.6
7	6.4	5.6	6.6
8	6	5.4	6.5

题 2.23　建立父母子身高回归

以子女身高 y 为结局，父亲身高 x1 和母亲身高 x2 为自变量，建立多重线性回归并简要评价。

补充练习

本节为配合正文新编的补充练习，按题型排列，题号接续本章往年题，解析见章末。

单项选择题

题 2.24　标准化指标的线性组合

三个已标准化指标的样本相关阵为

$$R=\begin{pmatrix}1 & 0.6 & 0.3\\ 0.6 & 1 & 0.6\\ 0.3 & 0.6 & 1\end{pmatrix}.$$

令 $Z=(X_1^*+X_2^*+X_3^*)/3$，则 Z 的样本均数和样本方差分别为：

A. 0, 1/3。

B. 0, 2/3。

C. 0, 1。

D. 1, 2/3。

E. 0, 2。

题 2.25　整体 F 检验检验什么

对 27 名研究对象拟合含截距、4 个数值自变量的多重线性回归，设计矩阵满列秩，经典模型假设成立。整体回归的 F 检验在 0.05 水平显著。以下说法正确的是：

A. 原假设是截距及 4 个斜率全部为 0。

B. 应以 $F(4,23)$ 分布确定 P 值。

C. 4 个斜率的双侧 t 检验一定均显著。

D. 原假设只约束 4 个斜率，F 检验自由度为 $(4,22)$。

E. 已可判定模型符合全部 LINE 条件。

题 2.26　逐步前进法的重新检验

采用逐步前进法，规定 $\alpha_{入}=0.05$、$\alpha_{出}=0.10$。当前方程含 X_1,X_2；待选变量中 X_3 的进入检验 P 值最小，为 0.032。引入 X_3 后，X_1,X_2,X_3 的偏 F 检验 P 值依次为 0.18、0.004、0.032。下一步应：

A. 保留全部变量，因为 X1 在较早步骤已入选。

B. 删除 X3，因为其 P 值大于 0.01。

C. 删除 X1，重新拟合并继续检查进出条件。

D. 按原系数直接去掉 X1 项，其他估计值不必更新。

E. 将退出标准临时改为 0.20 以保留 X1。

简答题

题 2.27　读最优子集比较表

同一样本、同一结局的三个候选模型如下，均含截距：

模型	自变量	普通 R 平方	调整 R 平方	AIC
M1	X1、X4	0.99339	0.99293	−46.59486
M2	X1、X2、X4	0.99381	0.99314	−46.69119
M3	X1、X2、X3、X4	0.99401	0.99313	−45.77377

仅按调整 R^2 与 AIC，分别应选哪个模型？说明“普通 R^2 最大，所以 M3 必最好”是否合理；表中很小的指标差异又能否说明某模型具有明显优势？

计算与分析题

题 2.28　肺活量回归的输出填空

正文例 3.1 对 29 名男童的肺活量 Y（L）、身高 X_1（cm）和体重 X_2（kg）作含截距回归。给出摘要（平方和按正文显示精度取值）：

$$\hat{Y} = -0.565664 + 0.00501684X_1 + 0.05406059X_2,$$

$$SS_{\text{总}} = 5.6336, \qquad SS_{\text{残}} = 2.5579.$$

$(X^TX)^{-1}$ 中对应两个斜率的对角元素分别为 0.00113681、0.00259686。仅含体重的模型残差平方和比上述模型多 0.02214。

1. 填出回归与误差的自由度、回归平方和、残差均方及整体 F 值。
2. 计算剩余标准差、普通 R^2 和调整 R^2，保留 4 位小数。
3. 计算身高和体重斜率的 t 值。在 $t_{0.975,26} = 2.0555$ 下作双侧检验。
4. 计算在体重基础上加入身高的偏 F 值，并与身高的 t 值平方比较。
5. 用一句话解释体重系数，并说明能否据两个原尺度系数直接比较变量的相对重要性。

本次补充习题

单项选择题

每题只有一个最佳答案，请从 A—E 中选择。

题 2.29　参数线性

以下模型均以式中出现的 β 为待估参数，$x > 0$，并只考虑表达式有定义的取值。哪一个属于对参数线性的回归模型？

A. $E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 e^{\beta_2 x}$

B. $E(Y \mid x) = \beta_0/(1 + \beta_1 x)$

C. $E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 \log x + \beta_2 x^2$

D. $E(Y \mid x) = \beta_0 + \log(\beta_1 + \beta_2 x)$

E. $E(Y \mid x) = \beta_0 + \beta_1 x^{\beta_2}$

题 2.30　误差方差的两种估计

27 例糖尿病资料用 4 个自变量及截距拟合回归。假定条件误差相互独立且服从 $N(0, \sigma^2)$，设计矩阵列满秩；拟合后的残差平方和为 $Q = 88.841167$。σ^2 的最大似然估计与常用无偏估计依次约为：

A. 3.2904，4.0382

B. 4.0382，3.2904

C. 3.4170，4.0382

D. 3.2904，3.4170

E. 88.8412，4.0382

题 2.31　联合变化的标准误

在以空腹血糖 y 为响应的 27 例糖尿病四自变量模型中，x_1 为总胆固醇，x_2 为甘油三酯，两者均以 mmol/L 计。控制其他变量后，估计 $b_1 = 0.142446$、$b_2 = 0.351465$，并得到估计协方差阵

$$\widehat{\mathrm{Cov}}\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.133702 & -0.047757 \\ -0.047757 & 0.041699 \end{pmatrix}.$$

两项指标同时各增加 1 mmol/L 时，估计条件均数变化 $b_1 + b_2$ 的标准误约为：

A. 0.4188

B. 0.4939

C. 0.5205

D. 0.2826

E. 0.0799

题 2.32　响应单位与模型比较

对同一批观测、相同的响应 y，分别拟合两个含截距的正态线性回归模型，均以最大似然估计参数。采用准则 $A = n\log(Q/n) + 2p$，其中 p 含截距。若把每个响应统一改记为 $y^* = 1000y$，重新拟合原来两个模型，则：

A. 两个模型各自的 A 值均保持不变

B. 两个模型的 A 值之差保持不变

C. 参数较少的模型，其 A 值增加得较少

D. 两个模型的 R^2 均乘以 10^6

E. 斜率的 t 统计量均乘以 1000

题 2.33　四个新个体的平均响应

某正态线性回归模型得到 $s^2 = 4$。给定同一自变量组合 x_0，有 $h_0 = x_0^\top (X^\top X)^{-1} x_0 = 0.10$。另随机观察 4 个具有该 x_0 的新个体；其误差相互独立，且均与建模样本独立。以 $\hat{\mu}_0 = x_0^\top b$ 预测这 4 个新个体响应的平均值，则预测误差方差的估计值为：

A. 0.4

B. 4.4

C. 5.6

D. 1.0

E. 1.4

题 2.34　最小二乘结论的条件

设 $Y = X\beta + \varepsilon$，X 固定且列满秩，$E(\varepsilon \mid X) = 0$、$\mathrm{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$，但不假定误差正态。考察：
I. 最小二乘估计 b 无偏。
II. 在关于 Y 线性且对所有 β 无偏的估计量中，b 具有最小的协方差阵。
III. 每个系数的常规 t 统计量在有限样本下必定服从精确 t 分布。
正确的是：

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. I、III

E. I、II、III

简答、计算与案例分析

题 2.35　两个约束的联合检验

完整模型为 $Y = \beta_0 + \beta_1 x_1 + \beta_2 x_2 + \beta_3 x_3 + \varepsilon$，两个 x_1, x_2 使用相同单位；设计矩阵列满秩，$n > 4$，正态线性模型假设成立。若要联合检验 $H_0 : \beta_1 = \beta_2,\ \beta_3 = 0$，请写出：

(1) $L\beta = c$ 形式中的 L 和 c；

(2) 简化模型及其参数个数；

(3) 用完整与简化模型残差平方和表示的 F 统计量和自由度。

题 2.36　糖尿病资料的增量检验

27 例糖尿病资料中，x_1 为总胆固醇、x_2 为甘油三酯、x_3 为空腹胰岛素、x_4 为糖化血红蛋白，y 为空腹血糖。同一批完整观测的拟合结果为

模型	均值结构	Q
R	$\beta_0+\beta_1x_1+\beta_4x_4$	114.761543
F	$\beta_0+\beta_1x_1+\beta_2x_2+\beta_3x_3+\beta_4x_4$	88.841167

假定正态线性模型条件成立。

(1) 写出比较 R 与 F 时的零假设，计算增量 F 值及自由度；给定 $F_{0.95}(2,22)=3.4434$，在 $\alpha=0.05$ 下作结论。

(2) 分别计算 $A=n\log(Q/n)+2p$，其中 p 含截距，并按 A 较小选择模型。

(3) 若两种选择不一致，是否表示计算有误?

题 2.37　肺活量的两个差值区间

29 名 13 岁男童的肺活量 Y(L) 对身高 h(cm)、体重 w(kg) 拟合含截距的正态线性模型。以下为本题练习数据版本的输出：

$$\begin{pmatrix} b_h \\ b_w \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.005016538 \\ 0.054061098 \end{pmatrix},\quad \widehat{\mathrm{Cov}}\begin{pmatrix} b_h \\ b_w \end{pmatrix}=\begin{pmatrix} 0.00011183994 & -0.00012544305 \\ -0.00012544305 & 0.00025548101 \end{pmatrix}.$$

剩余方差 $s^2=0.098380259$，剩余自由度 26，$t_{0.975}(26)=2.05553$。取条件 A 为 $(h,w)=(150,35)$，条件 B 为 $(160,40)$。

(1) 估计两条件总体平均肺活量之差 $\mu_B-\mu_A$ 及其 95% 置信区间。

(2) 若从两条件下各新观察 1 名男童，二者误差相互独立并与建模样本独立，求 Y_B-Y_A 的 95% 预测区间。

(3) 两个区间的解释有何不同?

题 2.38　缺失值后的模型比较

某分析者用 27 例糖尿病练习资料比较两个模型：$A:y\sim x_1+x_4$ 与 $B:y\sim x_1+x_2+x_3+x_4$。现作教学设定：将 3 人的 x_3 记为缺失，其余所需变量均完整。按模型分别删除缺失记录后，得到

模型及样本	n	p	Q	$A=n\log(Q/n)+2p$
A，27 人	27	3	114.761543	45.0695
B，24 人	24	5	42.415472	23.6670
A，与 B 相同的 24 人	24	3	66.096164	30.3134

分析者称：“23.6670 小于 45.0695，所以第一、二行已经证明 B 在同一数据上的拟合优于 A，而且 B 预测新患者一定更好。”

请评价这段话；指出本表中适当的比较，并写出用 R 保证两个模型使用同一批观测的基本做法。

习题解析

> **核对方式**
> 题号与前文一一对应。补写范围、原题歧义及数据还原方法列在相应答案中。

解析 题 2.1　偏相关与简单相关

返回题目

答案：B。

调整其他变量后，偏相关绝对值可增大、减小甚至变号，并非始终不超过简单相关。它只调整所指定的线性关系，不能保证消除一切混杂；标准化偏回归系数一般不等于偏相关系数。

解析 题 2.2　协方差阵与相关阵

返回题目

答案：D。

两者均对称；协方差阵刻画中心化变量的二阶信息，相关阵对应标准化变量。IV 声称协方差阵不对称，错误。

解析 题 2.3　分层与合并后的相关方向

返回题目

答案：A（控制分层变量后的关系）。

这是辛普森反转的表现：各层正相关而合并为负。若分层变量是应控制的混杂因素，应主要解释层内/调整后的关系；但仅凭反转不能独立确证它在因果图中的角色，还需设计与专业知识。

解析 题 2.4　模型筛选指标

返回题目

答案：C（给定选项中）。

调整 R^2 对增加变量有惩罚，比单纯追求训练 R^2 更适于比较相同结局和样本下的候选模型；还应结合专业依据、信息准则与样本外验证。F 或 P 的最优化不等于最佳预测模型。

解析 题 2.5　同量纲变量的贡献大小

返回题目

答案：C。

“贡献”可指每增加同一单位的效应、每增加 1 个标准差的效应或解释变异的增量。同量纲时 A 可比较单位效应，B 可比较标准差尺度的效应；必须先定义目标，不能认为有唯一通用指标。

解析 题 2.6　如何理解统计模型

返回题目

答案：D。

模型是对现实的近似，可按研究目标判断是否有用；形式选择需要专业判断和检验，而不是寻找脱离假设与用途的唯一真模型。这不表示模型可以随意挑选或结果不可信。

解析 题 2.7　不同尺度变量的效应比较

返回题目

答案：B（比较标准差尺度效应时）。

标准化偏回归系数将变量置于标准差尺度，比较幅度应看绝对值。它并不是因果贡献或解释变异的唯一指标；共线性严重时仍可能不稳定。

解析　题 2.8　最佳模型的筛选方法　返回题目

答案：A。

训练 R^2 随加入自变量不降低，单独最大化它倾向全模型。调整 R^2、Cp、逐步法可以是候选工具，但仍需专业判断和验证；逐步算法不保证找到唯一最佳模型。

解析　题 2.9　辛普森反转的解释　返回题目

答案：A（调整后关系的通常口径）。

这是辛普森反转的表现：各层正相关而合并为负。若分层变量是应控制的混杂因素，应主要解释层内/调整后的关系；但仅凭反转不能独立确证它在因果图中的角色，还需设计与专业知识。

解析　题 2.10　简单与复相关的取值范围　返回题目

答案：E。

简单相关 $r \in [-1,1]$，复相关通常定义为 $R = \sqrt{R^2} \in [0,1]$。含截距 OLS 下 R 等于观测 Y 与拟合 Y 的相关（非退化条件下）。

补写说明。 原 A 只记开头、B—D 空缺，补齐 A—D；E 的原意保留。

解析　题 2.11　预测区间与均值置信区间　返回题目

答案：A。

新个体预测还包括个体误差变异，区间中多一项误差方差。

补写说明。 原第 10 题整题未记录，本题新编。

解析　题 2.12　OLS 残差的正交性　返回题目

答案：A。

最小二乘正规方程给出设计矩阵各列与残差正交。残差由同一拟合产生，一般彼此相关；它们不等于真实误差。

补写说明。 2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.13　决定系数的定义　返回题目

答案：A。

它描述训练样本中相对于仅截距模型的平方和改善，不是因果解释比例或外部预测保证。

补写说明。 2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.14　自变量改变单位　返回题目

答案：B。

为保持 bX 不变，新斜率应为 b/10。正比例单位变换不改变对应标准化斜率。

补写说明。 2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.15　偏相关的计算思路　　返回题目

答案：A。

残差化剔除了所建模的 Z 线性部分；非线性及未测因素仍需另行考虑。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.16　偏回归系数的单位效应　　返回题目

答案：A。

回归描述条件均值，单个观测仍有误差；因果解释还需设计与识别条件。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.17　均值标准误中的杠杆项　　返回题目

答案：A。

新个体预测还要再加 s^2；远离设计中心的 x_0 通常有更大估计不确定性。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.18　等权中亲值的约束　　返回题目

答案：A。

展开 bZ 后父母原变量的系数均为 b/2；如事先作不同尺度校正，约束也相应改变。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.19　分组均数的加权一致性　　返回题目

答案：A。

总加权均数为 65.0579，与报告 66.9 差异远超这些一位小数舍入能解释的范围，应核查分组值或总均值；不能仅据此指定哪一个单元格必定错。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 2.20　焦虑系数的条件解释　　返回题目

答案：A。

使用原尺度 B 系数，不与标准化 β 混淆；观察性回归的条件关联不能直接解释为干预效果。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 2.21　高尔顿的中亲身高与多重回归

返回题目

父母的中亲值把两项相关的遗传背景信息压缩成一个量，等权或预先校正尺度后加权，模型较简洁、参数少，也避免分别估计高度相关的两个斜率。代价是施加了共同权重等限制，可能丢失父母贡献不同的信息。

多重回归允许两个斜率不同，并能纳入其他协变量，更灵活；但在小样本及强共线性下估计容易不稳定。不能只因为多一个参数就断言更优，应明确科学假设并比较验证表现。

解析 题 2.22　建立智商的多重线性回归

返回题目

按正文同名的 18 人数据：

$$\hat{y} = 4.591646 + 0.216856x_1 + 0.983433x_2.$$

$R^2 = 0.922034$、调整 $R^2 = 0.911638$，剩余标准差 5.7612。控制语文后数学系数 $P = 0.337$，控制数学后语文系数 $P = 0.00145$。两科相关较强，因此单个系数及其显著性不能仅按边际相关解释；还应检查 LINE 和预测表现。

解析 题 2.23　建立父母子身高回归

返回题目

正文同名的 8 条记录给出

$$\hat{y} = 7.943894 + 1.976382x_1 - 2.483871x_2.$$

$R^2 = 0.920212$，调整 $R^2 = 0.888297$，剩余标准差 0.11984；两个斜率 P 值约 0.00501 和 0.02075。母亲系数为负是给定父亲身高后的样本条件关联，不能解读为母亲越高会使子女变矮。样本极小且两自变量高度相关，应继续做共线性与敏感性分析。

补充练习解析

以下为补充练习的解析。这些题目为配合正文新编，并非往年试题；题中设定的数值仅供练习。

解析 题 2.24　标准化指标的线性组合

返回题目

答案：B。

标准化后各指标的均数为 0，故 $\bar{Z}=0$。令 $a=(1/3,1/3,1/3)^T$，

$$s_Z^2 = a^T R a = \frac{3+2(0.6+0.3+0.6)}{9} = \frac{2}{3}.$$

标准化使每个指标的方差为 1，并未使它们互不相关；不能忽略协方差项而答 1/3。

解析 题 2.25　整体 F 检验检验什么

返回题目

答案：D。

整体检验的原假设为 $H_0:\beta_1=\beta_2=\beta_3=\beta_4=0$，不包括截距。回归与误差自由度分别为 4 和 $27-4-1=22$。拒绝原假设说明至少一个斜率不为 0，不能推出每个斜率均显著；各变量的条件效应要看相应的 t 检验。

解析 题 2.26　逐步前进法的重新检验

返回题目

答案：C。

X_3 满足进入标准。引入后需重新检验在模变量，X_1 的 $P=0.18>0.10$，应删除并重新拟合 $Y\sim X_2+X_3$，再复查进出条件。不能沿用删项前的系数或 P 值，也不能认为变量一旦入选就永不退出。

解析 题 2.27　读最优子集比较表

返回题目

两项标准均选 **M2**：其调整 R^2 最大、AIC 最小。普通 R^2 随加入解释变量不降低，单靠它比较会偏向较复杂的 M3。

这里调整 R^2 的差异很小，M1 与 M2 的 AIC 也十分接近；只能说 M2 在给定指标中略优，不能据此宣称它具有明显优势或已找到唯一正确模型。还应结合变量的专业意义及模型诊断。

解析 题 2.28　肺活量回归的输出填空

返回题目

（1）方差分析填空。回归自由度 2，误差自由度 26；回归平方和 $5.6336-2.5579=3.0757$，回归均方 1.53785，残差均方 $2.5579/26=0.09838077$，整体 $F=15.6316$，参考分布为 $F(2,26)$。

（2）拟合指标。

$$s=\sqrt{2.5579/26}=0.3137,\quad R^2=1-\frac{2.5579}{5.6336}=0.5460,$$

$$R^2_{\text{adj}}=1-\frac{2.5579/26}{5.6336/28}=0.5110.$$

（3）单个系数。用 $s_{b_j}=s\sqrt{c_{jj}}$，得 $t_1=0.4744$、$t_2=3.3822$。按 0.05 水平，身高的条件效应无统计学意义，体重的条件效应有统计学意义。

（4）增量检验。

$$F_{X_1|X_2} = \frac{0.02214/1}{2.5579/26} = 0.2250 \approx t_1^2.$$

同一模型内对一个斜率的偏 F 检验与双侧 t 检验等价；末位差异来自摘要舍入。

（5）系数解释。 身高保持不变时，体重每增加 1 kg，预测平均肺活量增加约 0.0541 L。两个系数的单位不同，不能直接按数值大小比较相对重要性；若比较标准差尺度的效应，应使用标准化偏回归系数。

本次补充习题解析

解析　题 2.29　参数线性

返回题目

选 C。其设计矩阵的列为 $1, \log x, x^2$，都不含未知参数，条件均数是 $\beta_0, \beta_1, \beta_2$ 的线性组合。其余四式的某个未知参数位于指数、分母或对数内部；按题目指定的原参数，它们不是线性回归模型。自变量的函数形式有曲线，并不妨碍模型对参数线性。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[4]。

解析　题 2.30　误差方差的两种估计

返回题目

选 A。模型参数个数 $p = 4 + 1 = 5$，剩余自由度为 $27 - 5 = 22$。正态模型中 $\hat{\sigma}^2_{\mathrm{ML}} = Q/n = 88.841167/27 = 3.2904$，无偏估计为 $s^2 = Q/(n-p) = 88.841167/22 = 4.0382$。最大似然估计的分母是 n；截距也占一个回归参数。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[5]。

解析　题 2.31　联合变化的标准误

返回题目

选 D。估计变化为 $\widehat{\Delta} = b_1 + b_2 = 0.493911$；其估计方差为

$$\widehat{\mathrm{Var}}(\widehat{\Delta}) = 0.133702 + 0.041699 + 2(-0.047757) = 0.079887,$$

因此 $\mathrm{SE}(\widehat{\Delta}) = \sqrt{0.079887} = 0.2826$。两个系数来自同一个模型，必须计入协方差；0.0799 是方差，不是标准误。这里描述条件关联的联合变化，不赋予因果含义。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[5]。

解析　题 2.32　响应单位与模型比较

返回题目

选 B。改变单位后 $Q^* = 10^6 Q$，故每个模型的 $A^* = A + 2n\log 1000$。两个模型使用同一批 n 个观测，增加的是相同常数，因此差值及排序不变。R^2 中总平方和与残差平方和同时乘以 10^6；斜率及其标准误同时乘以 1000，所以 R^2 和 t 统计量也不变。该结论要求响应采用相同的单位变换，不能把只变换其中一个模型后的 A 值直接比较。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[4]、[8]。

解析　题 2.33　四个新个体的平均响应

返回题目

选 E。四个新个体平均响应的误差方差为 $\sigma^2/4$，原模型均值估计的方差为 $\sigma^2 h_0$；二者独立，故预测误差方差为 $\sigma^2(1/4+h_0)$，估计为 $4(0.25+0.10)=1.4$。此时既不是预测一个新个体，也不是只估计总体条件均数。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[4]。

解析　题 2.34　最小二乘结论的条件

返回题目

选 C。I 由 $b=\beta+(X^{\top}X)^{-1}X^{\top}\varepsilon$ 及零条件均值得到；II 是 Gauss–Markov 定理，不要求正态性。III 一般不成立：有限样本精确 t 分布还依赖正态模型提供的正态分子、卡方方差估计以及独立性。不能把最小二乘的无偏性、BLUE 性质与精确分布推断的条件混为一谈。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[4]。

解析　题 2.35　两个约束的联合检验

返回题目

按 $\beta=(\beta_0,\beta_1,\beta_2,\beta_3)^{\top}$，可取

$$L=\begin{pmatrix}0&1&-1&0\\0&0&0&1\end{pmatrix},\qquad c=\begin{pmatrix}0\\0\end{pmatrix}.$$

两个约束线性独立，$q=2$。零假设下令 $\gamma=\beta_1=\beta_2$，简化模型为 $Y=\beta_0+\gamma(x_1+x_2)+\varepsilon$，含 2 个参数；完整模型含 4 个参数。两模型须用同一批观测拟合，记残差平方和为 Q_R,Q_F，则

$$F=\frac{(Q_R-Q_F)/2}{Q_F/(n-4)}\overset{H_0}{\sim}F(2,n-4).$$

该题是两个约束的联合检验，不能以某一个系数的 t^2 代替。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[4]、[7]。

解析　题 2.36　糖尿病资料的增量检验

返回题目

(1) $H_0:\beta_2=\beta_3=0$，并保留 x_1,x_4。完整模型 $p_F=5$，简化模型 $p_R=3$，

$$F=\frac{(114.761543-88.841167)/2}{88.841167/22}=3.2094,\quad \nu=(2,22).$$

因 $3.2094<3.4434$，在 0.05 水平不拒绝 H_0；精确右尾 $P=0.05984$。这不等于证明两个系数都为 0。

(2) $A_R=27\log(114.761543/27)+2\times3=45.0695$，$A_F=27\log(88.841167/27)+2\times5=42.1574$。按此准则选择完整模型，$A_F-A_R=-2.9122$。

(3) 不矛盾。0.05 水平的假设检验与 AIC 式准则的惩罚标准不同，不能预期它们在所有样本中作出相同选择。这里报告的是一次既定模型比较；后续预测性能仍需另行评价。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[5]、[7]、[8]。

解析　题 2.37　肺活量的两个差值区间

返回题目

(1) 令 $d=(10,5)^{\top}$，记题给斜率估计的协方差阵为 $\widehat{\Sigma}_b$；截距在差值中抵消。

$$\widehat{\Delta}=10b_h+5b_w=0.320471\ \text{L},\quad \mathrm{SE}(\widehat{\Delta})=\sqrt{d^{\top}\widehat{\Sigma}_b d}=0.070899\ \text{L}.$$

95% 置信区间为 $0.320471\pm 2.05553\times 0.070899=(0.1747,0.4662)$ L。必须保留协方差交叉项。

(2) 两个独立新个体的误差之差额外具有方差 $2\sigma^2$，所以预测标准误为

$$\sqrt{0.070899^2+2(0.098380259)}=0.449207\ \text{L}.$$

95% 预测区间为 $0.320471\pm 2.05553\times 0.449207=(-0.6029,1.2438)$ L。

(3) 第一段区间针对两种条件的总体均数差；第二段针对两名新个体的实际响应差。虽然均数差区间全为正，仍可能出现条件 B 的新个体肺活量低于条件 A 的新个体。该比较依赖给定模型和人群，不是增重或增高的因果效应。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[6]。

解析　题 2.38　缺失值后的模型比较

返回题目

第一、二行使用不同观测，不能直接把其 A 值差解释为同一数据上的模型优劣；当 n 不同，省略的似然常数也不同。适当比较是第二、三行：同为 24 人、同一响应尺度，$A_B=23.6670<A_A=30.3134$，本准则在这 24 人中选择 B。其差为 -6.6464，只支持该次样本内准则下的选择，不能保证新患者预测更好；还应评价样本外误差，并考虑缺失导致的样本选择问题。

可先取全部候选变量的共同完整记录，再拟合两个模型：

```r
cc <- complete.cases(d[, c("y","x1","x2","x3","x4")])
dc <- d[cc, ]
a <- lm(y ~ x1 + x4, data = dc)
b <- lm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4, data = dc)
AIC(a, b)
```

R 的 `AIC()` 与题中省略常数的 A 值可能有公共平移，但在共同的 24 人中，模型排序及差值一致。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[5]、[8]。

第 3 章

多重线性回归：模型诊断与相关分析

第 2 章的 t 检验、F 检验与区间估计均以 LINE 假设为前提，而这些假设未必与实际数据相符。本章介绍模型拟合后的诊断方法：利用残差考察各项假设与数据是否大致相容，并识别对结论影响较大的个别观测。

模型诊断包括以下三方面内容：

1) 判断哪一项假设不满足。各项假设不满足时的后果不同，见下文“各项假设的重要性”。
2) 评价偏离的程度及其对结论的影响。实际数据不会完全满足模型假设，诊断关注的是偏离的程度与后果。
3) 选择处理方法：修改模型（加入非线性项、变量变换），改变估计方法（稳健标准误、加权最小二乘），或核查原始数据。

本章后半部分讨论的共线性、离群值与强影响点，属于数据结构导致估计不稳定或受少数观测左右的问题，与假设不满足有所区别。最后一节的复相关与偏相关，从相关分析的角度说明回归系数的含义。

3.1 考察模型是否满足 LINE 假设

诊断针对的是误差 ε 应满足的条件；误差不可观测，只能借助残差 e 来考察。

线性　均值结构正确，$E(\varepsilon \mid X) = 0$。用偏回归图等考察，如扣除 x_2, x_4 影响后，考察 x_3 与 y 的线性关系。

独立　各误差相互独立。按时间或顺序收集的数据可用 Durbin-Watson 统计量诊断一阶自相关，DW$\approx$ 2 提示无一阶自相关。

正态　误差服从正态分布。对残差作学生化变换后绘正态 Q-Q 图。

等方差　各误差的方差相同。以 $\hat{y}$ 为横轴、学生化残差为纵轴作图。

一阶自回归误差模型：

$$\varepsilon_t = \rho \varepsilon_{t-1} + u_t, \qquad u_t \sim N(0, \sigma_u^2) \text{ 独立}, \qquad |\rho| < 1.$$

ρ 为 1 阶自相关系数。内学生化残差为

$$\mathrm{SRE}_i = \frac{e_i}{s\sqrt{1 - h_{ii}}}.$$

> **批注**　“偏”指控制其他 x 的（线性）影响。偏回归图主要用于直观判断线性形式，必要时可配合检验，如加入二次项或样条项后作 t 检验或增量 F 检验。独立指各观测的误差独立；序列相关多见于时间序列或按顺序采集的数据，在经济学中讨论较多。u_t 为随机扰动项。SRE 为学生化残差，等方差作残差分布图。

各项假设的重要性

四项假设的重要性不同，按不满足时后果的严重程度排列如下：

1) **线性（均值结构正确）**最为重要。均值结构设定错误时，系数估计本身有偏，不反映真实关系，后续检验的精确性也就失去意义。
2) **独立性**次之。同一个体的重复测量、同一家庭或同一医院的个体之间往往相关，有效信息少于样本量 n 所示，常规标准误偏小，P 值偏小，易得出假阳性结论。
3) **等方差**再次。异方差时系数仍无偏，但标准误不准确，可采用稳健标准误。
4) **正态性**影响最小。样本量较大时，依据中心极限定理，系数的检验与区间估计对误差分布不敏感；正态性主要影响小样本推断与个体预测区间。


因此，残差图的检查顺序为：先考察有无曲线趋势，再考察离散程度是否变化，最后考察 Q-Q 图。正态性检验（如 Shapiro–Wilk 检验）在小样本时检验效能低，结果无统计学意义不能证明正态；在大样本时对实际意义不大的偏离也会给出有统计学意义的结果。因此诊断应以图形为主。

3.1.1　偏回归图

x_3 与 y 的偏回归图（partial regression plot，又称 added-variable plot），数据为例 15-1（对象 `da` 的定义见第2.6节）：

```
e1 <- resid(lm(x3~x2+x4,data=da))    # x3中不能由x2、x4线性解释的部分
e2 <- resid(lm(y~x2+x4,data=da))     # y中不能由x2、x4线性解释的部分
plot(e1,e2)
abline(lm(e2~e1))                    # 斜率 = -0.2870
```

> **批注**　`resid`：`plot` 的两个参数应为两个模型的残差向量，而非模型对象本身。



例 15-1 中 x_3 的偏回归图（由数据计算；直线斜率 -0.2870，即完整模型中 x_3 的系数）

Frisch–Waugh–Lovell 定理

条件　$Y = X_1\beta_1 + X_2\beta_2 + \varepsilon$，$[X_1\ X_2]$ 列满秩；X_2 含截距列。记 $H_2 = X_2(X_2^{\top}X_2)^{-1}X_2^{\top}$，$M_2 = I - H_2$。

结论　完整模型中 β_1 的最小二乘估计等于“M_2Y 对 M_2X_1 回归”的系数：

$$\hat{\beta}_1 = [(M_2X_1)^{\top}M_2X_1]^{-1}(M_2X_1)^{\top}M_2Y,$$

且这一回归的残差与完整模型的残差完全相同。

推导　完整模型的正规方程为 $X_1^{\top}(Y - X_1b_1 - X_2b_2) = 0$ 与 $X_2^{\top}(Y - X_1b_1 - X_2b_2) = 0$。由后者得 $X_2b_2 = H_2(Y - X_1b_1)$，于是完整模型的残差为

$$e = Y - X_1b_1 - H_2(Y - X_1b_1) = M_2(Y - X_1b_1) = M_2Y - M_2X_1b_1.$$


代入第一个方程：$X_1^{\top}M_2(Y - X_1b_1) = 0$，即 $X_1^{\top}M_2X_1b_1 = X_1^{\top}M_2Y$。因 M_2 对称幂等，$X_1^{\top}M_2X_1 = (M_2X_1)^{\top}(M_2X_1)$，$X_1^{\top}M_2Y = (M_2X_1)^{\top}(M_2Y)$，得结论。上式同时表明，$M_2Y$ 对 M_2X_1 回归的残差就是 e。

统计解释　偏回归图中 $e1 = M_2x_3$、$e2 = M_2y$，图中直线斜率正好等于完整模型中 x_3 的系数 -0.2870，点到直线的纵向距离就是完整模型的残差。因此偏回归图能直观显示该系数由哪些点决定、残差中是否还有弯曲趋势。注意：在图上直接拟合 $e2 \sim e1$ 得到的标准误（0.1071）使用自由度 $n-2$，与完整模型的 0.1117（自由度 $n-p=23$）略有不同，检验应以完整模型为准。


3.1.2　考察各残差有无 1 阶自相关性

1）残差序列图：绘制残差随时间变化的图形，若呈现周期性或趋势性变化，则可能存在自相关。


2）残差散点图：残差 e_t 与滞后一期残差 e_{t-1} 的散点图。点集中在一、三象限为正相关，二、四象限为负相关。




负自相关（示意图）



正自相关（示意图）



正自相关（示意图）



负自相关（示意图）

3.1.3 Durbin-Watson 检验

1）建立回归模型并计算残差。


2）计算 DW 统计量：

$$\mathrm{DW} = \frac{\sum (e_t - e_{t-1})^2}{\sum e_t^2}.$$

3）根据 α、模型自变量个数 m、总例数 n 查 DW 临界值表，确定 d_L 与 d_U，依评判标准得出残差间有无自相关的结论。

范围	判断
$0 < \mathrm{DW} < d_L$	存在正自相关
$d_L \le \mathrm{DW} \le d_U$	不能确定
$d_U < \mathrm{DW} < 4 - d_U$	无一阶自相关
$4 - d_U \le \mathrm{DW} \le 4 - d_L$	不能确定
$4 - d_L < \mathrm{DW} < 4$	存在负自相关

样本量较大时 $\mathrm{DW} \approx 2(1-\hat{\rho})$，$\hat{\rho}$ 为相邻残差的 1 阶自相关系数，所以 DW 接近 2 对应 $\hat{\rho} \approx 0$。DW 接近 2 的含义仅限于“未发现一阶自相关”：它不能排除高阶或季节性自相关（如滞后 7 天、12 个月）、整群（如同一家庭、同一医院）内的相关，也不能用于没有自然顺序的横断面数据。DW 检验还要求模型含截距、自变量中不含滞后的 y。R 中可用 `lmtest::dwtest(fit)` 计算精确 P 值，避免查表的不确定区。



3.1.4 考察残差是否服从正态分布

粗残差（未标化残差）：

$$e = y - \hat{y}.$$

由第2.2.4节，$\mathrm{Var}(e_i) = \sigma^2(1-h_{ii})$，各残差方差不等，需先统一尺度再作正态概率图。几种常用残差如下（h_{ii} 为杠杆值，由 `diag(H)` 或 `hatvalues(fit)` 获得）：

名称	定义	说明（R 函数）
标准化残差 ZRE	e_i/s	未考虑 h_{ii}
内学生化残差 SRE	$r_i = \dfrac{e_i}{s\sqrt{1-h_{ii}}}$	`rstandard(fit)`
删除残差	$e_{(i)} = y_i - \hat{y}_{i(i)} = \dfrac{e_i}{1-h_{ii}}$	删除第 i 点建模后对该点的预测误差
外学生化残差（删除学生化残差）	$t_i = \dfrac{e_i}{s_{(i)}\sqrt{1-h_{ii}}}$	$\sim t(n-p-1)$，`rstudent(fit)`

其中 $\hat{y}_{i(i)}$、$s_{(i)}$ 分别是删除第 i 个观测后所建模型对该点的预测值和剩余标准差，可不重新拟合而直接算出：

$$(n-p-1)s^2_{(i)} = (n-p)s^2 - \frac{e_i^2}{1-h_{ii}}, \qquad t_i = r_i\sqrt{\frac{n-p-1}{n-p-r_i^2}}.$$

删除残差 $e_{(i)}$ 与外学生化残差 t_i 是两个量：前者有原始单位，是“把该点留在外面时的预测误差”；后者再除以自身标准误，成为无量纲的 t 统计量。常说的“将第 i 个观测删除后建立模型，再将其回代得到残差”指的是 $e_{(i)}$；把它除以估计标准误 $s_{(i)}/\sqrt{1-h_{ii}}$ 即得 t_i。

$t_i \sim t(n-p-1)$ 的原因：正态模型下 $e_{(i)} \sim N(0, \sigma^2/(1-h_{ii}))$，$s^2_{(i)}$ 由其余 $n-1$ 个观测算得，$(n-p-1)s^2_{(i)}/\sigma^2 \sim \chi^2_{n-p-1}$，且与 $e_{(i)}$ 独立（新观测与建模样本独立），由 t 分布的定义即得。内学生化残差的分子分母不独立，$r_i^2/(n-p)$ 服从 Beta 分布，$|r_i| \le \sqrt{n-p}$，不服从 t 分布。

> **批注** 粗残差不服从标准正态分布。s 是 σ 的估计，即剩余标准差。内学生化残差使用包含当前点的所有数据估计标准差；外学生化残差排除当前点后重新拟合模型估计标准差，也叫删除学生化残差。

3.1.5　考察各残差是否等方差


以 $\hat{y}$（或某个 x）为横轴、学生化残差为纵轴作图时，须区分两类不同的模式：

- 残差的**平均水平**随 $\hat{y}$ 呈弯曲或趋势变化：提示均值结构设定有误（遗漏非线性项、交互项或重要变量），属于“线性”条件的问题。
- 残差的**离散程度**随 $\hat{y}$ 变化，如呈喇叭形：提示异方差。散点在 0 上下呈宽度大致不变的水平带，提示等方差假设可接受。


异方差时 $\hat{\beta}$ 仍无偏，但 $s^2(X^\top X)^{-1}$ 不再是其正确的协方差阵，常规 t、F 检验和区间失准。常见的后续处理：

- 稳健（异方差一致，sandwich）标准误：$\widehat{\mathrm{Cov}}(\hat{\beta}) = (X^\top X)^{-1} X^\top \mathrm{diag}(e_i^2) X (X^\top X)^{-1}$ 及其小样本修正，系数估计不变。R 代码见下。
- 加权最小二乘（WLS）：若 $\mathrm{Var}(\varepsilon_i) = \sigma^2 / w_i$ 且 w_i 已知或可估计，最小化 $\sum w_i e_i^2$，R：`lm(y~x,weights=w)`。
- 变量变换：如方差随均数增大时对 y 取对数或平方根；此时系数的解释随之改变。

```r
library(lmtest); library(sandwich)
coeftest(fit,vcov=vcovHC(fit,type="HC3"))    # 稳健标准误
```



等方差（示意图）



异方差（示意图）

3.1.6　例 15-1 的模型诊断

下面对第 2 章筛选得到的模型 `y~x2+x3+x4` 进行诊断。实际工作中应首先作图：`plot(fit)` 依次给出残差–拟合值图（考察线性与等方差）、正态 Q-Q 图、尺度–位置图（考察等方差）和残差–杠杆图（标出 Cook 距离等高线）。相应的数值检查如下：

```r
library(lmtest)
fit <- lm(y~x2+x3+x4,data=da)
par(mfrow=c(2,2)); plot(fit)              # 四张诊断图
shapiro.test(rstudent(fit))               # 正态
dwtest(fit)                               # 一阶自相关（需观测有自然顺序才有意义）
bptest(fit)                               # Breusch-Pagan异方差检验
inf <- data.frame(t=rstudent(fit),h=hatvalues(fit),D=cooks.distance(fit))
round(head(inf[order(-inf$D),],4),3)      # Cook距离最大的4个点
```

```
        Shapiro-Wilk normality test
W = 0.95395, p-value = 0.267

        Durbin-Watson test
DW = 1.6447, p-value = 0.1812

        studentized Breusch-Pagan test
BP = 0.59577, df = 3, p-value = 0.8974

       t     h     D
25 1.838 0.476 0.694
6  1.963 0.356 0.473
26 2.918 0.131 0.242
9  1.050 0.335 0.138
```

结果解释如下：

- 三项检验均无统计学意义，未发现明显的非正态、自相关和异方差。但 $n = 27$，各项检验的效能均较低，结果仅表明未发现明显问题。本例 27 名患者没有时间顺序，改变排列顺序即可改变 DW 值，故 DW 检验的意义有限。
- 平均杠杆值 $p/n = 4/27 = 0.148$。第 25 号观测的 $h = 0.476$，超过平均值的 3 倍，为高杠杆点。该患者的甘油三酯为 10.89，远高于其他患者（其总胆固醇 11.54 也为全样本最高，但 x_1 不在本模型中，不影响杠杆值）。该观测的 Cook 距离为 0.694，为全样本最大，虽未超过 1，但远大于 $4/n = 0.148$，应核查原始记录，并比较删除该观测前后的系数。
- 第 26 号观测的外学生化残差为 2.918，在 y 方向上偏离最大，但其杠杆值低，Cook 距离仅为 0.242，对系数的影响有限。

诊断发现的异常观测不应直接删除。核查后若数据无误，应予保留，并在报告中给出敏感性分析的结果，即删除与保留这些观测时结论是否一致。

3.2 考察自变量间有无严重共线性

共线性（collinearity）指自变量间高度线性相关。如果糖化血红蛋白 x_4 可以用甘油三脂 x_2、空腹胰岛素 x_3 的线性组合完全表达，

$$x_4 = b_0 + b_2 x_2 + b_3 x_3,$$

则称 x_4 与 x_2, x_3 间有完全共线性。这时设计矩阵 X 不满秩，$X^\top X$ 奇异，$(X^\top X)^{-1}$ 不存在，正规方程有无穷多组解：各回归系数不能唯一确定（不可识别），但拟合值 $\widehat{Y}$ 是 Y 在 X 列空间上的投影，仍唯一确定。作回归分析 `lm(y~x2+x3+x4)` 时，R 会对冗余的列给出 `NA`。当严重共线性时，即 $x_4 \approx b_0 + b_2 x_2 + b_3 x_3$，方程有解，但 $X^\top X$ 接近奇异，会出现某个自变量的回归系数符号异常或标准误显著增大问题。

3.2.1 共线性诊断

两两相关系数不足以排除共线性：多个自变量之间可以存在线性依赖，而任意两个变量的相关系数都不大。例如 $x_4 = x_1 + x_2 + x_3$、三者互不相关且方差相同时，x_4 与每个 x_j 的相关系数只有 $1/\sqrt{3} \approx 0.58$，却是完全共线性。因此除看 R 阵里的相关系数绝对值是否接近 1 之外，诊断方法有：

- 方差扩大因子（Variance Inflation Factor，VIF）很大，如 > 10。
- 容忍度（TOL，即 VIF 倒数）很小，如 < 0.1。
- 对 X 的相关阵求特征值。如有特征值接近 0，得出的条件指数（Condition Index）大于 30，提示严重共线性（10–30 为中等）。

$$k = \sqrt{\frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}}.$$

以上界限（10、0.1、30）都是经验界限，不是检验的临界值；共线性是否“严重”，还要看所关心系数的标准误是否大到影响结论。例 15-1 中 4 个自变量的 VIF 为 2.19、1.78、1.28、1.27，相关阵特征值为 2.037、1.031、0.647、0.285，最大条件指数 2.67，不存在严重共线性。R：`car::vif(fit)`。

3.2.2 VIF 的计算

将第 k 个自变量 X_k 作为因变量，其余所有自变量作为解释变量，建立线性回归模型：

$$X_k = \gamma_0 + \gamma_1 X_1 + \cdots + \gamma_{k-1} X_{k-1} + \gamma_{k+1} X_{k+1} + \cdots + \gamma_m X_m + \text{误差}.$$

得到该模型的决定系数 R_k^2，表示其他自变量对 X_k 的解释程度。

$$\mathrm{VIF}_k = \frac{1}{1 - R_k^2}.$$

R_k^2 越接近 1，说明 X_k 与其他自变量的线性相关性越强，VIF 值越大。

> **批注** 例子：《多元统计分析方法》45 页。VIF 越大，X_k 能被其他自变量线性解释的程度越高。

VIF 的来源

条件　$\mathrm{Cov}(\varepsilon \mid X) = \sigma^2 I$，模型含截距，$X$ 列满秩。记 x_j 为第 j 个自变量的观测向量，R_j^2 为 x_j 对其余自变量（含截距）回归的决定系数。

结论

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j \mid X) = \frac{\sigma^2}{\sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2} \cdot \frac{1}{1 - R_j^2}.$$

推导　令 $M_{-j} = I - H_{-j}$，H_{-j} 为向其余列（含全 1 列）张成空间的投影阵。由 Frisch–Waugh–Lovell 定理，$\hat{\beta}_j = (x_j^\top M_{-j} x_j)^{-1} x_j^\top M_{-j} Y$，故

$$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_j \mid X) = \frac{x_j^\top M_{-j}\, \sigma^2 I\, M_{-j} x_j}{(x_j^\top M_{-j} x_j)^2} = \frac{\sigma^2}{x_j^\top M_{-j} x_j}.$$

$x_j^\top M_{-j} x_j$ 正是 x_j 对其余自变量回归的残差平方和，等于 $(1 - R_j^2) \sum_i (x_{ij} - \bar{x}_j)^2$，代入即得。

统计解释　比较基准是：x_j 与其他自变量在样本中完全不相关（$R_j^2 = 0$）时的方差 $\sigma^2/\sum_i(x_{ij}-\bar{x}_j)^2$。VIF 就是实际方差相对于这一基准的倍数，标准误扩大 $\sqrt{\text{VIF}}$ 倍。例 3.1 中身高与体重的相关系数为 0.742，$\text{VIF} = 1/(1-0.742^2) = 2.23$，两系数的标准误约为无共线性时的 1.49 倍。共线性只增大方差，不使最小二乘估计产生偏倚。

共线性对估计的影响：模拟

上述推导表明，共线性增大估计的方差，但不产生偏倚。以下用模拟加以说明。设真实模型为 $y = 1 + x_1 + x_2 + \varepsilon$，$\sigma = 2$，$n = 30$，$x_1$ 与 x_2 的相关系数 r 分别取 0、0.9、0.99，各重复抽样 2000 次：

```
set.seed(7)
one <- function(r){
  n <- 30; x1 <- rnorm(n); x2 <- r*x1+sqrt(1-r^2)*rnorm(n)
  y <- 1+x1+x2+rnorm(n,sd=2)
  s <- summary(lm(y~x1+x2)); f <- s$fstatistic
  c(b1=coef(s)[2,1], p1=coef(s)[2,4], p2=coef(s)[3,4],
    pF=unname(pf(f[1],f[2],f[3],lower.tail=FALSE)))
}
for(r in c(0,0.9,0.99)){
  res <- t(replicate(2000,one(r)))
  cat("r=",r," mean(b1)=",round(mean(res[,"b1"]),3)," sd(b1)=",round(sd(res
   [,"b1"]),3),
      " P(b1<0)=",round(mean(res[,"b1"]<0),3),
      " F显著而两个t都不显著:",round(mean(res[,"pF"]<.05&res[,"p1"]>.05&res[,
   "p2"]>.05),3),"\n")
}
```

```
r= 0  mean(b1)= 0.997  sd(b1)= 0.389  P(b1<0)= 0.004  F显著而两个t都不显著: 0.016
r= 0.9  mean(b1)= 1.019  sd(b1)= 0.91  P(b1<0)= 0.124  F显著而两个t都不显著: 0.59
r= 0.99  mean(b1)= 1.007  sd(b1)= 2.906  P(b1<0)= 0.354  F显著而两个t都不显著:
 ↪  0.878
```

三种情形下 b_1 的均数均接近 1，即估计无偏。$r = 0.99$ 时，b_1 的标准差增大至 $r = 0$ 时的 7 倍以上，超过三分之一的样本中 b_1 为负值，即符号与真值相反；近九成样本出现整体 F 检验有统计学意义而两个 t 检验均无统计学意义的情况。$\text{VIF} = 1/(1-0.99^2) \approx 50$，$\sqrt{50} \approx 7$，与模拟结果一致。

共线性的实质在于各变量的作用难以分离：数据能够表明 x_1 与 x_2 合起来与 y 有关，但不足以确定二者各自的贡献。若研究目的仅为预测 y，共线性的影响不大；若需解释单个系数，共线性会造成严重困难。删除变量、岭回归与主成分回归，都是通过施加额外约束来换取估计的稳定。

3.2.3 严重共线性的处理

- 删除冗余自变量。
- 岭回归分析。
- 主成分回归分析。

> **批注** 岭回归见书 47 页；主成分回归在多元分析课讲解。

3.3 岭回归分析

标准化回归系数与岭回归：

$$\tilde{b} = R_{XX}^{-1} r_y = \begin{bmatrix} \tilde{b}_1 \\ \vdots \\ \tilde{b}_m \end{bmatrix}, \qquad \tilde{b}(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_y.$$

岭回归在相关矩阵 R_{XX} 的主对角线元素上增加 k（岭参数），使矩阵远离奇异，改善估计中的病态（ill-conditioned）问题，以偏倚换取方差的大幅减小。数据中自变量间的相关性本身并未改变。

惩罚最小二乘形式。先将各自变量中心化并标准化，记为矩阵 Z，y 中心化。截距不受惩罚，估计为 $\bar{y}$。岭回归估计使

$$\sum_{i=1}^{n} (y_i - \bar{y} - z_i^{\top} b)^2 + \lambda \sum_{j=1}^{m} b_j^2$$

达到最小，解为 $\hat{b}(\lambda) = (Z^{\top}Z + \lambda I)^{-1} Z^{\top}(y - \bar{y}\mathbf{1})$。若 Z 按样本标准差标准化、y 也标准化，则 $Z^{\top}Z = (n-1)R_{XX}$，$Z^{\top}y = (n-1)r_y$，上式即为

$$\tilde{b}(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_y, \qquad k = \frac{\lambda}{n-1}.$$

不同软件对 λ 的尺度规定不同（如按 n 或 $n-1$ 归一，标准化时用 n 还是 $n-1$ 作分母），岭参数的数值不能跨软件直接比较。

谱分解下的收缩与偏差–方差变化

条件　$R_{XX} = \sum_j \lambda_j e_j e_j^{\top}$ 为谱分解；同方差模型，标准化尺度下 $\mathrm{Cov}(r_y)$ 与 R_{XX} 成比例，从而 $\mathrm{Cov}(\tilde{b})$ 与 R_{XX}^{-1} 成比例。

结论　岭估计把普通最小二乘估计在每个特征方向上乘以收缩因子 $\lambda_j/(\lambda_j + k)$；特征值越小的方向收缩越多。$k > 0$ 时估计有偏，但方差减小。

推导

$$\tilde{b} = R_{XX}^{-1} r_y = \sum_j \frac{1}{\lambda_j} e_j e_j^{\top} r_y, \qquad \tilde{b}(k) = \sum_j \frac{1}{\lambda_j + k} e_j e_j^{\top} r_y = \sum_j \frac{\lambda_j}{\lambda_j + k} (e_j e_j^{\top} \tilde{b}).$$

普通最小二乘的协方差阵与 $\sum_j \lambda_j^{-1} e_j e_j^{\top}$ 成比例，当某个 $\lambda_j \to 0$（近似共线性）时方差爆炸；岭估计的协方差阵与 $\sum_j \lambda_j (\lambda_j + k)^{-2} e_j e_j^{\top}$ 成比例，每项不超过 $1/(4k)$，有界。代价是偏倚 $E[\tilde{b}(k)] - \tilde{\beta} = -\sum_j k/(\lambda_j + k)\, e_j e_j^{\top} \tilde{\beta}$。$R_{XX} + kI$ 的条件数 $\sqrt{(\lambda_{\max} + k)/(\lambda_{\min} + k)}$ 也随 k 增大而下降。

统计解释　可以证明总存在某个 $k > 0$ 使岭估计的均方误差小于最小二乘估计（Hoerl–Kennard），这并不违背 Gauss–Markov 定理，因为岭估计不是无偏估计。

岭参数的选择。岭迹图可作直观参考：系数随 k 增大逐渐稳定。原例依据下图取 $k = 0.04$。但不应以“系数符号转正”作为选择原则：偏回归系数的符号与单变量相关的符号不同本身可能是合理的，按预期符号挑选 k 等于用结论引导估计。更客观的做法是用交叉验证或广义交叉验证（GCV）选择使预测误差最小的 k。

```
library(MASS)
rr <- lm.ridge(y~x1+x2+x3+x4,data=da,lambda=seq(0,20,by=0.01))
select(rr)                    # 给出HKB、L-W估计及GCV最小的lambda
coef(rr)[which.min(rr$GCV),] # GCV最优lambda=8.83时的系数（原始尺度）
```

以例 15-1 数据演示（该例共线性并不严重，仅用于说明用法）：GCV 选得 $\lambda = 8.83$，截距为 6.325，x_1–x_4 的系数为 0.279、0.243、−0.207、0.500；最小二乘估计依次为 5.943 与 0.142、0.351、−0.271、0.638。相比之下，各斜率整体向 0 收缩，x_1 与 x_2 之间有所重新分配。`lm.ridge` 内部标准化时以 n 为分母，其 λ 与上面 k 的换算以该函数的定义为准。




图 3.1　不同岭参数 k 时回归系数的岭迹（示意图，非由本书数据计算）

3.4　诊断离群值和强影响点

y 的异常值　响应方向的离群点，一般认为是删除学生化残差 $|t_i| > 3$ 的观测值，也可与 $t(n-p-1)$ 分布比较。

x 的异常值　自变量方向远离数据中心的高杠杆点，如杠杆值 h_{ii} 超出平均杠杆值 $\bar{h} = p/n$ 的 2–3 倍的样本点。

强影响点 删除该数据点会使估计结果（系数、拟合值、检验结论）发生显著变化的点。

平均杠杆值来自 $\mathrm{tr}(H)=p$（第2.2.4节）：$\bar{h}=\frac{1}{n}\sum h_{ii}=p/n$。$h_{ii}$ 只取决于 x，度量第 i 点在自变量空间中离中心的远近，与 y 无关。

x 的异常值不一定是强影响点，要结合库克距离（p 为含截距的参数个数）：

$$D_i=\frac{e_i^2}{p\,s^2}\frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}=\frac{r_i^2}{p}\cdot\frac{h_{ii}}{1-h_{ii}}.$$

它反映杠杆值和残差的综合效应，$D_i>1$（或 $>4/n$）提示强影响点；这些都是提示进一步核查的经验界限。

Cook 距离的含义

条件　$\hat\beta_{(i)}$、$\hat Y_{(i)}=X\hat\beta_{(i)}$ 为删除第 i 个观测后所得的系数及其对全部 n 个点的拟合值。

结论

$$D_i=\frac{(\hat Y-\hat Y_{(i)})^{\top}(\hat Y-\hat Y_{(i)})}{p\,s^2}=\frac{(\hat\beta-\hat\beta_{(i)})^{\top}X^{\top}X(\hat\beta-\hat\beta_{(i)})}{p\,s^2}=\frac{e_i^2}{p\,s^2}\frac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}.$$

推导　由矩阵求逆的秩一更新公式可得 $\hat\beta-\hat\beta_{(i)}=(X^{\top}X)^{-1}x_i\,e_i/(1-h_{ii})$。代入第二个表达式，$x_i^{\top}(X^{\top}X)^{-1}X^{\top}X(X^{\top}X)^{-1}x_i=h_{ii}$，即得第三个表达式。


统计解释　D_i 衡量“删去第 i 点后全部拟合值整体移动了多少”，并以 $p\,s^2$ 标准化。它是残差（r_i^2）与杠杆（$h_{ii}/(1-h_{ii})$）的乘积：只有残差较大且杠杆较高的点，删除后结果才会明显改变。

批注 删除观测后考察系数、检验。为什么不用学生化残差?

答　学生化残差只反映 y 方向的偏离，不反映该点在 x 方向的位置。高杠杆点会把回归线拉向自己，自身残差反而很小（$\mathrm{Var}(e_i)=\sigma^2(1-h_{ii})$），学生化残差可能并不大，但删去它后系数可能大变。反过来，x 居中的点即使残差较大，对系数的影响也有限。所以判断强影响要同时看残差和杠杆，即用 Cook 距离（或 DFFITS、DFBETAS）。

3.4.1 y 的异常值举例

编号	x	y
1	1	3.4
2	2	7.9
3	3	14.6
4	4	13.6
5	5	15.5
(6)	(10)	(33.0)



问　第 3 号观测是否异常？说明理由。如果增加 6 号观测，$x_6 = 10, y_6 = 33$，其是否异常？

> **批注** 第 3 号超出了，= 4.xx。

答

- 1–5 号 ($n = 5, p = 2$)：拟合 $\hat{y} = 2.03 + 2.99x$。第 3 点残差 $e_3 = 14.6 - 11.00 = 3.60$，$h_{33} = 0.2$（低于平均杠杆 $p/n = 0.4$），内学生化残差 $r_3 = 1.646$，外学生化残差 $t_3 = 4.3164 > 3$，参照 $t(n-p-1) = t(2)$，单点双侧 $P = 0.0497$。故第 3 点是响应方向的离群点，但不是高杠杆点；其 $D_3 = 0.339 < 1$，不是强影响点。注意 $n = 5$ 时自由度只有 2，若对 5 个点同时检验作 Bonferroni 校正，$P = 0.25$，证据并不充分，应核查原始记录而不是直接删除。
- 加入 6 号点后（$n = 6$）：$h_{66} = 0.8361$，远超 $2p/n = 0.667$，是 x 方向的高杠杆点；但它几乎落在原趋势的延长线上，$t_6 = 0.177$，不是响应离群点；$D_6 = 0.1056 < 1$，删去它对拟合影响不大，不是强影响点。此时第 3 点的 $t_3 = 4.466$，仍是响应离群点。
- 由此区分三个概念：响应离群看 t_i，高杠杆看 h_{ii}，强影响看 D_i（二者兼有才强）。

R：`rstudent(fit)`; `hatvalues(fit)`; `cooks.distance(fit)`。

```r
x <- 1:5; y <- c(3.4,7.9,14.6,13.6,15.5)
f1 <- lm(y~x)
round(cbind(t=rstudent(f1),h=hatvalues(f1),D=cooks.distance(f1)),3)
```

```
      t   h     D
1 -1.074 0.6 0.823
2 -0.044 0.3 0.001
3  4.316 0.2 0.339
4 -0.157 0.3 0.008
5 -0.937 0.6 0.687
```

表中外学生化残差最大的是第 3 点，而 Cook 距离最大的是两端的第 1、5 点。两端各点的杠杆值为 0.6，对斜率起决定作用，删除其中任一点，回归直线均有明显转动；第 3 点位于中部，删除后直线主要发生平移。仅有 5 个观测时，几乎每一点都具有一定影响，此类指标只能作为参考。

3.5 多重线性相关分析

3.5.1 复相关系数

除用皮尔逊相关系数度量 y 与 x_i 间的线性相关程度外，可以用复相关系数 R 度量 y 与多个自变量间的线性相关程度：

$$R = \mathrm{cor}(y, \hat{y}).$$

含截距时 $R^2 = [\mathrm{cor}(y, \hat{y})]^2$，$R = \sqrt{R^2}$。例 3.1 中 $R = \sqrt{0.546} = 0.739$。

> **批注** 多个 x 看成一个整体。

3.5.2 偏相关分析

偏相关系数表示一组变量中，任意两个变量在其他变量固定不变时，它们之间的相关密切程度和方向；或扣除其他变量对它们的影响后，两个变量间的线性相关情况，用 $r_{x_1,x_2|x_3,x_4,\ldots,x_m}$ 表示。

要讨论 y 与 x_1 的相关关系时，应扣除其他自变量影响。

> **批注** 相当于把 y 看作 x_{m+1}。作回归得到残差，看残差之间的相关性。

残差定义与计算公式。设要控制的变量集合为 Z（q 个变量）。分别作 x 对 Z、y 对 Z 的回归（均含截距），偏相关系数就是两组残差的相关系数：

$$r_{xy\cdot Z} = \mathrm{cor}(e_{x|Z},\, e_{y|Z}).$$

只控制一个变量 z 时有显式公式

$$r_{xy\cdot z} = \frac{r_{xy} - r_{xz} r_{yz}}{\sqrt{(1 - r_{xz}^2)(1 - r_{yz}^2)}}.$$

检验。H_0：总体偏相关系数为 0。

$$t = \frac{r_{xy\cdot Z}\sqrt{n - 2 - q}}{\sqrt{1 - r_{xy\cdot Z}^2}} \overset{H_0}{\sim} t(n - 2 - q).$$

这一 t 值与“y 对 x 和 Z 作多重回归时 x 系数的 t 检验”完全相同，自由度 $n - 2 - q = n - p$ 也相同：由 Frisch–Waugh–Lovell 定理，x 的系数就是两组残差回归的斜率。因此“x 的偏回归系数为 0”与“x、y 的偏相关系数为 0”是同一个假设。

表 8.3 中 $r_{XY} = 0.932$，$r_{XZ} = 0.918$，$r_{YZ} = 0.958$，扣除智商 Z 后

$$r_{XY\cdot Z} = \frac{0.932 - 0.918 \times 0.958}{\sqrt{(1 - 0.918^2)(1 - 0.958^2)}} = 0.461,$$

$$t = \frac{0.461\sqrt{15}}{\sqrt{1 - 0.461^2}} = 2.013, \quad \nu = 15, \quad P = 0.062.$$

（按三位小数代入得 0.462，0.461 为用未舍入相关系数的结果；$n = 18$，$q = 1$。）数学与语文成绩的简单相关很高（0.932），主要是二者都与智商相关；扣除智商的线性影响后，相关明显减弱。

“控制其他变量”在这里指线性调整：只去掉了 x、y 中能被 Z 线性解释的部分。若 x 或 y 与 Z 呈非线性关系、Z 测量有误差，或存在未纳入的共同影响因素，偏相关系数仍可能受残余混杂影响。

```r
X <- c(78,84,61,52,93,89,98,98,65,73,48,45,67,75,95,88,99,81)          # 数学
Y <- c(83,76,70,58,82,78,89,95,61,75,53,43,70,78,97,92,92,88)          # 语文
Z <- c(95,100,100,75,105,97,110,120,76,92,61,60,88,96,125,113,126,102) # 智商
cor(resid(lm(X~Z)),resid(lm(Y~Z)))     # 0.4612
summary(lm(Y~X+Z))                     # X的t=2.013, P=0.062
```

表 8.3　18 名学生的智商、数学成绩和语文成绩

编号	数学 X	语文 Y	智商 Z	编号	数学 X	语文 Y	智商 Z
1	78	83	95	10	73	75	92
2	84	76	100	11	48	53	61
3	61	70	100	12	45	43	60
4	52	58	75	13	67	70	88
5	93	82	105	14	75	78	96
6	89	78	97	15	95	97	125
7	98	89	110	16	88	92	113
8	98	95	120	17	99	92	126
9	65	61	76	18	81	88	102

《医学统计学与电脑试验》第二版，160 页，方积乾主编。




图 21.1　扣除智商的影响后，数学成绩 Y 和语文成绩 X 之间的偏相关系数示意图（按原书图形重绘，点数与表 8.3 不同，仅示意 (a)–(d) 的残差构造过程）

《医学统计学与电脑试验》第二版，383 页，方积乾主编。

简单相关、偏相关、复相关与回归的关系

三种相关系数与回归分析的对应关系如下：

- 简单相关 r_{xy}：不控制任何变量，x 与 y 的线性关联；对应简单回归的斜率检验。

- 偏相关 $r_{xy\cdot Z}$：扣除 Z 的线性影响后的关联；与多重回归中 x 系数的 t 检验等价。
- 复相关 R：y 与全部自变量（合成一个 $\hat{y}$）的关联；R^2 的检验就是整体 F 检验。

数学与语文成绩的例子中，简单相关系数为 0.932，扣除智商的影响后降为 0.461，且无统计学意义。第三个变量同时影响两个变量的情形，在流行病学中称为混杂。另有一种相反的情形：若 Z 为 x 影响 y 的中间变量（例如 x 为吸烟、Z 为肺功能、y 为死亡），控制 Z 会扣除 x 的部分真实作用。是否应控制某一变量，取决于该变量在因果结构中的位置，不能由统计量本身判断。

本章要点

1) 诊断以残差为依据。残差方差为 $\sigma^2(1-h_{ii})$，故应先作学生化处理再作图或比较。内学生化残差用 `rstandard()`，外学生化残差用 `rstudent()`，后者服从 $t(n-p-1)$。
2) 残差对拟合值作图：平均水平呈曲线趋势提示线性问题，离散程度呈喇叭形提示异方差。
3) 独立性主要依据研究设计判断；DW 检验仅针对有顺序数据的一阶自相关，DW$\approx 2(1-\hat{\rho})$。
4) 异方差时系数仍无偏，但标准误不准确，可采用稳健标准误、加权最小二乘或变量变换。
5) 共线性：$\mathrm{VIF}_j = 1/(1-R_j^2)$，标准误扩大为原来的 $\sqrt{\mathrm{VIF}}$ 倍；常用经验界限为 VIF>10、条件指数 >30。两两相关系数不大时也可能存在共线性。
6) 岭回归以偏倚换取方差的减小，在特征值小的方向上收缩最多；岭参数宜用交叉验证（GCV）确定，不宜以系数符号是否符合预期为依据。
7) 区分三个概念：y 方向的离群用 t_i 判断，高杠杆用 h_{ii} 判断（与 y 无关，均数为 p/n），强影响用 Cook 距离 D_i 判断（残差与杠杆的综合）。
8) 偏相关系数的检验与相应偏回归系数的 t 检验等价；此处的“控制”仅指线性扣除。

常见错误表述

- “Shapiro–Wilk 检验 $P>0.05$，证明残差服从正态分布。”应表述为：未发现残差明显偏离正态分布。
- “VIF<10，故不存在共线性。”10 仅为经验界限，应考察关心的系数的标准误是否大到影响结论。
- “该点学生化残差很小，故对模型没有影响。”高杠杆点将回归线拉向自身，其残差反而较小，应结合 Cook 距离判断。
- “发现离群点后将其删除并重新分析。”应先核查数据；数据无误时予以保留，并报告删除前后的敏感性分析结果。

第 3 章　习题与解析

多重线性回归与相关：模型诊断

往年题

单项选择题

题 3.1　拟合优度与应用价值

关于多重线性回归中拟合优度指标的使用, 正确的说法是

A. 一般而言, 模型的决定系数在 0.8 以上才有价值

B. 如果决定系数大于 0.9, 即使 P 值大于 0.05 也是可信的模型

C. 在变量筛选时, 使用决定系数比较来判断变量的剔或入选

D. 在分析完毕写论文时, 要报告模型矫正决定系数, 因为这个指标是无偏性的。

E. 对于不同领域的应用, 对模型的拟合优度要求不同, 即使决定系数等于 0.1, 也可能有使用价值。

题 3.2　回归的前提条件

多重线性回归模型对资料的要求不包括

A. 因变量和自变量为线性关系

B. 因变量的变量值互不相关

C. 因变量和自变量相互独立

D. 给定自变量, 因变量分布为正态分布, 且等方差

E. 自变量之间不应有过高的相关性

共用资料：急诊就诊量与气象要素

阅读随包的《急诊就诊量与气象要素的相关性分析》（费敏，2008）。研究分析 2005—2006 连续 730 天数据，报告急诊 199649 人次、日均 274.5 人次；7 月最高、2 月最低。文中写采用 post hoc 检验。回归从 9 个气象变量中筛出以下 4 项：

变量	B	SE	标准化 β	P
平均相对湿度	1.011	0.159	0.244	<.001
最高气温	1.126	0.546	0.212	<.05
最低气温	2.2	0.591	0.378	<.001
最大风速	-0.606	0.091	-0.207	<.001

给出的预测公式截距为 285.481。讨论中认为春节期间停工休息可能减少意外就诊，也讨论高温和低温均可能增加急症。文中未给出本模型的 R^2、时间序列残差或共线性诊断；所引用的 84% 与 44% 来自别人的研究。

题 3.3　文献报告不足与已证实错误

文献 1 的多元线性回归模型分析中的错误不包括

A. 因变量可能存在序列相关

B. 未考虑共线性的问题

C. 未报告模型的拟合优度指标

D. 专业术语写错或错别字

E. 建模前未绘制散点图考核因变量和自变量的线性关系

题 3.4　讨论与模型是否一致

关于研究的结论, 最大的问题是

A. 气温与疾病的线性模型不符合专业常识

B. 讨论中太多无根据的揣测

C. 资料来源途径单一, 代表性差

D. 讨论中有自相矛盾之处

E. 讨论中有离题之处

共用资料：旧题文献 2 与 Framingham 模型

原题引用《多元线性回归……》及 Framingham 心脏病研究的表 1、方程；该原文未随本题库提供。现有“生命质量影响因素”是另一篇 2018 年文献，不能代替。以下保留原题，涉及具体数值与文章原句的答案须等待原文核验。

题 3.5　原文统计表述辨析

作者陈述中有误的是

A. 关于拟合优度指标的问题

B. 关于线性模型基本假设问题

C. 关于假变量定义的问题

D. 关于回归系数的解释问题

E. 关于原始资料与结论的关系问题

共用资料：旧题文献 4：少数民族婴儿死亡率

原题引用《中国少数民族……》，涉及两年的婴儿死亡率、出生率和人均 GDP。该原文未附；以下保留原设问及能够确定的方法解释。

题 3.6　率的变换与分析

本文分析中不妥之处不包括

A. 两年的率可能存在相关性而不符合因变量独立的假设

B. 未报告拟合优度指标

C. 对死亡率做平方根反正弦变换

D. 认为降低出生率可以降低婴儿死亡率

E. 未按回归系数解释人均 GDP 与婴儿死亡率的关系

题 3.7　将伴随关系解释为因果

本文结论有自相矛盾之处, 最大的问题是

A. 两年的率可能存在相关性而不符合因变量独立的假设

B. 受共线性影响, 得到了自相矛盾的回归系数

C. 未结果模型结果进行讨论

D. 认为降低出生率可以降低婴儿死亡率, 把统计的伴随关系当因果关系解释

E. 未按回归系数解释人均 GDP 与婴儿死亡率的关系

题 3.8　LINE 中的独立性

多重线性回归模型对资料的要求 LINE 条件中,I 是指

A. 因变量的正态性和等方差性

B. 因变量各变量值之间相互独立

C. 因变量和自变量相互独立

D. 因变量和自变量具有线性关系

E. 自变量之间相互独立

题 3.9　独立性如何判断

对于因变量 Y 的独立性考察方法

A. 使用 DW 统计检验

B. 一般基于专业假定

C. 根据残差分布图判断

D. 根据残差时序图判断

E. 根据偏回归图判断

题 3.10　R 平方的使用

关于多重线性回归中拟合优度指标的使用, 正确的说法是

A. 一般而言, 模型的决定系数在 0.8 以上才有价值

B. 如果决定系数大于 0.9, 即使 P 值大于 0.05 也是可信的模型

C. 在变量筛选时, 使用决定系数比较来判断变量的剔或入选

D. 在分析完毕写论文时, 要报告模型矫正决定系数, 因为这个指标是无偏性的。

E. 对于不同领域的应用, 对模型的拟合优度要求不同, 在有统计学意义的条件下, 即使决定系数等于 0.1, 也可能有使用价值。

题 3.11　预测价值的证据

考察线性回归模型的预测价值时, 最有说服力的指标是

A. 残差方差

B. 外残差方差

C. 依外考核样本计算的残差方差

D. 决定系数

E. 学生化残差

题 3.12　强影响点的处理

多重线性回归统计分析时, 发现存在强影响点, 则适宜的处理方法是

A. 同时报告基于原始数据的模型和删去强影响点的模型

B. 报告更符合自己专业预期的模型

C. 报告基于原始数据的模型

D. 报告删去强影响点的模型

E. 重新收集数据以避免强影响点的影响

题 3.13　等方差的图形诊断

判断线性模型等方差条件宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

题 3.14　控制智商后的成绩关系

一组学生参加语文、数学考试并做了智商测试, 欲考察语文数学成绩之间的关系, 分析宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

题 3.15　正态性的图形诊断

考察线性模型正态性假设时宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

共用资料：1990—2003 年住院人次及模型诊断

年份	住院人次 Y	门诊 X1	周转率 X2	使用率 X3	住院日 X4
1990	11501	454220	14.42	93.38	24.14
1991	11512	496556	14.43	90.81	23.73
1992	11504	480663	14.36	90.31	23.73
1993	11841	445274	14.11	88.75	22.64
1994	12096	427614	9.1	82.84	22.46
1995	11648	461228	13.92	82.53	21.93
1996	11622	391975	13.84	81.15	21.6
1997	14892	439554	17.81	92.05	19.12
1998	18928	533686	22.82	91.86	15.08
1999	21651	605660	23.13	91.84	14.68
2000	24673	597541	24.74	91.61	13.5
2001	28305	592311	25.1	88.63	12.7
2002	27864	590564	24.6	85.98	12.58
2003	28691	756273	27.2	84.56	12.18


X2 为年出院人数/床位数；X3 为占用总床日数/开放总床日数；X4 为平均住院日。原表 2：

变量	B	SE	标准化 β	t	P
截距	33058.528	12905.767	—	2.562	0.031
X1	0.0176	0.011	0.243	1.569	0.151
X2	45.151	445.16	0.034	0.095	0.927
X3	-56.103	162.181	-0.032	-0.346	0.737
X4	-1100.129	436.507	-0.736	-0.52	0.033

原表报告 $R^2 = .958$，调整 $R^2 = .939$。以下诊断也按原卷保留。

观测	残差	残差标准误	Student 残差	Cook D
1	1525	1449	1.052	0.109
2	186.8319	1492.8	0.125	0.001
3	445.4631	1536.9	0.29	0.006
4	178.2094	1651.5	0.108	0
5	468.4283	446.7	1.049	3.238
6	-1388	1503.1	-0.924	0.066
7	-577.5792	1093.9	-0.528	0.09
8	-460.7536	1498.2	-0.308	0.008
9	-2734	1555.1	-1.758	0.184
10	-1770	1539.1	-1.15	0.086
11	43.0857	1576.1	0.0273	0
12	2735	1575.9	1.735	0.158
13	2080	1537.1	1.353	0.12
14	-730.8267	892.2	-0.819	0.395

变量	VIF
X1	5.13579
X2	27.61614
X3	1.87395
X4	17.71312



题 3.16　高 R 平方与变量作用排序

根据表 2 结果，以下判断哪些正确?

I. 模型决定系数很大，至少有预测应用价值。

II. 各自变量作用大小依次为 X1>X2>X3>X4。

III. 各自变量作用大小依次为 X4>X1>X2>X3。

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I & III

E. I、II、III 均不正确

题 3.17　删去一个变量后的系数

若 Y 对 X1、X2、X3 建模, 估计偏回归系数从大到小 (不考虑绝对值) 排列为

A. X1 X3 X2

B. X2 X1 X3

C. X3 X2 X1

D. X1 X2 X3

E. X2 X3 X1

题 3.18　识别强影响观测

模型的强影响点是 OBS

A. 4&11

B. 5

C. 7&14

D. 14

E. 无强影响点

题 3.19　变量相关不等于误差不独立

以下哪些说法正确?
I. 根据专业知识，X2 和 X3 不符合 LINE 中的 I 条件。

II. 需要结合偏相关分析判断 Y 是否独立。

III. 根据已有统计信息，可断定 Y 存在序列相关。

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. I & III

E. I、II、III 均不正确

题 3.20　住院模型的改进

本例分析改进的建议, 合理的是 I: 将 X2 剔除
II: 使用岭回归
III: 考虑某种时间序列模型

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III

D. II & III

E. I & II &III

题 3.21　剔除春节数据后的变化

如果作者推测春节对急诊量的影响是正确的, 则剔除春节期间数据建模, 则可能出现的情况是 I. 模型的决定系数变大 II. 偏回归系数的 P 值变大 III. 偏回归系数绝对值变大

A. 仅 I

B. 仅 II

C. 仅 III。

D. I II

E. I III

F. 不能仅据题设确定这些指标的变化方向。

题 3.22　每日资料的独立性风险

你认为本文存在的致命缺陷是

A. 共线性问题导致参数估计结果难以理解

B. 违反线性假设导致模型不“正确”

C. 违反正态性或等方差假设导致参数估计和置信区间不准确

D. 违反独立性假设导致增大 I 型错误

E. 未给出拟合优度统计量评估模型的应用价值

题 3.23　旧文献的统计表述

本文论述不妥或错误之处不含

A. 关于回代符合率与 R2 的论述

B. 样本回归方程的书写格式

C. 使用冠心病发病概率的回归模型为线性回归的范例

D. 表 1 关于假变量 (标识变量) 的定义

E. 关于共线性的的论述

题 3.24　两年率资料的模型前提

本文的多重线性回归分析存在的最大问题是

A. 婴儿死亡率不服从正态分布

B. 共线性问题

C. 未报告拟合优度统计量

D. 可能不满足独立性假设

E. 未考察线性假设

题 3.25　三种残差的分布

多重线性回归模型, 如果满足 LINE 条件, 则 I、标准化残差服从标准正态分布 II、学生化残差服从 t 分布 III、粗残差估计值均值为 0, 标准差为剩余标准差

A. I

B. II

C. III

D. I&II&III

E. 全错

题 3.26　正态性是条件假设

关于回归分析的正态和等方差条件, 错误的是

A. 给定 X 条件下 Y 为正态分布。

B. 可以用 Y 的边际经验分布与正态分布的吻合判断回归的正态性假设。

C. 可以用粗残差的 PP 或 QQ 图初步判断正态性。

D. 可用残差对 Y 拟合值的散点图判断等方差性。

E. 在模型假设下，不同 X 取值处的 Y 条件方差相等。

题 3.27　影响点敏感性分析

多重线性回归统计分析时, 发现存在强影响点, 则适宜的处理方法是

A. 同时报告基于原始数据的模型和删去强影响点的模型

B. 报告更符合自己专业预期的模型

C. 报告基于原始数据的模型

D. 报告删去强影响点的模型

E. 重新收集数据以避免强影响点的影响

题 3.28　Durbin–Watson 的直接计算

如果某模型残差依照时间顺序为 (0.2, 0.03, 0.4, 0.5, -0.1, 0.02, -0.7, -0.1), 则其 Durbin-Watson 统计量是 (拍照没拍全, 数据可能不对)

A. 0.80

B. 0.89

C. 0.92

D. 0.96

E. 1.11

F. 1.486（按题中所记残差计算）。

题 3.29　杠杆与影响度

关于高杠杆点和强影响点，哪项正确?

A. 高杠杆点必有最大粗残差。

B. 高杠杆表示 X 空间位置特殊，但是否强影响还取决于残差等信息。

C. Cook 距离只反映结局绝对大小。

D. 一见高杠杆就必须删除。

E. 杠杆值与自变量无关。

题 3.30　VIF 与容忍度

若 X_j 对其余解释变量回归的 $R_j^2 = .95$，则 VIF 为：

A. 0.05。

B. 0.95。

C. 1.05。

D. 20。

E. 95。

题 3.31　DW 的无相关参考值

残差一阶自相关很弱时，DW 通常接近：

A. 0。

B. 1。

C. 2。

D. 3。

E. 4。

题 3.32　Cook 距离的含义

Cook 距离主要衡量：

A. 删除单个观测对整体拟合或系数的影响。

B. 某观测的 Y 值有多大。

C. 某自变量的样本均值。

D. 结局是否正态的 P 值。

E. 两组样本量差异。

题 3.33　正态性检查对象

回归的经典正态假设主要针对：

A. 给定设计后的误差。

B. X 的边际分布。

C. Y 的边际分布必为单峰正态。

D. X 与 Y 联合必相互独立。

E. 回归系数原始数值。

题 3.34　异方差稳健标准误

采用异方差稳健标准误后，哪项最准确？

A. 不改变 OLS 点估计，仅改变适当条件下的方差估计与推断。

B. 自动修正了遗漏的非线性。

C. 自动消除所有混杂。

D. 使残差必然正态。

E. 让新个体预测永远准确。

题 3.35　模型选择与验证泄漏

在交叉验证中筛选变量、选变换和岭参数，应如何处理？

A. 仅在各训练折内完成，再评估验证折。

B. 先用全数据选好，再声称验证完全独立。

C. 只看训练误差最小。

D. 根据验证折结局修改原始数据。

E. 忽略分组或时间结构随机打散所有观测。

题 3.36　急诊文章的日均数核查

按急诊共用资料，199649 人次除以 730 天，平均每日约为：

A. 273.49。

B. 274.50。

C. 199.65。

D. 730.00。

E. 285.48。

题 3.37　回归系数与标准误

急诊文中平均相对湿度 B=1.011、SE=.159，则检验该系数为 0 的 t 值约为：

A. 0.157。

B. 0.244。

C. 6.36。

D. 1.011。

E. 无法由这两个数计算。

共用资料：生命质量文章的回归结果

同文以生命质量总分为结局，报告如下最终多元回归。焦虑/抑郁用原始得分，病程用月，癫痫 0 否 1 是，病理分级与文化程度分别按 1—4 有序编码。

变量	B	SE	标准化 β	t	P
截距	74.033	1.543	—	47.974	<.01
焦虑	-0.884	0.204	-0.385	-4.326	<.01
抑郁	-0.655	0.225	-0.263	-2.906	<.01
病程	0.056	0.022	0.158	2.518	<.05
癫痫	-4.902	1.301	-0.233	-3.768	<.01
病理分级	-0.987	0.412	-0.156	-2.396	<.05
文化程度	0.905	0.393	0.148	2.302	<.05

文中报告 $F = 22.554$、$R^2 = .539$、调整 $R^2 = .517$。

题 3.38　R 平方与调整 R 平方

生命质量模型报告 R^2=.539、调整 R^2=.517。关于训练样本平方和比例，正确的是：

A. 普通 R^2 表示相对于仅截距模型解释了 53.9% 的总平方和。

B. 普通 R^2 等于 51.7%。

C. 调整 R^2 保证模型无偏。

D. 该模型已证明外部预测同样好。

E. 余下全部变异均为测量错误。

简答题

题 3.39　异方差残差图

方差不等的典型残差图呈何种形态？手绘示意并简要说明（原题要求提交手绘照片）。

计算与分析题

共用资料：数学、语文与智商数据

以智商为 y，数学为 x1，语文为 x2。原卷 data1 未独立附上，本包补入同课程“语文数学智商.sav”（18 人）作数值复算；若原卷数据有改动，需重新代入。

题 3.40　智商模型的共线性与岭回归

继续分析智商数据：1. 计算指标作共线性诊断。2. 做岭回归、绘制岭迹图，选择岭参数并说明依据。3. 给出岭参数 k=0.12 时的原尺度回归方程。

共用资料：父母与子女身高数据

y 为子女身高，x1 为父亲身高，x2 为母亲身高。正文同名数据与附带 2023 data1 逐值一致；以下保留原数据单位，不擅自转换为厘米。

观测	父 x1	母 x2	子 y
1	5.2	4.9	6.2
2	5.4	5.1	5.9
3	6.2	5.5	6.6
4	5.8	5.4	6
5	5.6	5.1	6.2
6	5	4.9	5.6
7	6.4	5.6	6.6
8	6	5.4	6.5

题 3.41　身高模型的岭迹与 k=0.11

对身高数据：1. 计算共线性指标。2. 绘制岭迹图，选岭参数并说明理由。3. 给出 k=0.11 时的岭回归方程。

题 3.42　父母身高的岭回归复习题

对父母子身高数据进行共线性分析，再作岭回归、选择岭参数并写出回归模型。

题 3.43　非线性关系与 LINE 诊断

原题给一个 SPSS 文件，含 4 个自变量和 1 个因变量，要求拟合多重线性回归并诊断 LINE。回忆提示某个自变量与结局明显呈反比例关系，需用 1/x 替换后重新拟合。
原 4 自变量文件未附；这里改用正文中的“线性假设诊断”数据（3 个解释变量），只作方法演示。

共用资料：1990—2003 年住院人次及模型诊断

年份	住院人次 Y	门诊 X1	周转率 X2	使用率 X3	住院日 X4
1990	11501	454220	14.42	93.38	24.14
1991	11512	496556	14.43	90.81	23.73
1992	11504	480663	14.36	90.31	23.73
1993	11841	445274	14.11	88.75	22.64
1994	12096	427614	9.1	82.84	22.46
1995	11648	461228	13.92	82.53	21.93
1996	11622	391975	13.84	81.15	21.6
1997	14892	439554	17.81	92.05	19.12
1998	18928	533686	22.82	91.86	15.08
1999	21651	605660	23.13	91.84	14.68
2000	24673	597541	24.74	91.61	13.5
2001	28305	592311	25.1	88.63	12.7
2002	27864	590564	24.6	85.98	12.58
2003	28691	756273	27.2	84.56	12.18


X2 为年出院人数/床位数；X3 为占用总床日数/开放总床日数；X4 为平均住院日。原表 2：

变量	B	SE	标准化 β	t	P
截距	33058.528	12905.767	—	2.562	0.031
X1	0.0176	0.011	0.243	1.569	0.151
X2	45.151	445.16	0.034	0.095	0.927
X3	-56.103	162.181	-0.032	-0.346	0.737
X4	-1100.129	436.507	-0.736	-0.52	0.033

原表报告 $R^2 = .958$，调整 $R^2 = .939$。以下诊断也按原卷保留。

观测	残差	残差标准误	Student 残差	Cook D
1	1525	1449	1.052	0.109
2	186.8319	1492.8	0.125	0.001
3	445.4631	1536.9	0.29	0.006
4	178.2094	1651.5	0.108	0
5	468.4283	446.7	1.049	3.238
6	-1388	1503.1	-0.924	0.066
7	-577.5792	1093.9	-0.528	0.09
8	-460.7536	1498.2	-0.308	0.008
9	-2734	1555.1	-1.758	0.184
10	-1770	1539.1	-1.15	0.086
11	43.0857	1576.1	0.0273	0
12	2735	1575.9	1.735	0.158
13	2080	1537.1	1.353	0.12
14	-730.8267	892.2	-0.819	0.395

变量	VIF
X1	5.13579
X2	27.61614
X3	1.87395
X4	17.71312



题 3.44　住院人次：逐步回归与诊断

以 y 为住院人次，x1—x4 的定义见共用资料，对 data2 作逐步回归。1. 写出最终回归方程和拟合优度。2. 计算指标考察独立性。3. 列出最大的中心化杠杆、学生化残差、Cook 距离及对应观测（原稿此句末尾缺失，本书按年份及数值补齐）。

题 3.45　住院人次：偏回归图与时间顺序

对同定义的住院 data2 资料作逐步回归。1. 写出回归方程和拟合优度。2. 绘图作线性诊断。3. 计算指标考察独立性。4. 列出最大的中心化杠杆、学生化残差、Cook 距离，给出年份与数值。

补充练习

本节为配合正文新编的补充练习，按题型排列，题号接续本章往年题，解析见章末。

单项选择题

题 3.46　DW 检验的不确定区间

对有时间顺序的资料作回归，得到 $DW = 1.30$。按题设检验水平、样本量及自变量数查表得 $d_L = 1.10$、$d_U = 1.50$。根据正文给出的 DW 区间判定法，最恰当的结论是：

A. 已证实存在一阶正自相关。

B. 已证实存在一阶负自相关。

C. 已证实不存在一阶自相关。

D. DW 小于 2，因此必定违反所有 LINE 条件。

E. 对一阶正自相关的判定不确定，需进一步考察。

题 3.47　条件指数与 VIF 的联合判断

三个解释变量的相关阵特征值为 2.500、0.499、0.001，其中 X_1 对其余两个解释变量回归的 $R_1^2 = 0.96$。以下说法正确的是：

A. 最大条件指数为 2500，$VIF_1 = 0.04$。

B. 最大条件指数为 50，说明相关阵必不可逆。

C. 最大条件指数为 50，$VIF_1 = 25$，提示严重但非完全共线性。

D. 容忍度为 25，说明共线性很弱。

E. 只要 3 个特征值之和为 3，就不存在共线性。

题 3.48　按相关阵计算岭系数

两个解释变量与结局均已标准化，给定

$$R_{XX} = \begin{pmatrix} 1 & 0.9 \\ 0.9 & 1 \end{pmatrix}, \qquad r_{XY} = \begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.7 \end{pmatrix}.$$

按正文定义 $b^*(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_{XY}$，取 $k = 0.10$。两个标准化岭系数依次为：

A. $(0.8947, -0.1053)$。

B. $(0.6250, 0.1250)$。

C. $(0.8000, 0.7000)$。

D. $(0.1250, 0.6250)$。

E. $(0.7273, 0.6364)$。

简答题

题 3.49　偏回归图的代码纠错

要考察控制 X_2, X_4 后 X_3 与 Y 的线性关系，某同学写出：

```
u <- resid(lm(x3 ~ x2 + x4, data = d))
v <- resid(lm(y ~ x2 + x3 + x4, data = d))
plot(u, v)
```

假设资料无缺失、模型满列秩。指出代码中的关键问题，写出正确代码，并说明为什么原图可能让人误判为“X3 与 Y 无关”。

计算与分析题

题 3.50　小样本的离群与杠杆诊断

对下列数据拟合含截距的一元线性回归：

观测号	1	2	3	4	5
X	1	2	3	4	5
Y	3.4	7.9	14.6	13.6	15.5

本题按正文经验标准筛查：$|r_{i(外)}| > 3$ 提示 Y 方向离群；$h_{ii} > 2\bar{h}$ 提示高杠杆；Cook $D_i > 1$ 提示强影响。

1. 给出回归方程、剩余标准差及第 3 号观测的粗残差、杠杆值、内学生化残差、外学生化残差、Cook 距离；据此判断第 3 号观测。
2. 加入第 6 号观测 $(X_6, Y_6) = (10, 33)$ 后重新拟合，计算第 6 号观测的杠杆值、外学生化残差、Cook 距离，并判断其属于哪类可疑观测。
3. 说明两问的结果为何不矛盾，以及发现可疑观测后的处理原则。

本次补充习题

单项选择题

每题只有一个最佳答案，请从 A—E 中选择。

题 3.51　响应换算与诊断量

对同一批观测、同一满秩设计矩阵，用普通最小二乘拟合含截距的线性回归；所有观测均满足 $h_{ii} < 1$，且以下诊断量均有定义。把响应改为 $y_i^{*} = 5 + 2y_i$ 并重新拟合。下列哪一个量一般会改变？

A. 杠杆值 h_{ii}

B. 外学生化残差 t_i

C. Cook 距离 D_i

D. 同一观测顺序下的 Durbin–Watson 统计量

E. 粗残差 e_i

题 3.52　两两相关与完整共线性

三个非常数自变量的样本相关阵恰为

$$R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/\sqrt{2} \\ 0 & 1 & 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} & 1/\sqrt{2} & 1 \end{pmatrix}.$$

现把它们同时纳入含截距的普通线性回归。下列判断正确的是：

A. 两两相关绝对值都小于 0.8，所以不可能有完整共线性

B. 三个斜率不能同时被唯一估计

C. 该相关阵含负特征值，故不可能由真实数据得到

D. 只要因变量正态，就能使三个斜率唯一可估计

E. 增大样本量且保持这个相关阵不变，一定能消除完整共线性

题 3.53　任意排序下的 DW 值

27 名相互不同的患者各测量一次，资料未记录有意义的时间或空间顺序。固定拟合 $y \sim x_2 + x_3 + x_4$。按原记录编号排列得到 DW = 1.6447；把完整的数据行按 x_2 从小到大排列后，同一模型得到 DW = 1.5289。最恰当的判断是：

A. 排序后的 DW 较小，证明重新排序使患者的误差相关性增强

B. 两次 DW 不等，说明两次普通最小二乘的系数必定不同

C. 应选 DW 更接近 2 的排序，据此确认误差独立

D. 在没有有意义的观测顺序时，不能据这两个 DW 值判断患者误差是否独立

E. 排序后残差平方和必定减小

题 3.54　逆方差权重

一项校准研究的三个观测具有相同的均值模型，但已知其误差方差依次为 $\sigma^2, 4\sigma^2, 9\sigma^2$，误差相互独立。用加权最小二乘拟合，规定第一观测权重为 1，则应采用的三项权重是：

A. $1,\ 1/4,\ 1/9$

B. $1,\ 1/2,\ 1/3$

C. $1,\ 4,\ 9$

D. $1,\ 2,\ 3$

E. $1,\ 1,\ 1$

题 3.55　偏相关检验的自由度

27 例糖尿病资料分别把 x_3 和 y 对 x_2, x_4 作含截距回归，两组残差的样本相关系数为 $r = -0.472350$。假定用于偏相关检验的正态线性模型条件成立。检验 y 与 x_3 控制 x_2, x_4 后的总体偏相关为 0，应采用的 t 值和自由度约为：

A. $t = -2.6795,\ \nu = 25$

B. $t = -0.4724,\ \nu = 23$

C. $t = -2.5701,\ \nu = 23$

D. $t = -2.6795,\ \nu = 23$

E. $t = -2.5701,\ \nu = 25$

题 3.56　岭回归的特征方向

自变量已经标准化，使用正文约定 $\tilde{b}(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_y$，其中 R_{XX} 正定、$k > 0$。考察下列说法：

I. 相比 R_{XX}，$R_{XX} + kI$ 的最大条件指数不会增大。

II. 加入 kI 以后，原始样本中自变量之间的相关系数会变小。

III. 最小二乘系数在较小特征值方向上的保留比例 $\lambda_j/(\lambda_j + k)$ 更小。

正确的是：

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. I、III

E. I、II、III

简答、计算与案例分析

题 3.57　三种异方差处理的目标

研究者认为 $E(Y \mid X) = X\beta$ 的均值结构合理，观测相互独立，但误差方差随拟合均数增大；Y 均为正数。准备比较三种处理：

甲：保留原最小二乘系数，改用异方差稳健标准误；

乙：在原 Y 尺度上采用合理的逆方差权重作 WLS；

丙：以 $\log Y$ 为响应重新拟合普通线性回归。

分别说明三种方法是否改变回归系数点估计、是否改变所拟合的条件均数对象，并说明它们能否自动修复遗漏非线性项造成的均值结构错误。

题 3.58　留一预测残差

固定使用 $y \sim x_2 + x_3 + x_4$ 分析 27 例糖尿病资料，模型含截距。总平方和 $T = 222.551852$，普通残差平方和 $Q = 89.454020$。部分诊断输出为

编号	e_i	h_{ii}
25	2.499330454	0.475598363
26	4.656976531	0.131272662

其余 25 个观测的留一预测残差平方和合计为 89.963074。可用公式

$$e_{(i)} = \frac{e_i}{1 - h_{ii}}, \qquad \mathrm{PRESS} = \sum_i e_{(i)}^2.$$

(1) 计算 25、26 号的留一预测残差及各自对 PRESS 的贡献。

(2) 计算训练 $R^2 = 1 - Q/T$ 及按 PRESS 定义的预测 $R^2 = 1 - \mathrm{PRESS}/T$。

(3) 解释两种 R^2 的差别；若该模型结构先由全部 27 例筛选得出，上述固定模型的 PRESS 能否评价整个筛选流程?

题 3.59　校准资料的加权拟合

以下为教学设定数据，包含 6 次相互独立的校准测量。拟合均值 $E(Y_i \mid x_i) = \beta_0 + \beta_1 x_i$，已知误差方差为 $\sigma^2 v_i$，表中的 v_i 由仪器精度资料预先给定。

编号	1	2	3	4	5	6
x_i	1	2	3	4	5	6
y_i	2.2	2.9	4.6	4.9	6.8	6.7
v_i	1	1	4	4	9	9

(1) 分别求 OLS 与 WLS 回归方程，并求 $x = 4$ 处的拟合均数。可用 $W = \mathrm{diag}(1/v_i)$、$b_W = (X^\top W X)^{-1} X^\top W y$。

(2) 某软件输出如下，请核对各列应由哪种方法取较小值：

	$\sum e_i^2$	$\sum e_i^2 / v_i$
OLS	0.944762	0.221744
WLS	0.990744	0.194607

(3) 是否因为 WLS 的普通残差平方和较大，就应否定它?

题 3.60　相近摘要下的两组资料

下表两组资料各含 11 个观测，均拟合带截距的简单线性回归。

	甲		乙	
编号	x	y	x	y
1	10	9.14	8	6.58
2	8	8.14	8	5.76
3	13	8.74	8	7.71
4	9	8.77	8	8.84
5	11	9.26	8	8.47
6	14	8.10	8	7.04
7	6	6.13	8	5.25
8	4	3.10	19	12.50
9	12	9.13	8	5.56
10	7	7.26	8	7.91
11	5	4.74	8	6.89

	b_0	b_1	R^2
甲	3.000909	0.500000	0.666242
乙	3.001727	0.499909	0.666707

有人据此认为：“两组直线模型同样合适；乙组第 8 点残差几乎为 0，因此它不可能左右斜率。”

请评价这两句话，指出每组应优先检查的问题，并说明乙组删除第 8 点后，斜率能否仍被唯一估计。

习题解析

> **核对方式**
> 题号与前文一一对应。补写范围、原题歧义及数据还原方法列在相应答案中。

解析　题 3.1　拟合优度与应用价值

返回题目

答案：E。

R^2 是否有用取决于领域、目标和验证表现，没有通用 0.8 或 0.9 门槛。加入变量会使训练 R^2 不降，不能单靠最大化它筛选；调整 R^2 也不是无条件无偏或预测可靠性的证明。

解析　题 3.2　回归的前提条件

返回题目

答案：C。

回归并不要求结局与自变量相互独立，否则通常也无关系可建模。独立性主要指给定设计后观测误差相互独立；正态性用于经典小样本推断，正态假定针对条件误差而不是边际 Y。

解析　题 3.3　文献报告不足与已证实错误

返回题目

答案：E 较符合“不包括”的意图。

未展示散点图不能证明作者没有检查过线性，且线性应结合专业关系、函数形式和残差/偏残差考察。文章确实未报告本模型拟合优度；表中 SE 中文写成“标准物”是笔误。时间相关及共线性是应检查的风险，不能在无原始数据时声称已由检验证实。

解析　题 3.4　讨论与模型是否一致

返回题目

答案：D。

讨论提到高温和低温都可能增加急症，而拟合式以最高、最低气温的正线性项描述关系，并未给出 U 形等非线性证据。应区分研究自身模型结果与引用或推测，避免把讨论中的机制解释当成已验证结果。

解析　题 3.5　原文统计表述辨析

返回题目

答案：待原文核实。

选项涉及文章对拟合优度、模型前提、哑变量和系数的具体陈述；原文未附，无法可靠指定错误项。可核对条件分布而非边际正态、参照编码以及概率与优势的区别。

解析　题 3.6　率的变换与分析

返回题目

答案：C 是通常可接受的方法选项，仍需原文核实。

对比例作平方根反正弦变换是传统可用方法之一，本身不能直接定为错误；是否适合还取决于分母、边界与方差结构。两年同一单位的率可能相关，且统计关联不能证明降低出生率会降低婴儿死亡率。

解析 题 3.7　将伴随关系解释为因果　　返回题目

答案：D。

若仅凭观察性回归即说降低出生率能够降低婴儿死亡率，属于把关联上升为因果干预效果。原文未附，能够评价的是选项所描述的推论，不能断言文章其他部分是否还有更大问题。

解析 题 3.8　LINE 中的独立性　　返回题目

答案：B。

指不同观察单位的误差在给定自变量后独立；不是 Y 与 X 独立，也不是各自变量必须独立。B 是原选项最接近的表述。

解析 题 3.9　独立性如何判断　　返回题目

答案：B（一般情形）。

独立性首先取决于抽样和研究设计。对有时间顺序的数据，DW 和残差时序图是辅助诊断，因此 A、D 在相应场景也有用；任何单一图或检验都不能证明任意依赖形式不存在。

解析 题 3.10　R 平方的使用　　返回题目

答案：E。

小 R^2 也可能有研究或预测价值，但仍须评估误差、校准及验证。统计显著不自动等于重要，调整 R^2 也不保证无偏。

解析 题 3.11　预测价值的证据　　返回题目

答案：C。

独立外部样本上的预测误差最有说服力。训练残差、R^2 或学生化残差都不能替代对新数据的预测评估；数据预处理与选择也不能泄漏外部样本信息。

解析 题 3.12　强影响点的处理　　返回题目

答案：A。

先核对录入、测量和样本是否符合纳入规则；无确证错误时不随意删除。报告包含与不包含该点的敏感性分析，说明系数、结论如何变化，避免按预期结果选模型。

解析 题 3.13　等方差的图形诊断　　返回题目

答案：E。

看残差相对拟合值或自变量的散点，漏斗形等模式提示方差随均值改变。

解析 题 3.14　控制智商后的成绩关系　　返回题目

答案：C。

分别剔除智商等协变量的线性作用后，可用偏回归/残差散点考察两科成绩的条件关系。

解析　题 3.15　正态性的图形诊断　　返回题目

答案：D。

应看模型残差的 QQ 图，重点是条件误差分布；不能只看原始 Y 的边际分布。

解析　题 3.16　高 R 平方与变量作用排序　　返回题目

答案：E。

高训练 R^2 本身不证明预测价值。变量量纲不同，且 X2/X4 共线性严重、有强影响点，不能据单次全模型系数直接确定稳健贡献排序；III 即便符合表中标准化绝对值排序，也不等于可靠的因果或预测贡献。

解析　题 3.17　删去一个变量后的系数　　返回题目

答案：B。

对原表 1 转录资料拟合 $Y \sim X_1 + X_2 + X_3$，得到系数约 0.01054、1057.35、−311.08，因此按代数值降序为 $X_2 > X_1 > X_3$。不要按旧模型系数直接删除一项而不重新拟合。

解析　题 3.18　识别强影响观测　　返回题目

答案：B。

原输出第 5 个观测 Cook D 约 3.238，明显突出；该点对应 1994 年。其学生化残差未必很大，因为高杠杆点可将回归面拉向自身。

解析　题 3.19　变量相关不等于误差不独立　　返回题目

答案：E。

LINE 中的 I 不是要求自变量之间独立。偏相关不能检验时间序列误差独立；原给诊断不足以断定序列相关存在。应结合按时间排列的残差及适当检验。

解析　题 3.20　住院模型的改进　　返回题目

答案：E（作为可研究的候选方案）。

核对并考虑移除冗余变量、使用岭回归缓解不稳定，以及处理年度时间结构，都是可比较的改进方向。删除 X2 须有依据并重新拟合；岭回归不自动解决序列相关，时间序列模型也不自动解决错误函数形式。

解析　题 3.21　剔除春节数据后的变化　　返回题目

答案：F（补入：无法仅据题设确定）。

删除部分日期可能改变暴露分布、残差方差、样本量和系数，因此 R^2、P 值、系数绝对值没有必然方向。需要原数据与明确的节假日效应模型，不能凭叙述决定 I/II/III。

补写说明。 原 B、C 选项均写“仅 II”，这里将 C 补为“仅 III”，并加入无法确定变化方向的 F 项；不宣称 F 来自原卷。

解析　题 3.22　每日资料的独立性风险　　返回题目

答案：D（优先需要检查的风险）。

730 个连续日期可能存在趋势、季节性或残差自相关；若被忽略，标准误和检验可能不可靠。但论文未给时间残差诊断，不能在没有数据时说已检验证实违反独立性。

解析　题 3.23　旧文献的统计表述　　返回题目

答案：待原文核实。

选项须对照原文关于线性概率模型、回代符合率、变量赋值和共线性的实际表述；本包未提供该文，不能指定唯一正确项。

解析　题 3.24　两年率资料的模型前提　　返回题目

答案：D 是题目提示的主要风险，需原文核验。

若同一民族或地区提供两个年份的率，它们可能相关，不能简单视为独立观察。原文未附，尚不能确认该研究具体数据结构或其余问题是否更严重。

解析　题 3.25　三种残差的分布　　返回题目

答案：B 若指外学生化；E 若指内部学生化。

含截距时残差均值为 0，但其样本标准差与剩余标准差分别为

$$\sqrt{SSE/(n-1)}, \qquad s=\sqrt{SSE/(n-p-1)},$$

二者不相等，所以 III 通常错误。以估计的 s 标准化的残差不严格为标准正态。删点外学生化残差在经典正态模型下有精确 t 分布；内部学生化不服从该 t 分布。原稿把 II 一律判错混淆了定义。

解析　题 3.26　正态性是条件假设　　返回题目

答案：B。

给定 X 的条件误差正态，不要求混合了不同条件均值的边际 Y 正态。粗残差 QQ 图可作初步诊断；杠杆差异大时标准化/学生化更有帮助，但不能说粗残差 QQ 图本身就是错误。原回忆稿的对错批注不正确。

解析　题 3.27　影响点敏感性分析　　返回题目

答案：A。

先核对录入、测量和样本是否符合纳入规则；无确证错误时不随意删除。报告包含与不包含该点的敏感性分析，说明系数、结论如何变化，避免按预期结果选模型。

解析　题 3.28　Durbin–Watson 的直接计算　　返回题目

答案：F（补入 1.486）。

按回忆向量，$DW=\sum_{i=2}^{n}(e_i-e_{i-1})^2/\sum_{i=1}^{n}e_i^2=1.4286/0.9613\approx 1.48611$。原 A—E 均不匹配，说明回忆向量或选项有缺误。保留原向量和选项，补入本向量对应值；R 应写 `sum(diff(e)^2)/sum(e^2)`，避免矩阵乘除优先级错误。

补写说明。保留回忆残差与原 A—E，新增与所记向量一致的 F 项。原稿注明残差可能没记全。

解析　题 3.29　杠杆与影响度　　返回题目

答案：B。

杠杆来自设计矩阵。强影响常是杠杆与残差共同作用，需检查删除该点后估计如何改变。

补写说明。 原第 9 题整题未记录，本题新编。

解析　题 3.30　VIF 与容忍度　　返回题目

答案：D。

$VIF = 1/(1 - R_j^2) = 20$，容忍度 0.05。阈值是经验诊断，不应单靠它删去关键变量。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.31　DW 的无相关参考值　　返回题目

答案：C。

近似关系为 $DW \approx 2(1 - \hat{\rho}_1)$；正式判定仍需对应设计的分布或检验，不能用 2 作机械界线。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.32　Cook 距离的含义　　返回题目

答案：A。

它结合残差与杠杆信息。可疑观测应核查并作敏感性分析，不宜为得到显著结果而删除。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.33　正态性检查对象　　返回题目

答案：A。

不同 X 对应不同条件均值，混合后边际 Y 可以不呈正态。残差图用于近似诊断，不能把它当独立误差的直接观测。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.34　异方差稳健标准误　　返回题目

答案：A。

稳健标准误解决的是方差估计问题，不能替代正确均值模型或因果设计。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.35　模型选择与验证泄漏

返回题目

答案：A。

所有利用结局的选择都应在训练阶段进行；相关资料还需按个体、组或时间块划分，必要时采用嵌套验证。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.36　急诊文章的日均数核查

返回题目

答案：A。

直接相除为 273.4918，与文中 274.5 不一致，应核查总数、天数或报告值。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.37　回归系数与标准误

返回题目

答案：C。

$t = B/SE \approx 6.3585$；但其标称 P 值是否可靠还取决于误差相关结构等条件。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.38　R 平方与调整 R 平方

返回题目

答案：A。


调整 R^2 加入自由度惩罚，不能简单替代原始平方和比例；两者也都不等于样本外表现。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 3.39　异方差残差图

返回题目

常见为漏斗形或喇叭形：残差中心仍大致围绕 0，但随拟合值或某自变量变化，竖向散布逐渐增大或减小。



这是数学示意的散布包络，不是实测样本点。还可能出现其他异方差模式，不能只寻找一种形状；需结合变量变换、方差建模或稳健标准误，并先确保均值函数合适。

解析　题 3.40　智商模型的共线性与岭回归


返回题目

本书统一采用相关阵尺度的岭参数定义：

$$b^*(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_{XY}, \quad b_j(k) = b_j^*(k)\frac{s_Y}{s_{X_j}}, \quad b_0(k) = \bar{Y} - \sum_j b_j(k)\bar{X}_j.$$

其他软件若以 $X^TX + \lambda I$ 定义惩罚，参数量级会不同，不能直接混用。

相关系数 0.932002；容忍度 0.131372；两个变量 VIF 均为 7.611995。以相关阵特征根比平方根定义的条件指数约 5.3304。



k=0.12 的原尺度方程为

$$\hat{y} = 12.092095 + 0.387816x_1 + 0.713526x_2.$$

在 0—0.20、步长 0.005 的预设网格中，GCV 最小在 k=0.04；它与题目指定的 0.12 不是同一要求。岭迹趋稳可作为辅助，但不应只为让系数“好看”选参数。图中为实算的标准化系数路径，完整网格随代码提供。

解析　题 3.41　身高模型的岭迹与 k=0.11


返回题目

本书统一采用相关阵尺度的岭参数定义：

$$b^*(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_{XY}, \quad b_j(k) = b_j^*(k)\frac{s_Y}{s_{X_j}}, \quad b_0(k) = \bar{Y} - \sum_j b_j(k)\bar{X}_j.$$

其他软件若以 $X^TX + \lambda I$ 定义惩罚，参数量级会不同，不能直接混用。

父母身高相关 0.974782；容忍度 0.049799；VIF 均为 20.080645；条件指数约 8.8493。



k=0.11 时

$$\hat{y} = 3.095451 + 0.595344x_1 - 0.055162x_2.$$

此时标准化系数为 (0.813395,−0.041879)。按每 0.01 一个 k、首列 k=0 的存储方式，k=0.11 应取第 12 列，不能误取第 11 列。

选参的限制。在本包 0—0.20、步长 0.005 网格中，GCV 最小在 k=0；这与“曲线变稳定”标准不同。因此可以报告正 k 下的稳定性分析，但不能声称 0.11 在该数据上已经证明预测最优。

解析　题 3.42　父母身高的岭回归复习题

返回题目

本书统一采用相关阵尺度的岭参数定义：

$$b^*(k) = (R_{XX} + kI)^{-1} r_{XY}, \quad b_j(k) = b_j^*(k)\frac{s_Y}{s_{X_j}}, \quad b_0(k) = \bar{Y} - \sum_j b_j(k)\bar{X}_j.$$

其他软件若以 $X^TX + \lambda I$ 定义惩罚，参数量级会不同，不能直接混用。

原 2019 数据未另附，采用正文同名的 8 条记录演示：VIF 约 20.0806，说明父母身高的条件系数不稳定。岭迹及原尺度换算可按本章身高题操作。

如指定 k=0.11 作稳定性展示，方程为 $\hat{y} = 3.095451 + 0.595344x_1 - 0.055162x_2$；若严格按本包粗网格 GCV 选择，最小点为 k=0，即普通最小二乘。应说明选择标准和小样本局限，而不是把某个正 k 当作唯一标准答案。

解析　题 3.43　非线性关系与 LINE 诊断

返回题目

先检查散点和控制其他变量后的偏残差关系，再检查设计独立性、残差正态与方差结构；同时看异常/强影响点。若专业及图形支持反比例关系，可用 $1/X_j$ 作为解释项，注意 $X_j = 0$ 的定义和近零值的不稳定性，再重复诊断与验证。

正文 3 自变量演示数据中，将 x1 改为倒数使 AIC 由 397.682 降至 390.610，方程为

$$\hat{y} = 347.5607 - 606.6008/x_1 + 4.5034x_2 + 1.9687x_3.$$

这些数字不冒作 2019 原卷 4 自变量的结果；原文件补齐后应按同样步骤分析，不能把 case 编号作为解释变量凑数。

解析　题 3.44　住院人次：逐步回归与诊断　返回题目

本包依据原卷表 1 逐格转录的 14 年数据，用 AIC 的双向逐步法，保留 x1、x4：

$$\hat{y} = 28825.883 + 0.0185703x_1 - 1122.3837x_4.$$

$R^2 = 0.956916$，调整 $R^2 = 0.949082$，剩余标准差 1613.316。按年份排列残差，$DW = 1.064356$；`lmtest::dwtest` 双侧 P 约 0.00829，提示该模型的序列相关问题值得处理。

最大中心化杠杆 $h_i - 1/n$ 在 2003 年，为 0.551061；最大绝对外学生化残差在 1998 年，为 −2.30630；代数最大的外学生化残差在 2001 年，为 2.21072；最大 Cook D 也在 2001 年，为 0.309879。必须说明按绝对值还是代数值选“最大”。

版本核对。原表 2 系数与表 1 转录复算不完全一致，且表中 X4 的 t 写作 −0.520，与系数/标准误约 −2.520 不符。旧卷 data2 没有独立文件，这里明确以可见表 1 为复算依据；若找到原卷文件，应重新核对。全部逐步选择、残差和年份指标已随代码提供。

解析　题 3.45　住院人次：偏回归图与时间顺序　返回题目

本包依据原卷表 1 逐格转录的 14 年数据，用 AIC 的双向逐步法，保留 x1、x4：


$$\hat{y} = 28825.883 + 0.0185703x_1 - 1122.3837x_4.$$

$R^2 = 0.956916$，调整 $R^2 = 0.949082$，剩余标准差 1613.316。按年份排列残差，$DW = 1.064356$；`lmtest::dwtest` 双侧 P 约 0.00829，提示该模型的序列相关问题值得处理。

最大中心化杠杆 $h_i - 1/n$ 在 2003 年，为 0.551061；最大绝对外学生化残差在 1998 年，为 −2.30630；代数最大的外学生化残差在 2001 年，为 2.21072；最大 Cook D 也在 2001 年，为 0.309879。必须说明按绝对值还是代数值选“最大”。

版本核对。原表 2 系数与表 1 转录复算不完全一致，且表中 X4 的 t 写作 −0.520，与系数/标准误约 −2.520 不符。旧卷 data2 没有独立文件，这里明确以可见表 1 为复算依据；若找到原卷文件，应重新核对。全部逐步选择、残差和年份指标已随代码提供。

最终模型的偏回归图（控制另一个保留变量，14 个年份）：



直线只作条件关系的图形参照。仅有总体趋势不足以证明线性形式正确；应同时看曲率、影响观测与时间残差，并区分原全模型的偏回归图和这里最终模型的图。

补充练习解析

以下为补充练习的解析。这些题目为配合正文新编，并非往年试题；题中设定的数值仅供练习。

解析 题 3.46　DW 检验的不确定区间

返回题目

答案：E。

$d_L < DW < d_U$，落在不能确定的区间。$DW < 2$ 可提示正相关方向，但不能替代查表结论，更不能把“不确定”当作“没有自相关”。可继续查看按时间排列的残差图，并采用适合该资料的进一步检验。

解析 题 3.47　条件指数与 VIF 的联合判断

返回题目

答案：C。

按正文相关阵定义，最大条件指数为 $\sqrt{2.500/0.001} = 50$；$VIF_1 = 1/(1-0.96) = 25$，容忍度 0.04。两项均提示严重共线性，但最小特征值仍大于 0，不能称为完全共线性。系数可能不稳定，不等于正规方程已无唯一解。

解析 题 3.48　按相关阵计算岭系数

返回题目

答案：B。

$$b^*(0.10) = \frac{1}{1.1^2 - 0.9^2}\begin{pmatrix} 1.1 & -0.9 \\ -0.9 & 1.1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 0.8 \\ 0.7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.625 \\ 0.125 \end{pmatrix}.$$

岭惩罚加在计算矩阵的主对角线上，原始变量的样本相关系数仍为 0.9。它改变的是估计方法；本题给定的 k 也不代表已由岭迹选出了最佳参数。

解析 题 3.49　偏回归图的代码纠错

返回题目

第二个辅助回归不应包含待考察的 X_3；两边都只剔除控制变量 X_2, X_4 的线性影响。

```
u <- resid(lm(x3 ~ x2 + x4, data = d))
v <- resid(lm(y ~ x2 + x4, data = d))
plot(u, v)
abline(lm(v ~ u))
```

原代码的 v 是完整回归的残差，与设计矩阵各列正交；u 又是这些列的线性组合，故样本内 $u^T v = 0$。原图中的线性趋势被构造过程消掉，不能据此说 X3 没有条件效应。正确图用于考察控制其他变量后的线性关系；图形本身也不是已证明 LINE 全部成立。

解析 题 3.50　小样本的离群与杠杆诊断

返回题目

(1) 原 5 点模型。 $\hat{Y} = 2.03 + 2.99X$，$s = 2.4453$。第 3 号观测的结果为：

指标	数值
粗残差	3.6000
杠杆值	0.2000
内学生化残差	1.6460
外学生化残差	4.3164
Cook 距离	0.3386

因此第 3 号按题设标准提示 Y 方向离群，但其杠杆不高，Cook 距离也未超过 1。不能仅因内学生化残差未超过 3 就忽略它。

（2）加入第 6 号后。 新方程为 $\hat{Y} = 1.6967 + 3.1128X$，$s = 2.1288$。第 6 号 $h_{66} = 0.8361$，$\bar{h} = 2/6 = 0.3333$，故 $h_{66} > 2\bar{h}$；其外学生化残差 0.1772、Cook 距离 0.1056。它提示高杠杆，但按题设阈值不提示 Y 方向离群或强影响。判断须使用 6 点模型的诊断量。

（3）区别与处理。 外学生化残差以删点后估计的误差方差衡量 Y 方向偏离；杠杆反映 X 位置是否特殊；Cook 距离综合残差与杠杆。本例第 6 号虽在 X 方向较远，却贴近回归线。经验阈值用于筛查，应先核查数据，再比较含该点与不含该点的拟合，不按是否有利于结论选择性删点。

可用 R 的 `rstandard()`、`rstudent()`、`hatvalues()`、`cooks.distance()` 复算，完整代码随笔记提供。

本次补充习题解析

解析　题 3.51　响应换算与诊断量

返回题目

选 E。拟合值满足 $\hat{y}_i^* = 5 + 2\hat{y}_i$，所以 $e_i^* = 2e_i$，一般改变。设计矩阵不变，杠杆值不变；$s^* = 2s$、$s_{(i)}^* = 2s_{(i)}$，标准化时尺度相消，所以内、外学生化残差和 Cook 距离不变。DW 的分子和分母同时乘以 4，也不变。题设排除了删除后不可估计或 $h_{ii} = 1$ 的边界情形。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]。

解析　题 3.52　两两相关与完整共线性

返回题目

选 B。标准化后 $z_3 = (z_1 + z_2)/\sqrt{2}$，相关阵行列式为 0，特征值为 $0, 1, 2$，是可实现的半正定相关阵。自变量列线性依赖，含截距的设计矩阵列不满秩，不能唯一确定全部三个斜率。两两相关不接近 1 仍可存在完整共线性；改变响应分布或保持此精确关系单纯增加样本量，都不能解除不可识别。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]。

解析　题 3.53　任意排序下的 DW 值

返回题目

选 D。重排完整数据行不改变最小二乘目标函数、系数或残差平方和，但改变相邻残差的配对，因而可能改变 DW 的分子。DW 针对有意义顺序下的一阶相关，不能通过任意排序来建立或排除误差独立性。本资料的独立性主要应由抽样、同一家系或机构等设计信息判断。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[9]、[5]。

解析　题 3.54　逆方差权重

返回题目

选 A。WLS 的权重与误差方差的倒数成比例；相对第一观测，权重为 $1, 1/4, 1/9$。采用标准差的倒数 $1, 1/2, 1/3$ 不能得到所需的逆方差权重。将所有权重同时乘以同一个正常数不改变系数，但题目已把第一项固定为 1。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]、[10]。

解析　题 3.55　偏相关检验的自由度

返回题目

选 C。控制变量数为 $q = 2$，自由度为 $n - 2 - q = 23$，

$$t = r\sqrt{\frac{n-2-q}{1-r^2}} = -0.472350\sqrt{\frac{23}{1-0.472350^2}} = -2.5701.$$

双侧 $P \approx 0.0171$。该检验与完整模型 $y \sim x_2 + x_3 + x_4$ 中 x_3 系数的 t 检验一致。不能把已经估计两个控制变量后的残差当作 27 对未经调整的原始观测，机械使用普通相关的 25 个自由度。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[9]、[5]、[11]。

解析　题 3.56　岭回归的特征方向

返回题目

选 D。I 中条件指数从 $\sqrt{\lambda_{\max}/\lambda_{\min}}$ 变为 $\sqrt{(\lambda_{\max}+k)/(\lambda_{\min}+k)}$，不会增大；当最大、最小特征值不同且 $k > 0$ 时严格下降。II 错误：岭回归改变估计规则，没有改写原始数据，样本相关系数不变。III 由谱分解得到，保留比例 $\lambda/(\lambda+k)$ 随 λ 增大而增大，因此小特征值方向收缩更强。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]。

解析　题 3.57　三种异方差处理的目标

返回题目

甲不改变 OLS 系数，只改变系数协方差阵、标准误及相应推断；目标仍为原尺度的 $E(Y \mid X)$。乙通常改变系数点估计，通过不同观测的相对精度加权；若原均值模型正确，拟合对象仍是原尺度的 $E(Y \mid X)$。丙通常改变系数及其解释，拟合对象变为 $E(\log Y \mid X)$；将其拟合值直接指数化通常不能直接当作 $E(Y \mid X)$。

三种方法都不能自动保证均值结构正确。稳健标准误处理方差估计，WLS 处理不同精度，响应变换是否改善均值/方差结构须重新检查；若遗漏非线性项，应依据关系形式重新建模并诊断，不能以标准误修正替代。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]、[10]。

解析　题 3.58　留一预测残差

返回题目

(1) $e_{(25)} = 2.499330454/(1 - 0.475598363) = 4.766062$，平方为 22.715342；$e_{(26)} = 4.656976531/(1 - 0.131272662) = 5.360688$，平方为 28.736980。25 号的普通残差较小，但高杠杆使它留在建模集内时的拟合误差明显低于留一预测误差。

(2) PRESS $= 89.963074 + 22.715342 + 28.736980 = 141.415396$，训练 $R^2 = 0.5981$，预测 $R^2 = 0.3646$。

(3) 训练 R^2 衡量对参与估计的数据的拟合；固定模型的 PRESS 使用每次不含被预测对象的拟合，反映不同的预测误差。若模型是先用全部 27 人筛选得到的，仍有筛选信息泄漏到固定结构中；评价整个流程，应在每次训练样本内重新筛选并拟合，再预测留出对象。不能把 0.3646 宣称为整套选择流程已得到充分验证。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[4]、[9]、[5]。

解析　题 3.59　校准资料的加权拟合

返回题目

(1) OLS 方程为 $\hat{y} = 1.233333 + 0.985714x$，$x = 4$ 时为 5.176190。WLS 采用 $w = (1, 1, 1/4, 1/4, 1/9, 1/9)$，

$$X^{\top}WX = \begin{pmatrix} 2.722222 & 5.972222 \\ 5.972222 & 18.027778 \end{pmatrix}, \quad X^{\top}Wy = \begin{pmatrix} 8.975000 \\ 24.594444 \end{pmatrix},$$

得到 $\hat{y}_W = 1.112442 + 0.995724x$，$x = 4$ 时为 5.095339。

(2) OLS 最小化普通平方和，故左列 OLS 较小；WLS 最小化题设加权平方和，故右列 WLS 较小。输出与两个优化目标一致。

(3) 不能据左列否定 WLS。题设误差方差不同且相对方差预先已知，逆方差权重反映观测精度。WLS 在不同准则下求最优，并不承诺普通平方和比 OLS 更小；仍须检查均值结构和精度信息是否合理。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[9]、[10]。

解析　题 3.60　相近摘要下的两组资料

返回题目

不能仅凭相近的系数及 R^2 判断两组直线模型同样合适。甲组随 x 增大先升高再回落，散点及残差会显示弯曲趋势，优先检查均值函数是否需要二次项；其一元直线摘要掩盖了非线性。

乙组 10 个 x 都等于 8，仅第 8 点的 $x = 19$ 提供第二个自变量水平。该点的杠杆值恰为 1，所以直线必通过它，残差为 0 不能解释成“不重要”。删去第 8 点后，只剩 $x = 8$ 这一水平，设计矩阵秩为 1，截距与斜率不能同时唯一估计，因而普通的删除后斜率比较也无法进行。

此处 $h_{88} = 1$ 是通常诊断公式的边界；不能将 $e_8 \approx 0$ 和 $1 - h_{88} \approx 0$ 直接代入 Cook 距离公式并把浮点输出当作可靠的有限诊断量。应先检查设计支持与可识别性。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[9]、[12]、[13]。

第 4 章

一般线性模型

完全随机设计、随机区组设计、析因设计的方差分析与协方差分析，通常各有一套平方和公式。本章将它们统一表述为线性模型 $Y = X\beta + \varepsilon$，各种设计的区别仅在于设计矩阵 X 的构成：分组因素以哑变量列表示，协变量为数值列，交互作用为相应列的乘积。第 2、3 章关于最小二乘估计、t 检验、增量 F 检验与模型诊断的内容均适用于本章。

对每一种设计，可从以下三方面理解：

1）设计矩阵包含哪些列，即模型的写法；
2）各系数的含义，它取决于编码方式，参照组编码与效应编码给出的系数不同；
3）误差项包含哪些变异。随机区组设计将窝别差异从误差中分离，协方差分析将年龄的作用从误差中分离，误差减小，检验效能随之提高。

第三点体现了试验设计的基本原则：通过合理设计，使误差中只保留无法控制的随机变异。

4.1 一般线性模型概述

一般线性模型（General Linear Model，GLM）是一种用于分析因变量与一个或多个自变量之间线性关系的统计模型。它通过建立变量间的线性关系，利用最小二乘法估计参数，从而解释或预测因变量的变化。

1）应用范围：不仅包含线性回归，还涵盖方差分析、协方差分析等模型。
2）参数估计：通常采用最小二乘法，但在数据存在异方差或非正态分布时可能使用更复杂方法。
3）建模目的：既可用于预测变量间关系，也可用于假设检验，如组间均值差异。

一般线性模型与多重线性回归是同一个模型 $Y = X\beta + \varepsilon$：多重线性回归本来就可以通过哑变量纳入分类自变量，通过变量变换、多项式项和交互项刻画非线性关系与效应修饰。称“一般线性模型”时，通常强调自变量中含有分类因素，把方差分析、协方差分析统一写成回归形式。其因变量仍为连续变量，假设为误差独立、正态、等方差（即第 3 章的 LINE 条件）。

须与广义线性模型（Generalized Linear Model，常缩写为 GLM 或 GLiM）区分：后者允许因变量服从二项、Poisson 等指数族分布，并通过连接函数 $g(E(Y)) = X\beta$ 建立联系，如 logistic 回归、Poisson 回归。二者英文缩写相同，阅读软件文档时须留意。

一般线性模型广泛应用于医学、金融、社会科学等领域，尤其适合需要同时分析连续和分类自变量或进行复杂假设检验的研究。

4.2 完全随机设计方差分析

例 1：为研究饮食对小鼠肥胖的干预作用，将 30 只肥胖小鼠随机等分为 3 组，每组 10 只，分别给予普通饮食 NR、高大豆蛋白饮食 HSP、高猪肉蛋白饮食 HPP，进行为期 12 周的膳食干预，记录前后小鼠体重的变化值（g）。

问　三种不同喂养方式对肥胖小鼠体重变化值的影响有无差别?

表 1　三种不同喂养方式下小鼠体重变化值（g）

	NR 组	HSP 组	HPP 组	合计
X_{ij}	3.98	1.98	2.68	
	5.51	2.83	4.02	
	4.93	2.30	3.46	
	5.92	3.20	4.40	
	5.54	2.86	4.05	
	5.39	2.72	3.90	
	5.20	2.55	3.72	
	6.14	3.04	4.61	
	5.95	3.23	4.43	
	5.80	3.10	4.29	
n_i	10	10	10	30 (N)
$\bar{X}_i$	5.4360	2.7810	3.9560	4.0577 ($\bar{X}$)
S_i	.6304	.4062	.5683	1.2229 (S)

> **批注** 分类变量需进行哑变量化。

4.2.1 参数化

$$y_{ij} = \mu_i + \varepsilon_{ij}, \qquad y = X\beta + \varepsilon, \quad i = 1, 2, 3, \quad j = 1, \ldots, 10.$$

```
x <- c(3.98,5.51,4.93,5.92,5.54,5.39,5.20,6.14,5.95,5.80,   # NR
       1.98,2.83,2.30,3.20,2.86,2.72,2.55,3.04,3.23,3.10,   # HSP
       2.68,4.02,3.46,4.40,4.05,3.90,3.72,4.61,4.43,4.29)   # HPP
g <- factor(rep(1:3,each=10))
```

不含截距的模型（单元均数参数化，$\beta_i = \mu_i$）：

```
lm(x~g-1)
```

$$\hat{\beta} = \begin{bmatrix} \hat{\beta}_1 \\ \hat{\beta}_2 \\ \hat{\beta}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5.436 \\ 2.781 \\ 3.956 \end{bmatrix},$$

即三组样本均数，是总体均数 μ_1, μ_2, μ_3 的估计值。

包含总体均数与组效应项的模型：

$$\mu_i = \mu + \alpha_i, \qquad \beta = \begin{bmatrix} \mu \\ \alpha_1 \\ \alpha_2 \\ \alpha_3 \end{bmatrix}.$$

设计矩阵 X_μ 的第 1 列等于后 3 列之和，$\operatorname{rank}(X_\mu) = 3 < 4$（秩亏），$X_\mu^\top X_\mu$ 不可逆，μ 与各 α_i 不能唯一确定：对任意 c，$(\mu + c, \alpha_i - c)$ 给出完全相同的 μ_i。须加一个约束才能唯一求解：

- 和为零约束 $\sum_i \alpha_i = 0$（效应编码，`contr.sum`）：$\mu = \frac{1}{3}\sum \mu_i$ 为各组总体均数的平均，$\alpha_i = \mu_i - \mu$ 为第 i 组相对于平均水平的效应。本例 $\hat{\mu} = 4.0577$，$\hat{\alpha} = (1.3783, -1.2767, -0.1017)$。各组例数相等时 $\hat{\mu}$ 就是 30 个观测的均数。
- 参考组约束 $\alpha_1 = 0$（R 默认的 `contr.treatment`）：截距为参考组均数 μ_1，其余系数为与参考组之差。

> **批注** μ 为 30 个观测的总体平均，α_i 为组效应项；`mean(y1)-mean(y)`。有的资料称“此模型只能手算，因为后面的列完全共线”：秩亏模型软件同样可以处理，`lm` 会对冗余列给出 `NA`（相当于令其系数为 0），加约束或改用上述编码即可唯一求解。

```
X_mu <- cbind(1,model.matrix(~g-1))    # 设计矩阵X_mu
qr(X_mu)$rank                          # 3: 4列但秩为3
lm(x~X_mu-1)                           # 冗余的最后一列系数为NA
options(contrasts=c("contr.sum","contr.poly")); lm(x~g)    # 和为零编码
options(contrasts=c("contr.treatment","contr.poly"))       # 恢复默认
```

以第 1 组为参照：

```
lm(x~g)
```

$$\gamma_0 = \mu + \alpha_1 = \mu_1, \qquad \gamma_2 = \alpha_2 - \alpha_1 = \mu_2 - \mu_1, \qquad \gamma_3 = \alpha_3 - \alpha_1 = \mu_3 - \mu_1.$$

$$(\widehat{\gamma}_0, \widehat{\gamma}_2, \widehat{\gamma}_3) = (\text{Intercept}, g2, g3) = (5.436, -2.655, -1.480).$$

> **批注** γ_2 为第 2 组与第 1 组的效应差，γ_3 为第 3 组与第 1 组的效应差。为避免与回归系数向量 β 混淆，参考组编码下的系数记为 γ。

可估计性。线性函数 $c^\top\beta$ 称为可估计的，若存在 a 使 $c^\top\beta = a^\top E(Y) = a^\top X\beta$ 对一切 β 成立，即 $c^\top$ 位于 X 的行空间内。秩亏模型中，$\mu_i = \mu + \alpha_i$、组间差 $\alpha_2 - \alpha_1$ 以及一般的对比 $\sum c_i\alpha_i$（$\sum c_i = 0$）都可估计；μ 与单个 α_i 不可估计，其数值取决于所加的约束。

列空间相同的参数化给出相同的拟合与对比

条件　两个设计矩阵 X_1、X_2 的列空间相同（如上面的 X_0、X_μ、X_{ref}，或任意一种对比编码），可以满秩，也可以秩亏。

结论　两者的拟合值、残差、残差平方和以及据此构造的 F 检验完全相同；任何可估计函数的估计值相同。

推导　最小二乘拟合值 $\widehat{Y}$ 是在列空间 $C(X)$ 中离 Y 最近的点，即 Y 在 $C(X)$ 上的正交投影。投影只由子空间决定，与用哪组列向量（以及秩亏时用哪个广义逆、哪种约束）表示该子空间无关，故 $\widehat{Y}$、$e = Y - \widehat{Y}$ 相同。可估计函数 $c^\top\beta = a^\top X\beta = a^\top E(Y)$ 的最小二乘估计为 $a^\top\widehat{Y}$，只依赖 $\widehat{Y}$，因此也相同。

统计解释　三种写法下，第 2 组与第 1 组之差都估计为 $2.781 - 5.436 = -2.655$；变的只是参数的名字与含义。解读系数前必须先弄清所用的编码。

$$
X_0 = \begin{bmatrix}
1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\
0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\0&1&0\\
0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1\\0&0&1
\end{bmatrix},\quad
X_\mu = \begin{bmatrix}
1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\1&1&0&0\\
1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\1&0&1&0\\
1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1\\1&0&0&1
\end{bmatrix},\quad
X_{\text{ref}} = \begin{bmatrix}
1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\1&0&0\\
1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\1&1&0\\
1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1\\1&0&1
\end{bmatrix}.
$$

4.2.2 检验过程

$$
H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0; \qquad H_1 : \text{至少有一个效应项不为 } 0, \qquad \alpha = 0.05.
$$

表 7-4　案例 7-1 资料的方差分析表

变异来源	SS	ν	MS	F	P
总变异	43.3685	29			
组间变异	35.4002	2	17.7001	59.9800	$<.05$
组内变异	7.9683	27	.2951		

$$F=\frac{\mathrm{MS}_{\text{组间}}}{\mathrm{MS}_{\text{组内}}}=59.98\sim F(2,27),\qquad P<0.05.$$

按 0.05 水准拒绝 H_0，接受 H_1，认为至少两组的干预作用有不同。

F 检验后的多重比较

方差分析的 F 检验只能判断各组总体均数是否全部相等。拒绝 H_0 后，需进一步确定哪些组之间存在差异及差异的大小，即进行多重比较。常用 Tukey 法，它将“三对比较中至少犯一次第一类错误”的概率控制在 0.05：

```
g <- factor(rep(c("NR","HSP","HPP"),each=10),levels=c("NR","HSP","HPP"))
TukeyHSD(aov(x~g))
```

```
          diff        lwr        upr     p adj
HSP-NR  -2.655 -3.2573759 -2.0526241 0.0000000
HPP-NR  -1.480 -2.0823759 -0.8776241 0.0000049
HPP-HSP  1.175  0.5726241  1.7773759 0.0001362
```

三对比较均有统计学意义：普通饮食组体重变化最大，高大豆蛋白组最小。其中差值 -2.655、-1.480 即参照组编码中 γ_2、γ_3 的估计值，区别仅在于置信区间按多重比较作了加宽。

多组比较不宜直接进行多次 t 检验。每次检验犯第一类错误的概率为 0.05，进行 3 次比较时，至少犯一次第一类错误的概率最高可达 $1-0.95^3\approx 0.14$。组数越多，该概率越大（5 组共 10 对比较，约为 0.40）。

完全随机设计方差分析的变异分解表

来源	平方和	自由度	均方的期望	F
组间	$\sum_i n_i(\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y})^2$	$a-1$	$\sigma^2+\dfrac{\sum n_i\alpha_i^2}{a-1}$	$\dfrac{\mathrm{MS}_{\text{组间}}}{\mathrm{MS}_{\text{组内}}}$
组内	$\sum_i\sum_j(Y_{ij}-\bar{Y}_{i\cdot})^2$	$N-a$	σ^2	
总	$\sum_i\sum_j(Y_{ij}-\bar{Y})^2$	$N-1$		

（均方期望中的 α_i 按 $\sum n_i\alpha_i=0$ 定义。）

$$\mathrm{MS}_{\text{处理}}=\frac{\mathrm{SS}_{\text{处理}}}{a-1},\qquad \mathrm{MS}_{\text{组内}}=\frac{\mathrm{SS}_{\text{组内}}}{N-a}.$$

> **批注** a 为组数，N 为实验对象总数。

4.3 随机区组设计方差分析

两因素方差分析，无交互作用。

例 2：为研究某改良型富血小板纤维蛋白（A-PRF）在软骨再生中的作用，建立兔膝关节软骨缺损模型，选取造模成功的 8 窝，每窝 3 只，共 24 只兔子。按窝别将每窝 3 只随机分配到三个处理组，在缺损处分别给予植入 A-PRF、植入 A-PRF+BMSCs（骨髓间充质干细胞）、不植入三种处理。手术后 12 周处死兔，采用国际软骨修复协会宏观评估评分（ICRS 评分）评估再生组织的质量。

问　不同植入方式间 ICRS 评分是否不同?

> **批注** 有的资料称“两步随机”：先分到 8 窝，每窝内再随机处理方法。更准确地说，8 窝是既有的区组，兔子按出生窝别自然归入区组，并非随机分配形成；随机化只有一步，即在每窝内将 3 只兔随机分配到三种处理。每个格子（窝 × 处理）只有 1 个观测，处理与区组的交互作用和纯随机误差无法分别估计；下面的检验采用可加模型，假定处理效应在各窝间相同，若存在交互作用则被并入误差项。

不同植入方式下兔软骨修复 ICRS 评分

区组	植入 A-PRF	植入 A-PRF+BMSCs	不植入
1	5.97	7.12	4.42
2	9.92	9.37	5.56
3	8.00	7.68	7.53
4	11.25	10.51	8.90
5	9.53	9.47	7.63
6	10.01	9.03	7.12
7	8.88	8.48	6.48
8	11.95	11.19	9.64

4.3.1 模型与参数估计

可加模型（i 为处理，$a = 3$；j 为区组，$n = 8$）：

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}, \qquad \sum_i \alpha_i = 0, \quad \sum_j \beta_j = 0, \quad i = 1,2,3, \quad j = 1,\dots,8.$$

记 $\mu_{i\cdot}$、$\mu_{\cdot j}$ 分别为第 i 个处理、第 j 个区组的总体均数，在和为零约束下 $\alpha_i = \mu_{i\cdot} - \mu$，$\beta_j = \mu_{\cdot j} - \mu$。最小二乘估计为

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\cdot\cdot}, \qquad \hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot}, \qquad \hat{\beta}_j = \bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot}, \qquad e_{ij} = y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot}.$$

> **批注** $\hat{\mu}$ 为所有 24 个数据的均数（本例 8.5683）；$\hat{\alpha}_i$ 为处理效应估计，$\hat{\beta}_j$ 为区组效应估计。下面的全组哑变量设计矩阵 X_{all} 有 12 列，秩为 $1+2+7=10$，需加约束或改用参照组编码；`lm` 可直接拟合，冗余列给出 `NA`。

以第一窝且植入 A-PRF 兔子的平均 ICRS 为参照（参照组编码，系数记为 γ）：

$$\begin{aligned}\gamma_0 &= \mu + \alpha_1 + \beta_1 = E(y_{11}),\\ \gamma_{\text{treat}i} &= \alpha_i - \alpha_1 = \mu_{i\cdot} - \mu_{1\cdot}, \quad i = 2,3,\\ \gamma_{\text{block}j} &= \beta_j - \beta_1 = \mu_{\cdot j} - \mu_{\cdot 1}, \quad j = 2,\dots,8.\end{aligned}$$

可加模型下，处理差 $\alpha_i - \alpha_1$ 在每一窝中都相同，所以无需指明是哪一窝。

```r
y <- c(5.97,9.92,8.00,11.25,9.53,10.01,8.88,11.95,    # 植入A-PRF
       7.12,9.37,7.68,10.51,9.47,9.03,8.48,11.19,     # A-PRF+BMSCs
       4.42,5.56,7.53,8.90,7.63,7.12,6.48,9.64)       # 不植入
treat <- factor(rep(1:3,each=8)); block <- factor(rep(1:8,3))
mean(y)
aggregate(y,by=list(treat),mean)
X <- model.matrix(~treat+block)
solve(t(X)%*%X)%*%t(X)%*%y
lm(y~treat+block)
```

$$X_{\text{all}} = \begin{bmatrix}
1&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
1&1&0&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
1&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&1&0&0&1&0&0&0&0&0&0\\
1&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0&0\\
1&0&1&0&0&0&0&1&0&0&0&0\\
1&0&1&0&0&0&0&0&1&0&0&0\\
1&0&1&0&0&0&0&0&0&1&0&0\\
1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1&0\\
1&0&1&0&0&0&0&0&0&0&0&1\\
1&0&0&1&1&0&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&1&0&1&0&0&0&0&0&0\\
1&0&0&1&0&0&1&0&0&0&0&0\\
1&0&0&1&0&0&0&1&0&0&0&0\\
1&0&0&1&0&0&0&0&1&0&0&0\\
1&0&0&1&0&0&0&0&0&1&0&0\\
1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&1&0\\
1&0&0&1&0&0&0&0&0&0&0&1
\end{bmatrix},\quad \beta = \begin{bmatrix}\mu\\ \alpha_1\\ \alpha_2\\ \alpha_3\\ \beta_1\\ \beta_2\\ \beta_3\\ \beta_4\\ \beta_5\\ \beta_6\\ \beta_7\\ \beta_8\end{bmatrix}.$$

$$X_{\text{ref}} = \begin{bmatrix}
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
1 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1
\end{bmatrix}, \quad \gamma = \begin{bmatrix}
\gamma_0 \\
\gamma_{\text{treat2}} \\
\gamma_{\text{treat3}} \\
\gamma_{\text{block2}} \\
\gamma_{\text{block3}} \\
\gamma_{\text{block4}} \\
\gamma_{\text{block5}} \\
\gamma_{\text{block6}} \\
\gamma_{\text{block7}} \\
\gamma_{\text{block8}}
\end{bmatrix}.$$

模型参数估计结果

参数	矩阵计算	`lm` 输出
Intercept	6.707083	6.7071
treat2	−.332500	−.3325
treat3	−2.278750	−2.2788
block2	2.446667	2.4467
block3	1.900000	1.9000
block4	4.383333	4.3833
block5	3.040000	3.0400
block6	2.883333	2.8833
block7	2.110000	2.1100
block8	5.090000	5.0900

4.3.2 变异分解

$$\begin{aligned}
y_{ij} &= \bar{y}_{\cdot\cdot} + (\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot}) + (\bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot}) + (y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot}), \\
y_{ij} - \bar{y}_{\cdot\cdot} &= \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j + e_{ij}, \\
\sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2 &= n\sum_{i=1}^{a}(\bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2 + a\sum_{j=1}^{n}(\bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot})^2 + \sum_{i=1}^{a}\sum_{j=1}^{n}(y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot})^2.
\end{aligned}$$

三部分两两正交，交叉项求和为 0。前两项的系数 n、a 分别是每个处理、每个区组包含的观测数。

随机区组设计方差分析的变异分解表

来源	平方和	自由度	均方的期望	F
处理	$n\sum_i(\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y})^2$	$a-1$	$\sigma^2+\dfrac{n\sum\alpha_i^2}{a-1}$	$\dfrac{\mathrm{MS}_{\text{处理}}}{\mathrm{MS}_{\text{误差}}}$
区组	$a\sum_j(\bar{Y}_{\cdot j}-\bar{Y})^2$	$n-1$	$\sigma^2+\dfrac{a\sum\beta_j^2}{n-1}$	$\dfrac{\mathrm{MS}_{\text{区组}}}{\mathrm{MS}_{\text{误差}}}$
误差	$\sum_i\sum_j(Y_{ij}-\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y}_{\cdot j}+\bar{Y})^2$	$(n-1)(a-1)$	σ^2	
总	$\sum_i\sum_j(Y_{ij}-\bar{Y})^2$	$na-1$		

$$\mathrm{MS}_{\text{处理}}=\frac{\mathrm{SS}_{\text{处理}}}{a-1},\quad \mathrm{MS}_{\text{区组}}=\frac{\mathrm{SS}_{\text{区组}}}{n-1},\quad \mathrm{MS}_{\text{误差}}=\frac{\mathrm{SS}_{\text{误差}}}{\nu_{\text{误差}}}.$$

> **批注** 处理自由度为组数减 1；区组自由度为每组个数减 1。

误差自由度可由模型的秩得到：可加模型的设计矩阵秩为 $1+(a-1)+(n-1)=a+n-1$，残差自由度为 $an-(a+n-1)=(a-1)(n-1)$，本例为 $2\times 7=14$。若在每格一个观测时再加入处理 × 区组交互项，模型秩将等于观测数 an，残差自由度为 0，误差方差无从估计。

4.3.3 处理因素的检验

$$H_0:\alpha_1=\alpha_2=\alpha_3=0;\qquad H_1:\text{至少有一个}\alpha\neq 0,\quad \alpha=.05.$$

```
anova(lm(y~treat+block))
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(> F)
treat	2	24.243	12.1215	26.354	1.793×10^{-5} (***)
block	7	51.088	7.2982	15.867	1.152×10^{-5} (***)
Residuals	14	6.439	.4600		

$$F=\frac{\mathrm{MS}_{\text{处理}}}{\mathrm{MS}_{\text{误差}}}=26.354\sim F(2,14),\qquad P<.05.$$

按 0.05 水准拒绝 H_0，接受 H_1，认为三种植入方式的 ICRS 评分总体均数不全相同。三种处理的均数依次为 9.439、9.106、7.160。

区组的作用

若忽略窝别，将同一资料按完全随机设计分析，结果如下：

```
anova(lm(y~treat))          # 忽略区组
```

```
          Df Sum Sq Mean Sq F value  Pr(>F)
treat      2 24.243 12.1215  4.4249 0.02491 *
Residuals 21 57.527  2.7394
```

处理平方和 24.243 不变，误差均方由 0.460 增至 2.739，F 值由 26.35 降至 4.42。其原因在于窝间差异（平方和 51.088）全部计入了误差。同窝兔子的遗传背景与体质相近，窝间差异较大，这部分变异与处理无关，却会掩盖处理效应。

随机区组设计将已知的较大变异来源设为区组，在区组内比较处理，从而将这部分变异从误差中分离。配对 t 检验是其在两组时的特例。若区组间差异不大，单独估计区组效应会多消耗 $n-1$ 个自由度，反而略有损失。

分析方法应与设计相符。随机区组设计的资料若按完全随机设计分析，即使本例结论方向未变，标准误也是错误的。

4.4 析因设计方差分析

两因素方差分析，考虑交互。

例 3：治疗缺铁性贫血病人 12 例，分为 4 组给予不同治疗，一个月后观察红细胞增加数（百万/mm^3）。现欲研究甲乙药单独使用的疗效如何，同时使用的疗效又如何（倪宗瓒，《医学统计学》第二版，92 页）。

批注　《医学统计学》194 页；平衡设计资料，一型与三型结果等价。

甲乙药治疗后的红细胞增加数（百万/mm^3）

	甲药	
乙药	用	不用
用	2.1	.9
	2.2	1.1
	2.0	1.0
不用	1.3	.8
	1.2	.9
	1.1	.7

数据格式

a	b	drug_a	drug_b	y	PRE_1
1	1	1	1	2.1	2.10
1	1	1	1	2.2	2.10
1	1	1	1	2.0	2.10
1	0	1	2	1.3	1.20
1	0	1	2	1.2	1.20
1	0	1	2	1.1	1.20
0	1	2	1	.9	1.00
0	1	2	1	1.1	1.00
0	1	2	1	1.0	1.00
0	0	2	2	.8	.80
0	0	2	2	.9	.80
0	0	2	2	.7	.80


编号	druga	drugb	rbc
1	1.00	1.00	2.10
2	1.00	1.00	2.20
3	1.00	1.00	2.00
4	1.00	.00	1.30
5	1.00	.00	1.20
…	…	…	…

```
y <- c(2.1,2.2,2.0, 1.3,1.2,1.1, 0.9,1.1,1.0, 0.8,0.9,0.7)
a <- factor(rep(c(1,2),each=6))          # 甲药：1=用，2=不用
b <- factor(rep(c(1,2,1,2),each=3))      # 乙药：1=用，2=不用
```

4.4.1 交互作用

> **批注** *A* 为列均数，*B* 为行均数。

方差分析中的交互作用（Interaction effect）是指两个或多个因素共同影响因变量时，一个因素对因变量的影响会因另一个因素的水平不同而发生变化的现象。交互作用反映因素之间是否存在“联合效应”或“依赖关系”。




两因素各两水平时交互作用的几种形态（示意图）。图中“显著”指效应存在；实际判断须结合误差方差和样本量作检验。

- 不用乙药也不用甲药（$b = 2, a = 2$）：红细胞数平均增加至 0.8。
- 不用乙药但用甲药（$b = 2, a = 1$）：红细胞数平均增加至 1.2。
- 用乙药但不用甲药（$b = 1, a = 2$）：红细胞数平均增加至 1.0。
- 两药同时使用：红细胞数平均增加至 2.1。

```
aggregate(y,by=list(a,b),mean)
```

Group.1	Group.2	x
1	1	2.1
2	1	1.0
1	2	1.2
2	2	.8



四个组合的样本均数（由数据计算）

> **批注** 两线不平行，提示交互作用。图形只描述效应的形态；两线不平行的程度是否超出随机误差，须结合误差方差和样本量检验（见下文 $F = 36.75$）。

4.4.2 效应估计

i 为甲药（A）水平，j 为乙药（B）水平，k 为格内重复，每格 $r = 3$ 个观测：

$$y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}, \quad i,j = 1,2, \quad k = 1,2,3,$$

约束 $\sum_i \alpha_i = \sum_j \beta_j = 0$，$\sum_i (\alpha\beta)_{ij} = \sum_j (\alpha\beta)_{ij} = 0$。估计为

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\cdots} = 1.275, \quad \hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdots}, \quad \hat{\beta}_j = \bar{y}_{\cdot j\cdot} - \bar{y}_{\cdots}, \quad \hat{\mu}_{ij} = \bar{y}_{ij\cdot}, \quad e_{ijk} = y_{ijk} - \bar{y}_{ij\cdot}.$$

甲药两水平的均数为 $\bar{y}_{1\cdot\cdot} = (2.1 + 1.2)/2 = 1.65$、$\bar{y}_{2\cdot\cdot} = (1.0 + 0.8)/2 = 0.90$；乙药两水平的均数为 $\bar{y}_{\cdot 1\cdot} = (2.1 + 1.0)/2 = 1.55$、$\bar{y}_{\cdot 2\cdot} = (1.2 + 0.8)/2 = 1.00$。全部计算统一采用总均数 1.275：

$$\hat{\alpha}_1 = 1.65 - 1.275 = 0.375, \qquad \hat{\alpha}_2 = 0.90 - 1.275 = -0.375,$$
$$\hat{\beta}_1 = 1.55 - 1.275 = 0.275, \qquad \hat{\beta}_2 = 1.00 - 1.275 = -0.275.$$

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{y}_{ij\cdot} - \bar{y}_{i\cdot\cdot} - \bar{y}_{\cdot j\cdot} + \bar{y}_{\cdots}.$$

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{11} = 2.1 - 1.65 - 1.55 + 1.275 = 0.175,$$
$$\widehat{(\alpha\beta)}_{12} = 1.2 - 1.65 - 1.00 + 1.275 = -0.175,$$
$$\widehat{(\alpha\beta)}_{21} = 1.0 - 0.90 - 1.55 + 1.275 = -0.175,$$
$$\widehat{(\alpha\beta)}_{22} = 0.8 - 0.90 - 1.00 + 1.275 = 0.175.$$

```
aggregate(y,by=list(a),mean)[,2]        # 1.65 0.90
```

```
aggregate(y,by=list(a,b),mean)
```

简单效应、主效应与回归系数的区别。

- 简单效应：固定另一因素的水平时，一个因素两水平之差。甲药的简单效应在用乙药时为 $2.1-1.0=1.1$，不用乙药时为 $1.2-0.8=0.4$。
- 交互对比：两个简单效应之差 $1.1-0.4=0.7$，等于 $4\widehat{(\alpha\beta)}_{11}=4\times0.175$。交互作用为 0 即两条线平行、两个简单效应相等。
- 平均主效应：简单效应的平均 $(1.1+0.4)/2=0.75=\hat{\alpha}_1-\hat{\alpha}_2$。有交互时它只是对乙药两个水平的平均，不代表任一具体情形下甲药的效应。
- 回归系数：`lm(y~a*b)` 采用参照组编码（参照水平为“用”），截距为 2.1，a2、b2、a2:b2 的系数依次为 −1.1、−0.9、0.7。其中 $a2=-1.1$ 是“用乙药时不用甲药相对用甲药之差”，即一个简单效应，并非主效应；交互系数 0.7 即交互对比。换用和为零编码时，系数又变为 $\hat{\alpha}_i$、$\hat{\beta}_j$、$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij}$。

4.4.3 变异分解与检验

析因设计方差分析的变异分解表

来源	平方和	自由度	均方	F
主效应 A	$br\sum_i(\bar{Y}_{i\cdot\cdot}-\bar{Y})^2$	$a-1$	SS_A/ν_A	$MS_A/\mathrm{MS}_{\text{误差}}$
主效应 B	$ar\sum_j(\bar{Y}_{\cdot j\cdot}-\bar{Y})^2$	$b-1$	SS_B/ν_B	$MS_B/\mathrm{MS}_{\text{误差}}$
交互效应 AB	$r\sum_i\sum_j(\bar{Y}_{ij\cdot}-\bar{Y}_{i\cdot\cdot}-\bar{Y}_{\cdot j\cdot}+\bar{Y})^2$	$(a-1)(b-1)$	SS_{AB}/ν_{AB}	$MS_{AB}/\mathrm{MS}_{\text{误差}}$
误差	$\sum_i\sum_j\sum_k(Y_{ijk}-\bar{Y}_{ij\cdot})^2$	$ab(r-1)$	$\mathrm{SS}_{\text{误差}}/\nu_{\text{误差}}$	
总	$\sum_i\sum_j\sum_k(Y_{ijk}-\bar{Y})^2$	$N-1=abr-1$		

a、b 为两因素的水平数，r 为每格重复数。SS_A 中的权重 br 是甲药每个水平包含的观测数，SS_B 中的 ar、SS_{AB} 中的 r 同理。本例 $a=b=2$，$r=3$：

$$SS_A=6\times(0.375^2+0.375^2)=1.6875,\qquad SS_B=6\times(0.275^2+0.275^2)=0.9075,$$
$$SS_{AB}=3\times4\times0.175^2=0.3675,$$

与下面 R 输出一致。

> **批注** 交互项显著时，即使单个变量不显著也要留在方程中；交互项不显著，再讨论单个变量的效应。

$$H_0:(\alpha\beta)_{ij}=0\ \text{对一切}\ i,j\ \text{成立};\quad H_1:\text{至少一个}\ (\alpha\beta)_{ij}\neq0;\quad \alpha=.05.$$

```
anova(lm(y~a+b+a*b))    # 平衡设计，各型平方和相同
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(> F)
a	1	1.6875	1.6875	168.75	1.169×10^{-6} (***)
b	1	.9075	.9075	90.75	1.218×10^{-5} (***)
a:b	1	.3675	.3675	36.75	.0003018 (***)
Residuals	8	.0800	.0100		

$$F = \frac{\mathrm{MS}_{\text{交互}}}{\mathrm{MS}_{\text{误差}}} = 36.75 \sim F(1,8), \qquad P < .05.$$

按 0.05 水准拒绝 H_0，接受 H_1，认为甲乙两药存在交互作用：甲药的效应随是否合用乙药而不同。

按模型层级原则，模型中保留交互项时，构成它的主效应项也应保留（无论其 P 值大小），否则交互项的含义会随编码方式改变。交互作用存在时，应以简单效应及其置信区间为主报告结果，平均主效应的意义有限。误差均方 $\mathrm{MS}_{\text{误差}} = 0.01$，$\nu = 8$，$t_{0.025}(8) = 2.306$：

$$\begin{aligned}
\text{甲药简单效应（用乙药）：} & \ 1.1 \pm 2.306 \times 0.1\sqrt{2/3} = 1.1 \pm 0.188 = (0.91,\ 1.29),\\
\text{甲药简单效应（不用乙药）：} & \ 0.4 \pm 0.188 = (0.21,\ 0.59),\\
\text{交互对比：} & \ 0.7 \pm 2.306 \times 0.1\sqrt{4/3} = 0.7 \pm 0.266 = (0.43,\ 0.97).
\end{aligned}$$

交互对比的 $t = 0.7/0.1155 = 6.06$，$t^2 = 36.75$，即上表交互项的 F 值（单自由度时 $F = t^2$）。结论：单用甲药平均使红细胞增加 0.4 百万/mm^3，与乙药合用时增加 1.1，增量相差约 0.7。

> **交互作用的报告**
>
> 本例主效应与交互作用均有统计学意义。报告时宜围绕研究问题给出简单效应：单用甲药红细胞增加 0.4，单用乙药增加 0.2，两药合用增加 1.3（$2.1 - 0.8$），大于 $0.4 + 0.2 = 0.6$，表明两药有协同作用。
>
> 交互作用的有无与所用尺度有关。线性模型中，无交互作用指两药效应可以相加；广义线性模型中的 logistic 回归，无交互作用指比值比可以相乘。同一资料在两种尺度下判断交互作用，结论可能不同，因此报告交互作用时应说明所用尺度。

4.5 协方差分析

协方差分析是将直线回归和方差分析结合应用的统计方法。比较各组结局均数时，对与结局有关的数值型协变量 x 作线性调整，以减少协变量组间分布不同带来的偏差，并减小误差方差、提高检验效能。

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta x_{ij} + \varepsilon_{ij}.$$

它能调整的只是模型中纳入的、已测量的协变量，并且是在线性和共同斜率假定下的调整；在非随机分组的观察性研究中，未测量的混杂仍可能存在。

> **批注** 类别变量加数值变量。


例 4（例 1.7）：某医生欲了解成人体重正常者与超重者的血清胆固醇是否不同，而胆固醇含量与年龄有关。

正常组与超重组的年龄、胆固醇资料

正常组		超重组	
年龄	胆固醇	年龄	胆固醇
48	3.5	58	7.3
33	4.6	41	4.7
51	5.8	71	8.4
43	5.8	76	8.8
44	4.9	49	5.1
63	8.7	33	4.9
49	3.6	54	6.7
42	5.5	65	6.4
40	4.9	39	6.0
47	5.1	52	7.5
41	4.1	45	6.4
41	4.6	58	6.8
56	5.1	67	9.2

图 1.16　数据格式

编号	group	age	chol
1	正常组	48.00	3.50
2	正常组	33.00	4.60
3	正常组	51.00	5.80
4	正常组	43.00	5.80
5	正常组	44.00	4.90
6	正常组	63.00	8.70
7	正常组	49.00	3.60
8	正常组	42.00	5.50
9	正常组	40.00	4.90
10	正常组	47.00	5.10




提示：两组中年龄和胆固醇都有线性趋势且斜率相近。

4.5.1 含交互项的完整模型

有的资料称为“饱和模型”。严格说，饱和模型指参数个数等于观测数（或格子数）的模型，这里只是允许两组斜率不同、含组别 × 年龄交互项的完整模型：

$$\hat{y}_{ij} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_i x.$$

```
y <- c(3.5,4.6,5.8,5.8,4.9,8.7,3.6,5.5,4.9,5.1,4.1,4.6,5.1,    # 正常组胆固醇
       7.3,4.7,8.4,8.8,5.1,4.9,6.7,6.4,6.0,7.5,6.4,6.8,9.2)    # 超重组
x <- c(48,33,51,43,44,63,49,42,40,47,41,41,56,                 # 正常组年龄
       58,41,71,76,49,33,54,65,39,52,45,58,67)                 # 超重组
g <- factor(rep(1:2,each=13))
lm(y~x+g+x*g)
anova(lm(y~x+g+x*g))
```



含交互项的完整模型的参数估计

Intercept	x	g2	x:g2
.64090	.09677	1.06462	−.00351

$$\hat{y} = .64 + .097x + 1.07z - .004xz,$$

正常组$(z=0)$：$\hat{y} = .64 + .097x,$

超重组$(z=1)$：$\hat{y} = 1.71 + .093x.$

> **批注** 以第 1 列为参照。

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(> F)
x	1	38.537	38.537	40.2955	2.181×10^{-6} (***)
g	1	4.458	4.458	4.6612	.04202 (*)
x:g	1	.006	.006	.0068	.93505
Residuals	22	21.040	.956		

> **批注** $P > 0.05$，应用简略模型。

交互项 $F = 0.0068$，$P = 0.935$，说明没有发现两组斜率不同的证据，可以采用共同斜率的简略模型。这不等于证明了斜率相等：每组只有 13 例，检验效能有限，还应结合专业知识与图形判断。


4.5.2 简略模型：平行性

$$\hat{y}_{ijw} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_w x.$$

> **批注** 删去交互项。原例写作“交互 $P > 0.05$，平行”，即在未发现斜率差异的前提下假定两组回归线平行。

```
fit2 <- lm(y~x+g)
summary(fit2)     # g2: 0.8955, SE 0.4057, t=2.207, P=0.03755
anova(fit2)
```

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(> F)
x	1	38.537	38.537	42.1141	1.272×10^{-6}
g	1	4.458	4.458	4.8716	.03755
Residuals	23	21.047	.915		



正常组：　$\hat{y} = .761 + .0942x,$


超重组：　$\hat{y} = .761 + .895 + .0942x = 1.656 + .0942x,$

$$b_w = \frac{\sum_{i=1}^{2} l_{x_i y_i}}{\sum_{i=1}^{2} l_{x_i x_i}} = \frac{68.9 + 190}{712 + 2037} = .0942.$$

4.5.3 重合性

如果截距相等，满足重合性假设：

$$\hat{y}_{ijt} = \hat{\mu} + \hat{\beta}x.$$



$$\hat{y} = .439 + .109x, \qquad b_t = \frac{\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x})(y_{ij}-\bar{y})}{\sum_{i=1}^{2}\sum_{j=1}^{n_i}(x_{ij}-\bar{x})^2} = \frac{351.97}{3214.615} = .109.$$

4.5.4 平方和分解

$$\sum(Y_{ij}-\bar{Y})^2 = \underbrace{\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ijt})^2}_{SS_{q\bar{w}}+SS_{qb}} + \underbrace{\sum(\widehat{Y}_{ijt}-\bar{Y})^2}_{x},$$

$$\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ijt})^2 = \underbrace{\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ijw})^2}_{SS_{q\bar{w}}=SS_{q1}+SS_{q2}} + \underbrace{\sum(\widehat{Y}_{ijw}-\widehat{Y}_{ijt})^2}_{SS_{qb},\ g},$$

$$\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ijw})^2 = \underbrace{\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ij})^2}_{SS_{q1},\ \text{residuals}} + \underbrace{\sum(\widehat{Y}_{ij}-\widehat{Y}_{ijw})^2}_{SS_{q2},\ x{:}g}.$$

$$F_1 = \frac{\sum(\widehat{Y}_{ij}-\widehat{Y}_{ijw})^2/(k-1)}{\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ij})^2/(n-2k)}, \qquad F_2 = \frac{\sum(\widehat{Y}_{ijw}-\widehat{Y}_{ijt})^2/(k-1)}{\sum(Y_{ij}-\widehat{Y}_{ijw})^2/(n-k-1)}.$$

F_1 推断 $x:g$ 有无意义，F_2 推断 g 的主效应有无意义。k 为组数，n 为总例数。

嵌套模型的逐级比较。三个模型依次嵌套，$M_1 \subset M_2 \subset M_3$：

模型	含义	残差平方和 Q	残差自由度
M_1：`y~x`	重合（共同截距、共同斜率）	25.504	24
M_2：`y~x+g`	平行（截距不同、共同斜率）	21.047	23
M_3：`y~x*g`	完整（截距、斜率均不同）	21.040	22

相邻模型用增量 F 检验（第2.3.3节）比较：

1）M_2 对 M_3（斜率是否相同），即 F_1：

$$F = \frac{(21.047-21.040)/1}{21.040/22} = 0.0068, \qquad P = 0.935.$$

2）在平行假定下，M_1 对 M_2（调整年龄后两组截距是否相同），即 F_2：

$$F = \frac{(25.504 - 21.047)/1}{21.047/23} = 4.8716, \qquad P = 0.03755.$$

完整模型的 `anova(lm(y~x+g+x*g))` 中 g 行的 $P = 0.04202$ 与上面的 $P = 0.03755$ 分子相同（都是 $Q_{M_1} - Q_{M_2} = 4.458$），差别在分母：前者用完整模型 M_3 的误差均方 0.956（$\nu = 22$），后者用平行模型 M_2 的误差均方 0.915（$\nu = 23$）。`anova(fit1,fit2,fit3)` 同时比较三个模型时，各行都以最大模型的误差均方为分母，也给出 0.04202。删去交互项后报告组别效应，通常采用 M_2 下的 0.03755。

```
fit1 <- lm(y~x); fit3 <- lm(y~x*g)
anova(fit2,fit3)        # 斜率是否相同：F=0.0068，P=0.935
anova(fit1,fit2)        # 平行前提下组别：F=4.8716，P=0.03755
anova(fit1,fit2,fit3)   # 分母均为fit3的误差均方：P=0.04202、0.935
```

> **批注** 一型平方和与自变量进入顺序有关，先放 x 和先放 g 得到的结果不同；若要与进入顺序无关，应选三型平方和；软件中在“单变量：模型-平方和”里选型。

各类平方和对应不同的假设，应先明确要检验什么，再选类型：

- 一型（序贯）：每一项检验“前面各项已在模型中时，再加入该项”的假设，结果依赖进入顺序。`anova(lm(y~x+g))` 中 g 行检验的是调整年龄后的组别差异；若写成 `y~g+x`，g 行检验的是未调整的组间差异，问题不同。
- 二型：每一项在“所有不含该项的其他项”都在模型中时检验，遵守层级原则。无交互的平行模型中，g 的二型检验即 M_1 对 M_2（$P = 0.03755$），与顺序无关。R：`car::Anova(fit2,type=2)`。
- 三型：每一项在其余全部项（含交互）都在模型中时检验。含交互项时，主效应的三型检验检验的是“协变量取 0 处（或在所用编码的特定平均意义下）组间是否有差异”，结果依赖编码方式（须用和为零编码），本例相当于检验年龄为 0 岁时两组的差异，通常不是研究问题。

各组例数相等、因素间正交的平衡设计（如上节析因例题）中，三类平方和一致；协方差分析中协变量与组别一般不正交，须按研究问题选择。

4.5.5　修正均数比较

在两条直线平行但不重合的情况下，进行修正均数比较。修正均数（调整均数，estimated marginal mean）是各组在协变量取同一值 x_0 时的估计均数。

修正均数及其差值的来源

条件　平行模型 $y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta x_{ij} + \varepsilon_{ij}$，误差独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$。

结论

$$\hat{\mu}_i(x_0) = \bar{y}_i + \hat{\beta}_w(x_0 - \bar{x}_i), \qquad \hat{\beta}_w = \frac{\sum_i l_{xy,i}}{\sum_i l_{xx,i}},$$

两组修正均数之差及其标准误为

$$\hat{\mu}_2(x_0)-\hat{\mu}_1(x_0)=(\bar{y}_2-\bar{y}_1)-\hat{\beta}_w(\bar{x}_2-\bar{x}_1),\qquad \mathrm{SE}=s\sqrt{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}+\frac{(\bar{x}_2-\bar{x}_1)^2}{\sum_i l_{xx,i}}},$$

差值与 x_0 无关，按 $t(n-k-1)$ 构造置信区间与检验。

推导　由 Frisch–Waugh–Lovell 定理，先用组别哑变量（即各组均数）对 x、y 作“组内中心化”，再回归，得到共同斜率 $\hat{\beta}_w$ 即组内合并斜率。组别的正规方程给出每组残差和为 0：$\bar{y}_i=\hat{\mu}+\hat{\alpha}_i+\hat{\beta}_w\bar{x}_i$，故 $x=x_0$ 处的拟合值为 $\bar{y}_i+\hat{\beta}_w(x_0-\bar{x}_i)$。两组相减时 x_0 项抵消。$\bar{y}_1$、$\bar{y}_2$ 与 $\hat{\beta}_w$ 两两不相关，$\mathrm{Var}(\bar{y}_i)=\sigma^2/n_i$，$\mathrm{Var}(\hat{\beta}_w)=\sigma^2/\sum_i l_{xx,i}$，相加得方差公式。

统计解释　修正均数差是“若两组年龄相同，胆固醇均数相差多少”在线性、共同斜率假定下的估计。若存在交互（斜率不同），组差 $(\alpha_2-\alpha_1)+(\beta_2-\beta_1)x_0$ 随 x_0 而变，应在若干有代表性的 x_0 处分别报告，而不能只报告一个“修正均数差”。

本例 $\bar{y}_1=5.0923$，$\bar{x}_1=46.00$；$\bar{y}_2=6.7846$，$\bar{x}_2=54.46$；$\hat{\beta}_w=(68.9+190.0)/(712+2037.2)=0.09417$；$s^2=0.9151$（$\nu=23$）。取 $x_0=\bar{x}=50.23$：

$$\begin{aligned}\hat{\mu}_1(50.23)&=5.0923+0.09417\times(50.23-46.00)=5.491,\\ \hat{\mu}_2(50.23)&=6.7846+0.09417\times(50.23-54.46)=6.386,\\ \hat{\mu}_2-\hat{\mu}_1&=1.6923-0.09417\times 8.4615=0.895,\\ \mathrm{SE}&=\sqrt{0.9151\times\left(\tfrac{1}{13}+\tfrac{1}{13}+\tfrac{8.4615^2}{2749.2}\right)}=0.406,\end{aligned}$$

$t=0.895/0.406=2.207$，$\nu=23$，$P=0.038$，95% 置信区间 $0.895\pm2.069\times0.406=(0.056,\ 1.735)$，与下面 SPSS 输出一致。这个差值就是平行模型 `lm(y~x+g)` 中 `g2` 的系数。

本例为观察性资料，体重分组并非随机分配。调整年龄后两组胆固醇的差异仍有统计学意义，但只能说明“在年龄相同的人中，超重者的胆固醇均数较高”这一关联，年龄以外的因素（如饮食、运动）未被调整。两组年龄范围（33–63 岁与 33–76 岁）基本重叠，$x_0=50.23$ 位于两组数据范围之内；若比较点落在某组数据范围以外，修正均数依赖外推。

调整协变量前后的比较

未调整年龄与调整年龄后的组间比较结果如下：

```r
coef(summary(lm(y~g)))        # 不调整：等价于两样本t检验
coef(summary(lm(y~x+g)))      # 调整年龄
t.test(x~g,var.equal=TRUE)    # 两组年龄是否相同
```

```
            Estimate Std. Error   t value     Pr(>|t|)
(Intercept) 5.092308  0.3815713 13.345626 1.343163e-12
g2          1.692308  0.5396233  3.136091 4.481431e-03
             Estimate Std. Error   t value     Pr(>|t|)
(Intercept) 0.7605338 0.88016398 0.8640819 3.964652e-01
x           0.0941690 0.01824403 5.1616348 3.126741e-05
g2          0.8954931 0.40572196 2.2071596 3.755356e-02
```

```
t = -2.0156, df = 24, p-value = 0.05517
mean in group 1 mean in group 2
       46.00000        54.46154
```

调整后两组差值由 1.692 降至 0.895，标准误由 0.540 降至 0.406。这两个变化分别对应协变量的两种作用：

- **校正偏倚**。超重组平均年龄大 8.5 岁，胆固醇随年龄升高（每岁约 0.094），$0.094 \times 8.46 \approx 0.80$，即粗差值中约 0.8 来自两组的年龄差异。调整后的 0.895 为年龄相同条件下的组间差值。
- **提高精度**。年龄解释了胆固醇的一部分变异，误差均方减小，标准误随之减小。

本例两组年龄差异的 $P = 0.055$，无统计学意义，但不能据此认为无需调整。是否调整取决于协变量对结局的影响大小及其在组间的不平衡程度，而非组间差异的 P 值。随机对照试验中基线协变量的组间差异均为随机误差，此时调整的主要目的是提高精度。

```r
x0 <- mean(x)                                          # 50.23
predict(fit2,data.frame(x=x0,g=factor(1:2)),se.fit=TRUE)    # 5.491、6.386, SE
   0.276
confint(fit2)["g2",]                                   # 0.056  1.735
```

Estimates　因变量：胆固醇

组别	Mean	Std. Error	95% 下限	95% 上限
1	5.491	.276	4.919	6.062
2	6.386	.276	5.815	6.958

协变量年龄在 $x = 50.23$ 处计算。

Pairwise Comparisons　因变量：胆固醇

(I) 组别	(J) 组别	均数差 (I − J)	标准误	Sig.	95% 下限	95% 上限
1	2	−.895*	.406	.038	−1.735	−.056
2	1	.895*	.406	.038	.056	1.735

基于估计边际均数。* 均数差在 0.05 水准有统计学意义。多重比较调整：Least Significant Difference（相当于无调整）。

批注 SPSS 中 50.23 为 x 的均数；P 值为.038，均数间的差异有统计学意义。

本章要点

1) 方差分析与协方差分析均为线性回归，区别在于设计矩阵。k 个水平的分类变量用 $k-1$ 个哑变量表示；再增加一列将与截距完全共线（秩亏）。
2) 系数的含义取决于编码方式：参照组编码中，截距为参照组均数，其余系数为与参照组之差；和为零编码中，截距为各组均数的平均，系数为相对于平均水平的效应。拟合值、残差与 F 检验不受编码方式影响。
3) 完全随机设计：$\mathrm{SS}_{\text{总}} = \mathrm{SS}_{\text{组间}} + \mathrm{SS}_{\text{组内}}$，自由度 $N-1 = (a-1) + (N-a)$。F 检验拒绝 H_0 后，以多重比较（如 Tukey 法）确定差异所在。
4) 随机区组设计：另分离出区组平方和，误差自由度为 $(a-1)(n-1)$；每格仅一个观测时无法估计交互作用，只能采用可加模型。
5) 析因设计：交互作用指一个因素的效应随另一因素的水平而变化，在图中表现为两线不平行。存在交互作用时报告简单效应，并按层级原则保留构成交互项的主效应。
6) 协方差分析的步骤：先检验各组斜率是否相同（交互项），再在平行假定下比较截距（修正均数），必要时检验重合性。修正均数差为 $(\bar{y}_2 - \bar{y}_1) - \hat{\beta}_w(\bar{x}_2 - \bar{x}_1)$。
7) 平方和类型：一型依赖变量顺序，二型遵循层级原则，三型在含交互项时依赖编码方式。平衡设计中三者一致。

常见错误表述

- “方差分析 $P < 0.05$，说明三组均数各不相同。”应表述为：三组总体均数不全相同，具体差异需经多重比较确定。
- “交互作用有统计学意义，故主效应无意义，可从模型中删去。”主效应项应保留，只是不宜单独解释平均主效应。
- “两组协变量差异无统计学意义，故无需进行协方差分析。”协变量与结局关联较强时，即使组间差异无统计学意义，调整仍可校正偏倚、提高精度。
- “交互项无统计学意义，证明两组回归线平行。”应表述为：未发现斜率存在差异；小样本时检验效能有限。

第 4 章　习题与解析

一般线性模型

往年题

单项选择题

共用资料：减肥训练与基线不均衡

在一个减肥训练班（训练方法为控制饮食与锻炼）中招募志愿者服用减肥药，志愿者和其他人都继续饮食控制与锻炼。用试验前后体重减少量评价疗效；研究人员发现服药志愿者通常比非志愿者更肥胖，两个组的基线不均衡。

题 4.1　调整不均衡的基线

研究者希望控制基线不均衡可能带来的混杂效应，宜使用何种统计方法？

A. 配对 t 检验

B. 单因素方差分析

C. 线性回归

D. GLM

E. 非条件 logistic 回归

题 4.2　基线与处理的交互

如果基线体重和分组变量存在交互作用，则

A. 难以判定药物减肥效果

B. 需进一步做成组设计均数比较的 t 检验

C. 需计算调整后的 OR 值

D. 可以计算偏相关系数做疗效判断

E. 可以计算标准化回归系数做进一步比较

题 4.3　无交互后的疗效评价

如果基线体重和分组变量不存在交互作用，则

A. 可以判定减肥药无效

B. 无论基线体重与体重减少量是否有线性关系，都可以进一步评价药物的减肥效果


C. 如果基线体重与体重减少量无线性关系，可以认为减肥药有效

D. 可以直接做单因素方差分析

E. 以 MH 卡方检验或 logistic 模型分析

题 4.4　散点图与表观药效

如果下图是数据的散点图, 则最可能的结论是



A. 两组基线体重均衡

B. 基线体重与用药存在交互作用

C. 基线体重与减重的分组回归线平行且重合

D. 成组比较 (减重) 结果为两组差异无统计学意义

E. 减肥药有效

题 4.5　将连续疗效二分类

如果研究者以体重减少 5kg 为疗效判断指标, 将结果变量设为有效和无效并使用 logistic 回归分析, 则以下错误的说法是

A. 损失了数据信息, 降低了检验效能

B. 如果发现药物有效, 同时也可确定药物的临床使用价值

C. 如果没有其他混杂因素, 可以同时计算 RR 和 OR

D. 可以用有效和无效分组, 比较两组人的平均体重, 如果有效组平均体重高于无效组, 则说明减肥药对胖人有效

E. 可以考察基线体重和分组变量间的交互作用

共用资料：两所医院的护理量与新生儿死亡

医院和护理按表中 1/2 编码，响应为死亡 1、存活 0。下表给出 4 个 Logistic 模型的原输出；P 显示 0.000 表示小于显示精度，不代表概率严格为 0。

医院	护理量	死亡	存活	死亡率%
A（1）	少（1）	3	176	1.676
A（1）	多（2）	4	293	1.347
B（2）	少（1）	17	197	7.944
B（2）	多（2）	1	23	4.0

模型	变量	B	SE	Wald	df	P	Exp(B)
1	hospital	2.085	1.705	1.495	1	0.221	8.048
1	nurse	0.241	1.865	0.017	1	0.897	1.273
1	hospital×nurse	-0.463	1.304	0.126	1	0.722	0.629
1	截距	-5.935	2.782	4.553	1	0.033	0.003
2	hospital	1.507	0.528	8.159	1	0.004	4.515
2	nurse	-0.395	0.592	0.445	1	0.505	0.674
2	截距	-5.089	1.423	12.78	1	0.0	0.006
3	hospital	1.701	0.453	14.115	1	0.0	5.482
3	截距	-5.906	0.8	54.499	1	0.0	0.003
4	nurse	-1.22	0.506	5.822	1	0.016	0.295
4	截距	-1.705	0.643	7.027	1	0.008	0.182

题 4.6　护理量与医院的调整分析

根据统计结果, 新生儿死亡的影响因素是

A. 仅医院原因

B. 仅护理量原因

C. 医院原因和护理量二者均是影响因素

D. 不同护理量下,A,B 医院的影响不同

E. 无法判断

题 4.7　未调整的护理 OR

如果忽略医院不同的影响做单因素分析, 较高护理量对较低护理量的 OR 是

A. 0

B. 0.295

C. 0.674

D. 1

E. 1.273

题 4.8　最终医院 OR

根据最终统计结果,B 医院对 A 医院的 OR 是

A. 0

B. 1

C. 4.5

D. 5.5

E. 8.0

题 4.9　被删除项的模型 OR

根据最终统计结果, 较高护理量对较低护理量的 OR 是

A. 0

B. 0.295

C. 0.674

D. 1

E. 1.273

题 4.10　医院间的风险比

根据最终统计结果,B 医院对 A 医院的 RR 是

A. 1.1

B. 4.5

C. 5.1

D. 5.5

E. 8.0

题 4.11　三个 OR 的组合

某药效临床试验, 研究对象分低龄和高龄两组随机分配入用药组和安慰剂组, 使用 logistic model, 以高龄和安慰剂为参照, 得到年龄的 OR=2, 药物的 OR=5, 年龄和药物的交互作用为 0.8, 则低龄用药组对高龄安慰剂组的 OR 是

A. 6.2

B. 7.8

C. 8

D. 10

E. 10.8

题 4.12　一般线性模型与参照类别

关于 GLM, 以下判断正确的是

A. 不要求因变量服从正态分布

B. 要求自变量互相独立

C. 对于有交互作用的模型, 可以在估计交互作用后评价主效应

D. 对于无交互作用模型, 可以直接做单因素方差分析

E. 可以任意指定某分类变量中某类的主效应参数 (回归系数) 为 0

共用资料：旧题文献 2 与 Framingham 模型

原题引用《多元线性回归……》及 Framingham 心脏病研究的表 1、方程；该原文未随本题库提供。现有“生命质量影响因素”是另一篇 2018 年文献，不能代替。以下保留原题，涉及具体数值与文章原句的答案须等待原文核验。

题 4.13　由原文方程计算风险

根据表 1 结果,45 岁, 女性,SBP<22kPa, 其冠心病发病的概率是

A. 0.0613

B. 0.0277

C. 0.1273

D. 0.1680

E. 尚无法判断

共用资料：BMI 与非吸烟女性肺癌

上海市肿瘤登记收集 1992 年 2 月 1 日至 1993 年底的女性肺癌新病例 649 例，年龄 35—69 岁；73% 由病理或细胞学确诊，其余经胸部影像。按病例年龄分布，以 5 岁为组作频数匹配，在市区人群中随机抽取健康对照 675 例。非吸烟病例、对照分别为 504、601 例。对非吸烟者拟合多变量非条件 Logistic 模型，调整烹调油烟、用油类型、被动吸烟、饮茶、肺结核、家族史、月经生育等因素；下表为两个调整层次的结果。原结论：“体质指数可能是非吸烟女性肺癌的危险因素之一。”

BMI 组	病例/对照	ORI	95% CII	ORII	95% CIII
≥ 25.15	94/152	1	—	1	—
22.86—25.14	103/159	1.017	0.706—1.464	1.021	0.707—1.473
20.96—22.85	129/140	1.399	0.976—2.006	1.498	0.971—2.012
<20.96	176/150	1.793	1.268—2.536	1.794	1.263—2.548

两个模型的趋势检验均报告 $P = 0.0002$。

题 4.14　病例对照设计

本研究属于

A. 横断面调查研究

B. 病例对照研究

C. 队列研究

D. 社区干预研究

E. 随机对照临床试验

题 4.15　病例对照研究的实施难点

按此研究设计, 在操作上最难做到的是

A. 获得癌症病人资料

B. 获得对照组人群资料

C. 问卷调查

D. BMI 测试

E. 统计分析

题 4.16　表内数字核查

此研究中肯定存在的问题有

A. 统计数字有误

B. 假设检验有误

C. OR 计算有误

D. 资料获取方法有误

E. 模型选择有误

题 4.17　有序分类自变量的分析

当 Y 为数值变量,X 为有序多分类变量, 则以下正确的说法是

A. 使用单因素方差分析最优

B. 可以直接进行多次 t 检验

C. 使用等级相关分析最优

D. 使用 GLM 进行分析最优

E. 如果 LINE 假设成立，宜用线性回归分析，模型假设检验的自由度为 1。

题 4.18　温度与催化剂的关系

欲考察某化学反应条件 (温度、催化剂) 与底物浓度 (变化) 的关系, 数据分析宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

共用资料：减肥训练与基线不均衡

在一个减肥训练班（训练方法为控制饮食与锻炼）中招募志愿者服用减肥药，志愿者和其他人都继续饮食控制与锻炼。用试验前后体重减少量评价疗效；研究人员发现服药志愿者通常比非志愿者更肥胖，两个组的基线不均衡。

题 4.19　基线不均衡还能否分析

如果服药组与对照组的体重基线不均衡, 则本研究

A. 无法回答药物是否有效问题

B. 使用 GLM 模型可以消除体重不均衡因素, 回答药物是否有效问题

C. 不妨使用 t 检验做成组比较

D. 在一定情况下可以回答药物是否有效问题

E. 因为没有随机入组, 本试验无效

题 4.20　药效依赖基线水平

如果基线体重和分组变量存在交互作用, 则

A. 可以计算标准化回归系数做进一步比较

B. 需进一步做成组设计均数比较的 t 检验

C. 药效大小与体重有关

D. 可以计算偏相关系数做疗效判断

E. 可以判定药物减肥有效

题 4.21　共同斜率模型的下一步

如果基线体重和分组变量不存在交互作用, 则

A. 即可判定减肥药有效

B. 可以通过进一步分析得出药物是否有效的结论


C. 如果基线体重与体重减少量无线性关系, 可以认为减肥药有效

D. 如果基线体重与体重减少量有线性关系, 亦难评价减肥药是否有效

E. 即可做单因素方差分析来进一步判定

题 4.22　重叠趋势与基线混杂

如果下图是数据的散点图, 则最可能的结论是



A. 两组基线体重均衡

B. 基线体重与分组变量存在交互作用

C. 减肥药无效

D. 基线体重与减重无线性关系

E. 成组比较 (减重) 结果为两组差异无统计学意义

题 4.23　基线均衡后的分析选择

如果两组基线体重均衡, 则以下错误的说法是

A. 无把握判断减肥药是否有效

B. 可以科学判断训练方法是否有效

C. 可以使用 t 检验

D. 必须基线体重为协变量建立 GLM

E. 可以使用方差分析

共用资料：急诊就诊量与气象要素

阅读随包的《急诊就诊量与气象要素的相关性分析》（费敏，2008）。研究分析 2005—2006 连续 730 天数据，报告急诊 199649 人次、日均 274.5 人次；7 月最高、2 月最低。文中写采用 post hoc 检验。回归从 9 个气象变量中筛出以下 4 项：

变量	B	SE	标准化 β	P
平均相对湿度	1.011	0.159	0.244	<.001
最高气温	1.126	0.546	0.212	<.05
最低气温	2.2	0.591	0.378	<.001
最大风速	-0.606	0.091	-0.207	<.001

给出的预测公式截距为 285.481。讨论中认为春节期间停工休息可能减少意外就诊，也讨论高温和低温均可能增加急症。文中未给出本模型的 R^2、时间序列残差或共线性诊断；所引用的 84% 与 44% 来自别人的研究。

题 4.24　月份均数的事后比较

7 月份和 2 月份日平均就诊人次与其他月份相比差异有统计学意义, 作者最可能使用的统计方法是

A. GLM
B. t 检验
C. 线性回归
D. 方差分析后的多重比较 post-hoc
E. 非参数检验

题 4.25　0.0613 对应什么人群

依照 Framingham 心脏病研究的回归方程,0.0613 是指

A. 各自变量为均数时的发病率
B. 人群基线发病率
C. 45 岁女性收缩压小于 22 者发病率
D. 血压正常者平均发病率
E. 61 岁组平均发病率

题 4.26　含交互模型的自由度

GLM 的交互作用模型, 自变量为一个数值变量和一个 4 分类变量, 则模型误差的自由度是

A. n-5
B. n-6
C. n-7
D. n-8
E. n-9

题 4.27　R 公式与层次原则

按 R 公式语法，下列哪些模型符合层次原则?

I. `y ~ x1 + x2 + x3 + x1*x2*x3`

II. `y ~ x1 + x2 + x3 + x1*x2 + x2*x3 + x1*x2*x3`

III. `y ~ x1 + x2 + x3 + x1*x2*x3`

三个公式按回忆稿原样保留（I 与 III 相同）。

A. I

B. II

C. III

D. I&II

E. I&II&III

题 4.28　aov 的顺序平方和

关于 aov() 函数, 正确的说法有 I、aov() 函数对交互作用的检验与自变量的顺序有关 II、aov() 函数对主效应的检验与自变量的顺序有关 III、aov() 函数可以用于协方差矩阵的球形检验

A. I

B. II

C. III

D. I&II

E. I&II&III

共用资料：减肥训练与基线不均衡

在一个减肥训练班（训练方法为控制饮食与锻炼）中招募志愿者服用减肥药，志愿者和其他人都继续饮食控制与锻炼。用试验前后体重减少量评价疗效；研究人员发现服药志愿者通常比非志愿者更肥胖，两个组的基线不均衡。

题 4.29　基线不均衡还能否分析

如果服药组与对照组的体重基线不均衡, 则本研究

A. 无法回答药物是否有效问题

B. 使用 GLM 模型可以消除体重不均衡因素, 回答药物是否有效问题

C. 不妨使用 t 检验做成组比较

D. 在一定情况下可以回答药物是否有效问题

E. 因为没有随机入组, 本试验无效

题 4.30　药效依赖基线水平

如果基线体重和分组变量存在交互作用, 则

A. 可以计算标准化回归系数做进一步比较
B. 需进一步做成组设计均数比较的 t 检验
C. 药效大小与体重有关
D. 可以计算偏相关系数做疗效判断
E. 可以判定药物减肥有效


题 4.31　共同斜率模型的下一步

如果基线体重和分组变量不存在交互作用, 则

A. 即可判定减肥药有效
B. 可以通过进一步分析得出药物是否有效的结论
C. 如果基线体重与体重减少量无线性关系, 可以认为减肥药有效
D. 如果基线体重与体重减少量有线性关系, 亦难评价减肥药是否有效
E. 即可做单因素方差分析来进一步判定

题 4.32　重叠趋势与基线混杂

如果下图是数据散点图，则最可能的结论是：



A. 两组基线体重均衡

B. 基线体重与分组变量存在交互作用

C. 减肥药无效

D. 基线体重与减重无线性关系

E. 成组比较 (减重) 结果为两组差异无统计学意义

题 4.33　设计阶段的混杂控制

这个研究给你哪些启发?

I. 只要一项基线指标均衡，就一定不存在混杂。

II. 组间检验不显著就证明处理完全无效。

III. 设计阶段未考虑混杂，可能无法回答研究者关心的问题。

A. I

B. II

C. III

D. I&II

E. I&II&III

题 4.34　一般线性模型的组成

一个连续结局、一个二分类因素和一个数值协变量，无交互的含截距一般线性模型可写为：

A. $E(Y \mid X, G) = \beta_0 + \beta_X X + \beta_G G$。

B. Y 必须与 X 相互独立。

C. 必须省略截距。

D. 必须将连续结局先二分类。

E. 无需任何关于误差和设计的条件。

题 4.35　交互模型的层次性

若模型保留 X_1X_2 交互项，通常应同时保留：

A. 仅截距。

B. X1 与 X2 两个低阶主效应。

C. 只保留 P 值较小的一个主效应。

D. 删除全部主效应。

E. 任意与题目无关的变量。

题 4.36　三分类因素的设计矩阵

含截距、3 类别因素的一元一般线性模型，满秩参数数目为：

A. 1。

B. 2。

C. 3。

D. 4。

E. n。

题 4.37　交互项的条件效应

模型 $E(Y) = b_0 + b_X X + b_G G + b_{XG} XG$ 中，给定 X 的组 1 对组 0 均值差为：

A. $b_G + b_{XG} X$。

B. b_G 对所有 X 不变。

C. b_X。

D. b_0。

E. $b_X + b_G$。

题 4.38　中心化协变量

将数值协变量减去一个常数重新拟合同一可等价表达的含交互模型，通常：

A. 拟合值可保持相同，但截距及部分主效应解释改变。

B. 所有 P 值都必变为 0。

C. 必须删去交互项。

D. 所有观测的 Y 值改变。

E. 残差必增大。

题 4.39　非平衡设计中的顺序平方和

非平衡资料的 I 型平方和一般：

A. 可能依赖模型项加入顺序。

B. 与顺序永远无关。

C. 总等于 III 型平方和。

D. 无需考虑交互结构。

E. 只适用于二分类结局。

题 4.40　改变参照类别

在同一满秩模型空间内改变分类变量的参照组，通常：

A. 拟合值与整体模型检验不变，系数含义改变。

B. 预测值一定改变。

C. 变量类型由分类变连续。

D. 样本量增加。

E. 所有系数均不变。

题 4.41　肿瘤类型的编码

若把胶质瘤、脑膜瘤、垂体瘤作为无序 3 分类解释变量，含截距时通常需要：

A. 2 个哑变量。

B. 直接用 1、2、3 且不加任何间距假定。

C. 3 个哑变量加截距且声称满秩。

D. 不需要任何变量。

E. 先将结局二分类。

简答题

共用资料：BMI 与非吸烟女性肺癌

上海市肿瘤登记收集 1992 年 2 月 1 日至 1993 年底的女性肺癌新病例 649 例，年龄 35—69 岁；73% 由病理或细胞学确诊，其余经胸部影像。按病例年龄分布，以 5 岁为组作频数匹配，在市区人群中随机抽取健康对照 675 例。非吸烟病例、对照分别为 504、601 例。对非吸烟者拟合多变量非条件 Logistic 模型，调整烹调油烟、用油类型、被动吸烟、饮茶、肺结核、家族史、月经生育等因素；下表为两个调整层次的结果。原结论："体质指数可能是非吸烟女性肺癌的危险因素之一。"

BMI 组	病例/对照	ORI	95% CII	ORII	95% CIII
≥ 25.15	94/152	1	—	1	—
22.86—25.14	103/159	1.017	0.706—1.464	1.021	0.707—1.473
20.96—22.85	129/140	1.399	0.976—2.006	1.498	0.971—2.012
<20.96	176/150	1.793	1.268—2.536	1.794	1.263—2.548

两个模型的趋势检验均报告 $P = 0.0002$。

题 4.42　一句话评价肺癌研究

请用一句话对此研究结论作评价。

题 4.43　一般线性模型的层次规则

简述一般线性模型建模的层次规则。

题 4.44　从一般线性模型看常用分析

从一般线性模型的简化形式，总结数值结局的常见统计分析方法。

计算与分析题

题 4.45　儿童测验：组别、年龄与交互

data3 为儿童生长发育测验分数，分两个有害因素暴露组和一个对照组，以年龄为协变量，用一般线性模型分析：1. 按步骤筛选最终模型。2. 给出最终模型方差分析表。3. 给出回归方程，以对照为参照组。4. 作统计学和专业解释。
原儿童测验文件没有附上。2023 data3 标注为 BMR，不能不加说明地当作儿童测验原数据。

题 4.46　儿童测验：组别、年龄与交互

data3 为儿童生长发育测验分数，分两个有害因素暴露组和一个对照组，以年龄为协变量，用一般线性模型分析：1. 按步骤筛选最终模型。2. 给出最终模型方差分析表。3. 给出回归方程，以对照为参照组。4. 作统计学和专业解释。
原儿童测验文件没有附上。2023 data3 标注为 BMR，不能不加说明地当作儿童测验原数据。

补充练习

本节为配合正文新编的补充练习，按题型排列，题号接续本章往年题，解析见章末。

单项选择题

题 4.47　小鼠饮食试验的参照编码

正文小鼠饮食试验中，NR、HSP、HPP 三组各 10 只，体重变化均数依次为 5.436、2.781、3.956 g。以 NR 为参照，D_H, D_P 分别表示 HSP、HPP 组，模型为 $\hat{Y} = b_0 + b_H D_H + b_P D_P$。以下说法正确的是：

A. 截距必为三组合并均数 4.0577。

B. $b_H = 2.781$, $b_P = 3.956$。

C. 组别整体检验的分子自由度为 3。

D. $b_0 = 5.436$, $b_H = -2.655$, $b_P = -1.480$。

E. 因每只小鼠有干预前后体重，这个变化值模型必须另加入时间项。

题 4.48　随机区组设计的误差自由度

正文软骨修复试验设 8 窝兔，每窝 3 只，在每窝内分别随机安排 3 种处理，每个“窝别 × 处理”组合只有 1 只兔。按正文的无交互随机区组模型分析，以下说法正确的是：

A. 处理效应以 $F(2, 21)$ 检验，因为共有 24 只兔。

B. 处理效应以 $F(2, 14)$ 检验，模型不单独估计窝别 × 处理交互。

C. 可用剩余 14 个自由度同时独立估计交互和随机误差。

D. 窝别和处理自由度分别为 8 和 3。

E. 每窝有 3 只兔，因此属于三时点重复测量。

题 4.49　顺序平方和的数值辨析

同一样本中，X 是数值协变量，G 是分类因素。四个含截距模型的残差平方和如下，且 $Y \sim X + G$ 不含交互：

模型	仅截距	X	G	X+G
残差平方和	100	70	85	60

采用 I 型平方和时，以下说法正确的是：

A. 先放 X 后放 G，G 的顺序平方和为 10；先放 G 后放 X，X 的顺序平方和为 25。

B. 两种顺序下，G 的平方和均为 15。

C. 改变顺序后，最终模型残差平方和必改变。

D. 先放 X 时，G 的顺序平方和为 40。

E. 两种顺序下，X 与 G 的顺序平方和之和不同。

简答题

题 4.50　胆固醇协方差分析的结果解释

正文比较正常体重组和超重组的胆固醇，年龄为 X，正常组 $G=0$、超重组 $G=1$。年龄 × 组别交互的 $P=0.935$；删去交互后的拟合式为

$$\hat{Y}=0.760534+0.094169X+0.895493G.$$

在共同年龄 50.23 岁处，模型给出的修正均数约为 5.491、6.386；组差检验 $P=0.038$。
按 0.05 水平，说明采用哪种模型、修正均数比较的含义，以及能否据“交互不显著”把两组直接合为一条直线。

计算与分析题

题 4.51　两药析因试验的交互填空

正文例 3 将 12 名缺铁性贫血患者分为 4 组，每组 3 人，一个月后红细胞增加数如下（单位沿用正文：百万/mm^3）：

甲药 A	乙药 B	3 名患者的增加数
不用	不用	0.8，0.9，0.7
用	不用	1.3，1.2，1.1
不用	用	0.9，1.1，1.0
用	用	2.1，2.2，2.0

1. 以不用药为 0、用药为 1，写出含交互的回归方程 $\hat{Y}=b_0+b_AA+b_BB+b_{AB}AB$。
2. 填写 A、B、A×B、误差的平方和、自由度、均方与 F 值。
3. 已知 $F_{0.95}(1,8)=5.318$，检验交互作用；计算不用乙药和用乙药时甲药效应的估计，并说明为何不能只用一个甲药效应概括。
4. 在本题平衡设计中，以正文的和为零约束 $\sum\alpha_i=\sum\beta_j=0$ 表示效应时，交互效应四个格子的估计是多少？它们与 0/1 编码的 b_{AB} 是否为同一个参数？

本次补充习题

单项选择题

每题只有一个最佳答案，请从 A—E 中选择。

题 4.52　非等样本量下的和为零约束

某完全随机设计试验的教学资料如下，三组均比较同一连续结局：

组别	A	B	C
样本量	5	10	15
样本均数	6	9	12

拟合模型 $Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \varepsilon_{ij}$，并明确采用 $\alpha_A + \alpha_B + \alpha_C = 0$ 约束。以下说法正确的是：

A. $\hat{\mu} = 10$，因为截距总等于 30 个观测的合并均数。

B. $\hat{\mu} = 6$，因为 A 组列在表格最前面。

C. $\hat{\mu} = 9$，而 30 个观测的合并均数为 10。

D. $\hat{\alpha}_A = 6, \hat{\alpha}_B = 9, \hat{\alpha}_C = 12$。

E. 三组样本量不相等，因此无法使用和为零约束。

题 4.53　Tukey 比较中的未检出差异

一项三组完全随机试验中，A、B、C 组各 8 人。教学资料的组均数依次为 10、11.5、13，三组样本方差均为 4。方差分析得 $F(2, 21) = 4.500$，$P = 0.0236$。软件给出下列 Tukey 两两比较结果，区间与 P 值均已作多重比较校正：

比较	均数差	同时 95% 置信区间	校正 P
B–A	1.500	$(-1.021, 4.021)$	0.3111
C–A	3.000	$(0.479, 5.521)$	0.0180
C–B	1.500	$(-1.021, 4.021)$	0.3111

按 0.05 水准，最恰当的解释是：

A. 三组总体均数已经证实各不相同。

B. B 与 A、C 比较均不显著，因此 A 与 C 也应判为无差异。

C. 总体 F 检验显著，因此表中三个两两比较均应改判为显著。

D. 必须改作三次未经校正的 t 检验，才能确定差异所在。

E. 仅 C 与 A 检出差异；其他两对未检出差异，并不证明相应总体均数相等。

题 4.54　完整区组内如何随机化

某体外实验拟比较 4 种处理浓度。实验分 3 日完成，每日有 4 皿可分别接受处理的细胞培养物；不同实验日的培养条件可能影响连续测量结局。现拟以实验日为区组，采用完整随机区组设计。以下安排符合该设计的是：

A. 将 12 皿在全体范围内随机分为 4 组，不限制每日出现哪些浓度。

B. 在每日 4 皿中随机分配 4 种浓度，每种浓度在该日出现一次。

C. 按结局测定值由低到高排列各皿，再依次分配浓度。

D. 每日均按培养皿编号从小到大固定分配 4 种浓度，不再随机化。

E. 每天用同一皿依次接受 4 种浓度，并将 4 次结果作为独立观察。

题 4.55　区组模型的含义与正交性

有 4 种处理、5 个区组，每个“处理 × 区组”组合恰有 1 个独立实验单位。按可加的一般线性模型分析，处理及区组均作为分类因素完整纳入。以下说法正确的有：

I. 模型假定任意两种处理的总体均数差在各区组相同。

II. 将区组编号 1 至 5 直接作为一个数值线性项，等价于将区组作为分类因素。

III. 在本题完整平衡设计中，交换处理和区组的进入顺序，不改变处理的 I 型平方和。

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. I、III

E. I、II、III

题 4.56　一个简单效应显著而另一个不显著

某 2×2 独立析因试验中，每个组合 10 人，结局为连续变量。教学资料的四格均数为：

	$A=0$	$A=1$
$B=0$	5	7
$B=1$	8	9

完整模型的误差均方为 4，误差自由度为 36。软件对 A 的两个简单效应给出未经多重比较校正的双侧 P 值：在 $B=0$ 时为 0.032，在 $B=1$ 时为 0.271。以下判断正确的是：

A. 不能仅因一个 P 小于 0.05、另一个大于 0.05 就认定有交互；须直接检验两个简单效应之差。

B. 已经证明 A 在 B=1 时的总体效应严格等于 0。

C. 交互作用的估计应为两个简单效应相加，即 3。

D. 两个简单效应同为正数，因此总体交互作用必定为 0。

E. 0.032 就是该完整模型中 A 与 B 交互项的 P 值。

题 4.57　修正均数差的标准误

两组各 8 人的连续结局按共同斜率协方差模型分析，数值协变量记为 X。教学资料满足本章误差条件，且给出充分汇总量：

$$\bar{X}_1 = 10, \quad \bar{X}_2 = 14, \quad \sum_i \sum_j (X_{ij} - \bar{X}_i)^2 = 80, \quad MSE = 4.$$

在相同 $X = x_0$ 处比较两组修正均数，其差值的标准误约为：

A. 1.000

B. 1.183

C. 1.342

D. 2.000

E. 4.000

简答、计算与案例分析

题 4.58　方差分析究竟要求什么正态

在三组独立对象的完全随机试验中，合并三组结局 Y 所画的直方图出现多个峰。分析者据此认为方差分析必定不适用，并建议先对分组变量做正态性检验。

请指出上述两处判断的问题，写出本章模型对误差的基本要求，并说明应查看哪些资料或图形。

题 4.59　实验日区组与预设处理比较

某实验比较 A、B、C 三种培养条件对蛋白浓度 Y（mg/L）的影响。分 4 个实验日完成，每日 3 个可分别接受处理的培养单位，在日内随机分配三种条件。下表为独立设置的教学数据：

实验日	A	B	C
1	8	11	11
2	13	13	16
3	15	18	21
4	20	22	24

采用处理与实验日的可加模型，假定误差满足本章条件。

1）写出模型和处理效应整体检验的原假设；填写处理、区组、误差、总变异的 SS、自由度、MS 及处理 F 值。

2）已知 $F_{0.95}(2,6) = 5.143$，作整体检验结论。

3）研究方案事先只指定 C–A 这一项处理对比。估计该差值及其 95% 置信区间，已知 $t_{0.975}(6) = 2.447$。

4）若忽略实验日，误差均方变为多少？说明其变动来源。

题 4.60　小样本协方差分析的完整核算

某训练试验将 12 人随机分为普通训练组 $G=0$ 和强化训练组 $G=1$。X 为训练前评分，Y 为训练后另一项运动测验评分，分数越高表示表现越好。以下为新编教学数据：

普通训练组		强化训练组	
X	Y	X	Y
6	19.5	8	22.0
7	17.9	9	20.6
8	19.3	10	22.2
9	19.7	11	22.8
10	19.1	12	22.4
11	21.5	13	25.0

软件对同一批 12 人拟合得到：

模型	残差平方和	残差自由度
$M_2: Y \sim X + G$	8.35	9
$M_3: Y \sim X + G + XG$	8.00	8

假定可按本章误差条件分析。取 $\alpha=0.05$，给定 $F_{0.95}(1,8)=5.318$、$t_{0.975}(9)=2.262$。

1) 检验两组斜率是否不同，说明本题是否有证据必须保留交互项。
2) 按共同斜率模型计算 $\hat{\beta}_X$，并以普通训练组为参照写出回归方程。可使用组内离均差积和公式。
3) 在共同评分 $X_0=9.5$ 处计算两组修正均数、差值及其 95% 置信区间。说明这里应使用哪个模型的误差均方。

题 4.61　平均主效应为零能否判定方案无效

某随机 2×2 析因试验比较训练方案 A（0：常规，1：强化）和辅助方案 B（0：不用，1：使用）。每组合 15 人，结局为连续的功能改善评分，越高越好。下表为新编教学汇总资料；各格样本方差均为 9。

	$A=0$	$A=1$
$B=0$	10	16
$B=1$	18	12

完整析因方差分析的误差自由度为 56、$MSE=9$。按跨另一因素水平平均的主效应定义，A 的 $F=0, P=1$；交互项 $F=60, P<0.001$。

研究者据此写道：“A 的主效应不显著，说明 A 在任何条件下都没有作用；交互项显著，所以最终模型只保留 AB 项；强化方案代表更积极的治疗，因此仍可统一推荐 $A=1$。”

1) 计算 B 的两个水平下 A 的简单效应，以及按“$B=1$ 减 $B=0$”定义的交互对比。
2) 逐项评价研究者的三句话，并给出与数据相符的模型和结果表述。

习题解析

核对方式

题号与前文一一对应。补写范围、原题歧义及数据还原方法列在相应答案中。

解析 题 4.1　调整不均衡的基线

返回题目

答案：D（一般线性模型/协方差分析）。

以减重为结局，纳入基线体重、分组及必要的交互项。数值协变量加分类因素可用一般线性模型表示。C 若指含哑变量的多重线性回归，也能表达同一模型，故选项术语有重叠；D 是课程意图。调整不能自动消除未测混杂。

解析 题 4.2　基线与处理的交互

返回题目

答案：A（仅就统一药效的解释而言）。

交互意味着药效与基线体重有关，应解释 $\beta_G + \beta_{GX}X$ 或报告不同基线水平的简单效应。不能再只用一个恒定药效概括。A 若被理解为完全无法评价药效则过强；其余选项也不是正确替代交互分析的方法。

解析 题 4.3　无交互后的疗效评价

返回题目

答案：B。

未发现交互可进一步用共同斜率 ANCOVA 评价调整后的组差；若协变量与结局的关系也可忽略，再考虑简化。无交互本身既不证明有效，也不证明无效。

解析 题 4.4　散点图与表观药效

返回题目

答案：C（示意图的命题意图）。

图中两组分布在不同基线区间，整体大致沿同一趋势；未经调整的减重差可能来自基线。它不能证明疗效，且基线区间缺乏重叠，调整高度依赖模型外推。示意图也不足以正式证明两条线完全平行重合，应以模型与不确定性为准。

解析 题 4.5　将连续疗效二分类

返回题目

答案：D 最直接；B 也表述过强。

按疗效分组再比较基线体重不能替代处理效应或处理 × 基线交互分析，故 D 的推论不成立。B 也不能仅凭统计结果就确定综合临床使用价值，还需收益、伤害等证据。二分类通常损失信息；随访设计和分母合适时可分别估计 RR 与 OR，但两者不是同一量。

解析 题 4.6　护理量与医院的调整分析

返回题目

答案：A（统计关联层面）。

交互项 P=.722，护理在调整医院后 P=.505；按原卷逐步简化口径仅医院项留下。这里是统计关联，不能称为已证明“医院原因”导致死亡。

解析　题 4.7　未调整的护理 OR　　返回题目

答案：B。

单因素护理模型的指数系数为 $e^{-1.220} \approx 0.295$，也可由合并 2×2 表计算。该粗 OR 受医院构成差异影响。

解析　题 4.8　最终医院 OR　　返回题目

答案：D。

若“最终模型”指删除护理后的表 3，$OR = e^{1.701} \approx 5.482$，选 5.5。若保留护理调整，则表 2 为 4.515，须区别模型。

解析　题 4.9　被删除项的模型 OR　　返回题目

答案：D（简化模型所施加的约束）。

只含医院的模型将护理系数设为 0，故模型内 $OR = e^0 = 1$；这不是证明真实护理效应等于 0。若问表 2 的调整 OR 则为 0.674。

解析　题 4.10　医院间的风险比　　返回题目

答案：C。

两院死亡风险为 7/476 与 18/238，因此 $RR = (18/238)/(7/476) = 5.1429$。它不同于优势比约 5.482。

解析　题 4.11　三个 OR 的组合　　返回题目

答案：C。

把题中 0.8 理解为交互项的 OR，则低龄且用药相对于高龄且安慰剂的 OR 为 $2 \times 5 \times 0.8 = 8$。若 0.8 指对数系数，结果应为 $2 \times 5e^{0.8}$；原选项支持前一种解释。

解析　题 4.12　一般线性模型与参照类别　　返回题目

答案：E（参照编码）。

这里 GLM 指一般线性模型。可选任一类别为参照并将对应冗余参数设为 0，需保持整套编码一致。有交互时仍可解释特定参照条件下的主效应系数，但不能忽略交互作无条件解释，因此 C 措辞也存在歧义。

解析　题 4.13　由原文方程计算风险　　返回题目

答案：原文缺失，不能确认原题选项。

需要表 1 完整系数、变量定义、参照及连接函数。如果是 Logistic，应先求线性预测子，再作 $p = 1/(1 + e^{-\eta})$；如文中给的是线性概率模型，计算和适用边界不同。这里不能因附件缺失就冒认原考试正确项为 E。

解析 题 4.14　病例对照设计　　返回题目

答案：B。

先按是否为肺癌病例抽取病例与健康对照，再比较 BMI 和其他特征，是病例对照研究；对照按年龄分布频数匹配。

解析 题 4.15　病例对照研究的实施难点　　返回题目

答案：B（通常的命题意图）。

对照必须来自与病例相同的来源人群，并能代表产生病例的暴露分布，选择和获取合适对照通常最困难。BMI 测量时点也很重要，病后体重变化可能带来反向因果；“最难”不是普遍定理。

解析 题 4.16　表内数字核查　　返回题目

答案：A。

表中病例数 $94 + 103 + 129 + 176 = 502$，与正文非吸烟病例 504 不符；对照数相加为 601。可指出计数不一致，但仅凭摘要不能判定是遗漏、排除未说明还是排版错误。

解析 题 4.17　有序分类自变量的分析　　返回题目

答案：E 需附加线性评分假定；否则 D。

若把有序水平编码为有实际意义的数值，且条件均值对这一分数确为直线，可用 1 个斜率，自由度 1。只有顺序而间距未知时，不应自动如此，可用分类因子 GLM 或预设有序对比。原题条件不足，不能无条件称某法“最优”。

解析 题 4.18　温度与催化剂的关系　　返回题目

答案：A。

按催化剂组画温度与结局的散点及拟合线，有助于检查组间斜率差异和非线性。

解析 题 4.19　基线不均衡还能否分析　　返回题目

答案：D。

非随机和基线不均衡增加混杂风险，但不使研究完全无效。在协变量测量充分、模型形式合适、组间有可比范围等条件下可估计调整关联；不能保证一个 GLM 就消除了全部混杂。

解析 题 4.20　药效依赖基线水平　　返回题目

答案：C。

交互项表示分组效应随基线改变：$\Delta(X) = \beta_G + \beta_{GX}X$。应报告有意义基线水平下的效应与置信区间，不能从交互存在就判定整体有效。

解析 题 4.21　共同斜率模型的下一步　　返回题目

答案：B。

无交互后可进一步考察协变量及调整后的组差；是否有效仍需估计、区间和专业解释，不由“无交互”直接决定。

解析　题 4.22　重叠趋势与基线混杂　　返回题目

答案：C 是图示原意，但不能证明等效。

图示中两组整体沿相似趋势，未经调整的均数差可能主要来自基线体重。C 应理解为没有充分的独立药效证据，而不是从一幅图证明药物无效；基线范围缺乏重叠使任何调整依赖外推。

解析　题 4.23　基线均衡后的分析选择　　返回题目

答案：D 最直接；B 的因果表述也过强。

基线均衡不意味着必须用该变量作协变量；t 检验、方差分析或调整模型各有合适情境。两组均接受训练而无不训练对照，仅作自身前后比较也不能严格确证训练的因果效果。

解析　题 4.24　月份均数的事后比较　　返回题目

答案：D。

附文献统计方法明确写 post hoc，指总体组间比较后作多重比较；不能把每对月份未校正的 t 检验当成等价操作。

解析　题 4.25　0.0613 对应什么人群　　返回题目

答案：待原文方程与编码核实。

概率是否对应基准人群、某年龄女性或均值协变量，取决于截距、变量中心化、哑变量和连接函数，不能只凭这个数值或研究名称推断。

解析　题 4.26　含交互模型的自由度　　返回题目

答案：D。

一个四分类因素需 3 个哑变量，加截距 1 个、数值斜率 1 个及 3 个交互斜率，共 8 个独立参数；满秩时误差自由度为 $n-8$。

解析　题 4.27　R 公式与层次原则　　返回题目

答案：E（按 R 公式的星号语法）。

在 R 公式中 `x1*x2*x3` 会展开主效应、全部二阶交互和三阶交互；重复项会去重。因此原稿所列三个公式均包含完整层次结构。若把星号仅理解为数学乘积，结论会不同；应使用 `:` 明确表示单独交互项，避免把两种语义混用。

解析　题 4.28　aov 的顺序平方和　　返回题目

答案：D（一般情形）；单一完整最高阶交互可有例外。

aov 常规输出使用顺序平方和。非平衡且有多个相关项时，主效应和交互项的顺序都可能影响检验；若只有一个交互且它排在所有低阶项之后，交换主效应顺序通常不改变该交互检验。III 错误：aov 本身不是球形检验函数。原稿对 I 的一概否定过于绝对。

解析 题 4.29　基线不均衡还能否分析

返回题目

答案：D。

非随机和基线不均衡增加混杂风险，但不使研究完全无效。在协变量测量充分、模型形式合适、组间有可比范围等条件下可估计调整关联；不能保证一个 GLM 就消除了全部混杂。

解析 题 4.30　药效依赖基线水平

返回题目

答案：C。

交互项表示分组效应随基线改变：$\Delta(X) = \beta_G + \beta_{GX}X$。应报告有意义基线水平下的效应与置信区间，不能从交互存在就判定整体有效。

解析 题 4.31　共同斜率模型的下一步

返回题目

答案：B。

无交互后可进一步考察协变量及调整后的组差；是否有效仍需估计、区间和专业解释，不由“无交互”直接决定。

解析 题 4.32　重叠趋势与基线混杂

返回题目

答案：C 是图示原意，但不能证明等效。

图示中两组整体沿相似趋势，未经调整的均数差可能主要来自基线体重。C 应理解为没有充分的独立药效证据，而不是从一幅图证明药物无效；基线范围缺乏重叠使任何调整依赖外推。

解析 题 4.33　设计阶段的混杂控制

返回题目

答案：C。

在设计阶段未保证可比性和充分测量混杂因素，事后模型可能无法回答原本关心的因果问题。基线均衡不保证所有混杂消失，无统计学差异也不能直接证明无效。

补写说明。 原稿只完整记录 III；I、II 根据主题补写，以形成可作答的题目。

解析 题 4.34　一般线性模型的组成

返回题目

答案：A。

GLM 在这里指一般线性模型，用线性预测子描述条件均值，可同时纳入分类因素和数值协变量。

补写说明。 原第 8 题只记录“GLM”，本题按该主题补写。

解析 题 4.35　交互模型的层次性

返回题目

答案：B。

层次原则保留构成交互的低阶项，使参数解释和重新编码更一致；不单靠主效应 P 值删除它们。

补写说明。 原第 11 题整题未记录，本题新编。

解析 题 4.36　三分类因素的设计矩阵

返回题目

答案：C。

1 个截距与 2 个哑变量，共 3 个类别均值的自由参数。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.37　交互项的条件效应

返回题目

答案：A。

交互使组差随 X 变化，应在有数据支持的 X 范围内解释。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.38　中心化协变量

返回题目

答案：A。

中心化是在同一模型空间中重参数化，可让某些主效应对应更有意义的参照值。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.39　非平衡设计中的顺序平方和

返回题目

答案：A。

应事先说明研究假设与平方和类型；不能把不同软件默认值当作同一检验。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.40　改变参照类别

返回题目

答案：A。

单个参数的比较对象发生变化，整体拟合模型并未改变。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.41　肿瘤类型的编码

返回题目

答案：A。

以一个类型为参照，2 个哑变量允许任意三个类别均值；用 1、2、3 施加了不适合无序类别的线性间距约束。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 4.42　一句话评价肺癌研究

返回题目

答案：参考作答。

在所调查的非吸烟女性中，较低 BMI 与肺癌患病优势较高相关，但该病例对照设计不能单凭此结果确立因果关系。原稿“配对就必须用条件 Logistic”的批注不准确：频数匹配可用非条件 Logistic 并适当调整匹配因素，不能与个体配对混同。

解析 题 4.43　一般线性模型的层次规则

返回题目

保留高阶交互时，通常同时保留构成它的所有低阶交互和主效应。例如含 $A:B:C$ 时，保留 A、B、C、A:B、A:C、B:C。筛选应从高阶项开始，并结合研究设计与专业意义；即使某个低阶项的单独 P 值较大，也不直接删去。含交互时，应解释条件效应及有意义水平下的比较。

解析 题 4.44　从一般线性模型看常用分析

返回题目

模型形式	对应分析
$Y \sim 1$	均值估计与单样本 t
$Y \sim G$，G 两类	独立两样本 t 的等方差形式
$Y \sim G$，G 多类	单因素方差分析
$Y \sim X$	一元线性回归
$Y \sim X_1 + \cdots + X_p$	多重线性回归
$Y \sim X + G$	共同斜率协方差分析
$Y \sim X * G$	不同组斜率/交互模型
$Y \sim A * B$	析因方差分析

配对 t 可以对个体差值作单样本 t；重复测量应引入个体层次或相关误差结构，不能仅把所有观测拼入一个独立误差 GLM。以上形式相通不代表它们无需各自的前提条件。

解析 题 4.45　儿童测验：组别、年龄与交互

返回题目

先核对对照组编码并设为参照，拟合完整 $Y \sim age*group$，检验年龄 × 组别交互；有交互则保留全部低阶项并解释不同年龄下的组差，无交互证据时比较共同斜率模型，再评估年龄和组别。

令对照的两哑变量均为 0，完整模型为

$$E(Y \mid a, G) = \beta_0 + \beta_a a + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \gamma_2 a D_2 + \gamma_3 a D_3.$$

无交互模型令两项 γ 为 0。方差分析应说明采用嵌套模型 F 检验或适当的 II/III 型平方和；交互存在时，主效应是指定参照年龄/组别下的条件效应。

可运行的同型演示。 附件 BMR 数据把第 1 组暂作参照：交互 F 约 0.161，P=.854，无明显交互；其具体最终共同斜率系数和方差分析见随包“BMR 演示”输出。这些数值不代替缺失的儿童原卷答案。实际儿童解释必须结合评分方向、年龄范围、暴露定义及置信区间，不能直接推断有害暴露的因果效应。

解析 题 4.46　儿童测验：组别、年龄与交互　　返回题目

先核对对照组编码并设为参照，拟合完整 $Y \sim age*group$，检验年龄 × 组别交互；有交互则保留全部低阶项并解释不同年龄下的组差，无交互证据时比较共同斜率模型，再评估年龄和组别。

令对照的两哑变量均为 0，完整模型为

$$E(Y \mid a, G) = \beta_0 + \beta_a a + \beta_2 D_2 + \beta_3 D_3 + \gamma_2 a D_2 + \gamma_3 a D_3.$$

无交互模型令两项 γ 为 0。方差分析应说明采用嵌套模型 F 检验或适当的 II/III 型平方和；交互存在时，主效应是指定参照年龄/组别下的条件效应。

可运行的同型演示。附件 BMR 数据把第 1 组暂作参照：交互 F 约 0.161，P=.854，无明显交互；其具体最终共同斜率系数和方差分析见随包 “BMR 演示” 输出。这些数值不代替缺失的儿童原卷答案。实际儿童解释必须结合评分方向、年龄范围、暴露定义及置信区间，不能直接推断有害暴露的因果效应。

补充练习解析

以下为补充练习的解析。这些题目为配合正文新编，并非往年试题；题中设定的数值仅供练习。

解析 题 4.47　小鼠饮食试验的参照编码

返回题目

答案：D。

$b_0 = 5.436$ 是 NR 组均数，$b_H = 2.781 - 5.436 = -2.655$，$b_P = 3.956 - 5.436 = -1.480$。检验三组总体均数相等对应联合假设 $b_H = b_P = 0$，分子自由度 2、分母自由度 $30 - 3 = 27$。参照组的截距不是三组合并均数。

解析 题 4.48　随机区组设计的误差自由度

返回题目

答案：B。

处理自由度 $3-1=2$，区组自由度 $8-1=7$，误差自由度 $(3-1)(8-1)=14$。加性模型共有 $1+2+7=10$ 个参数，故剩余自由度也为 $24-10=14$。若再放入完整交互，将用尽剩余自由度，没有独立误差估计可供交互检验。这里是不同兔承担不同处理，不能当作同一只兔接受三次处理。

解析 题 4.49　顺序平方和的数值辨析

返回题目

答案：A。

先放 X 时，X 的顺序平方和为 $100 - 70 = 30$，G 在 X 之后的增量为 $70 - 60 = 10$。先放 G 时，G 为 $100 - 85 = 15$，X 在 G 之后为 $85 - 60 = 25$。两种顺序均总计 40，最终模型和残差平方和不变，但对重叠解释变异的分配不同。

本题体现正文所说的顺序依赖；比较调整效应时必须说明具体假设，不能仅凭更换顺序选择较小 P 值。

解析 题 4.50　胆固醇协方差分析的结果解释

返回题目

没有证据表明两组斜率不同，可采用含年龄与组别的共同斜率模型。修正均数是在相同年龄 50.23 岁处计算的预测均数，比较的是排除模型中年龄差异后的组差；超重组较正常组高约 0.8955，按 0.05 水平有统计学意义。

交互不显著只支持考虑平行线模型，不能推出两线重合。本题组差仍显著，不能据此删除组别并合成一条线。这里解释的是调整后的统计关联，不能把观察性组差直接称为超重的因果效应。

解析 题 4.51　两药析因试验的交互填空

返回题目

（1）回归方程。 四个组均数依次为 0.8、1.2、1.0、2.1，故

$$\hat{Y} = 0.8 + 0.4A + 0.2B + 0.7AB.$$

（2）方差分析。 这里采用平衡析因设计的正交主效应及交互平方和，与正文的完整两因素方差分析表一致。

来源	SS	df	MS	F
A	1.6875	1	1.6875	168.75
B	0.9075	1	0.9075	90.75
A×B	0.3675	1	0.3675	36.75
误差	0.0800	8	0.0100	—
总	3.0425	11	—	—

（3）解释交互。 $F_{AB} = 36.75 > 5.318$，交互有统计学意义（$P \approx 0.000302$）。不用乙药时，甲药效应估计为 $1.2 - 0.8 = 0.4$；用乙药时为 $2.1 - 1.0 = 1.1$，差中之差为 $1.1 - 0.4 = 0.7$。甲药的效应随乙药水平而变，因此须作条件解释，保留交互及两个低阶主效应。

（4）参数化区别。 总均数为 1.275；甲药用/不用的边际均数为 1.65/0.90，乙药用/不用为 1.55/1.00。由

$$\widehat{(\alpha\beta)}_{ij} = \bar{Y}_{ij} - \bar{Y}_{i\cdot} - \bar{Y}_{\cdot j} + \bar{Y}_{\cdot\cdot}$$

得到“均不用、仅甲、仅乙、均用”四格依次为 $0.175, -0.175, -0.175, 0.175$。这是和为零约束下的格子效应，不等于 0/1 参照编码下的交互系数 0.7。两种表示给出同样的四个拟合均数。

上述主效应 F 检验针对跨另一因素水平平均的主效应；不应与含交互 0/1 回归中参照条件下单个主效应系数的 t 检验混为一谈。

本次补充习题解析

解析　题 4.52　非等样本量下的和为零约束

返回题目

答案：C。 模型为每组拟合一个均数，故

$$\hat{\mu} = \frac{6 + 9 + 12}{3} = 9, \qquad (\hat{\alpha}_A, \hat{\alpha}_B, \hat{\alpha}_C) = (-3, 0, 3).$$

观测值的合并均数为 $(5\times 6 + 10\times 9 + 15\times 12)/30 = 10$。本题约束是 $\sum_i \alpha_i = 0$，而非 $\sum_i n_i \alpha_i = 0$；非等样本量时两种平均不能混同。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]。

解析　题 4.53　Tukey 比较中的未检出差异

返回题目

答案：E。 C–A 的同时置信区间不含 0，校正 $P = 0.0180$；另外两对区间均含 0。未拒绝均数相等的原假设，不等于证明均数相等，也不具有“传递性”。总体 F 检验只说明三组总体均数不全相同。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[17]。

解析　题 4.54　完整区组内如何随机化

返回题目

答案：B。每个实验日均包含全部 4 种处理，在日内随机分配处理，才能在相同区组条件下比较浓度效应。A 未保证完整区组；C 使用结局决定处理；D 没有日内随机化；E 改变了实验单位并产生同一单位的重复观察。可加模型可写为 $Y_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij}$，其中 i 为浓度，j 为实验日。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[14]、[16]。

解析　题 4.55　区组模型的含义与正交性

返回题目

答案：D（I、III）。可加模型没有处理 × 区组项，因而施加区组间处理差相同的假定。5 个区组按分类因素需要 4 个独立对比；直接放入编号只有一个斜率，额外假定区组效应随编号等距线性变化，不能表示任意区组差异。完整平衡区组设计中，去除截距后的处理与区组设计空间正交，因此两者的平方和不随进入顺序改变。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[16]。

解析　题 4.56　一个简单效应显著而另一个不显著

返回题目

答案：A。两个简单效应的估计分别为 2 和 1，按“$B=1$ 减 $B=0$”定义的交互对比为 $1-2=-1$。四组独立，故

$$SE(\widehat{\Delta}_{AB})=\sqrt{4\times 4/10}=1.2649,\quad t=-1/1.2649=-0.7906,\quad F=t^2=0.625.$$

交互检验 $P=0.434$，本资料未检出两个简单效应的差异；这也不证明其总体差异严格为 0。“一显著、一不显著”与“二者显著不同”是不同问题。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[20]。

解析　题 4.57　修正均数差的标准误

返回题目

答案：C。共同斜率模型下，两组修正均数差的标准误为

$$SE=\sqrt{MSE\left\{\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2}+\frac{(\bar{X}_2-\bar{X}_1)^2}{\sum_i l_{xx,i}}\right\}}=\sqrt{4\left(\frac{1}{8}+\frac{1}{8}+\frac{16}{80}\right)}=\sqrt{1.8}=1.3416.$$

组间协变量均数不同，使共同斜率估计的不确定性进入组差的方差；只算 $\sqrt{4(1/8+1/8)}=1$ 漏掉了这一项。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]。

解析　题 4.58　方差分析究竟要求什么正态

返回题目

参考作答。对模型 $Y_{ij}=\mu_i+\varepsilon_{ij}$，经典小样本 F 推断要求误差独立、均值为 0、方差相同且服从正态分布。正态性针对给定组别后的误差，不能由合并三组 Y 的多峰形状直接否定；各组均数不同可以使合并分布呈多峰。组别是分类解释变量，无须服从正态分布。

应查看残差 QQ 图、各组残差散布及残差对拟合值图，检查明显偏态、异常点和异方差；结合实验单位、随机化安排与测定顺序检查独立性。残差图用于诊断误差假设，不能仅凭一张图证明所有假设成立。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[18]。

解析 题 4.59　实验日区组与预设处理比较

返回题目

（1）模型与变异分解。 令 i 为处理、j 为实验日，

$$Y_{ij}=\mu+\alpha_i+\beta_j+\varepsilon_{ij},\quad \sum_i\alpha_i=\sum_j\beta_j=0,\quad H_0:\alpha_A=\alpha_B=\alpha_C=0.$$

处理均数为 14、16、18；区组均数为 10、14、18、22；总均数为 16。

来源	SS	自由度	MS	F
处理	32	2	16	16
区组	240	3	80	—
误差	6	6	1	—
总变异	278	11	—	—

例如 $SS_{\text{处理}}=4[(14-16)^2+(16-16)^2+(18-16)^2]=32$，$SS_{\text{区组}}=3[(10-16)^2+(14-16)^2+(18-16)^2+(22-16)^2]=240$，误差按 $Y_{ij}-\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y}_{\cdot j}+\bar{Y}$ 求得。

（2）整体检验。 $F=16>5.143$，拒绝 H_0（$P=0.00394$），认为三种处理的总体均数不全相同。

（3）预设对比。 $\hat{\mu}_C-\hat{\mu}_A=18-14=4$ mg/L；$SE=\sqrt{2MSE/4}=\sqrt{0.5}=0.7071$。95% 置信区间为

$$4\pm2.447\times0.7071=(2.270,5.730)\ \text{mg/L}.$$

这是唯一预设对比的区间，没有将三对事后比较都按未校正区间报告。

（4）忽略区组。 原区组平方和并入误差，$SSE=240+6=246$，误差自由度 $12-3=9$，$MSE=246/9=27.333$。本例实验日差异较大；分离其变异后误差均方从 27.333 降为 1。分析方法应与日内随机化设计相符。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[16]。

解析 题 4.60　小样本协方差分析的完整核算

返回题目

（1）斜率检验。 $H_0:\beta_{XG}=0$。完整模型的 $MSE_3=8/8=1$，故

$$F=\frac{(8.35-8.00)/1}{8.00/8}=0.350,\qquad P=0.570>0.05.$$

本题未发现两组斜率不同的证据，可在专业假定支持下采用共同斜率近似；小样本不显著不等于证明斜率相等。

（2）共同斜率方程。 两组 $\bar{X}$ 为 8.5、10.5，$\bar{Y}$ 为 19.5、22.5。组内汇总量为 $\sum_i l_{xx,i}=35$、$\sum_i l_{xy,i}=17.5$，因而

$$\hat{\beta}_X=17.5/35=0.5,\quad \hat{\beta}_G=(22.5-19.5)-0.5(10.5-8.5)=2,$$

$$\widehat{Y}=15.25+0.5X+2G=20+0.5(X-9.5)+2G.$$

（3）修正均数与区间。在 $X_0 = 9.5$ 处，两组修正均数分别为 20 和 22，差值为 2 分。此时报告的是 M_2 下的组差，应使用 $MSE_2 = 8.35/9 = 0.92778$，而非完整模型的 MSE_3。

$$SE = \sqrt{\frac{8.35}{9}\left(\frac{1}{6} + \frac{1}{6} + \frac{(10.5-8.5)^2}{35}\right)} = 0.64443.$$

95% 置信区间为 $2 \pm 2.262 \times 0.64443 = (0.542, 3.458)$ 分。共同评分 9.5 位于两组观察范围内；在所采用模型下，强化组调整后的均数较高（$t = 3.104, \nu = 9, P = 0.01265$）。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[19]。

解析 题 4.61　平均主效应为零能否判定方案无效

返回题目

（1）简单效应。$B = 0$ 时，强化对常规的差为 $16 - 10 = 6$ 分；$B = 1$ 时为 $12 - 18 = -6$ 分。交互对比为 $-6 - 6 = -12$ 分。两个简单效应平均为 0，正是 A 的平均主效应为 0 的原因。

（2）评价与修正。

1) A 的平均主效应为 0 不能推出各 B 水平下均无效；本例两个条件效应方向相反，平均后相互抵消。
2) 保留 AB 交互时应按层级原则保留 A、B 及截距，不能只保留乘积项。以 0/1 参照编码，拟合方程为 $\widehat{Y} = 10 + 6A + 8B - 12AB$。其中 A 系数 6 是 $B = 0$ 时的简单效应，不等于跨 B 平均的主效应 0。
3) 不能因方案名称“强化”便统一推荐。按本题评分方向，$B = 0$ 时强化组均数更高，$B = 1$ 时却更低，应按 B 水平分别报告估计及不确定性，不能用一个平均 A 效应概括。

可报告：“训练方案与辅助方案在改善评分上存在交互；不用辅助方案时，强化对常规的均数差估计为 6 分；使用辅助方案时为 -6 分。该差异随辅助方案而改变，需分别解释。”

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[14]、[15]、[20]。

第 5 章

重复测量资料的方差分析

前几章的方法均假定各观测相互独立。重复测量资料不满足这一条件：同一个体的多次测量值彼此高度相关，例如体重较大者各次测量值均较大。本章讨论此类相关资料的分析方法。

重复测量资料的分析单位是个体而非测量值。10 人各测 5 次，独立的信息来源为 10 个，而非 50 个。另一方面，重复测量使每个个体可作为自身对照，个体间的差异可从时间效应的比较中扣除，因而其检验效能通常高于各时点分别抽取不同个体的设计。方差分析表区分个体间与个体内两部分，以及需要考察球形性，均源于以上两点。

5.1 重复测量资料

重复测量资料（repeated measured data）是同一受试对象的同一观察指标在不同时间点上进行多次测量所得的数据。这类数据常用于分析观察指标随时间变化的趋势。

- 患者用药物减肥，记录服药前和服药后 1–4 周的体重，分析效果。
- 将患者随机分为 3 组，采用不同麻醉诱导方法，在手术前 T_0 及诱导后多个时间点 T_1–T_4 测量收缩压，分析麻醉方法的差异及时间效应。

> **批注** 边际均数图展示各组随时间的变化趋势。

重复测量资料除时间上的重复外，还包括空间或条件上的重复。

空间重复　对同一研究对象的不同部位或不同空间位置进行测量，如同一肿瘤患者的不同肿块、同一患者两只眼睛。

条件重复　在视觉研究中，让同一受试者戴上不同效率的镜片，观察大脑皮质的电反应延迟。

5.1.1 资料类型的辨别

问　不同留置时间对静脉炎发生率的影响研究，是重复测量资料吗?

研究目标　比较不同留置时间对静脉炎发生率的影响。

区组因素　不同科室，如内科、外科、儿科。

处理因素　不同留置时间，如 72 小时、96 小时、120 小时。

实验设计　将不同科室患者设为区组，条件如年龄、病情相近；在每个科室内，将患者随机分配到不同留置时间组。

结果分析　比较不同留置时间的静脉炎发生率，同时控制科室的影响。

> **批注** 不属于重复测量资料，属于随机区组资料。

答　判断资料类型要分两步。(1) 看实验单位与相关结构：每位患者只分到一个留置时间组、结局只观察一次，不同患者之间相互独立，没有“同一个体的多次测量”，故不是重复测量资料；科室是区组因素。(2) 看结局类型：结局是“是否发生静脉炎”的二分类变量，比较的是发生率，不能直接套用以正态连续变量为前提的方差分析，应采用按科室分层的 χ^2 检验（Cochran–Mantel–Haenszel 检验），或以留置时间、科室为自变量的 logistic 回归。

5.1.2　经常误用的统计分析方法

1) 将重复测量时间点作为独立组处理：忽略同一受试者不同时间点数据的相关性，违反独立性假设。
2) 多次进行两两比较的 t 检验：对每个时间点进行多次两两比较，会增加 I 类错误的概率。
3) 作一般线性模型分析，如使用随机区组方差分析处理数据；该法只有在满足广义球形假设时可采用。

将重复测量资料按独立资料分析的后果

以下一节的减肥资料（10 人 ×5 次）为例。错误的做法是将 5 个时点视为 5 个独立的组作单因素方差分析；正确的做法是将个体作为一层误差：

```
# 矩阵d（10人 x 5次）的录入见下一节
da <- data.frame(id=factor(rep(1:10,5)), t=factor(rep(1:5,each=10)), y=c(d)
   )
anova(lm(y~t,data=da))                    # 错误：当作5个独立组
summary(aov(y~t+Error(id/t),data=da))     # 正确：重复测量
```

```
          Df  Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
t          4   403.8  100.96  0.3816 0.8206
Residuals 45 11906.5  264.59

Error: id
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
Residuals  9  11871    1319

Error: id:t
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
t          4  403.8     101   101.4 <2e-16 ***
Residuals 36   35.8       1
```

两种分析的时间平方和均为 403.8。错误分析得 $P = 0.82$，结论为服药前后体重无差异；正确分析得 $F = 101.4$，$P < 10^{-16}$。差别在于误差项：患者之间体重相差数十公斤（个体间平方和 11871），错误分析将这部分全部计入误差；正确分析中每个个体与自身比较，个体间差异被单独分离，个体内误差仅为 35.8。

本例中错误分析导致遗漏了真实效应。另一类错误的方向相反：组间比较时将每人的多次测量视为独立样本，相当于虚增样本量，标准误偏小，易得出假阳性结论。两类错误的根源相同，即未按数据的相关结构进行分析。

> **批注** $t_0 - t_1, t_0 - t_2, \ldots$ 这样比较是错的。

更准确地说，与基线逐次比较本身可以是合理的研究问题，问题在于做法：(1) 应保留同一个体的配对关系，用配对差值（或在重复测量模型中设定对比）比较，而不是把各时点当作独立的两组作两样本 t 检验；(2) 应预先规定比较范围（如 $k-1$ 个时点分别与基线比较），并对这一组比较控制多重性（如 Bonferroni、Holm 法或 Dunnett 型校正），而不是事后不加控制地作大量两两比较。

5.1.3 常用分析方法

基本模型。第 5 章记号：k 为测量次数（时点数），单组时 n 为人数；多组时 a 为组数，n 为每组人数，$N = an$ 为总人数。第 i 个个体的 k 次测量组成向量 $Y_i = (Y_{i1}, \ldots, Y_{ik})^\top$，

$$Y_i \sim N_k(\mu_{g(i)}, \Sigma), \qquad Y_1, \ldots, Y_N \text{ 相互独立,}$$

$\mu_{g(i)}$ 为该个体所在组各时点的总体均数向量，Σ 为 $k \times k$ 的个体内协方差阵（各组共同）。即：不同个体之间独立，同一个体的各次测量相关，相关结构由 Σ 描述。普通方差分析把 kN 个观测都当作独立，忽略了 Σ 的非对角元。

1) 重复测量方差分析（repeated measures ANOVA）：数据满足正态性、方差齐性及球形假设。
2) 混合效应模型（Linear Mixed Model，LMM）：可处理缺失数据、非平衡设计及复杂相关结构，如自相关、随机效应。
3) 广义估计方程（Generalized Estimating Equations，GEE）：因变量可为非正态分布，如二分类、计数数据。
4) 非参数方法，如 Friedman 检验，或综合指标法：将多个时间点的数据汇总为均数等指标，再采用 t 检验或方差分析。需确保综合指标具有临床意义，可能损失时间趋势信息。

> **批注** 重点学习重复测量方差分析。混合效应模型常使用，作了解，时间关系不讲解。

5.2 单组重复测量资料

例 1：10 名患者在医生指导下服用药物减肥，按统一标准记录服药前和服药后 1–4 周的体重，试分析减肥效果。

表 14-9　服药前后各次体重测量值（kg）

患者编号	服药前	第 1 周	第 2 周	第 3 周	第 4 周
1	131.5	128.4	127.4	125.3	124.9
2	154.7	152.9	150.7	148.2	145.9
3	146.7	145.5	143.6	140.5	139.8
4	163.2	161.6	158.4	154.2	153.4
5	128.6	125.3	124.1	122.8	120.9
6	134.2	132.6	130.4	129.4	124.8
7	126.8	125.7	123.9	123.5	121.6
8	119.5	118.1	115.6	114.3	112.1
9	112.4	108.6	104.7	102.6	101.4
10	121.3	120.1	118.5	116.9	114.2
$\bar{X}$	133.9	131.9	129.7	127.8	125.9
S	16.2	16.6	16.6	15.9	16.1




图 14-2　10 名肥胖患者服药前后体重的变化趋势

5.2.1 分析步骤

1）推断 k 次测量值的理论协方差阵 Σ 是否满足重复测量方差分析所需的球形条件（第5.3节），即是否具有 Huynh-Feldt（HF）结构；独立等方差结构 $\sigma^2 I$、复合对称（Compound Symmetry，CS）结构都是它的特例。

2）作重复测量方差分析。满足球形条件时结果无需校正，否则需要校正自由度。

> **批注** 第一步：讨论 k 个指标之间的相关性。

```r
d <- matrix(c(131.5,128.4,127.4,125.3,124.9, 154.7,152.9,150.7,148.2,145.9,
              146.7,145.5,143.6,140.5,139.8, 163.2,161.6,158.4,154.2,153.4,
              128.6,125.3,124.1,122.8,120.9, 134.2,132.6,130.4,129.4,124.8,
              126.8,125.7,123.9,123.5,121.6, 119.5,118.1,115.6,114.3,112.1,
              112.4,108.6,104.7,102.6,101.4, 121.3,120.1,118.5,116.9,114.2),
            ncol=5,byrow=TRUE)     # 10人 x 5次（服药前、第1--4周）
```

5.3 协方差阵的特殊结构

5.3.1 球形结构

这里的“球形”指原协方差阵本身为 $\sigma^2 I$（以 $k=5$ 为例）：

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma^2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \sigma^2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \sigma^2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \sigma^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \sigma^2 \end{bmatrix} = \sigma^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

> **批注** 对角阵：只有对角线有值，方差相等且互不相关（正态时即相互独立）。

$\Sigma = \sigma^2 I$ 表示各次测量方差相等、互不相关。同一个体的各次测量通常正相关，重复测量资料几乎不可能满足它。须与重复测量方差分析所需的“球形性”区分：后者只要求对比变换后的协方差阵为球形（见第5.3.3节），$\sigma^2 I$ 只是满足该条件的最特殊情形。

5.3.2 复合对称结构

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 \end{bmatrix}$$

$$= (\sigma^2+\sigma_1^2) \begin{bmatrix} 1 & \rho & \rho & \rho & \rho \\ \rho & 1 & \rho & \rho & \rho \\ \rho & \rho & 1 & \rho & \rho \\ \rho & \rho & \rho & 1 & \rho \\ \rho & \rho & \rho & \rho & 1 \end{bmatrix}, \qquad \rho = \frac{\sigma_1^2}{\sigma^2+\sigma_1^2}.$$

> **批注** 横排为 5 次测量；任意两次测量之间都是相同的相关关系。

复合对称具有常数方差和常数协方差（以 $k=4$ 为例）：

$$\begin{bmatrix} \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 & \sigma_1^2 \\ \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma_1^2 & \sigma^2+\sigma_1^2 \end{bmatrix}.$$

它来自随机截距模型 $Y_{ij}=\mu_j+b_i+\varepsilon_{ij}$，$b_i\sim N(0,\sigma_1^2)$ 为个体效应，$\varepsilon_{ij}\sim N(0,\sigma^2)$，二者独立：同一个体共享 b_i，所以任意两次测量的协方差都是 σ_1^2。任意两次测量之差 $Y_{ij}-Y_{ij'}=\varepsilon_{ij}-\varepsilon_{ij'}$ 中 b_i 抵消，

$$\mathrm{Var}(Y_{ij}-Y_{ij'})=2(\sigma^2+\sigma_1^2)-2\sigma_1^2=2\sigma^2,$$

与 j,j' 无关，因而满足下面的球形条件（$\lambda=\sigma^2$）。

5.3.3 Huynh-Feldt 结构

$$\sigma_{ij}=\frac{\sigma_{ii}+\sigma_{jj}}{2}-\lambda \quad\Longleftrightarrow\quad \mathrm{Var}(Y_i-Y_j)=\sigma_{ii}+\sigma_{jj}-2\sigma_{ij}=2\lambda,\quad i,j=1,\dots,k,\quad i\neq j.$$

这是一个“圆形”矩阵，其中任意两个元素之间的协方差等于它们的方差平均值减去一个常数。方差和协方差都不是常数。

$$\begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_1^2+\sigma_3^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_1^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda \\ \frac{\sigma_1^2+\sigma_2^2}{2}-\lambda & \sigma_2^2 & \frac{\sigma_2^2+\sigma_3^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_2^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda \\ \frac{\sigma_1^2+\sigma_3^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_2^2+\sigma_3^2}{2}-\lambda & \sigma_3^2 & \frac{\sigma_3^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda \\ \frac{\sigma_1^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_2^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda & \frac{\sigma_3^2+\sigma_4^2}{2}-\lambda & \sigma_4^2 \end{bmatrix}.$$

HF 结构是 CS 结构的进一步放宽，允许方差、协方差都不相同，只要求任意两次测量之差的方差相等。它等价于重复测量方差分析所需的球形性（sphericity，又称环形性 circularity）：取 $k\times(k-1)$ 的标准正交对比矩阵 C，满足

$$C^{\top}C=I_{k-1},\qquad C^{\top}\mathbf{1}=0,$$

（如 `contr.poly(k)` 给出的正交多项式对比），球形条件为

$$C^{\top}\Sigma C=\lambda I_{k-1}.$$

球形条件与“差值方差相等”等价

条件　Σ 为 $k\times k$ 协方差阵，C 满足 $C^{\top}C=I_{k-1}$、$C^{\top}\mathbf{1}=0$。

结论　以下三者等价：(1) $C^\top \Sigma C = \lambda I_{k-1}$；(2) 对一切 $i \neq j$，$\mathrm{Var}(Y_i - Y_j) = 2\lambda$；(3) Σ 具有 HF 结构。并且条件 (1) 与 C 的具体选取无关。

推导　C 的各列与 $\mathbf{1}/\sqrt{k}$ 构成 $\mathbb{R}^k$ 的一组标准正交基，故 $CC^\top = I - \mathbf{1}\mathbf{1}^\top/k$，它把任一向量投影到“分量之和为 0”的对比空间。

(1)⇒(2)：$d = \ell_i - \ell_j$（第 i、j 个分量为 1、−1）是对比，$CC^\top d = d$。令 $c = C^\top d$，则

$$\mathrm{Var}(Y_i - Y_j) = d^\top \Sigma d = c^\top (C^\top \Sigma C) c = \lambda c^\top c = \lambda d^\top C C^\top d = \lambda d^\top d = 2\lambda.$$

(2)⇔(3)：$\mathrm{Var}(Y_i - Y_j) = \sigma_{ii} + \sigma_{jj} - 2\sigma_{ij}$，移项即 HF 结构。

(3)⇒(1)：记 $v_i = \sigma_{ii} - \lambda$，HF 结构可写成 $\Sigma = \lambda I + \frac{1}{2}(v\mathbf{1}^\top + \mathbf{1}v^\top)$（逐元核对：对角元 $\lambda + v_i = \sigma_{ii}$，非对角元 $(v_i + v_j)/2 = (\sigma_{ii} + \sigma_{jj})/2 - \lambda$）。由 $C^\top \mathbf{1} = 0$，

$$C^\top \Sigma C = \lambda C^\top C + \tfrac{1}{2}(C^\top v \mathbf{1}^\top C + C^\top \mathbf{1} v^\top C) = \lambda I_{k-1}.$$

若 $C_2 = C_1 Q$ 为另一组标准正交对比（Q 正交），则 $C_2^\top \Sigma C_2 = Q^\top (\lambda I) Q = \lambda I$，故与 C 的选取无关。

统计解释　$\sigma^2 I$（$\lambda = \sigma^2$）与 CS（$\lambda = \sigma^2$）都满足球形条件；反之满足球形条件的 Σ 不必是 CS。重复测量方差分析只用到个体内的对比（各时点与个体均数之差），所以只要求对比的协方差阵为球形，而对个体间的变异（个体均数的方差）没有要求。

三者从强到弱的关系：

$\sigma^2 I$（独立等方差）　⊂　复合对称结构（等方差、等协方差）　⊂　HF 结构（球形性）.

批注　k 为观察次数；λ 为常数。$k = 2$ 时只有一个对比，$C^\top \Sigma C$ 是 1×1 矩阵，球形条件自动成立。

球形条件的直观含义

球形条件最直观的表述是第 (2) 条：任意两次测量之差的方差相等。重复测量方差分析检验时间效应时，实际利用的是每个个体自身的前后差值；将所有差值的变异合并作为误差，要求各差值的变异程度相近。

减肥资料中各对时点差值的方差如下：

```
D <- outer(1:5,1:5,Vectorize(function(i,j) var(d[,i]-d[,j])))
round(D,2)
```

```
     [,1] [,2] [,3] [,4] [,5]
[1,] 0.00 0.99 1.98 3.96 3.01
[2,] 0.99 0.00 0.78 2.73 2.56
[3,] 1.98 0.78 0.00 1.22 1.17
[4,] 3.96 2.73 1.22 0.00 1.51
[5,] 3.01 2.56 1.17 1.51 0.00
```

> 相邻两周差值的方差约为 1，服药前与第 3 周之差的方差接近 4。这是纵向资料的常见特征：测量间隔越长，个体间变化速度的差异越明显，相关性越弱，差值越分散。这种协方差结构不满足球形条件，下文求得的 $\hat{\varepsilon}_{\mathrm{GG}} = 0.54$ 也反映了这一点；由于样本量小，Mauchly 检验未能拒绝球形假设。

5.4 球形与广义球形检验

5.4.1 球形检验

Mauchly 检验是似然比检验，由 Mauchly 于 1940 年提出，检验一个 $d \times d$ 协方差阵是否与单位阵成比例：

$$H_0 : \Psi = \lambda I_d, \qquad H_1 : \Psi \neq \lambda I_d.$$

用其样本估计 $\widehat{\Psi}$（自由度 ν）构造统计量

$$W = \frac{|\widehat{\Psi}|}{[\mathrm{tr}(\widehat{\Psi})/d]^d} = \Big(\frac{\text{特征值的几何均数}}{\text{特征值的算术均数}}\Big)^d, \qquad 0 < W \le 1,$$

各特征值全相等时 $W = 1$。H_0 下的一阶近似为

$$-\left[\nu - \frac{2d^2 + d + 2}{6d}\right] \ln W \dot{\sim} \chi^2_{d(d+1)/2-1}.$$

自由度 $d(d+1)/2 - 1$ 是“对称阵的自由参数个数 $d(d+1)/2$”减去 H_0 下的 1 个参数 λ。

被检验的矩阵有两种，须区分：

- 直接检验原协方差阵：$\Psi = \Sigma$，$d = k$，$H_0 : \Sigma = \sigma^2 I$。这是对“独立等方差”的检验，重复测量资料几乎总被拒绝，不是方差分析需要的条件。
- 检验对比协方差阵：$\Psi = C^{\top}\Sigma C$，$d = k - 1$，$H_0 : C^{\top}\Sigma C = \lambda I_{k-1}$，即第5.3.3节的球形条件。重复测量方差分析需要的是这一检验。

样本协方差阵的自由度：单组 $\nu = n - 1$；a 组合并时 $\nu = N - a$（见第5.6.3节）。

> **批注** H_0 为具有球形结构。若 H_0 成立，W 接近 1。将统计量换算成卡方值；$P < 0.05$，拒绝 H_0，不是球形结构。

$P \ge 0.05$ 只表示“未发现偏离球形的证据”，不等于证明了球形成立：样本量小时 Mauchly 检验的效能很低，样本量大时它又对非正态很敏感。因此实践中常不以 Mauchly 检验为前提，而直接报告 Greenhouse-Geisser 或 Huynh-Feldt 校正的结果。

5.4.2 单组体重资料的球形检验

试推断 10 名患者服药前和服药后 1–4 周体重的理论协方差阵是否有球形结构。

Covariance matrix

	y_0	y_1	y_2	y_3	y_4
y_0	263.1	268.6	268.2	255.3	259.1
y_1	268.6	275.0	274.8	261.9	265.3
y_2	268.2	274.8	275.3	262.8	266.1
y_3	255.3	261.9	262.8	251.4	254.0
y_4	259.1	265.3	266.1	254.0	258.1

```r
fit <- lm(d~1)
mauchly.test(fit)          # 默认：检验Sigma本身是否为sigma^2*I (d=5)
mauchly.test(fit,X=~1)     # 检验与常数正交的对比：C'SigmaC=lambda*I (d=4)
```

Mauchly's test of sphericity，`SSD matrix from lm(formula=d~1)`：

默认：$W = 3.3961 \times 10^{-11}$，　$P < 2.2 \times 10^{-16}$；　　`X=~1`：$W = 0.1305$，　$P = 0.09544$.

默认调用检验的是 $\Sigma = \sigma^2 I$。本例各次体重的相关系数都在 0.99 以上，强烈拒绝是意料之中的，并不说明不能作重复测量方差分析。重复测量需要的是 `X=~1` 所作的检验，其 W 与下文由 $C^{\top}SC$ 手算的结果相同。

5.4.3 广义球形检验

检验步骤：

1) 寻找标准正交对比矩阵 C（$C^{\top}C = I$，$C^{\top}\mathbf{1} = 0$）。
2) 计算 $(k-1)\times(k-1)$ 的 $A = C^{\top}SC$，它估计 $C^{\top}\Sigma C$。
3) 对 A 作 Mauchly 检验，$d = k - 1$。

如果不拒绝 $C^{\top}\Sigma C$ 为球形，就按 Σ 具有 Huynh-Feldt 结构处理。

> **批注** C 为 $k\times(k-1)$，$C^{\top}$ 为 $(k-1)\times k$。$P > 0.05$，不拒绝原假设，可认为是 HF 结构。严格地说，这只是未发现违背 HF 结构的证据。

5.4.4 Greenhouse-Geisser 校正系数

若认为 k 次测量的总体协方差阵不具有 HF 型结构，需计算 Greenhouse-Geisser 校正系数。校正不改变观测到的 F 值，而是把参考 F 分布的两个自由度同乘 ε，再据此确定 P 值。系数由对比协方差阵 $A = C^{\top}SC$ 计算：

$$\hat{\varepsilon}_{\mathrm{GG}} = \frac{[\operatorname{tr}(A)]^2}{(k-1)\operatorname{tr}(A^2)} = \frac{\left(\sum_{i=1}^{k-1}\lambda_i\right)^2}{(k-1)\sum_{i=1}^{k-1}\lambda_i^2}.$$

λ_i 是 A 的 $k-1$ 个特征值，k 为重复测量的水平数，S 为样本协方差矩阵。

$$df_1^{\text{校正}} = \varepsilon\, df_1, \qquad df_2^{\text{校正}} = \varepsilon\, df_2, \qquad df_1 = k-1, \quad df_2 = (k-1)(n-1).$$

> **批注** 对 $C^{\mathsf{T}}SC$ 矩阵计算。

$\hat{\varepsilon}_{\text{GG}}$ 的取值范围

条件　$A = C^{\mathsf{T}}SC$ 为 $(k-1)\times(k-1)$ 半正定矩阵，特征值 $\lambda_1, \dots, \lambda_{k-1} \geq 0$，不全为 0。

结论　$\dfrac{1}{k-1} \leq \hat{\varepsilon}_{\text{GG}} \leq 1$；上限当且仅当全部 λ_i 相等（样本对比协方差阵为球形）时取到，下限当且仅当只有一个 λ_i 非零时取到。

推导　$\operatorname{tr}(A) = \sum \lambda_i$，$\operatorname{tr}(A^2) = \sum \lambda_i^2$。由 Cauchy–Schwarz 不等式，$\left(\sum_{i=1}^{k-1} 1 \cdot \lambda_i\right)^2 \leq (k-1)\sum \lambda_i^2$，故 $\hat{\varepsilon} \leq 1$，等号当且仅当 λ_i 全相等。又 $\lambda_i \geq 0$，$\left(\sum \lambda_i\right)^2 = \sum \lambda_i^2 + 2\sum_{i<j} \lambda_i \lambda_j \geq \sum \lambda_i^2$，故 $\hat{\varepsilon} \geq 1/(k-1)$，等号当且仅当至多一个 λ_i 非零。

统计解释　$\varepsilon = 1$ 时无需校正；$\varepsilon = 1/(k-1)$ 称为下界（lower-bound）校正，此时分子自由度变为 1，是最保守的做法。$k = 2$ 时 ε 只能等于 1。

HF 结构与 HF 校正系数是两回事。HF 结构是对 Σ 的一种假设（即球形条件）；HF 校正系数 $\tilde{\varepsilon}_{\text{HF}}$ 是 Huynh 与 Feldt 为减小 $\hat{\varepsilon}_{\text{GG}}$ 在 ε 接近 1 时的低估而提出的另一估计，单组时

$$\tilde{\varepsilon}_{\text{HF}} = \frac{n(k-1)\hat{\varepsilon}_{\text{GG}} - 2}{(k-1)\left[n - 1 - (k-1)\hat{\varepsilon}_{\text{GG}}\right]},$$

a 组时把 n 换为 $N-a+1$、把 $n-1$ 换为 $N-a$；大于 1 时取 1。一般 $\hat{\varepsilon}_{\text{GG}} \leq \tilde{\varepsilon}_{\text{HF}}$，GG 校正偏保守，HF 校正偏宽松。

5.4.5 单组体重资料的 HF 检验

```
contrasts <- contr.poly(5)        # C: 5 x 4, C'C=I, C'1=0
fit <- lm(d~1)
res <- resid(fit)
S <- cov(res)                     # 单组时等于cov(d), 自由度n-1=9
A <- t(contrasts)%*%S%*%contrasts
```

正交对比矩阵：

$$C = \begin{bmatrix} -.6324555 & .5345225 & -.3162278 & .1195229 \\ -.3162278 & -.2672612 & .6324555 & -.4780914 \\ -3.510833\times10^{-17} & -.5345225 & 1.755417\times10^{-16} & .7171372 \\ .3162278 & -.2672612 & -.6324555 & -.4780914 \\ .6324555 & .5345225 & .3162278 & .1195229 \end{bmatrix}_{\texttt{(.L, .Q, .C, ^4)}}.$$

（10^{-16}、10^{-17} 量级的元素是浮点运算误差，实为 0。）残差协方差阵：

$$S = \begin{bmatrix} 263.0766 & 268.5609 & 268.2092 & 255.2719 & 259.0733 \\ 268.5609 & 275.0396 & 274.7929 & 261.8671 & 265.2811 \\ 268.2092 & 274.7929 & 275.3246 & 262.7621 & 266.1167 \\ 255.2719 & 261.8671 & 262.7621 & 251.4223 & 253.9989 \\ 259.0733 & 265.2811 & 266.1167 & 253.9989 & 258.0822 \end{bmatrix}.$$

$$A = C^{\top}SC = \begin{bmatrix} 2.28032222 & -.3351224 & -.5451444 & -.03643997 \\ -.33512244 & .8484206 & .1416948 & .18701692 \\ -.54514444 & .1416948 & .5895667 & .19788120 \\ -.03643997 & .1870169 & .1978812 & .26422381 \end{bmatrix}.$$

```
n <- 10; k <- 5
dd <- k-1                          # 被检验矩阵A的维数d
nu <- n-1                          # S的自由度
W <- det(A)/(sum(diag(A))/dd)^dd; W
chi <- -(nu-(2*dd^2+dd+2)/(6*dd))*log(W); chi
df <- dd*(dd+1)/2-1; df
1-pchisq(chi,df)                   # 一阶近似
gg <- sum(diag(A))^2/((k-1)*sum(diag(A%*%A))); gg
```

$$W = .1305064,\quad \chi^2 = 15.10281,\quad df = 9,\quad P = .08815052,\quad \hat{\varepsilon}_{\mathrm{GG}} = 0.5397.$$

$P = 0.08815$ 是上面一阶 χ^2 近似的结果；`mauchly.test(fit,X=~1)` 及 ez 包报告的 $P = 0.09544$ 在此基础上加了二阶修正项（$P = P_1 + \omega_2(P_2 - P_1)$，$P_2$ 为自由度加 4 的 χ^2 尾概率），二者同一来源，只是近似阶数不同。两者都大于 0.05，未发现违背球形条件的证据，但不能据此断言球形成立。A 的特征值为 2.527、0.839、0.495、0.122，相差较大，$\hat{\varepsilon}_{\mathrm{GG}} = 0.54$，离 1 较远，说明样本对比协方差阵与球形相差不小，只是 $n = 10$ 时检验效能有限。

5.5　单组重复测量方差分析

$$y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij},\quad i = 1,\dots,k\ (k = 5),\quad j = 1,\dots,n\ (n = 10).$$

$$\hat{\mu} = \bar{y}_{\cdot\cdot},\qquad \hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot\cdot},\qquad \hat{\beta}_j = \bar{y}_{\cdot j} - \bar{y}_{\cdot\cdot},\qquad e_{ij} = y_{ij} - \bar{y}_{i\cdot} - \bar{y}_{\cdot j} + \bar{y}_{\cdot\cdot}.$$

$\hat{\alpha}_i$ 为时间（受试者内因素）效应估计，$\hat{\beta}_j$ 为个体（受试者间）效应估计，e_{ij} 为残差。y_{ij} 表示第 j 人第 i 次测量值。

$$\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(Y_{ij}-\bar{Y})^2 = \underbrace{n\sum_{i=1}^{k}(\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y})^2}_{\text{时间 factor}} + \underbrace{k\sum_{j=1}^{n}(\bar{Y}_{\cdot j}-\bar{Y})^2}_{\text{个体间 error}} + \underbrace{\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=1}^{n}(Y_{ij}-\bar{Y}_{i\cdot}-\bar{Y}_{\cdot j}+\bar{Y})^2}_{\text{Error(factor)}}.$$

时间平方和的系数 n 是每个时点的人数，个体平方和的系数 k 是每人的测量次数。自由度：

$$nk-1=(k-1)+(n-1)+(n-1)(k-1).$$

$$F_{\text{时间}}=\frac{\text{MS}_{\text{时间}}}{\text{MS}_{\text{误差}}}=\frac{\text{SS}_{\text{时间}}/(k-1)}{\text{SS}_{\text{误差}}/[(n-1)(k-1)]}.$$

本例 $\text{SS}_{\text{时间}}=403.85$，$\text{SS}_{\text{个体}}=11870.66$，$\text{SS}_{\text{误差}}=35.84$，$F=(403.85/4)/(35.84/36)=101.40$，$\nu=(4,36)$。个体间平方和很大，但它不进入时间效应的检验：每个人都作自己的对照，个体间差异被扣除。

球形条件如何保证 F 分布

条件　个体间独立，$Y_j\sim N_k(\mu,\Sigma)$；C 为标准正交对比矩阵，$C^{\top}\Sigma C=\lambda I_{k-1}$。

结论　$H_0:\alpha_1=\cdots=\alpha_k=0$（即 $C^{\top}\mu=0$）下，$F_{\text{时间}}\sim F(k-1,(n-1)(k-1))$。

推导　对每个人作对比变换 $Z_j=C^{\top}Y_j\in\mathbb{R}^{k-1}$，则 Z_j 独立同分布于 $N(C^{\top}\mu,\lambda I_{k-1})$：$k-1$ 个分量相互独立、方差都为 λ。由 $CC^{\top}=I-\mathbf{1}\mathbf{1}^{\top}/k$（去掉个体均数），可以验证

$$\text{SS}_{\text{时间}}=n\,\bar{Z}^{\top}\bar{Z},\qquad \text{SS}_{\text{误差}}=\sum_{j=1}^{n}(Z_j-\bar{Z})^{\top}(Z_j-\bar{Z}).$$

对第 c 个分量，$\sum_j(Z_{jc}-\bar{Z}_c)^2/\lambda\sim\chi^2_{n-1}$，$k-1$ 个分量独立，相加得 $\text{SS}_{\text{误差}}/\lambda\sim\chi^2_{(n-1)(k-1)}$；$H_0$ 下 $n\bar{Z}_c^2/\lambda\sim\chi^2_1$，相加得 $\text{SS}_{\text{时间}}/\lambda\sim\chi^2_{k-1}$；正态样本的均数与离差平方和独立，故二者独立。按 F 分布的定义即得结论，λ 在比值中约去。

统计解释　若不满足球形条件，各分量方差不等或相关，$\text{SS}_{\text{误差}}/\lambda$ 不再是 χ^2，而是加权 χ^2 之和，常规 F 检验的 I 类错误偏大。GG、HF 校正用 ε 缩小自由度，以 $F(\varepsilon(k-1),\varepsilon(n-1)(k-1))$ 近似其分布。

两次测量时 F 等于配对 t 的平方

条件　$k=2$，配对差值 $D_j=Y_{1j}-Y_{2j}$，$\bar{D}$、s_D 为其均数与标准差。

结论　$F_{\text{时间}}=t^2$，$t=\bar{D}/(s_D/\sqrt{n})$ 为配对 t 统计量，且无需球形校正。

推导　$k=2$ 时 $C=(1,-1)^{\top}/\sqrt{2}$，$Z_j=D_j/\sqrt{2}$。代入上式，$\mathrm{SS}_{\text{时间}}=n\bar{D}^2/2$，$\mathrm{SS}_{\text{误差}}=\sum_j(D_j-\bar{D})^2/2=(n-1)s_D^2/2$，自由度为 1 与 $n-1$，

$$F=\frac{n\bar{D}^2/2}{(n-1)s_D^2/[2(n-1)]}=\frac{n\bar{D}^2}{s_D^2}=t^2.$$

$C^{\top}\Sigma C$ 为 1×1 矩阵，球形条件自动成立。

统计解释　例：只取服药前与第 1 周两次体重，配对 t^2 与重复测量方差分析的 F 同为 40.63。

5.5.1 R 分析

批注 用 ez 包作方差分析，需转换为长数据格式。

```r
id <- rep(1:10,5)
t <- rep(1:5,c(10,10,10,10,10))
y <- c(d)
da <- data.frame(id,t,y)
da$id <- as.factor(da$id)
da$t <- as.factor(da$t)
library(ez)
result <- ezANOVA(data=da,dv=y,wid=id,within=t)
print(result)
```

长数据格式

id	t	y	id	t	y	id	t	y	id	t	y	id	t	y
1	1	131.5	1	2	128.4	1	3	127.4	1	4	125.3	1	5	124.9
2	1	154.7	2	2	152.9	2	3	150.7	2	4	148.2	2	5	145.9
3	1	146.7	3	2	145.5	3	3	143.6	3	4	140.5	3	5	139.8
4	1	163.2	4	2	161.6	4	3	158.4	4	4	154.2	4	5	153.4
5	1	128.6	5	2	125.3	5	3	124.1	5	4	122.8	5	5	120.9
6	1	134.2	6	2	132.6	6	3	130.4	6	4	129.4	6	5	124.8
7	1	126.8	7	2	125.7	7	3	123.9	7	4	123.5	7	5	121.6
8	1	119.5	8	2	118.1	8	3	115.6	8	4	114.3	8	5	112.1
9	1	112.4	9	2	108.6	9	3	104.7	9	4	102.6	9	5	101.4
10	1	121.3	10	2	120.1	10	3	118.5	10	4	116.9	10	5	114.2

ANOVA

Effect	DFn	DFd	F	P	ges	$P<.05$
t	4	36	101.4041	4.430774×10^{-19}	.03280533	*

Mauchly's Test for Sphericity

Effect	W	P	$P < .05$
t	.1305064	.09543534	

Sphericity Corrections

Effect	GGe	P[GG]	P[GG] $< .05$	HFe	P[HF]	P[HF] $< .05$
t	.5396849	3.303128×10^{-11}	*	.7157817	3.159455×10^{-14}	*

GG 校正时 $F = 101.40$ 不变，参考分布的自由度改为 $4 \times 0.5397 = 2.16$ 与 $36 \times 0.5397 = 19.43$，$P = 3.3 \times 10^{-11}$；HF 校正（$\tilde{\varepsilon} = 0.7158$）下自由度为 2.86 与 25.77。无论是否校正，体重随服药时间的变化都有统计学意义。

未安装 ez 包时，可用基础 R 的 `aov()` 加 `Error()` 项得到相同的方差分析表（不含球形检验与校正），前文两种分析的比较即采用此法。也可用线性混合模型拟合随机截距模型，该模型对应复合对称结构：

```
library(nlme)
anova(lme(y~t,random=~1|id,data=da))
```

```
            numDF denDF  F-value p-value
(Intercept)     1    36 639.0199  <.0001
t               4    36 101.4041  <.0001
```

平衡数据下，随机截距模型给出的 $F = 101.4041$ 与重复测量方差分析完全相同。混合模型可选用其他协方差结构（如一阶自回归），并可直接处理有缺失值的个体，在实际研究中应用日益广泛。

5.6　多组重复测量资料

例 12-3：将手术要求基本相同的 15 名患者随机分为 3 组，手术过程中分别采用 A、B、C 三种麻醉诱导方法，在 T_0（诱导前）、T_1, T_2, T_3, T_4 五个时相测量患者的收缩压，试进行方差分析。

表 12-17　不同麻醉诱导时相患者的收缩压（mmHg）

诱导方法	患者序号	T_0	T_1	T_2	T_3	T_4
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

> **批注** 三个影响因素。

本例 $a = 3$ 组，每组 $n = 5$ 人，$N = 15$，$k = 5$ 次测量。

```
d <- cbind(g=rep(1:3,each=5), id=1:15, matrix(c(
  120,108,112,120,117, 118,109,115,126,123, 119,112,119,124,118,
  121,112,119,126,120, 127,121,127,133,126,                      # A组
  121,120,118,131,137, 122,121,119,129,133, 128,129,126,135,142,
  117,115,111,123,131, 118,114,116,123,133,                      # B组
  131,119,118,135,129, 129,128,121,148,132, 123,123,120,143,136,
  123,121,116,145,126, 125,124,118,142,130),ncol=5,byrow=TRUE))  # C组
colnames(d)[3:7] <- paste0("T",0:4)
d1 <- d[1:5,3:7]; d2 <- d[6:10,3:7]; d3 <- d[11:15,3:7]
```

5.6.1　分析步骤

1）用三组残差的合并协方差阵估计理论协方差阵 Σ，推断有无 HF 结构。

2）作重复测量方差分析。有特殊结构时结果无需校正，否则需要校正。

> **批注** 三组合并成一组。

多组设计中的两个误差项

本设计包含两类比较，其信息来源不同：

- 三种诱导方法（组别）的比较在不同个体之间进行。每个个体只属于一组，有效样本量为 15 人，误差来自个体间差异，自由度为 $15-3=12$。
- 不同时相的比较，以及时相变化模式在组间是否相同（交互作用）的比较，在同一个体内部进行，个体差异在差值中抵消，误差较小，自由度为 48。

因此组别效应的检验效能通常低于时间效应。表 12-19 和表 12-20 中，组别 $F=5.78$，时间 $F=106.6$，二者的误差均方分别为 78.87 和 5.48。重复测量设计提高的主要是个体内比较的精度；若研究问题主要为组间比较，增加样本量比增加测量次数更为有效。

5.6.2 R 分析

```
id <- rep(1:15,5)
t <- rep(1:5,c(15,15,15,15,15))
g <- rep(rep(1:3,c(5,5,5)),5)
y <- c(d[,3:7])
da <- data.frame(id,t,g,y)
da$id <- as.factor(da$id)
da$t <- as.factor(da$t)
da$g <- as.factor(da$g)
library(ez)
result <- ezANOVA(data=da,dv=y,wid=id,within=t,between=g)
print(result)
```

ANOVA

Effect	DFn	DFd	F	P	ges	$P<.05$
g	2	12	5.782943	.01743351	.4299287	*
t	4	48	106.557616	3.017101×10^{-23}	.6588084	*
g:t	8	48	19.100638	1.621310×10^{-12}	.4091519	*

基础 R 的写法如下：

```
summary(aov(y~g*t+Error(id/t),data=da))
```

```
Error: id
          Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)
g          2  912.2   456.1   5.783 0.0174 *
Residuals 12  946.5    78.9

Error: id:t
```

```
          Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
t          4 2336.5   584.1   106.6  < 2e-16 ***
g:t        8  837.6   104.7    19.1 1.62e-12 ***
Residuals 48  263.1     5.5
```

输出按两层误差分为上下两部分，分别对应表 12-19 和表 12-20。

Mauchly's Test for Sphericity

Effect	W	P	$P < .05$
t	.2930746	.1776608	
g:t	.2930746	.1776608	

Sphericity Corrections

Effect	GGe	P[GG]	P[GG] $< .05$	HFe	P[HF]	P[HF] $< .05$
t	.678693	1.867336×10^{-16}	*	.896371	4.649080×10^{-21}	*
g:t	.678693	4.262529×10^{-9}	*	.896371	2.041727×10^{-11}	*

5.6.3 三组残差的合并协方差阵

合并的是“组内残差”：每个人的 5 次测量减去其所在组各时点的均数，从而扣除了组别与时点（及其交互）的均数差异，只留下个体内外的随机变异。合并的前提是各组有共同的协方差阵 Σ（协方差阵齐性，可用 Box's M 检验考察），且个体间独立。合并协方差阵为

$$S = \frac{\sum_{g=1}^{a}(n_g - 1)S_g}{N - a},$$

其自由度为 $N - a = 12$，用于后续 Mauchly 检验的 ν。

```r
k <- 5; n <- 5
m1 <- apply(d1,2,mean)
mean1 <- matrix(rep(m1,each=n),nrow=n,ncol=k)
res1 <- d1-mean1
S1 <- cov(res1)
m2 <- apply(d2,2,mean)
mean2 <- matrix(rep(m2,each=n),nrow=n,ncol=k)
res2 <- d2-mean2
S2 <- cov(res2)
m3 <- apply(d3,2,mean)
mean3 <- matrix(rep(m3,each=n),nrow=n,ncol=k)
res3 <- d3-mean3
S3 <- cov(res3)
S <- (S1*(n-1)+S2*(n-1)+S3*(n-1))/(n+n+n-3)    # 分母N-a=12
# 等价写法: S <- crossprod(resid(lm(d[,3:7]~factor(d[,1]))))/12
```

$$S_1 = \begin{bmatrix} 12.50 & 16.75 & 16.75 & 13.00 & 8.50 \\ 16.75 & 26.30 & 28.30 & 21.85 & 13.85 \\ 16.75 & 28.30 & 31.80 & 24.35 & 14.85 \\ 13.00 & 21.85 & 24.35 & 22.20 & 16.20 \\ 8.50 & 13.85 & 14.85 & 16.20 & 13.70 \end{bmatrix},$$

$$S_2 = \begin{bmatrix} 18.70 & 25.55 & 22.75 & 21.2 & 17.2 \\ 25.55 & 35.70 & 30.00 & 29.8 & 23.3 \\ 22.75 & 30.00 & 29.50 & 25.5 & 21.5 \\ 21.20 & 29.80 & 25.50 & 27.2 & 20.7 \\ 17.20 & 23.30 & 21.50 & 20.7 & 19.2 \end{bmatrix},$$

$$S_3 = \begin{bmatrix} 13.2 & 2.710505 \times 10^{-19} & 2.10 & -7.40 & -1.40 \\ 2.710505 \times 10^{-19} & 11.5 & 4.75 & 13.00 & 5.50 \\ 2.1 & 4.75 & 3.8 & 3.05 & 6.05 \\ -7.4 & 13.00 & 3.05 & 23.3 & 2.80 \\ -1.4 & 5.50 & 6.05 & 2.80 & 13.8 \end{bmatrix}.$$

（S_3 中的 2.71×10^{-19} 为浮点误差，实为 0。）

$$S = \begin{bmatrix} 14.80000 & 14.10000 & 13.86667 & 8.933333 & 8.10000 \\ 14.10000 & 24.50000 & 21.01667 & 21.550000 & 14.21667 \\ 13.86667 & 21.01667 & 21.70000 & 17.633333 & 14.13333 \\ 8.933333 & 21.55000 & 17.63333 & 24.233333 & 13.23333 \\ 8.100000 & 14.21667 & 14.13333 & 13.233333 & 15.56667 \end{bmatrix}.$$

5.6.4 HF 结构检验

```
contrasts <- contr.poly(5)
A <- t(contrasts)%*%S%*%contrasts
N <- 15; a <- 3; k <- 5
dd <- k-1; nu <- N-a              # d=4, nu=12
W <- det(A)/(sum(diag(A))/dd)^dd
chi <- -(nu-(2*dd^2+dd+2)/(6*dd))*log(W)
1-pchisq(chi,dd*(dd+1)/2-1)       # 一阶近似
gg <- sum(diag(A))^2/((k-1)*sum(diag(A%*%A)))
```

$$A = C^{\top} S C = \begin{bmatrix} 7.9033333 & -1.0226366 & .4516667 & -2.115971 \\ -1.0226366 & 6.6833333 & .6014681 & 3.290747 \\ .4516667 & .6014681 & 1.9966667 & 1.340514 \\ -2.1159711 & 3.2907475 & 1.3405140 & 5.343333 \end{bmatrix}, \qquad W = .2930746.$$

$\chi^2 = 12.785$，$df = 9$，一阶近似 $P = 0.1726$（ez 包含二阶修正项，报告 $P = 0.1777$）；$\hat{\varepsilon}_{\mathrm{GG}} = 0.678693$，$\tilde{\varepsilon}_{\mathrm{HF}} = 0.896371$。上述 W 与 GG 系数都与 ez 输出一致。

5.6.5 均数与变异分解

y_{gij} 表示第 g 组第 i 个观测第 j 次测量值，$g = 1, \ldots, a$，$i = 1, \ldots, n$，$j = 1, \ldots, k$。

均数	对应范围
$\bar{Y}$	总平均
$\bar{Y}_{g}$	第 g 组
$\bar{Y}_{gi}$	第 g 组第 i 个观测
$\bar{Y}_{j}$	第 j 个时点
$\bar{Y}_{gj}$	第 g 组第 j 个时点

$$\begin{aligned} \sum_{g}\sum_{i}\sum_{j}(Y_{gij}-\bar{Y})^2 = {} & \underbrace{nk\sum_{g}(\bar{Y}_{g}-\bar{Y})^2}_{\text{group}} + \underbrace{an\sum_{j}(\bar{Y}_{j}-\bar{Y})^2}_{\text{factor1}} \\ & + \underbrace{n\sum_{g}\sum_{j}(\bar{Y}_{gj}-\bar{Y}_{g}-\bar{Y}_{j}+\bar{Y})^2}_{\text{factor1}*\text{group}} \\ & + \underbrace{k\sum_{g}\sum_{i}(\bar{Y}_{gi}-\bar{Y}_{g})^2}_{\text{个体间 error}} \\ & + \underbrace{\sum_{g}\sum_{i}\sum_{j}(Y_{gij}-\bar{Y}_{gi}-\bar{Y}_{gj}+\bar{Y}_{g})^2}_{\text{个体内 error(factor1)}}. \end{aligned}$$

各项系数为对应均数所含的观测数。

$$\begin{aligned} \text{总自由度 } ank-1 = {} & (a-1)+(k-1)+(a-1)(k-1) \\ & + a(n-1)+a(n-1)(k-1). \end{aligned}$$

a 为组数，k 为次数，n 为每组例数（有的资料分别记为 g、m、n）。本例 $74 = 2+4+8+12+48$。

效应	比较的性质	F 的分母	自由度
组别（A）	个体间：比较各组的个体均数	个体间误差 $\mathrm{MS}_{\text{个体间}}$	$(a-1,\ a(n-1)) = (2, 12)$
时间（B）	个体内：同一个体不同时点	个体内误差 $\mathrm{MS}_{\text{个体内}}$	$(k-1,\ a(n-1)(k-1)) = (4, 48)$
组别 × 时间	个体内：时间变化模式的组间差	个体内误差 $\mathrm{MS}_{\text{个体内}}$	$((a-1)(k-1),\ 48) = (8, 48)$

组别是个体间因素，每人只属于一组，组间比较实际上比较的是各人 k 次测量的均数，其随机变异来自个体间差异（含个体随机效应），所以用个体间误差作分母，自由度为 $N - a = 12$。时间及其与组别的交互是个体内比较，个体效应在差值中抵消，用个体内误差作分母；球形校正只针对这两项。

表 12-19　不同诱导方法患者收缩压比较的方差分析表

变异来源	自由度	*SS*	*MS*	*F*	*P*
患者间合计	14	1858.72			
诱导方法（A）	2	912.24	456.12	5.78	$< .05$
患者间误差	12	946.48	78.87		


表 12-20　麻醉诱导时相及其与诱导方法交互作用的方差分析表

变异来源	自由度	自由度（校正）	*SS*	*MS*	*F*	*P*（校正后）
患者内合计	60		3437.20			
诱导时相（B）	4	1	2336.45	584.11	106.59	$< .01$
AB	8	2	837.63	104.70	19.11	$< .01$
患者内误差	48	12	263.12	5.48		

表 12-20 中的校正自由度 1、2、12 是下界校正 $\varepsilon = 1/(k-1) = 1/4$ 的结果（$4/4 = 1$，$8/4 = 2$，$48/4 = 12$），不是 GG 校正。三种做法的对比：

校正方法	ε	时间（B）的自由度及 P	交互 AB 的自由度及 P
不校正	1	$(4, 48)$，$P = 3.0 \times 10^{-23}$	$(8, 48)$，$P = 1.6 \times 10^{-12}$
GG 校正	0.6787	$(2.71, 32.58)$，$P = 1.9 \times 10^{-16}$	$(5.43, 32.58)$，$P = 4.3 \times 10^{-9}$
HF 校正	0.8964	$(3.59, 43.03)$，$P = 4.6 \times 10^{-21}$	$(7.17, 43.03)$，$P = 2.0 \times 10^{-11}$
下界校正（表 12-20）	0.25	$(1, 12)$，$P = 2.5 \times 10^{-7}$	$(2, 12)$，$P = 1.9 \times 10^{-4}$

F 值在各行中都相同（106.56 与 19.10），变的只是参考分布。下界校正最保守；本例无论哪种校正，结论都不变。



三组各时点收缩压均数（由表 12-17 数据计算）

结果解释。先看交互作用：`factor1*group`（诱导方法 × 时相）$F = 19.10$，GG 校正后 $P = 4.3 \times 10^{-9}$，三组收缩压随时相变化的模式不同，三组曲线不平行。交互作用存在时，组别主效应（$F = 5.78$，$P = 0.017$，比较的是 5 个时相的平均水平）和时相主效应只是平均意义上的结论，解释有限，应按研究问题报告具体的对比。例如以各组相对诱导前 T_0 的变化为研究问题，各组组内配对差值的均数（95% 置信区间，未作多重校正）为：

组别	$T_1 - T_0$	$T_2 - T_0$	$T_3 - T_0$	$T_4 - T_0$
A	−8.6 (−11.5, −5.7)	−2.6 (−6.7, 1.5)	4.8 (1.1, 8.5)	−0.2 (−4.0, 3.6)
B	−1.4 (−3.7, 0.9)	−3.2 (−5.2, −1.2)	7.0 (4.7, 9.3)	14.0 (11.7, 16.3)
C	−3.2 (−9.4, 3.0)	−7.6 (−12.0, −3.2)	16.4 (7.5, 25.3)	4.4 (−2.4, 11.2)

共 12 个对比，若需控制多重性，可按 Bonferroni 法把每个区间的置信水平提高到 $1 - 0.05/12$。由此可见，B 组在 T_4 较基线升高约 14 mmHg，C 组在 T_3 升高约 16 mmHg，A 组各时相相对基线的变化都在 −9 到 +5 mmHg 之间。“A 组不同诱导时相收缩压较为稳定”是对均数图的描述，上表的区间为其提供了数量依据；若要正式比较组间的稳定程度，应预先规定指标（如 T_1–T_4 相对 T_0 的最大变化）再作检验。

```
for (g in 1:3) {                                    # 各组相对T0的配对变化及95%CI
  dg <- d[d[,"g"]==g,3:7]
  for (j in 2:5) print(t.test(dg[,j]-dg[,1])$conf.int)
}
```

5.6.6 复习提示

前两次为多重线性回归，后两次推广到一般线性模型。带电脑，考试 2 小时；题型为选择与计算分析，选择题 50 分。计算分析给数据，算出结果，形式为填空，不需要写过程，例如是否满足 HF、自由度、统计量、校正后分子与分母自由度。手画图形轮廓？

> **批注** 手画图形轮廓：可理解为按各组各时点均数手绘轮廓图（如上面的收缩压均数图、析因设计的交互作用图），重点画出曲线的走向以及各组曲线是否平行。

数据为 dat 格式。岭回归（原代码第一行未写完，原为 `ry <- c(cor(d,`，下面按第3.3节的公式补全，以例 15-1 为例，须先运行第2.6节的数据定义）：

```
X  <- cbind(x1,x2,x3,x4)          # 例15-1的自变量矩阵，y为空腹血糖
R  <- cor(X)                      # 自变量的相关阵R_XX
ry <- c(cor(X,y))                 # 各自变量与y的相关系数r_y
solve(R)%*%ry                     # 标准化偏回归系数
k  <- 0.04
solve(R+k*diag(ncol(X)))%*%ry     # 岭参数为k时的标准化岭回归系数
```

本章要点

1) 重复测量资料指同一个体的同一指标被测量多次（时间、部位或条件上的重复）。每个对象仅测量一次的分组比较资料，即使设有区组，也不属于重复测量资料。
2) 不应将各时点视为独立组进行分析，也不宜对各时点反复进行未经校正的两两 t 检验。
3) 三种协方差结构的关系：$\sigma^2 I \subset$ 复合对称 $\subset$HF（球形）。重复测量方差分析要求对比协方差阵 $C^{\top}\Sigma C = \lambda I$，等价于任意两次测量之差的方差相等。
4) Mauchly 检验应针对 $C^{\top}SC$ 进行（R 中为 `mauchly.test(fit,X=~1)`），$W = |A|/[\mathrm{tr}(A)/d]^d$，$d = k-1$。该检验在小样本时效能低，不拒绝 H_0 不等于球形条件成立。
5) GG 系数 $\hat{\varepsilon} = [\mathrm{tr}(A)]^2/[(k-1)\,\mathrm{tr}(A^2)]$，取值范围为 $1/(k-1)$ 至 1；校正时 F 值不变，两个自由度同乘 ε。下界校正最保守，HF 校正较宽松。
6) 单组设计：$\mathrm{SS}_{\text{总}} = \mathrm{SS}_{\text{时间}} + \mathrm{SS}_{\text{个体}} + \mathrm{SS}_{\text{误差}}$，自由度 $nk-1 = (k-1)+(n-1)+(n-1)(k-1)$。$k = 2$ 时等价于配对 t 检验。
7) 多组设计：组别效应以个体间误差为分母（自由度 $N-a$），时间与交互效应以个体内误差为分母（自由度 $(N-a)(k-1)$）；球形校正仅用于个体内的两项。
8) 应首先考察交互作用。交互作用有统计学意义表明各组随时间的变化模式不同，此时应报告各组、各时点的具体比较结果，而不宜笼统地报告组别差异。

第 5 章　习题与解析

重复测量资料的方差分析

往年题

单项选择题

题 5.1　不等间隔的重复测量

重复测量资料, 如果重复测量的时间间隔不等, 则适宜的综合指标是

A. 有峰型资料用均数

B. 生长型资料用极值

C. 均可使用最后的时点测量值

D. 有峰型资料用曲线下面积

E. 生长型资料用均数

题 5.2　把重复观测当独立样本

将 n 个患者的 k 次不同观察作因变量, 样本含量为 nk, 用方差分析或 GLM 模型分析, 可能出现的统计问题主要是

A. 降低了检验效能

B. 不易控制混杂因子

C. 信息利用率降低

D. 增加了 I 型错误概率

E. 无法分析时间趋势

题 5.3　综合指标法与重复测量模型

重复测量资料的综合指标法与 GLM 法, 正确的理解是

A. 综合指标效率高

B. GLM 法效率高

C. 总是 GLM 法较好

D. 总是综合指标法较好

E. 二者均不好, 宜使用多重回归法分析

题 5.4　给药途径与浓度轨迹

某激素类药的不同给药途径的临床药代学及药效学研究, 对两组病人采用不同给药途径, 分别于给药即刻,1h,4h,12h,24h, 测量其靶器官浓度并记录相应的疗效指标, 数据分析宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

题 5.5　血药浓度与时间因素

药物动力学研究, 考察给药后多个时点的血药浓度, 分析其中某影响因素时宜使用

A. 分组散点图。

B. 边际均数图。

C. 偏回归图。

D. QQ 图。

E. 残差分布图。

共用资料：早产儿配方奶与肠道菌群

原题引用 Addition of gangliosides to an adapted milk formula modifies levels of fecal Escherichia coli in preterm newborn infants（Rueda 等，1998，PMID 9672517）。已核对题名和公开摘要，但原题所需 Fig.2 与 Table 2 完整数值未提供；摘要不能替代这些图表。

题 5.6　由原图重算卡方 P 值

Fig.2, Days 3, Chi-square test, 其 P 值是

A. 0.068

B. 0.088

C. 0.091

D. 0.096

E. 0.176

题 5.7　哪种菌有组与时间交互

Table 2, 如果使用 GLM of repeated measurements, 则 group*day 最有可能有统计学意义的菌类是

A. Coliforms

B. E.coli

C. Total aerobes

D. Bifidobacteria

E. E.coli and Bifidobacteria

题 5.8　用 AUC 比较菌群过程

Table 2, 适宜使用曲线下面积进行综合指标分析, 且可能得到有统计学意义结果的菌类是

A. Coliforms
B. E.coli
C. Total aerobes
D. Bifidobacteria
E. Enterobacteria

题 5.9　重复测量分析的主要问题

本文有关统计分析存在最主要的问题是

A. 统计效率不高结果解释困难
B. 用 Mean±SEM 展示数据
C. 样本量小
D. 图 1 令人费解
E. 同时使用 Kruskal-walis test and Friedman test

题 5.10　错误独立化后的方差分解

将 n 个患者的 k 次不同观察作因变量视为 nk 个样本做普通方差分析, 则在分析组间效应时, 与重复测量方差分析不同之处有 I、误差平方和不同 II、误差自由度不同 III、组间或个体间均方不同 (错, 相同)

A. I
B. I&II
C. I&III
D. II&III
E. I&II&III

题 5.11　单变量重复测量的条件

关于重复测量资料做一元方差分析需要满足的条件, 正确的说法是

A. 需满足 Mauchly's Sphericity 条件, 否则需要校正
B. 需满足 Compound Symmetry 条件, 否则需要校正
C. 需满足 Huyhn-Feldt 条件, 否则需要校正
D. 需满足 Greenhouse-Geisser 条件, 否则需要校正
E. 需满足 Equal Variance 条件, 否则需要校正

题 5.12　标准化 Helmert 对比

下列哪些是标准化 Helmert 对比矩阵?

$$\text{I}: \begin{pmatrix} 1 & -0.5 & -0.5 \\ 0 & 0.5 & -0.5 \end{pmatrix},$$

$$\text{II}: \begin{pmatrix} 2/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} & -1/\sqrt{6} \\ 0 & 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} \end{pmatrix}, \qquad \text{III}: \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

A. 仅 I。

B. 仅 II。

C. 仅 III。

D. I 与 III。

E. I、II 与 III。

题 5.13　重复测量平方和的层次

重复测量资料的平方和分解, 正确的说法有 I、个体间的变异含处理或组间的主效应 II、个体内的变异含处理和时间的交互作用 III、个体间的误差包含个体内的误差

A. I

B. II

C. III

D. I&II

E. I&II&III

题 5.14　GG 校正改变什么

重复测量单变量检验采用 Greenhouse–Geisser 校正时，通常:

A. 改变原始观察值。

B. 将 F 统计量乘以 epsilon。

C. 用 epsilon 同时调整相关 F 检验的分子与分母自由度，F 值本身不变。

D. 删除所有不显著时点。

E. 把同一个体的测量强行视为独立。

题 5.15　两个时点的球形性

只有两个完整重复测量时点时，球形条件:

A. 自动成立，因为只有一个独立差值维度。

B. 必然不成立。

C. 必须通过四维正态检验。

D. 必须要求每个 Y 完全相同。

E. 只有样本量超过 100 才成立。

题 5.16　按指定检验水平作决定

Mauchly 检验 P=.065，题目规定前提检验水平 =.20，应：

A. 拒绝球形性，考虑校正或其他适合方法。

B. 因 P>.05 而直接判满足题目条件。

C. 把 P 四舍五入为 0。

D. 删除所有不满足的受试者。

E. 增大每个观测值。

共用资料：运动员激素资料的重复观测设计

随附《三种口服避孕药对女运动员部分甲状腺轴激素的影响》随机分 21 名受试者至 A、B、C 三组（8、8、5 人），在服药前后不同月经周期阶段反复测量 TSH、T4、rT3 等指标。各组部分采样日程不同，文章给出多个组别 × 时点均值及标准差。以下仅练习统计设计与解释，不作为选药建议。

题 5.17　激素试验的独立单位

对运动员激素重复测量研究，通常独立实验单位是：

A. 受试者。

B. 每次抽血得到的一条数值。

C. 每种激素的名称。

D. 每个 P 值。

E. 每个时间点均值。

题 5.18　从激素结果到应用结论

仅观察到某些激素在服药前后有变化，最稳妥的统计解释是：

A. 限定在所测指标和比较条件，不直接推断运动表现改善或完整临床使用价值。

B. 足以证明所有运动员都应采用该方案。

C. 足以证明未测的代谢率必然改变相同幅度。

D. 未显著的激素变化就证明药物完全无效应。

E. 可以忽略多指标、多时点的比较问题。

题 5.19　不等间隔 AUC 的计算

时间为 0、0.5、1、2 小时，梯形法 AUC 正确做法是：

A. 每段平均高度乘该段实际时间宽度后求和。

B. 把 4 个数直接相加。

C. 将 3 段都当成 1 小时。

D. 只取最大值。

E. 用每组均值的一个 AUC 当作多个受试者。

题 5.20　球形条件的矩阵表述

令 H 为标准正交的时间对比矩阵，球形性通常要求：

A. $H\Sigma H^T = \sigma^2 I$。

B. Σ 的所有元素为 0。

C. 所有时点的均值相同。

D. 不同组均值相同。

E. 每个人的观测轨迹相同。

简答题

题 5.21　为何经常采用重复测量设计

为什么具有重复测量的设计在医学研究领域中被使用的频率相当高？

题 5.22　重复测量资料的收集规范

人们在收集具有重复测量设计的资料时常犯什么错误？避免此类错误的办法是什么？

题 5.23　重复测量资料的本质区别

重复测量设计资料与非重复测量设计资料的本质区别是什么？

题 5.24　识别与分析重复测量

如何准确识别重复测量设计？处理重复测量数据的基本思路是什么？

计算与分析题

题 5.25　家兔血钾的重复测量与综合指标

15 只家兔分成 3 个处理组，各 5 只，测量处理前及处理后 0.5、1、2 小时的血钾。研究目标是不同处理后的变化是否不同。数据文件为个人还原版，已与附带文献的表 1 逐行核对一致，数值按原单位保留。

组	兔号	处理前	0.5h	1h	2h
1	1	154.5	129.8	122.7	171.7
1	2	173	124	170.4	168.6
1	3	186	131	137	138
1	4	161	154	178	128
1	5	187	158	162	152
2	6	144.4	135.5	149.9	129.1
2	7	147.1	134.2	138.3	146.1
2	8	183.6	189.3	190.5	227.3
2	9	181.7	160.3	163.3	163.3
2	10	166.7	136.8	134.6	142.5
3	11	173.3	231.4	293.7	401.4
3	12	155.1	199.6	191.8	203.4
3	13	177.9	153.6	158.7	240.3
3	14	158.2	146.7	135.2	228.7
3	15	180.4	170.8	226.2	267.7

1. 检验 H-F 条件，球形检验水平 0.2。
2. 做单变量重复测量方差分析，效应检验水平 0.05，必要时校正。
3. 绘制分组时点均数图，说明结果。
4. 去掉第 3 组，用 SMA 比较第 1、2 组的血钾平均变化量。

题 5.26　Attention Blink 的重复测量分析

对 Attention Blink 数据（删去乒乓球选手组、保留三个研究组及 8 个位置指标）作分析：1. 检验 H-F 条件，检验水平 0.2。2. 做单变量重复测量方差分析，效应水平 0.05；需要时给出“CG 校正”结果（本书按 GG 校正理解）。3. 绘制各组的时点/刺激位置均数图并解释。

配套还原数据保留 80、14、17 人的三组。原始 2023 附件把后两组合在同一标签中，不应直接把该两组标签当作原题三组。

补充练习

本节为配合正文新编的补充练习，按题型排列，题号接续本章往年题，解析见章末。

单项选择题

题 5.27　区组与条件重复的识别

以下哪些资料属于同一实验单位的重复测量?

I. 在每个科室内，将不同患者随机分到三种处理，每位患者仅测量一次结局。

II. 同一受试者依次戴三种不同镜片，分别测量同一项电反应延迟。

III. 同一患者分别在给药前及给药后四个时点测量收缩压。

A. 仅 I。

B. 仅 II。

C. 仅 III。

D. II 与 III。

E. I、II 与 III。

题 5.28　协方差结构的判别

三个重复测量时点的理论协方差阵为

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 4 & 1 & 2 \\ 1 & 6 & 3 \\ 2 & 3 & 8 \end{pmatrix}.$$

以下判断正确的是:

I. 该矩阵具有复合对称（CS）结构。

II. 三个两两差值 $Y_1 - Y_2$、$Y_1 - Y_3$、$Y_2 - Y_3$ 的方差均为 8。

III. 该矩阵满足正文所称 H-F 条件（广义球形性）。

A. 仅 I。

B. 仅 II。

C. II 与 III。

D. I 与 III。

E. I、II 与 III。

题 5.29　由对比协方差计算 GG 系数

一组受试者有 4 个重复测量时点。对样本协方差阵作标准正交时间对比变换，所得 3×3 协方差阵的特征值为 1、1、4。按正文公式，Greenhouse-Geisser 系数 $\hat{\varepsilon}$ 为：

A. 1/3。

B. 1/2。

C. 3/4。

D. 1。

E. 2/3。

简答题

题 5.30　多组资料为什么用合并残差协方差

三组受试者分别有 n_1, n_2, n_3 人，每人均有 5 个时点的完整测量。拟按正文方法检验共同协方差阵的 H-F 条件。某同学不区分组别，直接用全部原始观测的 5×5 协方差阵作检验。

说明这一做法可能混入什么变异；写出正文合并协方差阵的计算思路、分母自由度及应接受球形检验的矩阵维度。

计算与分析题

题 5.31　麻醉诱导的重复测量输出填空

15 名受试者随机等分为 A、B、C 三组，在 5 个时点测量收缩压（mmHg），采用正文原表：

组别	编号	T0	T1	T2	T3	T4
A	1	120	108	112	120	117
A	2	118	109	115	126	123
A	3	119	112	119	124	118
A	4	121	112	119	126	120
A	5	127	121	127	133	126
B	6	121	120	118	131	137
B	7	122	121	119	129	133
B	8	128	129	126	135	142
B	9	117	115	111	123	131
B	10	118	114	116	123	133
C	11	131	119	118	135	129
C	12	129	128	121	148	132
C	13	123	123	120	143	136
C	14	123	121	116	145	126
C	15	125	124	118	142	130

给出软件输出摘要：在合并残差的时间对比空间中，Mauchly $W = 0.2930746$、$P = 0.1776608$，$\hat{\varepsilon}_{GG} = 0.6786930$。前提检验水平定为 0.20，效应检验水平为 0.05。

1. 指出组间因素、组内因素及独立受试者数；按题设水平判断是否需要球形性校正。
2. 用原始数据填出“组别、个体间误差、时间、组别 × 时间、个体内误差”五项的平方和与自由度，并计算三个效应的未校正 F 值。
3. 填出时间和交互作用 GG 校正后的分子、分母自由度，说明组别检验是否作相同校正。
4. 计算各组在 5 个时点的均数，结合效应检验解释组间过程。若把前提检验水平改为 0.05，是否仍须按该检验结果作 GG 校正？

本次补充习题

单项选择题

每题只有一个最佳答案，请从 A—E 中选择。

题 5.32　组间差异的变化

UCLA 重复测量教学资料有两组各 4 名对象、4 个时点。由其原始表算得下列均数：

组别	时点 2	时点 4
1	4	8
2	3	10

以“第 2 组减第 1 组”为组间差异的方向，时点 4 相对于时点 2 的组间差异变化为多少？

A. -3

B. 2

C. 3

D. 3.5

E. 8.25

题 5.33　随机截距与个体内差值

在一个教学模型中，同一对象的 4 次测量满足

$$Y_{ij} = \mu_j + b_i + \varepsilon_{ij}, \qquad \mathrm{Var}(b_i) = 9, \quad \mathrm{Var}(\varepsilon_{ij}) = 4.$$

随机截距与各次随机误差相互独立，各次随机误差也相互独立。$Y_{i4} - Y_{i1}$ 的方差为多少？

A. 4

B. 8

C. 13

D. 18

E. 26

题 5.34　与基线比较的多重性

某重复测量研究预先规定 3 个随访时点分别与基线比较，每项检验均保留个体配对。为说明校正方法，设未校正的双侧 P 值依次为 0.012、0.028、0.041。采用 Holm 法控制这 3 项比较的家族错误率为 0.05：将 P 值从小到大排列，依次与 0.05/3、0.05/2、0.05 比较；遇到首个未拒绝的原假设即停止。应拒绝哪些原假设？

A. 仅第 1 项

B. 仅第 1、2 项

C. 仅第 1、3 项

D. 3 项均拒绝

E. 3 项均不拒绝

题 5.35　不等间隔的变化率对比

家兔血钾资料在处理前及处理后 0.5、1、2 小时测量，记为 $Y_0, Y_{0.5}, Y_1, Y_2$。若预先规定比较“1 至 2 小时平均变化率减去 0 至 0.5 小时平均变化率”，按上述变量顺序，其对比系数应为哪组？

A. $(-2, 2, -1, 1)$

B. $(1, -1, -1, 1)$

C. $(2, -2, 1, -1)$

D. $(2, -2, -1, 1)$

E. $(-1, 0, 0, 1)$

题 5.36　SEM 能说明什么

Rueda 等论文表 II 将结果写作均数 $\pm$SEM。MF 组第 7 天的对数大肠杆菌计数为 8.62 ± 0.64，来自同组 20 名婴儿。下列说法正确的是：

A. 0.64 是该时点个体观测值的样本标准差。

B. 每组测量 3 次，故计算该 SEM 使用的独立样本量应为 60。

C. 已知第 3 天 SEM 为 0.78，即可断定第 3 至第 7 天均数变化的 SEM 为 $\sqrt{0.78^2 + 0.64^2}$。

D. 利用各时点的均数和 SEM，即可唯一还原组 × 时间交互作用的检验。

E. 按 SEM $= S/\sqrt{n}$ 换算，该时点个体观测值的样本标准差约为 2.86。

题 5.37　正交对比与独立性

设不同对象的 $Y_i \sim N_k(\mu, \Sigma)$ 相互独立，Σ 正定。考察下列说法：

I. 对预先固定且非零的 c（$c^\top \mathbf{1} = 0$），若只检验 $c^\top \mu = 0$，可对每人的 $Z_i = c^\top Y_i$ 作单样本 t 检验；无须先要求整个 Σ 具有 HF 结构。

II. 只要 $c_1^\top c_2 = 0$，无论 Σ 为何，$c_1^\top Y_i$ 和 $c_2^\top Y_i$ 均相互独立。

III. 若 $C^\top C = I$、$C^\top \mathbf{1} = 0$ 且 Σ 具有讲义所定义的 HF 结构，则 $C^\top Y_i$ 的各分量等方差；在上述多元正态模型下也相互独立。

正确的是：

A. 仅 I

B. 仅 II

C. I、II

D. I、III

E. I、II、III

简答、计算与案例分析

题 5.38　漏访与实际时间不一致

教学情境：两组对象拟在基线及第 1、3、6 个月测量同一连续结局。有些对象漏访，有些人的实际访视时间明显偏离计划；病情较重者更容易退出。研究者拟删除所有不完整对象后作经典重复测量方差分析。简述这一方案的两项主要局限，并提出一种可考虑的分析方法及其仍需审查的假定。

题 5.39　重复测量输出的误差分层

以下改编自 UCLA 的 Demo Analysis #4（教学示例），共 8 名对象，分为 2 组，各测量 3 次。为本题计算，假定单变量重复测量检验的条件成立，包括讲义所定义的 HF 广义球形条件。软件输出摘录如下，平方和有少量舍入：

变异来源	平方和	自由度	F
组别	2542.041667	1	(a)
个体（组内）误差	24.250000	6	—
时间	1.000000	2	(b)
组别 × 时间	1736.333333	2	(c)
个体内误差	76.000000	12	—

1) 计算 (a)、(b)、(c)，并写出各自使用的误差均方。

2) 软件给出的时间效应 $P = 0.9246$，交互作用 $P < 0.0001$。能否据此说两组都没有随时间变化？能否只凭此表判断哪一组上升？

3) 如需进一步定位组间变化模式的差异，应预先规定哪一类后续比较，并怎样处理多重性？

题 5.40　比较预设的 0 至 2 小时变化量

下表节录 15 只家兔血钾资料的第 1、3 组，数值保留原表量尺，未作单位换算。预先规定比较两组从处理前至 2 小时的变化量，方向为“第 3 组减第 1 组”。

组别	兔号	处理前	2 小时
1	1	154.5	171.7
1	2	173.0	168.6
1	3	186.0	138.0
1	4	161.0	128.0
1	5	187.0	152.0
3	11	173.3	401.4
3	12	155.1	203.4
3	13	177.9	240.3
3	14	158.2	228.7
3	15	180.4	267.7

假定不同兔相互独立，各组的个体变化量近似正态；不要求两组变化量方差相等。

1) 令 $D_i = Y_{i,2\mathrm{h}} - Y_{i,0}$，分别计算两组的 $\bar{D}$ 及样本方差 s_D^2。

2) 对 $H_0 : \mu_{D,3} - \mu_{D,1} = 0$ 作双侧 Welch 检验，给出差异估计、标准误、t 和近似自由度。可使用

$$\nu = \frac{(s_3^2/5 + s_1^2/5)^2}{(s_3^2/5)^2/4 + (s_1^2/5)^2/4}.$$

3) 取相应 $t_{0.975,\nu} \approx 2.567$，求差异的 95% 置信区间并解释。该检验是否等同于原 3 组 4 时点的全部交互作用检验？

题 5.41　重复测量文献的分析目标与结局定义

阅读 Rueda 等（1998）的下列资料摘述：研究将早产儿分为普通配方奶组（MF）和添加神经节苷脂的配方奶组（GMF）；初始共 43 人，最终每组 20 人完成，3 人因未遵循喂养方案或发生胃肠炎而退出。两组均在生后第 3、7、30 天采集粪便。论文表 II 报告各菌种对数计数的均数 $\pm$SEM，统计部分列出 Kruskal–Wallis 与 Friedman 检验。对“大肠杆菌阳性”，第 3 天定义为菌落数 >1000，第 7、30 天定义为 >10000。

1) 在各时点分别比较两组，再分别检验各组的时间效应，是否已经给出了“饮食组别 × 时间”交互作用的检验？说明理由。
2) 若要重做连续结局的重复测量分析，只有表 II 的均数和 SEM 是否足够？至少还需要什么信息？
3) 能否把第 3 至第 7 天阳性率的差异直接解释为同一定义下定植率的变化？同一天的两组比较是否也面临完全相同的问题？
4) 只分析 40 名完成者有什么潜在局限？指出需要补充报告的一项信息或一项敏感性分析。

习题解析

核对方式

题号与前文一一对应。补写范围、原题歧义及数据还原方法列在相应答案中。

解析 题 5.1　不等间隔的重复测量

返回题目

答案：D。

峰形过程可用梯形法按实际间隔计算 AUC；直接平均各时点会隐含等权，不能表达真实时间累计暴露。生长型过程也可用斜率等指标，选择须对应研究问题。

解析 题 5.2　把重复观测当独立样本

返回题目

答案：D。

同一受试者的多次测量相关，按 nk 个独立单位计算会错误估计标准误和自由度，常导致组间效应检验的 I 类错误膨胀。有效独立受试者数仍是 n。

解析 题 5.3　综合指标法与重复测量模型

返回题目

答案：B（一般经验，不是必然结论）。

正确的重复测量模型利用完整时间结构，通常比压缩成单一指标保留更多信息。但预先选定且切合目标的综合指标可更稳健、更易解释；没有对所有数据均更优的方法，C、D 的“总是”不成立。

解析 题 5.4　给药途径与浓度轨迹

返回题目

答案：B。

边际均数图可展示各组在多个实际时点的平均浓度轨迹，并辅助解释组 × 时间交互；本图并非完整的推断方法。

解析 题 5.5　血药浓度与时间因素

返回题目

答案：B。

边际均数图显示给定因素各水平下的平均时间过程；还应以合适的重复测量模型处理个体内相关。

解析 题 5.6　由原图重算卡方 P 值

返回题目

答案：原图缺失，不能确认选项。

应从 Day 3 的实际计数构造列联表，并明确 Pearson 卡方是否作连续性校正，或是否改用精确检验。公开摘要不含 Fig.2 计数，不能从其他日期的显著性反推本题 P 值。

解析　题 5.7　哪种菌有组与时间交互　　返回题目

答案：原表缺失，不能确认选项。

组 × 时间交互检验的是两组时间曲线形状是否不同；某一时点显著或同组随时间显著都不能替代交互检验。需完整个体数据或足够的均值、协方差与样本量。

解析　题 5.8　用 AUC 比较菌群过程　　返回题目

答案：原表缺失，不能确认选项。

应按个体在实际时点计算 AUC，再比较两组。不能仅用组均值曲线计算一个面积后当作拥有多个独立重复的样本；原摘要提及 E.coli 关联，但不足以确认本题的唯一选项。

解析　题 5.9　重复测量分析的主要问题　　返回题目

答案：A 是通常的评议方向，需全文核验。

将多时点分别作组间和组内检验可能难以整体评价交互且有多重性问题，合适的重复测量或混合模型通常更易对应目标。均值 ±SEM 本身不必然错误，但要说明它表达均值精度；不能仅凭方法名认定两种非参数检验并用必错。

解析　题 5.10　错误独立化后的方差分解　　返回题目

答案：B。

同一个平衡完整数据表，组间效应平方和的计算可相同，但普通 nk 样本模型与重复测量模型使用的误差平方和、误差自由度不同。组间效应应以个体间误差检验，不能用混合了个体内变异的误差项。

解析　题 5.11　单变量重复测量的条件　　返回题目

答案：C 是课程的 H-F 条件命名。

通常所需为球形性：对比空间的协方差矩阵与单位阵成比例。Mauchly 是检验名称；复合对称更强，并非必要条件。GG/HF 通常是违反球形性后的自由度校正名。A 若只想表达“满足球形性”也有道理，故这道题主要考术语，不能把它们误作互不相关的 5 种条件。

解析　题 5.12　标准化 Helmert 对比　　返回题目

答案：B。

标准化 Helmert 对比每行和为 0，行间正交，且每行长度为 1。矩阵 I 行长度不同，III 未单位化；II 满足 $HH^T = I_2$ 且 $H\mathbf{1} = 0$。

解析　题 5.13　重复测量平方和的层次　　返回题目

答案：D。

个体间变异含组效应及个体间误差；个体内变异含时间、组 × 时间及个体内误差。两种误差属于不同层次，个体间误差不包含个体内误差。

解析　题 5.14　GG 校正改变什么　　返回题目

答案：C。

GG 校正通过自由度影响尾概率，不改变已计算的平方和与 F 比值。

补写说明。 原第 12 题整题未记录，本题新编。

解析　题 5.15　两个时点的球形性　　返回题目

答案：A。

一维对比协方差天然是标量，仍需考虑不同个体独立等其他条件。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 5.16　按指定检验水平作决定　　返回题目

答案：A。

必须按题设水平判断；拒绝球形性后可以使用 GG/HF 自由度校正或合适的相关结构模型。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 5.17　激素试验的独立单位　　返回题目

答案：A。

同一人的多时点及多个指标会相关，不能把所有数值都当独立受试者；随机分组发生在受试者层面。

附文献批注校正。 批注建议把“服药前后”和“药物种类”视为两个组间因素；同一受试者前后反复观测时，前后实际上是组内因素，药物种类才是组间因素。周期内阶段也是重复因素，还需核对各组测量时间是否可比。不能因把数据排成长表，就将同一人的前后值当作独立组。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 5.18　从激素结果到应用结论　　返回题目

答案：A。

应区分已测结果与未测结局，考虑对照、周期变化、重复相关、多重性及不确定性。这里不对临床用药作建议。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析　题 5.19　不等间隔 AUC 的计算　　返回题目

答案：A。

各段宽度为 0.5、0.5、1；组间比较应先在每个独立个体层面计算指标。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 5.20　球形条件的矩阵表述

返回题目

答案：A。

它约束个体内对比的协方差，不约束均值或处理效应。对比空间内更换正交基不应改变是否球形的结论。

补写说明。2019 回忆稿只给出 30 道选择的总数及大致范围，没有记录本题原文；本题是依课程内容与所附材料新编的补充练习，不冒作恢复的原试卷。

解析 题 5.21　为何经常采用重复测量设计

返回题目

医学研究常关注病程、治疗反应、药代过程和生长发育的动态变化。同一受试者在多个时点观测可描述轨迹、比较变化，并利用个体内相关减少某些个体差异的影响，在合适设计下提高效率。反复测量的便利并不等于增加了同等数量的独立受试者，推断必须保留个体层次。

解析 题 5.22　重复测量资料的收集规范

返回题目

常见问题包括丢失个体与时点对应、只保存各组均值而不留个体原始值、未记录实际间隔、把未测记成 0、测量方法随时间改变而未注明。应保存唯一受试者 ID、组别、实际时间、结局与缺失原因，统一测量流程，并能从宽表或长表还原每个人的完整观测序列。仅有均值和标准差通常不能重建个体内协方差。

解析 题 5.23　重复测量资料的本质区别

返回题目

重复测量来自同一实验单位的多次观测，因此具有共同个体来源及相应的协方差结构；它包含个体间和个体内两个层次。是否属于重复测量应由设计和个体身份判定，而不是依据相关检验是否显著。非重复资料也可能有其他聚集相关，不能反过来认为它总是独立。

解析 题 5.24　识别与分析重复测量

返回题目

先追溯实验单位：同一人、动物或其他独立单位在不同时间/条件下是否反复提供观测。明确组间因素、组内因素、实际时点和目标比较，再绘制个体及组均值轨迹，检查缺失。

分析可以是预先定义的 SMA、合适的单变量重复测量方差分析及球形性校正、多变量方法或混合模型。需要使用正确的个体间/个体内误差，不能把正交变换理解为能够自动消除任意相关或“修好”球形性；模型应与设计、协方差结构和研究问题相符。


解析 题 5.25　家兔血钾的重复测量与综合指标

返回题目

对正确的个体内对比空间作 Mauchly 检验，$W = 0.378422$，R 的 P 约 0.06523；在 **0.2** 水平拒绝球形性（若用 0.05 则结论不同）。未校正检验如下：

效应	F	df1	df2	P
组别	4.77741	2	12	0.029773
时点	5.66101	3	36	0.002776
组 × 时点	5.83597	6	36	0.000251

GG 系数为 0.654690，HF 系数为 0.781622。GG 校正不改 F 值，时点自由度改为约 (1.9641, 23.5688)，P=.01013；交互自由度改为 (3.9281, 23.5688)，P=.00215。组别检验使用个体间误差，不因这项球形性校正改变。R 与其他软件的 Mauchly 近似 P 可略有差别。



图为组均值，无置信区间；第 3 组后期明显上升，第 1、2 组相对平缓。交互有统计学证据，应优先描述不同时间过程，而非只给一个总体组差。

SMA 必须先定义指标。 不等间隔下取基线校正曲线的时间平均变化

$$\Delta_i = \frac{1}{2}\int_0^2 \{Y_i(t) - Y_i(0)\}\,dt,$$

积分以梯形法估计。第 1、2 组均值为 −20.2500、−7.6475；Welch t=−1.3001，df≈ 7.999，P=.2298，差值 95% CI 为 (−34.956, 9.751)，证据不足。若按 3 个处理后时点直接平均再减基线，两组为 −23.9533、−8.6333，P=.2025；若用个体线性斜率，P=.4758。原题“平均变化量”未唯一规定算法，应说明所采用的 SMA 定义，不能混淆变化量与变化率。

解析　题 5.26　Attention Blink 的重复测量分析


返回题目

还原依据：正文的 134 人资料中删去原组 2（23 名乒乓球选手），剩余 111 行的 8 个观测值与 2023 附件逐值一致；保留原组 1、3、4 后重标为 1、2、3，各均数与回忆稿完全相符。原附件未改写，还原 CSV 单独提供。

Mauchly $W = 0.074145$，$P \approx 1.04 \times 10^{-42}$，不满足球形性。GG 系数 0.514766，HF 系数 0.534728。以 III 型平方和为明确约定：

效应	F	原 df1	原 df2	原 P	GG 校正 P
组别	1.57722	2	108	0.21127	不适用
位置	42.38643	7	756	<.001	2.84e-27
组 × 位置	0.75126	14	756	0.72266	0.63241

位置校正自由度为约 (3.6034, 389.1630)，交互为 (7.2067, 389.1630)。原代码 aov 的顺序平方和与 III 型在不平衡组数下可检验不同加权主效应；本包同时保留 aov 输出，比较时不要混用。



图只显示各组算术均值。p1—p8 是刺激位置，原题没有给出足够信息换算成绝对时间。存在明显的位置变化，但组别及组 × 位置没有统计学证据；“不显著”不等于证明各组等效。

补充练习解析

以下为补充练习的解析。这些题目为配合正文新编，并非往年试题；题中设定的数值仅供练习。

解析　题 5.27　区组与条件重复的识别

返回题目

答案：D。

II 是在同一人不同条件下重复测量，III 是在同一人不同时点重复测量。I 是区组内不同患者接受处理，每个人只提供一次结局；“有三种处理”不等于“同一人测三次”。是否重复须追溯实验单位，而不是只看资料按几列排列。

解析　题 5.28　协方差结构的判别

返回题目

答案：C。

三个差值方差分别为 $4+6-2\times1=8$、$4+8-2\times2=8$、$6+8-2\times3=8$，故 II 成立，也满足球形性对比条件。其对角元素不等、非对角元素也不等，不是 CS 结构。

若 C 的行是单位正交对比，$C\mathbf{1}=0$、$CC^{T}=I_2$，可验证 $C\Sigma C^{T}=4I_2$，所以 III 成立。本题区分原矩阵 $\sigma^2 I$、CS 与对比空间的广义球形性，不能把 CS 当作后者的必要条件。

解析　题 5.29　由对比协方差计算 GG 系数

返回题目

答案：E。

共有 $4-1=3$ 个对比维度，故

$$\hat{\varepsilon}=\frac{(1+1+4)^2}{(4-1)(1^2+1^2+4^2)}=\frac{36}{54}=\frac{2}{3}.$$

不能把分母中的“时点数减 1”误写成 4。应使用对比协方差阵的特征值；算出校正系数本身也不等于已完成球形性检验。

解析　题 5.30　多组资料为什么用合并残差协方差

返回题目

全部原始观测的协方差阵可能混入不同组均值轨迹之间的变异。正文的做法是先在各组、各时点减去相应组均数，计算组内协方差，再按组内自由度合并。若各组的理论协方差阵可视为共同的 Σ，则

$$S_{\text{pool}}=\frac{\sum_{g=1}^{3}(n_g-1)S_g}{N-3},\qquad N=n_1+n_2+n_3.$$

等组数时它等于三个组内协方差阵的平均；组数不等时不能机械地等权平均。

令 C 为 4×5 的单位正交对比矩阵，检验 $CS_{\text{pool}}C^{T}$ 对应的理论 4×4 对比协方差阵是否与单位阵成比例。不能只对未经对比变换的 5×5 原始矩阵检验 $\Sigma=\sigma^2 I$，就把其拒绝结果解释为不满足 H-F 条件。

解析 题 5.31　麻醉诱导的重复测量输出填空

返回题目

（1）设计与前提。组别是组间因素，时间是组内因素，独立受试者数为 15 而不是 75。$P = 0.1776608 < 0.20$，按题设拒绝 H-F 条件，对涉及时间的单变量检验采用 GG 校正。

（2）未校正方差分析。

来源	SS	df	MS	F
组别	912.2400	2	456.1200	5.7829
个体间误差	946.4800	12	78.8733	—
时间	2336.4533	4	584.1133	106.5576
组别 × 时间	837.6267	8	104.7033	19.1006
个体内误差	263.1200	48	5.4817	—

自由度相加为 74。组别使用个体间误差作分母；时间与交互使用个体内误差作分母，不能混用。

（3）校正后的读表结果。

效应	F（不变）	df1	df2	P
组别	5.7829	2	12	0.01743
时间（GG）	106.5576	2.7148	32.5773	1.87×10^{-16}
组别 × 时间（GG）	19.1006	5.4295	32.5773	4.26×10^{-9}

时间的自由度为 $(4\varepsilon, 48\varepsilon)$，交互为 $(8\varepsilon, 48\varepsilon)$；组别检验不作该项校正。三个效应在 0.05 水平均显著。

（4）过程解释。

组别	T0	T1	T2	T3	T4
A	121.0	112.4	118.4	125.8	120.8
B	121.2	119.8	118.0	128.2	135.2
C	126.2	123.0	118.6	142.6	130.6

三组的平均时间轨迹不同：A 组先降后回升，B 组后期上升，C 组在 T3 达到本组均数最高值后回落。交互显著说明组间差异随时间变化，不能用一个恒定组差概括，更不能从整体显著直接断言所有时点的任意两组均不同。

若前提水平改为 0.05，则 $P > 0.05$，不拒绝 H-F 条件；仅依据该检验，不再要求作 GG 校正，但这不等于证明总体严格满足球形性。

两种输出的口径。本题据原始 15 行数据复算，与正文的软件输出一致。另一份汇总表的部分 F 值有舍入差异，且“校正”自由度采用更保守的下界 $\varepsilon = 1/4$（不是本题给定 GG 系数）；两套自由度不能混填。

本次补充习题解析

解析　题 5.32　组间差异的变化

返回题目

选 C。预设对比为

$$(\bar{Y}_{2,4}-\bar{Y}_{1,4})-(\bar{Y}_{2,2}-\bar{Y}_{1,2})=(10-8)-(3-4)=3.$$

它估计这一特定时间对比上的组间差异变化。仅由这些均数不能给出其标准误或检验结果。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[22]、[21]。

解析　题 5.33　随机截距与个体内差值

返回题目

选 B。差值中的 b_i 相消，故方差为 $4+4=8$。亦可由 $\mathrm{Var}(Y_{ij})=13$、$\mathrm{Cov}(Y_{i4},Y_{i1})=9$ 算得 $13+13-2\times 9=8$。该模型的协方差为 CS 结构，是讲义 HF 结构的特例。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[21]。

解析　题 5.34　与基线比较的多重性

返回题目

选 A。排序后的阈值依次为 0.05/3、0.05/2、0.05。第 1 项通过，第 2 项 $0.028>0.025$，顺序检验在此停止。Holm 校正后的 P 值为 0.036, 0.056, 0.056。第 3 项不能越过前面的未拒绝项单独通过。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[21]、[23]。

解析　题 5.35　不等间隔的变化率对比

返回题目

选 D。所需指标为

$$\frac{Y_2-Y_1}{2-1}-\frac{Y_{0.5}-Y_0}{0.5-0}=2Y_0-2Y_{0.5}-Y_1+Y_2.$$

分母应采用实际经过的小时数；用访视序号代替实际时间会改变“变化率”的含义。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[24]、[21]。

解析　题 5.36　SEM 能说明什么

返回题目

选 E。$S=0.64\sqrt{20}\approx 2.86$，因原表已四舍五入，换算值也是近似值。3 次测量仍来自同一批婴儿；同一人的两次测量通常相关，变化量的标准误还需要协方差。因此边际 SEM 不能单独确定变化量或交互作用的检验。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[27]、[21]。

解析　题 5.37　正交对比与独立性

返回题目

选 D。I 中的 Z_i 为相互独立的单个正态标量，直接估计其方差即可。II 错误：两对比的协方差为 $c_1^{\top}\Sigma c_2$，一般不能用 $c_1^{\top}c_2$ 替代。III 由 $C^{\top}\Sigma C=\lambda I$ 及多元正态分布下不相关蕴含独立得到。这里的 HF 结构是广义球形性，不要求原始 $\Sigma=\sigma^2 I$。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[21]。

解析　题 5.38　漏访与实际时间不一致

返回题目

删除不完整对象会损失信息，并可能因退出与病情有关而造成选择偏倚；不能把完整病例自动视为原随机分组的代表。按统一访视名称作分析还可能掩盖实际经过时间的差异，尤其当研究目标是单位时间的变化率时。

应保留对象编号、组别、计划与实际测量时间、已观测结局及退出原因；先描述缺失模式，再考虑使用线性混合效应模型处理不平衡测量，并按研究目标把实际时间作为连续变量或合理建模。该方法仍依赖均数和协方差模型；常用似然推断还依赖给定已观测信息后可忽略缺失的条件（如 MAR）。若退出还依赖未观测结局，应作相应敏感性分析。不能笼统声称“混合模型自动消除缺失偏倚”。计划时点本身不等间隔，并不使把时间作为分类因素的 RM ANOVA 自动无效。

来源与改编：知识点配套。题干与设问为新编；参考依据[21]、[26]。

解析　题 5.39　重复测量输出的误差分层

返回题目

(1) 个体（组内）误差均方为 $24.25/6 = 4.041667$，个体内误差均方为 $76/12 = 6.333333$。因此

$$F_{\text{组}} = \frac{2542.041667}{4.041667} = 628.959, \quad F_{\text{时}} = \frac{1/2}{6.333333} = 0.07895, \quad F_{\text{交互}} = \frac{1736.333333/2}{6.333333} = 137.079.$$

参考分布分别为 $F_{1,6}$、$F_{2,12}$、$F_{2,12}$。组效应用个体之间的误差；时间及组别 × 时间用个体内误差，不能共用错误的分母。

(2) 不能。总体时间效应反映跨组平均的时间变化，组内变化可能互相抵消。显著交互提示两组时间模式不同，不能把时间主效应不显著解释成两组都不变。平方和和 F 值不带方向，仅凭此表不能判断哪组上升，也不能把显著组主效应解释为每个时点均有组间差异。

(3) 可根据预设科学问题比较特定时点的组间简单效应，或比较两组从基线到某时点的变化量，也可设定其他有意义的组 × 时间对比；应报告估计值及区间。对预先界定的一组后续比较，采用 Holm 等方法控制多重性，避免只挑显著的比较。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[26]、[21]、[23]。

解析　题 5.40　比较预设的 0 至 2 小时变化量

返回题目

(1) 第 1 组变化量为 $17.2, -4.4, -48.0, -33.0, -35.0$，第 3 组为 $228.1, 48.3, 62.4, 70.5, 87.3$。故

$$\bar{D}_1 = -20.64, \quad s_1^2 = 700.788; \qquad \bar{D}_3 = 99.32, \quad s_3^2 = 5381.372.$$

(2) 差异估计为 $99.32 - (-20.64) = 119.96$，

$$SE = \sqrt{\frac{5381.372}{5} + \frac{700.788}{5}} = 34.8774, \qquad t = \frac{119.96}{34.8774} = 3.4395, \quad \nu \approx 5.0244.$$

双侧 $P \approx 0.0183$。

(3) 使用未舍入的临界值，95% 置信区间为 $(30.44,\ 209.48)$；使用题给 2.567 得近似 $(30.43,\ 209.49)$，均应接受。在给定模型假定下，第 3 组的平均 0 至 2 小时变化比第 1 组大，区间较宽，估计仍不精确。

这一检验利用每只兔的实际差值保留了配对信息，检验的是一个预设的组间变化量对比。它不等于 3 组 4 时点的总体交互作用检验，也不能单独说明 0.5 或 1 小时的组间差异。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[24]、[25]、[21]。

解析　题 5.41　重复测量文献的分析目标与结局定义

返回题目

(1) 没有。逐时点组间检验和组内时间检验分别针对不同假设，并不直接检验两组的变化模式是否相同。“一组显著、另一组不显著”也不等于变化差异显著。应在符合结局分布与个体相关结构的方法中，明确检验组 × 时间项或预设的组间变化量对比。

(2) 不足。边际 SEM 不含同一婴儿各次测量的协方差。至少应取得可按婴儿编号连接的个体纵向记录、组别、实际时点和缺失情况；若随机化确有匹配或分层，还应保留相应设计信息。取得数据后再检查适用假定并选择方法，不能从表 II 拼出交互作用的 P 值。原文因分布检查结果而采用非参数方法，不能未经审查直接替换为正态 RM ANOVA。

(3) 不能。跨时点比较同时改变了阈值，所定义的二分类结局并不完全相同。宜采用可比的固定阈值，或直接分析保留尺度信息的计数/对数计数及其时间变化。同一时点两组使用相同阈值，因此不存在这个跨时点阈值不一致的问题；但仍需按研究设计和比较范围解释。

(4) 完成病例分析可能因退出与结局或组别相关而偏倚；仅凭 3 人退出也不能确定偏倚方向。应按随机组报告人数流转、原因和已观测结局，说明分析人群；可结合退出机制对缺失结局进行适当敏感性分析。不能把完成者结果自动称为全部随机入组对象的分析。

来源与改编：案例改编。材料及改编范围见[27]、[21]。

附录　易错表述与更正

下表汇总学习中容易出现的不准确写法、记号或数据转录错误，并给出本书采用的写法，便于复习时对照。“位置”为本书的节号。

位置	易错写法或表述	本书采用	说明
1.1.5	迹“表示数据包含的总信息量”	各分量方差之和	受量纲影响
1.1.5	相关矩阵为单位阵“说明 p 个指标间相互独立”	两两不相关	联合正态时才等价于独立
1.2.2	$AB \neq BA$，“除非 B 为单位矩阵”	一般不可交换，$B = I$ 只是特例	如 $B = cI$、A^{-1}
全文	转置记为 X' 或 X^T	$X^\top$	b_i' 另作他用，避免混淆
2.2.2	最大似然法“假设残差 $e \sim N(0, \sigma^2)$”	误差 $\varepsilon \sim N(0, \sigma^2 I)$	残差不独立、不同方差
2.2.4	残差向量 E、系数向量 B；“各残差之和为 0”	e、b；含截距时 $\sum e_i = 0$	避免与期望 $E(\cdot)$ 混淆
2.3.2	“若模型假设成立且 H_0 成立，b 服从 $N(\beta, \sigma^2(X'X)^{-1})$”	正态模型下该分布不以 H_0 为前提	H_0 只用于代入 $\beta_i = 0$
2.4	标准化系数记为 b_i'；“体重对肺活量的作用比身高大”	记为 $\tilde{b}_i$；按标准差换算的条件关联	不直接代表重要性或因果
2.5	C_p：“应选择 C_p 最接近 p 的模型”	在 $C_p \lesssim p$ 的模型中兼顾简洁性	全模型 $C_p \equiv p$
3.1	$\mathrm{SRE} = e/(s\sqrt{1-h_{ii}^2})$	$\mathrm{SRE} = e_i/(s\sqrt{1-h_{ii}})$	与学生化残差的定义一致，$\mathrm{Var}(e_i) = \sigma^2(1-h_{ii})$
3.1	$e_t = \rho e_{t-1} + \varepsilon_t$，$-1 \le \rho \le 1$	$\varepsilon_t = \rho\varepsilon_{t-1} + u_t$，$\lvert\rho\rvert < 1$	自相关是误差的性质
3.1	线性关系“不涉及检验，只作图”	以图为主，必要时检验	如加入二次项
3.1.1	`e1 <- lm(x3~x2+x4)`；`plot(e1,e2)`	`e1 <- resid(lm(...))`	应对残差作图
3.1.3	DW 判断表只列三个区间	补入两个“不能确定”区	与 DW 分布图一致
3.2	“$(X'X)^{-1}$ 无解”	$X^\top X$ 奇异，系数不唯一，拟合值唯一	
3.3	岭回归“相对削弱自变量间的相关性”	改善 $X^\top X$ 的病态	数据相关性不变

位置	易错写法或表述	本书采用	说明
3.3	“寻找符号转正、岭迹平稳且较小的 k 值”	交叉验证/GCV 选 k，岭迹作参考	按预期符号选参不客观
3.4	$D_i=\dfrac{e_i^2}{(p+1)\widehat{\sigma}^2}\dfrac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}$（$p$ 为自变量个数）	$D_i=\dfrac{e_i^2}{p\,s^2}\dfrac{h_{ii}}{(1-h_{ii})^2}$（$p$ 含截距）	记号不同，数值相同
4.1	“线性回归更专注于连续变量的预测”	线性回归同样可含分类自变量与交互	与广义线性模型区分
4.2.1	“此模型只能手算”；参数写作 $\beta=(5.436,2.781,3.956)$	软件可处理秩亏模型；写作估计值 $\hat{\beta}$	
4.3	“两步随机”；“全组哑变量模型无法用软件实现”	区组既有，组内一步随机化	
4.4.1	交互作用图中 $b=1$ 线为 $(1,2.1)$–$(2,1.2)$，$b=2$ 线为 $(1,1.0)$–$(2,0.8)$	$b=1$：$(1,2.1)$–$(2,1.0)$；$b=2$：$(1,1.2)$–$(2,0.8)$	与格子均数表一致
4.4.2	$\hat{\alpha}_1=1.7-1.3=0.4$，$\hat{\beta}_1=1.6-1.3=0.3$ 等（按 1.3 代入），交互效应式中亦代入 1.3	统一用总均数 1.275：±0.375、±0.275、±0.175	按 1.3 代入时交互式应得 0.2，与 0.175 不一致
4.4.3	$SS_A=\sum(\bar{Y}_i-\bar{Y})^2$ 等，误差自由度 $ab(n-1)$	$SS_A=br\sum_i(\cdot)^2$，$SS_B=ar\sum_j(\cdot)^2$，$SS_{AB}=r\sum\sum(\cdot)^2$；$ab(r-1)$	补齐权重
4.4.3	H_0：交互作用无统计学意义	$H_0:(\alpha\beta)_{ij}=0$	假设针对总体参数
4.5	“消除混杂因素的影响”	对已测协变量作线性调整	
4.5.1	“饱和模型”；“$P>0.05$，应用简略模型/平行”	含交互项的完整模型；未发现斜率差异的证据	
4.5.4	“若要与进入顺序无关，应选三型平方和”	先明确假设，再选平方和类型	
5.1.2	“$t_0-t_1,t_0-t_2,\ldots$ 这样比较是错的”	可配对比较，按预设范围控制多重性	
5.3.2	第二个复合对称矩阵非对角元为 σ_1	σ_1^2	
5.3.3	$\sigma_{ij}=\frac{\sigma_{ii}+\sigma_{jj}}{2}-\lambda\ \longrightarrow\ \lambda=\sigma_{ii}+\sigma_{jj}-2\sigma_{ij}$	$\mathrm{Var}(Y_i-Y_j)=\sigma_{ii}+\sigma_{jj}-2\sigma_{ij}=2\lambda$	右侧应为 2λ
5.3.3	HF 结构“存在正交变换矩阵 C，使 $C^T\Sigma C$ 满足球形假设”	$C^{\top}\Sigma C=\lambda I_{k-1}$，$C^{\top}C=I$，$C^{\top}\mathbf{1}=0$	对任意此类 C 成立
5.4.1	$\chi^2=-\Big[(n-1)-\dfrac{n-(2p^2+2)}{6p}\Big]\ln\lambda$，$\nu=\dfrac{p(p-1)}{2}-1$	$-\Big[\nu-\dfrac{2d^2+d+2}{6d}\Big]\ln W$，自由度 $\dfrac{d(d+1)}{2}-1$	与正文 R 程序一致
5.4.4	$\varepsilon=\dfrac{(\sum_{i=1}^{k}\lambda_i)^2}{(k-1)\sum_{i=1}^{k}\lambda_i^2}=\dfrac{[\mathrm{tr}(S)]^2}{(k-1)\,\mathrm{tr}(S^2)}$；“对 F 值校正”	用 $A=C^{\top}SC$ 的 $k-1$ 个特征值；F 不变，校正自由度	应对 $C^{\top}SC$ 计算

位置	易错写法或表述	本书采用	说明
5.5	$F_{\text{时间}} = \dfrac{\text{SS}_{\text{时间}}/(p-1)}{\text{MS}_{\text{误差}}/[(n-1)(p-1)]}$	分母为 $\text{SS}_{\text{误差}}/[(n-1)(k-1)]$	避免两次除以自由度
5.6.4	$C^{\top}SC$ 第 3 行第 3 列为 11.9966667	1.9966667	与 W、GG 系数一致
5.6.5	表 12-20 “自由度（校正）”	下界校正 $\varepsilon = 1/4$	非 GG 校正
5.6.5	1, 2, 12 未注明方法		
5.6.5	记号 g（组数）、m（次数）	a、k	与第 5 章统一

来源与选编依据

以下“来源”指数据、研究材料或知识点依据。除特别说明外，本册的问题、选项和解析均为配套编写；不将其标作教材原题或往年真题。各题后的编号链接到本节。公开网页核对日期为 2026 年 10 月 10 日。

[1] 本仓库《应用线性回归》第一章：矩阵知识简介

定位：矩阵和向量；矩阵运算；特征值和特征向量；例 1.1。

以用户笔记为直接范围依据；配套题为新编，未冒称教材原题。第 10 题复用例 1.1 协方差阵并另拟评析。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec1.tex

[2] Penn State STAT 505, Lesson 2: Linear Combinations of Random Variables

定位：§2.2–2.4：线性组合的均值、方差与协方差。

官方教学资料支持公式和题型设计；第 2、5 题的背景和数字均自拟，不是该课程原题。

https://online.stat.psu.edu/stat505/Lesson02

[3] NIST/SEMATECH e-Handbook §6.5.4.1: Mean Vector and Covariance Matrix

定位：Sample data matrix；Mean vector and covariance matrix for sample data matrix。

第 8 题的 5×3 原始数据与 NIST 原页一致；四个小问、R 命令排错和解析为改编。

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmc/section5/pmc541.htm

[4] 原笔记：多重线性回归——模型构建

定位：线性模型、最小二乘与最大似然、一般线性假设、区间估计、模型评价及筛选各节。

已通读正文及 ex1、ex2；这些题均为新编配套练习或案例改编，不标作往年原题。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec2.tex

[5] 孙振球主编《医学统计学》第 1 版：第 15 章例 15-1

定位：第 15 章“多元线性回归”，例 15-1，第 241—242 页；原笔记 lec2“最优子集法的 R 输出”给 27 行完整数据。

原笔记明确归属此教材例 15-1；公开节选已核对例号、27 例及变量组合。题目数值按原笔记 27 行数据独立重算，不宣称是原教材习题或已逐格核对原书数据。

https://mip.tsu.tw/xiyi/435689.html

[6] 陈峰《现代医学统计方法与 Stata 应用》肺活量案例：原笔记固定数据版本

定位：表 3.1，29 名 13 岁男童；正文资料来源标“2000，109 页”。

正文有明确书目。外部同源教程的第 16 人体重为 47.2kg，而原笔记为 32.0kg；本题明确沿用原笔记 32.0kg 版本，只使用题内充分统计量。原书版次、印次及该格原值仍待核，不能把本题输出标作原教材原值。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec2.tex

[7] Penn State STAT 501：MLR Model Evaluation

定位：6.2 The General Linear F-Test。

已读官方课程中的 full/reduced model 定义及增量 F 公式。用于知识点和命题方法，不冒称复刻其原练习。

https://online.stat.psu.edu/stat501/Lesson06

[8] R stats 官方文档：Akaike’s An Information Criterion

定位：Details：同一数据比较、响应变换、AIC 与 extractAIC 常数差异。

已核对官方文档；本题采用题干明确给出的省略公共常数的准则，数值由脚本生成。

https://www.stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/AIC.html

[9] 原笔记：多重线性回归——模型诊断与相关分析

定位：LINE 诊断、WLS、共线性、岭回归、诊断量及偏相关各节。

已通读正文及 ex1、ex2；题目限定在正文已给公式及方法内。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec3.tex

[10] NIST/SEMATECH e-Handbook：Weighted Least Squares Regression

定位：4.1.4.3，权重与误差方差的关系及已知权重的限制。

官方页面已读。仅改编其逆方差加权原则；六点校准数据为本套配套练习设定，不是 NIST 原数据。

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pmd/section1/pmd143.htm

[11] Penn State STAT 505：Testing for Partial Correlation

定位：6.3，控制 c 个变量后的 t 统计量与 $n-2-c$ 自由度。

官方公式已核，题目只使用原笔记 lec3 已讲的偏相关 t 检验，不涉及该页的 Fisher 变换。

https://online.stat.psu.edu/stat505/Lesson06

[12] R datasets 官方文档：Anscombe’s Quartet

定位：Description、Format、References、Examples；选用第 II 与第 IV 组。

官方文档指向 Anscombe(1973), The American Statistician 27(1):17–21。此题为数据案例改编，未声称原论文有本题设问。

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/datasets/html/anscombe.html

[13] R 源代码数据：anscombe.R

定位：x2、y2、x4、y4 四列，各 11 个数值。

已通过 GitHub 读取实际源数据；文件 SHA 570594eed3665e148efae11d6a3d3585586eb372。题内完整列出两组数据并独立重算。

https://github.com/wch/r-source/blob/trunk/src/library/datasets/data/anscombe.R

[14] 原笔记：一般线性模型

定位：第 4 章：完全随机设计、随机区组设计、析因设计、协方差分析。

已完整通读正文及对应 ex3.tex。本套依据已讲知识补足设问；除另行说明的设计结构外，教学数字与题干均为本套新编，不冒认教材原题或往年题。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec4.tex

[15] 倪宗瓒《医学统计学》第 2 版（原笔记转引）

定位：原笔记“析因设计方差分析”例 3：甲乙两药与红细胞增加数。

正文写第 2 版 92 页，另有 194 页批注；本轮未核原书版面，不能将两处页码当作已核来源。本套只借鉴 2×2 析因及简单效应的教学主题，不使用原书数据，也不声称有原书习题号。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec4.tex

[16] NIST/SEMATECH e-Handbook：Randomized block designs

定位：§5.3.3.2，Example of a Randomized Block Design 及 Model for a Randomized Block Design。

已核官方原页。原例为 4 种晶圆植入剂量 ×3 次炉次；SUPL4-03 改写为 4 浓度 ×3 实验日，保留完整区组结构，未借用真实生物医学结果。其他题只引用区组模型知识。

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section3/pri332.htm

[17] NIST/SEMATECH e-Handbook：Tukey's method

定位：§7.4.7.1，同时两两比较的置信区间。

已核官方方法页。SUPL4-02 的 3 组均数、方差及软件输出均为新设教学资料，已独立计算；不沿用该页的 4 组实例数值。题目仅要求判读已校正输出，不要求课外推导。

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/prc/section4/prc471.htm

[18] NIST/SEMATECH e-Handbook：Are the model residuals well-behaved?

定位：§5.2.4，误差假设与残差诊断。

官方页面直接支持通过残差检查误差假设；本套问题为知识点配套，未摘录原页习题。

https://www.itl.nist.gov/div898/handbook/pri/section2/pri24.htm

[19] Penn State STAT 502：ANCOVA Part I

定位：Lesson 9，§9.1 ANCOVA in the GLM Setting 及 §9.2 Steps in ANCOVA。

官方检索正文可核共同斜率、斜率比较及修正均数主题；直接打开曾返回 502。本套 12 例数据为独立新编，并非该课例题数据；标准误公式另以本笔记第 4 章推导为直接依据。

https://online.stat.psu.edu/stat502/Lesson09

[20] UCLA OARC：Decomposing, Probing, and Plotting Interactions in R

定位：Main vs. Simple effects (slopes) 及 Categorical by Categorical。

已核官方原页：区分简单效应及简单效应差的检验。本套析因数值独立新编，未沿用其 900 人模拟减重资料。

https://stats.oarc.ucla.edu/r/seminars/interactions-r/

[21]《应用线性回归》第 5 章：重复测量资料的方差分析（仓库讲义）

定位：重复测量资料 / 经常误用的统计分析方法；常用分析方法；协方差结构；多组重复测量资料的方差分析与结果解释。

本章知识点依据。沿用讲义定义：原始协方差的球形结构指 sigma^2 I；HF 结构指对比空间的广义球形性。HF 结构与 HF 自由度校正不同。本批题未把二者混称。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/lec5.tex

[22] UCLA OARC: How can I use LMATRIX and MMATRIX to perform custom contrasts in a repeated measures ANOVA?

定位：开头 s, a, y1, y2, y3, y4 的 8 人数据表；Simple effect contrasts: differences of differences 节。

据网页明列的 8 人数据自行计算均数后改编。该表的两组 y2 均数为 4、3，y4 均数为 8、10，差中差为 3。网页末段另写 3.5，且其代入均数与该原始表不符；本题没有照抄这一错误。该数据按官方教学示例标注，未声称是真实临床实测。

https://stats.oarc.ucla.edu/spss/faq/how-can-i-use-lmatrix-and-mmatrix-to-perform-custom-contrasts-in-a-repeated-measures-anova/

[23] R stats 官方手册：p.adjust —Adjust P-values for Multiple Comparisons

定位：Details（Holm 方法及家族错误率）；References: Holm S. (1979), Scandinavian Journal of Statistics 6:65–70。

方法依据；SUPL5-03 的三个 P 值是题内明确标注的教学设定，不是手册或某项研究的实测结果。

https://stat.ethz.ch/R-manual/R-devel/library/stats/html/p.adjust.html

[24] 仓库 ex4.tex，C20-4：家兔血钾的重复测量与综合指标

定位：C20-4，15 只家兔、3 组、0/0.5/1/2 小时血钾表；本题取原表第 1、3 组的处理前及 2 小时列。

10 只兔的 20 个血钾值逐值沿用仓库表，原笔记未注明物理单位，保留原表数值量尺。新问题为预设的 0 至 2 小时变化量比较，与原题的完整 RM ANOVA 及第 1/2 组 AUC 问题不同。公开课件同表是数据来源线索，尚未确定最早教材出处。

https://github.com/fxt-gw-pb/public-health-statistics-notes/blob/2d799e0af68ae6a472a44f25aefbeec8cb59a1e1/notes/linear/content/ex4.tex

[25]《医学研究方法》公开课件：15 只家兔血钾表（转载资料）

定位：例 10、表 21；3 组各 5 只兔，0、0.5、1、2 小时血钾。

先前来源追溯已核到全部 60 个数值与仓库同表。仅列为同源课件的旁证；不将转载站、课件标注或题号作为最早原作者的证明。

https://www.renrendoc.com/paper/535897605.html

[26] UCLA OARC: Repeated Measures Analysis using SAS

定位：Demo Analysis #4：Between Subjects Effects / Within Subject Effects 两张表；Further Issues（Missing Data）；后续 PROC MIXED 与实际时间示例。

SUPL5-08 保留 Demo #4 已公开的平方和与自由度，只把 F 值挖空并增加解释题。依据这些充分统计量重算 F 和 P，不推造个体内协方差。SUPL5-07 仅采用方法线索，其访视安排和缺失情境明确为教学设定。

https://stats.oarc.ucla.edu/sas/seminars/sas-repeatedmeasures/

[27] Rueda R, Sabatel JL, Maldonado J, Molina-Font JA, Gil A. Addition of gangliosides to an adapted milk formula modifies levels of fecal Escherichia coli in preterm newborn infants. J Pediatr. 1998;133(1):90–94.

定位：pp.90–91 Subjects and Experimental Design；p.91 Table II 及表注；p.92 Statistical Analysis、Results 末段（E. coli 阳性阈值）；p.93 图 2。DOI:10.1016/S0022-3476(98)70184-2。

已逐页阅读完整 5 页原论文。第 7 天 MF 组 E. coli 为 8.62±0.64（mean±SEM），每组 20 份样本。初始 43 人，完成 40 人；第 3 天与第 7/30 天的 E. coli 阳性阈值不同。论文没有提供个体内协方差，本批题不从边际 SEM 推造交互检验或 P 值。

https://taiwan.wyethnutritionsc.org/sites/default/files/2020-04/Rueda_preterm%20study%201998.pdf

按题号查看选编理由

第 1 章矩阵知识简介

题 1.1 相关阵的可行性：将本章半正定定义转化为数据结果的合理性检查。

题 1.2 两个线性组合的协方差：补足两个线性组合之间的协方差，区别于原讲义的标准化均值方差。

题 1.3 矩阵逆的运算顺序：覆盖矩阵运算、维数和逆的顺序，为回归正规方程作准备。

题 1.4 正交变换的性质：沿用原题的罗马数字组合单选题，区分一般正交变换与谱分解。

题 1.5 均数差的方差：将个体内协方差与样本均值的 1/n 缩放区分开，为重复测量作铺垫。

题 1.6 样本协方差阵的秩：把数据矩阵的维数、中心化和可逆条件联系起来。

题 1.7 不相关、独立与可逆：使用与讲义 X 及 X 平方不同的离散例，同时检查独立性与矩阵秩。

题 1.8 由原始数据填写矩阵输出：保留原始数据和 R 命令读写形式；覆盖均数、L、S、R 四个对象的相互关系。

题 1.9 特征值、线性组合与逆矩阵：把本章谱分解与后续共线性联系起来，计算仍限于二阶矩阵。

题 1.10 学生体格资料的分析报告评析：复用用户熟悉的 12 名学生资料，但改考完整分析文字的评析，而不是重复原有平均分方差。

第 2 章多重线性回归：模型构建

题 2.29 参数线性：补足“对参数线性”的实际识别；原选择题主要考模型意义、相关系数和筛选。

题 2.30 误差方差的两种估计：教材案例用于估计原理，而不是重复原逐步筛选问题。

题 2.31 联合变化的标准误：补足回归系数线性组合及协方差交叉项；不是比较标准化系数大小。

题 2.32 响应单位与模型比较：从响应尺度解释 AIC 的公共常数，区别于原题的自变量单位变换。

题 2.33 四个新个体的平均响应：把正文的均值响应/个体预测公式扩展为 4 个独立新个体的均值，考查方差来源而非重复记忆两个区间。

题 2.34 最小二乘结论的条件：用 I/II/III 形式考查假设分别支撑哪些结论，较原 LINE 识别题更深入。

题 2.35 两个约束的联合检验：补足一般线性约束到简化设计矩阵的转换，区别于只删一个变量的偏 F 题。

题 2.36 糖尿病资料的增量检验：对已定位教材数据提出联合增量检验与选择准则比较，避免重复正文逐步回归操作。

题 2.37 肺活量的两个差值区间：从已有肺活量案例转向两预测响应之间的协方差及个体差值，区别于原输出填空和单点区间题。

题 2.38 缺失值后的模型比较：补充原题未充分练习的缺失值与 AIC 可比性；缺失场景为教学构造，非对原教材作者的评判。

第 3 章多重线性回归：模型诊断与相关分析

题 3.51 响应换算与诊断量：通过尺度不变性检验对各诊断量定义的理解，区别于旧题直接辨认其名称/分布。

题 3.52 两两相关与完整共线性：由具体可实现的相关阵识别多变量线性依赖，避免只套 VIF 或条件指数经验阈值。

题 3.53 任意排序下的 DW 值：以可复现的排序反例说明 DW 的适用对象，区别于旧题只计算一个残差向量的 DW。

题 3.54 逆方差权重：补充正文提出而原习题尚少练习的 WLS 实际权重设置。

题 3.55 偏相关检验的自由度：补足偏回归/偏相关的有效自由度问题，区别于原题仅计算或解释控制智商后的相关。

题 3.56 岭回归的特征方向：用正文的谱分解解释岭回归，不重复原相关阵求逆求系数题，也不引入额外调参算法。

题 3.57 三种异方差处理的目标：比较处理方法对估计对象的影响，较原稳健标准误选择题多一层实际决策。

题 3.58 留一预测残差：将已定位教材案例用于 PRESS 计算和高杠杆的样本外误差，区别于原 Cook/离群阈值计算题。

题 3.59 校准资料的加权拟合：完整的小数据练习让读者实际构造 WLS，并比较两种残差目标；原题中没有这类操作。

题 3.60 相近摘要下的两组资料：引入已核官方完整数据的 Anscombe II/IV，对照均值错设与单点支撑设计；超越旧题的阈值套用但只用正文线性模型与杠杆知识。

第 4 章一般线性模型

题 4.52 非等样本量下的和为零约束：原补充题只考等样本量的参照编码；本题考不等样本量时约束对应的平均对象。

题 4.53 Tukey 比较中的未检出差异：正文小鼠例中三对比较全部显著；本题补充仅一对显著时的判读，避免把未拒绝当等效。

题 4.54 完整区组内如何随机化：把原题仅考误差自由度扩展为实际随机化安排；保留 NIST 四处理、三区组结构并换为体外实验背景。

题 4.55 区组模型的含义与正交性：补充区组变量的错误数值编码，并考顺序平方和受顺序影响这一一般结论的正交设计例外。

题 4.56 一个简单效应显著而另一个不显著：原析因题直接计算较强的协同交互；本题专门纠正用两个显著性结论替代交互检验的常见错误。

题 4.57 修正均数差的标准误：原协方差题重在模型选择和组差解释；本题补修正均数差的不确定性，直接使用正文已推导公式。

题 4.58 方差分析究竟要求什么正态：补正态假设对象的辨析，避免将解释变量或合并 Y 分布与条件误差混淆；未增加新模型。

题 4.59 实验日区组与预设处理比较：原区组习题只有自由度选择；本题新增自足数据的变异分解、单个预设对比区间及忽略区组的误差代价。

题 4.60 小样本协方差分析的完整核算：针对原 C20-3/C21-3 原始数据缺失的问题提供明确标为新编的完整练习；重点补模型比较分母、组内共同斜率及组差区间，而非冒充补回原卷。

题 4.61 平均主效应为零能否判定方案无效：与原两药题的各效应均显著、同向协同场景不同，本题设计为交叉交互和零平均主效应，训练评价错误研究结论。

第 5 章重复测量资料的方差分析

题 5.32 组间差异的变化：练习组 × 时间交互的一个预设对比，把组间差异与组间差异的变化区分开。

题 5.33 随机截距与个体内差值：用可计算的误差模型说明个体内差值为什么扣除了对象间异质性，与误差分层相衔接。

题 5.34 与基线比较的多重性：补充讲义所强调的预设比较与多重性，避免把正确的配对方法误当成已经控制全部 I 类错误。

题 5.35 不等间隔的变化率对比：利用原资料不等间隔的设计，补充有明确科学含义的个体内对比；未重复原题 AUC。

题 5.36 SEM 能说明什么：把文献中 SEM 的解释接到重复测量协方差问题，防止从边际汇总表反推不存在的配对信息。

题 5.37 正交对比与独立性：补充单一预设对比与多自由度总体时间检验的假定差别，并检验正交和统计独立的边界。

题 5.38 漏访与实际时间不一致：作为重复测量 ANOVA 的适用范围题，要求指出何时考虑讲义已介绍的混合模型；不要求超出课程的估计推导。

题 5.39 重复测量输出的误差分层：直接覆盖本章主线：组间/组内误差、相应 F 分布、交互与主效应解释以及有目的的简单效应比较。

题 5.40 比较预设的 0 至 2 小时变化量：在既有真实表格上新增一个有方向、单自由度的组 × 时间对比；使用 Welch 方法承认两组变化量方差差异，避免机械重复 AUC 或完整 ANOVA。

题 5.41 重复测量文献的分析目标与结局定义：同一原论文的新问题聚焦交互假设、协方差信息、随访结局定义的一致性和完成病例限制，避开原题已考的阳性 2×2 卡方、AUC 及泛泛方法点评。