

Solutions to homework 5:

1. Solutions

- (a) $u_1 = \frac{4}{3}, u_2 = \frac{10}{7}, u_3 = \frac{24}{17}$
- (b) *Proof*

Proof by Induction:

Base Case: $n = 0, u_0 = 2$ so $1 \leq u_0 \leq 2$. Base case holds.

I.H. for $k \geq 0, 1 \leq u_k \leq 2$

I.S.

► Lower Bound

$$u_k \geq 1 \quad \text{By I.H.}$$

$$u_k + 2 \geq u_k + 1$$

$$\frac{u_k + 2}{u_k + 1} \geq 1 \quad \text{By I.H. } u_k + 1 > 0$$

$$u_{k+1} \geq 1$$

► Upper Bound

$$u_k \leq 2 \quad \text{By I.H.}$$

$$u_k + 2 \leq 2u_k + 2$$

$$\frac{u_k + 2}{u_k + 1} \leq 2 \quad \text{By I.H. } u_k + 1 > 0$$

$$u_{k+1} \leq 2$$

Hence, by induction $1 \leq u_k \leq 2$.

2. Solution

• Proof by Induction:

► **Base Case:** $n = 1, 1^{\frac{1+1}{2}} = 1^3, 1 = 1$. Base case holds.

► **I.H.**

$$\sum_{k=1}^{\ell} k^3 = \left(\frac{\ell(\ell+1)}{2} \right)^2$$

► **I.S.**

$$\begin{aligned}
\sum_{k=1}^{\ell} k^3 &= \left(\frac{\ell(\ell+1)}{2} \right)^2 \\
\sum_{k=1}^{\ell} k^3 + (\ell+1)^3 &= \left(\frac{\ell(\ell+1)}{2} \right)^2 + (\ell+1)^3 \\
\sum_{k=1}^{\ell+1} k^3 &= \frac{\ell^2(\ell+1)^2 + 4(\ell+1)^3}{4} \\
&= \frac{(\ell+1)^2(\ell^2 + 4\ell + 4)}{4} \\
&= \frac{(\ell+1)^2(\ell+2)^2}{4} \\
&= \left(\frac{(\ell+1)(\ell+2)}{2} \right)^2
\end{aligned}$$

Hence by induction $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{k=1}^{\ell} k^3 = \left(\frac{\ell(\ell+1)}{2} \right)^2$.

3. • **Proof by Induction:**

► **Base Case:** $n = 1, \frac{1}{1} \leq 2 - 1, 1 \leq 1$. Base case holds.

► **I.H.**

$$\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} < 2 - \frac{1}{k}$$

► **I.S.**

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} &< 2 - \frac{1}{k} \\
\sum_{i=1}^k \frac{1}{i^2} + \frac{1}{(k+1)^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{(k+1)^2} \\
\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \frac{1}{k+1} \\
\sum_{i=1}^{k+1} \frac{1}{i^2} &< 2 - \frac{1}{k} + \frac{2}{k+1} \\
&< 2 + \frac{-(k+1) + 2k}{k(k+1)} \\
&< 2 + \frac{k}{k(k+1)} - \frac{1}{k(k+1)} \\
&< 2 + \frac{k}{k(k+1)} \\
S_{k+1} &< 2 + \frac{1}{k+1}
\end{aligned}$$

Hence by induction $\forall n \in \mathbb{N}, \sum_{i=1}^n \frac{1}{i^2} \leq 2 - \frac{1}{n}$

4. • Solutions

(a) $u_{n+1} - 5^2 \cdot u_n = -17 \cdot 2^{3n+1}$

(b) *Proof*

Proof by Induction

Base Case $n = 0, 3 \cdot 5^{0+1} + 2^{0+1} = 17$ and $17 \pmod{17} = 0$. Base case holds.

I.H. $\forall k \in \mathbb{Z}, k \geq 0, u_k = 3 \cdot 5^{2k+1} + 2^{3k+1}$ s.t. $17 \mid u_k$.

Lemma: $\forall k \in \mathbb{N}, u_{n+1} = -17 \cdot 2^{3n+1} + 5^2 \cdot u_n$

I.S.

$$\begin{aligned}
u_{k+1} &= -17 \cdot 2^{3n+1} + 5^2 \cdot u_k && \text{By Lemma} \\
&= -17 \cdot 2^{3n+1} + 5^2 \cdot 17i && \text{By I.H. and } i \in \mathbb{Z} \\
&= 17(-2^{3n+1}) + 17(5^2 \cdot i) \\
&= 17(-2^{3n+1} + 5^2 \cdot i) \\
&= 17\ell && \ell \in \mathbb{Z}
\end{aligned}$$

Hence by induction, $17 \mid u_n$.

5. Proof by Induction

Base Case $n = 1, 2^{1^2} > 1!$ so $2 > 1$. Base case holds.

I.H. $\forall k \in \mathbb{N}, 2^{k^2} > k!$.

• **Sub Induction:** $\forall t \in \mathbb{N}, 2^{2t+1} > (t+1)$

Base Case: $t = 1, 2^{2(1)+1} > 2$. Base case holds.

I.H. $\forall s \in \mathbb{N}, 2^{2s+1} > (s+1)$

I.S.

$$2^{2s+1} > (s+1)$$

$$2 \cdot 2^{2s+1} > 2(s+1)$$

$$2^{2s+2} > 2s+2$$

$$2^{2s+2} > s+2$$

Thus if $P(s)$ then $P(s+1)$.

Hence by induction, $\forall t \in \mathbb{N}, 2^{2t+1} > t+1$

Lemma: $\forall k \in \mathbb{N}, 2^{2k+1} > k+1$

I.S.

$$2^{k^2} > k!$$

$$2^{k^2} \cdot (k+1) > k! \cdot (k+1) \quad k \geq 1$$

$$2^{k^2} \cdot 2^{2k+1} > 2^{k^2} \cdot (k+1) > (k+1)! \quad \text{By Lemma}$$

$$2^{k^2+2k+1} > (k+1)!$$

$$2^{(k+1)^2} > (k+1)!$$

Thus if $P(k)$ then $P(k+1)$

Hence by induction, $\forall n \in \mathbb{N}, 2^{n^2} > n!$