Prissättning av Statsobligationer

OU-processen, Vasicek-modellen och Historisk data

Viggo Forsman · Carl Gustaf Bril · Hjalmar Lindström · Gabriel Svärdson Wächter

SF1693 Analytiska och Numeriska Metoder för Partiella Differentialekvationer och Transformer · VT 2026

Abstract

1. PROBLEMFORMULERING

En statsobligation är ett lån till staten där investeraren betalar ett pris idag och får tillbaka ett bestämt belopp vid förfallodatumet T, oftast tillsammans med löpande ränteutbetalningar (kuponger) under tiden. I det här projektet studerar vi det enklaste fallet, en nollkupongsobligation som bara betalar ut beloppet vid förfall. Priset $P(r, \tau)$ beror på räntan r och hur lång tid som är kvar till förfall, $\tau = T - t$.

Räntan spelar roll eftersom investeraren alltid har ett alternativ: att istället sätta in pengarna på ett riskfritt bankkonto, som växer med den riskfria räntan r. För att en obligation ska vara värd att köpa måste den ge minst lika mycket som banken, annars skulle ingen välja den. Priset idag motsvarar alltså det belopp man skulle behöva sätta in på banken nu för att vid tid T ha exakt det utlovade beloppet. Ju högre ränta och ju längre tid kvar till förfall, desto lägre pris.

Problemet är att räntan ändrar sig hela tiden och vi vet inte vad den blir i framtiden. Eftersom statsobligationer handlas för enorma belopp på världens marknader är det viktigt att kunna prissätta dem korrekt, små prisfel får stora konsekvenser för både investerare och stat.

Målet med projektet är att härleda och lösa en modell för att prissätta nollkupongsobligationer när räntan är stokastisk.

2. MODELLERING

Aktiekurser modelleras oftast som en geometrisk Brownsk rörelse. En aktie saknar naturlig nivå att återvända till, det finns ingen ekonomisk mekanism som drar priset mot ett specifikt värde, eftersom aktiens "rätta" nivå i sig förändras med bolagets framtida kassaflöden.

Vi modellerar istället den korta räntan r_t, den hypotetiska räntan vid tid t på ett lån vars löptid går mot noll. Den observeras inte direkt, men approximeras av räntor på korta statsobligationer med några månaders löptid (statsskuldväxlar). Den korta räntan delar grundidén att rörelser kan beskrivas med en stokastisk term driven av en Brownsk rörelse, men skiljer sig på en avgörande punkt: den har en naturlig nivå att återvända till. Empiriskt rör sig räntor tillbaka mot en långsiktig nivå istället för att driva iväg. Detta beror på penningpolitiken — centralbanker som Riksbanken och ECB har explicita inflationsmål (oftast två procent) och styr den korta räntan för att hålla inflationen nära målet. Det är denna egenskap, *mean reversion*, som gör Ornstein–Uhlenbeck-processen till en naturlig utgångspunkt.

Denna modellering låter oss härleda en partiell differentialekvation för obligationspriset $P(r,t)$ som sedan kan lösas på flera sätt. Vi löser den först analytiskt med en smart ansats, sedan med Monte Carlo-simuleringar och slutligen med finita differensmetoden över ett rutnät.

3. SLUTSATS

Vi härledde en analytisk lösning till Vasicek-PDE:n med en smart ansats, och både Monte Carlo ($\mathcal{O}(N^{-1/2})$) och finita differensmetoden ($\mathcal{O}(h^2)$) konvergerar mot den. När vi kalibrerade modellen mot svenska och indiska 10-åriga statsobligationsräntor 2020–2026 fick vi tydligt olika parametrar för de två länderna, vilket är väntat eftersom räntemiljöerna ser så olika ut. För Sverige fungerar modellen bra när styrräntan ligger nära jämviktsnivån, men vid räntetoppen 2024 gick det sämre: räntan ändrades för snabbt och kraftigt för att modellen skulle hinna med. Det är Vasicek-modellens stora begränsning.

OU-processen

MEAN-REVERTING PROCESS

Vi modellerar korträntan r_t som en Ornstein–Uhlenbeck-process. Processen beskrivs av en stokastisk differentialekvation där en liten förändring i räntan dr_t ges av två bidrag över ett kort tidssteg dt. Driftstermen $\theta(\mu - r_t)\,dt$ är proportionell mot avståndet till jämviktsnivån μ och drar räntan tillbaka mot μ med en hastighet som bestäms av θ. Diffusionstermen $\sigma\, dW_t$ tillför slumpmässiga störningar via en Brownsk rörelse W_t, där dW_t representerar en liten oförutsägbar förändring under tidssteget dt och σ styr störningens amplitud. För varje fixt t är r_t normalfördelad: väntevärdet närmar sig μ exponentiellt och variansen växer mot ett stationärt värde $\sigma^2/(2\theta)$, oberoende av startvärdet. Räntan svänger alltså kring μ utan att driva iväg på sikt, vilket kallas *mean reversion*.

$$dr_t = \theta(\mu - r_t)\,dt + \sigma\, dW_t$$

Fokker–Planck-satsen säger att tätheten $p(r,t)$ för r_t uppfyller en deterministisk PDE som beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid:

$$\partial_t p = -\partial_r(\theta(\mu - r)p) + (\sigma^2/2)\,\partial_{rr} p$$

r_t: räntans värde vid t. r_0: begynnelsevärde. θ: återgångshastighet. μ: långsiktigt medelvärde. σ: brusets styrka. W_t: Brownsk rörelse.



Tätheten $p(x,t)$ för OU-processen. SDE:n beskriver enskilda banor; PDE:n beskriver hur sannolikhetsfördelningen utvecklas över tid.

Data och parameterskattning

Data. Vasicek-modellen är formulerad i termer av korträntan r_t, men i praktiken finns ingen direkt observerbar motsvarighet. Strikt sett bör r_t approximeras med kortfristiga instrument som statsskuldväxlar, men dessa har glest med data och domineras av Riksbankens styrräntebeslut. Vi använder istället räntan på 10-åriga statsobligationer utgivna av svenska respektive indiska staten, mätt en gång i veckan under perioden 2020–2026 och hämtad från *investing.com*. Detta ger längre och renare data. Värdena $\{r_k\}$ har tidssteg $\Delta t \approx 7$ dagar och uttrycks i procent per år. Länderna är valda för att representera två olika räntemiljöer.

Skattning. Vid jämna tidssteg Δt följer OU-processens samplade värden $\{r_k\}$ exakt en autoregressiv process av ordning ett, alltså är varje nytt värde är en linjär funktion av det föregående plus en oberoende gaussisk slumpterm:

$$r_{k+1} = \alpha + \beta\, r_k + \varepsilon_k, \quad \varepsilon_k \sim \mathcal{N}(0, s^2) \text{ oberoende.}$$

Koefficienterna (α, β, s^2) skattas via minsta-kvadratmetoden: vi minimerar $\Sigma_k\,(r_{k+1} - \alpha - \beta r_k)^2$ i α och β, och tar s^2 som stickprovsvariansen av residualerna ε_k. För att återfå parametrarna θ, μ, σ i OU-processen utnyttjar vi att processen har en analytisk lösning där koefficienterna kan identifieras som funktioner av α, β och s^2:

$$\theta = -\ln \beta \,/\, \Delta t, \quad \mu = \alpha \,/\, (1-\beta), \quad \sigma = \sqrt{(\, s^2 \cdot 2\theta \,/\, (1-e^{-2\theta\Delta t})\,)}.$$

För **Sverige** hittar vi $\theta \approx 0{,}358$, $\mu \approx 2{,}83$ %, $\sigma \approx 0{,}80$ %, och för **Indien** $\theta \approx 0{,}489$, $\mu \approx 6{,}80$ %, $\sigma \approx 0{,}50$ %. Dessa kalibrerade värden används som indata i de efterföljande Monte Carlo- och FDM-experimenten.

Vasicek-modellen

HÄRLEDNING AV OBLIGATIONSPRISET

1 — Bankkonto

En riskfri investering växer med den korta räntan r_s. Vid konstant ränta gäller $B_t = e^{rt}$, men med stokastisk ränta generaliseras detta till en integrerad tillväxtfaktor:

$$B_t = e^{\int_0^t r_s\, ds}$$

Bankkontot fungerar som numeraire, vilket betyder att vi uttrycker alla andra tillgångars priser relativt B_t istället för i kronor. Detta gör diskontering naturlig: en framtida utbetalning omvandlas till dagens värde genom division med B_t.

2 — Korträntа (OU)

Vasicek antar att korträntan r_t följer en Ornstein–Uhlenbeck-process. Parametern θ styr återgångshastigheten, μ är det långsiktiga jämviktsläget och σ är volatiliteten:

$$dr_t = \theta(\mu - r_t)\,dt + \sigma\, dW_t^{*}$$

* Strikt sett gäller detta under ett justerat sannolikhetsmått Q som kompenserar för investerares riskaversion. Vi skattar parametrarna direkt från historisk data och bortser från denna justering.

3 — FTAP

Om 1 kr på bankkontot idag är värd $e^{\int_0^T r_s\, ds}$ kr vid tid T, så är 1 kr vid tid T värd $e^{-\int_0^T r_s\, ds}$ kr idag. En nollkupongsobligation betalar ut precis 1 kr vid förfall T, så priset idag bör vara väntevärdet av denna diskonterade utbetalning. Finansens fundamentalsats (FTAP) formaliserar detta:

$$P(t,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\, ds} \,\middle|\, \mathcal{F}_t \right]$$

$\mathcal{F}_t$ representerar all tillgänglig information vid tid t. Eftersom vi antar att r_t är en Markov-process finns all relevant information samlad i nuvarande räntan r_t, så vi kan ersätta $\mathcal{F}_t$ med r_t:

$$P(t,T) = \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\, ds} \,\middle|\, r_t \right]$$

4 — Feynman–Kac

Feynman–Kac-satsen kopplar ett stokastiskt väntevärde av denna form till en deterministisk PDE. Om r_t följer $dr_t = a(r_t)\,dt + \sqrt{b(r_t)}\,dW_t$ och vi definierar

$$u(t,r) := \mathbb{E}\left[e^{-\int_t^T r_s\, ds} \,\middle|\, r_t = r \right]$$

så löser u bakåt-PDE:n

$$\partial_t u + a(r)\,\partial_r u + \tfrac{1}{2}\, b(r)\,\partial_{rr} u - ru = 0$$

med terminalvillkor $u(T,r) = 1$.

5 — Vasicek-PDE

Eftersom $P(t,T) = u(t, r_t)$ sätter vi in OU-processens koefficienter $a(r) = \theta(\mu - r)$ och $b = \sigma^2$ i Feynman–Kac-PDE:n. Detta ger Vasicek-PDE:n som obligationspriset P måste uppfylla:

$$\partial_t P + \theta(\mu - r)\partial_r P + \tfrac{1}{2}\sigma^2 \partial_{rr} P - rP = 0$$

Denna PDE löses analytiskt via en smart ansats och sedan numeriskt via Monte Carlo-simulering och finita differensmetoden på ett rutnät. De numeriska lösningarna jämförs mot den analytiska för att verifiera korrekt konvergens.

RESULTAT OCH KONVERGENS



Sverige: analytisk.



Sverige: Monte Carlo-simulerad obligationsyta.



Sverige: FDM-lösning (finita differenser).

ANALYTISK LÖSNING

Ansats. Eftersom Vasicek-PDE:n är linjär i r provar vi

$$P = \exp(A(t) - B(t)\,r)$$

Insättning ger en ekvation av formen [...] + [...]·r = 0 som måste gälla för alla r. Genom att kräva att konstantdelen och r-delen var för sig är noll får vi två ODE:er, en för varje okänd funktion:

$$dB/dt = \theta B - 1, \quad B(T) = 0$$
$$dA/dt = \theta\mu B - \tfrac{1}{2}\sigma^2 B^2, \quad A(T) = 0$$

Lösning. Med $\tau = T - t$ och $R_\infty = \mu - \sigma^2/(2\theta^2)$ (långsiktig avkastning):

$$B = (1 - e^{-\theta\tau})/\theta$$
$$A = (B - \tau)R_\infty - \sigma^2 B^2/(4\theta)$$

MONTE CARLO-KONVERGENS

Vi kör Monte Carlo-metoden för ett antal olika N = [100, 200, 300, 500, 1 000, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000] och beräknar max-felet över hela nätet jämfört med den analytiska lösningen. Eftersom Monte Carlo är stokastisk tar vi medelvärdet av max-felet över 10 oberoende simulationer för varje N. RMS-felet kan användas för en mindre pessimistisk uppskattning. I en log-log-plot ser vi att lutningen är −½, vilket ger konvergensordning ½.



Konvergens för Monte Carlo-metoden mot analytisk Vasicek-lösning.

FINITA DIFFERENSMETODEN - KONVERGENS

FDM-lösaren körs på en sekvens av rutnät där Δr och Δt halveras successivt. Log-log-diagrammet följer referenslinjen med lutning 2 nära, med maxfel som går från $\approx 10^{-5}$ på det grövsta rutnätet till $\approx 10^{-9}$ på det finaste, vilket bekräftar $\mathcal{O}(h^2)$-konvergens.



Sverige 10Y: maxfel FDM vs. analytisk som funktion av Δr.

Diskussion

VASICEK-MODELLEN VS. MARKNADSDATA OCH JÄMFÖRELSE MED INDIEN



Vasicek-implicerade obligationspriser $P(r,\tau)$ jämfört med svenska statsobligationspriser från Riksbanken vid tre tidpunkter.



Indien: analytisk Vasicek-yta $P(r,\tau)$ med indiska parametrar.

Vasicek-modellen mot marknadsdata. Plotten ovan jämför Vasicek-priserna för Sverige med Riksbankens marknadsdata, omräknade till diskonteringsfaktorer via $P = e^{-y\tau}$. När styrräntan ligger nära modellens långsiktiga jämvikt $R_\infty \approx 2{,}80\%$, som i april 2026 ($r_0 = 2{,}00\%$), följer modellen marknaden mycket väl. I juni 2022 ($r_0 = 0{,}00\%$) går det också hyfsat: vi befann oss i efterdyningarna av coronapandemin, då Riksbanken hade sänkt styrräntan till noll för att stötta ekonomin under nedstängningarna. Inflationen hade redan börjat skena men räntehöjningarna hade inte hunnit slå igenom. Modellen prissätter obligationerna något för högt eftersom den drar räntan långsamt tillbaka mot $R_\infty \approx 2{,}80\%$, medan marknaden redan prisade in en betydligt snabbare normalisering uppåt.

Vid årsskiftet 2024 ($r_0 = 4{,}00\%$) går det sämre. Räntan stod på sin topp efter en av de snabbaste höjningscyklerna i modern historia, där centralbankerna höjde aggressivt för att få ned den höga inflationen 2022–2023. Marknaden förväntade sig snabba sänkningar tillbaka mot normala nivåer. Vasicek-modellen antar däremot en konstant återgångshastighet θ och drar därför räntan långsamt mot R_∞, vilket gör att modellen prissätter obligationerna för lågt jämfört med marknaden.

Den underliggande begränsningen är densamma i båda fallen: modellen antar en konstant θ och en fix jämviktsnivå μ, men i verkligheten är båda rörliga mål som centralbanker justerar efter omständigheterna. Modellen kan därför inte fånga regimskiften eller den typen av kraftiga, händelsedrivna räntejusteringar som präglat det senaste decenniet.

Sverige vs. Indien. Ytan nedan visar samma analytiska Vasicek-pris men med indiska parametrar ($\theta \approx 0{,}489$, $\mu \approx 6{,}80\%$, $\sigma \approx 0{,}50\%$). Det högre θ-värdet ger snabbare mean reversion: faktorn $B(\tau) = (1 - e^{-\theta\tau})/\theta$ mättas tidigare, vilket gör att priset avtar brantare med löptiden τ, stabiliseras på en lägre nivå och blir mer okänsligt för den initiala räntan, ytan blir därmed mer parallell med r-axeln. Det högre μ förskjuter dessutom hela prisytan nedåt eftersom de långsiktiga räntorna är systematiskt högre i Indien.

Skillnaderna speglar grundläggande olikheter mellan ekonomierna. Indien har historiskt haft högre inflation än Sverige, och centralbanken (RBI) håller därför en högre styrränta för att hålla inflationen i schack. Det högre θ-värdet betyder att räntan i genomsnitt rör sig snabbare tillbaka mot jämviktsnivån när den avvikit, vilket är konsistent med en mer aktiv penningpolitik där centralbanken justerar styrräntan oftare och i större steg.

Datakälla: *investing.com* — historiska 10-åriga statsobligationsräntor, Sverige & Indien (2020–2026). Parametrar skattade via AR(1)-anpassning med minsta-kvadratmetoden.