

1 ejercicio serie de fourier

Definición

Si $f(t)$ es una función periódica de periodo $T = \frac{2\pi}{w}$, que puede expresarse como una serie de Fourier, entonces esa serie está dada por:

$$f(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} [a_n \cos(nwt) + b_n \sin(nwt)] \quad (1)$$

donde los coeficientes están dados por la fórmula de Euler


$$a_0 = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) dt \quad (2)$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \cos(nwt) dt \quad (3)$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \sin(nwt) dt \quad (4)$$

para $n = 1, 2, \dots$,

EJEMPLO Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la siguiente función periódica.



$$f(t) = \begin{cases} 0 & -\pi < t < 0 \\ t^2 & 0 \leq t < \pi \end{cases}$$

$$f(t + T) = f(t), \quad T = 2\pi.$$

Solución: Usando las ecuaciones (2), (3) y (4) tenemos que:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) dt \\ &= \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) dt = \frac{\pi^2}{3} \end{aligned}$$

Para $n = 1, 2, \dots$, tenemos:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \cos(nwt) dt \Rightarrow a_n = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \cos\left(n \frac{2\pi}{2\pi} t\right) dt$$

sustituyendo $f(t)$ y usando integración por partes, tenemos

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} t^2 \cos nt dt = \frac{1}{\pi} \frac{1}{n^3} \left[n^2 t^2 \sin nt - 2 \sin nt + 2nt \cos nt \right]_0^{\pi} \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{n^3} \left[n^2 \pi^2 \sin n\pi - 2 \sin n\pi + 2n\pi \cos n\pi - 0 \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{n^3} 2n\pi \cos n\pi = 2 \frac{(-1)^n}{n^2}, \quad \text{sen } n\pi = 0, \quad n \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Metodo de tabulacion

Derivadas	signo	Integraciones	Términos
e^{2x}			
x^2	+	$\frac{1}{2}e^{2x}$	$+ (x^2) \left(\frac{1}{2}e^{2x}\right)$
$2x$	—	$\frac{1}{4}e^{2x}$	$- (2x) \left(\frac{1}{4}e^{2x}\right)$
2	+	$\frac{1}{8}e^{2x}$	$+ (2) \left(\frac{1}{8}e^{2x}\right)$
0	—		

$$\int x^2 e^{2x} dx = \frac{1}{2} x^2 e^{2x} - \frac{1}{2} x e^{2x} + \frac{1}{4} e^{2x}$$

Ahora calculemos b_n , similarmente

$$\begin{aligned} b_n &= \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \text{sen}(nwt) dt = \frac{2}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) \text{sen}\left(n \frac{2\pi}{2\pi} t\right) dt \\ &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{\pi} t^2 \text{sen}\left(n \frac{2\pi}{2\pi} t\right) dt \end{aligned}$$


$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{n^3} \left[-n^2 t^2 \cos nt + 2(\cos nt + nt \sen nt) \right]_0^\pi \\
 &= \frac{1}{\pi} \frac{1}{n^3} [-n^2 \pi^2 \cos n\pi + 2 \cos n\pi - 2] \\
 &= \frac{(-1)^{n+1} \pi}{n} + \frac{2}{\pi n^3} ((-1)^n - 1)
 \end{aligned}$$

Así $f(t)$ se representa como una serie de Fourier como:

$$f(t) = \frac{\pi^2}{6} + \sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{2(-1)^n}{n^2} \cos(nt) + \left(\frac{(-1)^{n+1} \pi}{n} + \frac{2}{\pi n^3} ((-1)^n - 1) \right) \sen(nt) \right]$$

Otro ejemplo:

EJEMPLO Obtener el desarrollo en serie de Fourier de la siguiente función periódica.



Solución: Usando las ecuaciones de los coeficientes de Fourier, tenemos que:

$$\begin{aligned}
 a_0 &= \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) dt \\
 &= \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) dt = 2\pi
 \end{aligned}$$

$f(t) = t, f(t + 2\pi) = f(t).$

Para $n = 1, 2, \dots$, tenemos:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \cos(nwt) dt \Rightarrow a_n = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \cos\left(n \frac{2\pi}{2\pi} t\right) dt$$

sustituyendo $f(t)$ y usando integración por partes, tenemos

$$\begin{aligned}
 a_n &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} t \cos nt dt = \frac{1}{\pi} \left[\frac{t \sen nt}{n} + \frac{\cos nt}{n^2} \right]_0^{2\pi} \\
 &= \frac{1}{\pi} \left[\frac{2\pi}{n} \sen 2n\pi + \frac{1}{n^2} \cos 2n\pi - \frac{\cos 0}{n^2} \right] = 0
 \end{aligned}$$

ya que $\sen 2n\pi = 0$ y $\cos 2n\pi = \cos 0 = 1$. Observe, en este caso la necesidad de resolver a_0 por separado, ya que para $n = 0$ el término a_n anterior no está definido. Ahora calculemos b_n , similarmente

$$\begin{aligned}
 b_n &= \frac{2}{T} \int_d^{d+T} f(t) \sen(nwt) dt = \frac{2}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(t) \sen\left(n \frac{2\pi}{2\pi} t\right) dt \\
 &= \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} t \sen(nt) dt
 \end{aligned}$$

integrando por partes resulta

$$\begin{aligned}b_n &= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{t}{n} \cos nt + \frac{\operatorname{sen} nt}{n} \right] \Big|_0^{2\pi} \\&= \frac{1}{\pi} \left[-\frac{2\pi}{n} \cos 2n\pi \right] \\&= -\frac{2}{n}, \quad (\cos 2n\pi = 1).\end{aligned}$$

Así $f(t)$ se representa como una serie de Fourier como:

$$f(t) = \frac{2\pi}{2} - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{n} \operatorname{sen} nt$$

o, en forma explícita

$$f(t) = \pi - 2 \left(\operatorname{sen} t + \frac{\operatorname{sen} 2t}{2} + \frac{\operatorname{sen} 3t}{3} + \dots + \frac{\operatorname{sen} nt}{n} + \dots \right).$$