



SOS PET · GUIA COMPLETO

As 8 Emergências Mais Comuns

Passo a passo para agir nos primeiros minutos, até chegar ao veterinário.

Leia com calma, pelo menos uma vez, antes de qualquer emergência. Na hora do aperto, você só reconsulta a ficha que precisar. Em qualquer emergência, ligue para o veterinário enquanto presta os primeiros socorros — este guia orienta, não substitui o atendimento profissional.

1 ENGASGO E OBSTRUÇÃO DAS VIAS AÉREAS

SINAIS DE ALERTA

- Tosse forte e repentina, ou esforço de tossir sem conseguir emitir som
- Boca aberta, pescoço esticado para frente, esforço visível para respirar
- Som agudo e ofegante ao tentar puxar o ar (estridor)
- Patas levadas à boca, animal esfregando o focinho no chão
- Gengivas e língua mudando de rosa para azulado ou arroxeado (cianose): sinal grave
- Pânico, agitação intensa e, em casos extremos, colapso

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Mantenha a calma e contenha o animal com firmeza, mas sem agredir: o pânico dele pode fazê-lo morder por reflexo ou por dor.
2. Abra a boca com cuidado e olhe o fundo da garganta. Se enxergar o objeto e ele estiver acessível, remova com os dedos ou uma pinça, sempre puxando para fora, nunca empurrando. Se houver qualquer perfuração visível ou sangramento, não tente remover: isso pode piorar o caso. Nesse caso, a remoção deve ser feita por um médico veterinário, com o paciente anestesiado.
3. Cães pequenos e gatos: segure o animal de cabeça para baixo (suspensão pelas patas traseiras ou pela cintura) e dê 4 a 5 tapas firmes com a palma da mão, entre as escápulas.
4. Cães médios e grandes (manobra de Heimlich pet): fique atrás do animal, passe os braços ao redor do abdômen, logo atrás das costelas, feche uma das mãos e aplique 4 a 5 compressões rápidas e firmes, para dentro e para cima.
5. Reavalie a boca após cada série de manobras para ver se o objeto se soltou.
6. Se o animal perder a consciência, cheque a boca novamente e inicie o transporte imediato, mantendo as manobras no caminho.

Nunca faça: Introduzir os dedos às cegas repetidamente na garganta. Isso costuma empurrar o objeto mais fundo e transformar uma obstrução parcial em total.

Leve ao veterinário: Sempre, mesmo que o objeto saia e o pet pareça recuperado. Pode haver lesão na garganta ou no esôfago invisível a olho nu.

2 INTOXICAÇÃO POR ALIMENTOS E SUBSTÂNCIAS

SINAIS DE ALERTA

- Vômito (às vezes com sangue) e diarreia
- Salivação excessiva
- Letargia, fraqueza, dificuldade de ficar em pé
- Tremores musculares, descoordenação ao andar
- Perda de apetite repentina
- Em casos graves: convulsões, urina muito escura, ausência de urina, gengivas pálidas ou amareladas

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Identifique e retire do alcance o que foi ingerido. Guarde a embalagem, o rótulo ou uma amostra: isso direciona o tratamento.
2. Anote a quantidade aproximada e o horário da ingestão.
3. Ligue imediatamente para o veterinário ou centro de intoxicação, mesmo sem sintomas. Informe espécie, peso, o que foi ingerido e quando.
4. Siga rigorosamente a orientação recebida. A indução de vômito só deve ser feita sob orientação veterinária e dentro de uma janela de tempo específica. Não faça isso sozinho.
5. Leve o paciente ao atendimento levando junto a embalagem da substância.

Nunca faça: Nunca induza vômito por conta própria. Em ingestão de produtos cáusticos, derivados de petróleo ou objetos pontiagudos, o vômito causa mais dano ao subir pelo esôfago.

Leve ao veterinário: Imediatamente ao confirmar ou suspeitar de ingestão, mesmo sem sintoma algum. Em intoxicação, esperar o sintoma aparecer é esperar tempo demais.

3 HEMORRAGIA E FERIMENTOS

SINAIS DE ALERTA

- Sangue visível, contínuo ou em jatos, saindo de um ferimento
- Gengivas pálidas ou esbranquiçadas (perda significativa de sangue)
- Respiração acelerada, fraqueza, animal apático ou frio
- Sangramento que não cessa após alguns minutos de pressão

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Aplique uma gaze ou pano limpo diretamente sobre o ferimento, com pressão firme e constante. Não levante para conferir se parou: isso reinicia o sangramento.
2. Se o pano encharcar, coloque outro por cima, sem remover o primeiro.
3. Eleve a região ferida acima do nível do coração, se possível e sem forçar movimentos.
4. Mantenha o animal o mais imóvel possível durante o transporte: agitação eleva a pressão e aumenta o sangramento.

Nunca faça: Limpar o ferimento com álcool, água oxigenada ou produtos caseiros antes de estancar. Isso atrapalha a coagulação, causa dor e pode danificar o tecido.

Leve ao veterinário: Qualquer sangramento que não estanca em 5 a 10 minutos de pressão direta, ferimentos profundos ou extensos, e qualquer sinal de gengiva pálida e fraqueza.

4 CONVULSÃO

SINAIS DE ALERTA

- Perda de consciência com movimentos rígidos e involuntários das patas (remada)
- Salivação intensa, mastigação no vazio
- Perda de controle da bexiga ou do intestino
- Olhar fixo e vidrado antes ou durante a crise
- Desorientação, cegueira temporária ou agitação após a crise (fase pós-ictal)

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Não tente conter o animal. Afaste objetos e móveis ao redor que possam machucá-lo (cantos, escadas, água).
2. Cronometre a duração exata pelo celular: essa é a informação mais importante para o veterinário.
3. Reduza estímulos: apague a luz forte, faça silêncio, afaste outros animais e pessoas agitadas.
4. Grave um vídeo da crise, se conseguir: ajuda enormemente no diagnóstico.

Nunca faça: Não coloque a mão ou objetos na boca do animal durante a crise. Ao contrário do mito, ele não vai engolir a língua, e você corre risco real de uma mordida grave e involuntária.

Leve ao veterinário: Imediatamente, desde a primeira convulsão da vida do animal. Não espere o paciente ter uma segunda crise.

5 AFOGAMENTO E QUASE-AFOGAMENTO

SINAIS DE ALERTA

- Animal encontrado submerso ou boiando sem reagir
- Tosse intensa, respiração ruidosa e ofegante ao sair da água
- Letargia ou inconsciência
- Espuma na boca ou nas narinas
- Gengivas azuladas

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Retire o animal da água rapidamente. Posicione a cabeça mais baixa que o corpo, inclinada para um lado, para drenar a água das vias aéreas.
2. Cheque e remova qualquer obstrução visível da boca.
3. Se não estiver respirando, inicie respiração artificial: feche a boca do animal e sopra firme pelo focinho, observando o peito subir, a cada 4 a 5 segundos.
4. Sem batimento perceptível, inicie a reanimação cardiopulmonar: 30 compressões torácicas para 2 ventilações.
5. Mesmo recuperado e aparentemente bem, leve ao atendimento e monitore as próximas 24 a 48 horas.

Nunca faça: Não perca tempo com manobras agressivas para esvaziar a barriga. O foco é via aérea livre e respiração, não o estômago. De preferência, faça a manobra dentro do carro, a caminho do veterinário.

Leve ao veterinário: Sempre, mesmo após recuperação completa aparente. A observação das próximas 48 horas é parte do tratamento.

6 PICADA DE INSETO E DE COBRA

SINAIS DE ALERTA

- Inchaço repentino, sobretudo na face, focinho ou patas
- Vermelhidão e dor no ponto da picada
- Salivação, vômito
- Coceira intensa, urticária (caroços na pele)
- Picada de cobra: dois pontos de perfuração, inchaço progressivo e intenso, sangramento no local, fraqueza
- Sinal de alerta máximo: dificuldade respiratória, inchaço de focinho ou garganta (anafilaxia)

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Identifique, com segurança, o agente (inseto ou cobra). Fotografe de longe, sem se arriscar.
2. Mantenha o animal o mais imóvel possível: o movimento espalha o veneno mais rápido pela circulação.
3. Se a picada for em uma pata, mantenha o membro abaixo do nível do coração.
4. Em picada de abelha visível, remova o ferrão raspando com a borda de um cartão rígido.
5. Leve ao veterinário imediatamente, principalmente em qualquer suspeita de cobra ou sinal de reação alérgica.

Nunca faça: Nunca corte, chupe, aplique torniquete ou gelo direto sobre picada de cobra. Essas práticas antigas concentram o veneno e podem custar o membro ou a vida do animal.

Leve ao veterinário: Imediatamente em qualquer suspeita de cobra, e em picada de inseto com inchaço facial de evolução rápida ou qualquer dificuldade para respirar.

7 QUEIMADURAS

SINAIS DE ALERTA

- Vermelhidão, bolhas ou pele esbranquiçada na região
- Perda de pelo na área afetada
- Lambedura insistente do local
- Dor intensa ao toque (ou, paradoxalmente, ausência de dor em queimaduras profundas)
- Cheiro de pelo queimado

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Resfrie a área imediatamente com água corrente fria, não gelada, por 10 a 15 minutos, para parar o dano térmico nos tecidos.
2. Não arranque pelos ou tecido grudado na queimadura.
3. Cubra com gaze limpa e seca, sem apertar.
4. Em queimadura química, lave abundantemente com água corrente por 15 a 20 minutos, removendo o produto da pele e do pelo.
5. Impeça que o animal lamba a área: use cone ou cubra o local com uma gaze limpa durante o transporte.

Nunca faça: Nunca aplique manteiga, pasta de dente, gelo direto, pomada humana ou qualquer receita caseira. Essas substâncias retêm calor, contaminam a lesão e dificultam o tratamento.

Leve ao veterinário: Sempre que a queimadura for maior que poucos centímetros, tiver bolhas ou pele esbranquiçada, atingir rosto, patas ou genitais, ou for de origem química ou elétrica.

8 FRATURAS E TRAUMA

SINAIS DE ALERTA

- Recusa em apoiar a pata ou andar (claudicação súbita e total)
- Deformidade visível, ângulo anormal no membro
- Inchaço rápido na região
- Dor intensa, vocalização ao se mover ou ao toque
- Fratura exposta: osso visível através da pele
- Em trauma de coluna: arrastar as patas traseiras, perda de movimento

O QUE FAZER — PASSO A PASSO

1. Minimize a movimentação. Improvise uma maca rígida (tábua, papelão firme, bandeja) e mova o animal como um bloco único, sem torcer a coluna.
2. Imobilize o membro com uma tala improvisada (jornal grosso enrolado, papelão, madeira) presa com bandagem, firme mas sem cortar a circulação.
3. Em fratura exposta, cubra com gaze limpa e levemente umedecida com soro fisiológico, sem tentar recolocar o osso.
4. Mantenha o animal aquecido e calmo: o frio e o estresse agravam o estado de choque.
5. Transporte com cuidado e velocidade ao veterinário.

Nunca faça: Nunca tente colocar o osso no lugar ou endireitar o membro. Isso só deve ser feito por um veterinário, frequentemente sob anestesia.

Leve ao veterinário: Imediatamente, em qualquer suspeita de fratura ou trauma. O atraso compromete a cicatrização e, em casos de coluna, pode definir entre o animal voltar a andar ou não.

Dr. Eduardo Sebastião

Médico Veterinário · CRMV-MT 6412

Este material organiza e educa; em qualquer emergência, procure sempre um veterinário. Este guia acompanha os bônus Carteira de Vacinação, Transporte Seguro e Alimentos que Intoxicam, e o acesso completo, sempre atualizado, no app Pet Saudável.