



SINAIS SILENCIOSOS

*Os 10 avisos que seu pet dá
antes de uma emergência*

Aprenda a enxergar o que o seu veterinário enxerga —
horas ou dias antes de um quadro grave.

DR. EDUARDO
MEDICINA VETERINÁRIA
CRMV-MT 6412

*Guia educativo de observação — complemento do e-book
Primeiros Socorros para Cães e Gatos*

SEU PET AVISA. VOCÊ SABE ESCUTAR?



Em mais de uma década de clínica, aprendi uma coisa que nenhuma faculdade ensina direito: quase nenhuma emergência começa como emergência. Ela começa como um detalhe. Um cachorro que hoje não veio te receber na porta. Uma gata que passou o dia embaixo da cama sem motivo. Uma tigela de água que esvaziou rápido demais — ou que ficou cheia demais.

Quando a tutora chega ao consultório dizendo “foi do nada, doutor”, quase nunca foi do nada. O corpo do animal vinha avisando havia horas, às vezes dias. O problema é que cães e gatos são mestres em esconder dor e fraqueza — é instinto de sobrevivência. Eles não reclamam. Eles sinalizam. E sinalizam baixinho.

Este guia existe para treinar o seu olhar. O e-book de Primeiros Socorros ensina o que fazer quando a emergência já aconteceu. Aqui, o objetivo é outro — e talvez mais poderoso: reconhecer os sinais silenciosos antes, quando ainda há tempo de agir com calma, agendar uma consulta e, muitas vezes, evitar que o quadro se torne grave.

Você conhece o seu pet melhor do que ninguém. Ninguém no mundo sabe como ele acorda, como ele come, como ele te olha. Este guia só organiza esse conhecimento que você já tem — e coloca nele os olhos de um veterinário.

NOTA IMPORTANTE

Este é um material educativo de observação. Ele ensina a reconhecer sinais de alerta — não substitui, em nenhuma hipótese, a consulta, o diagnóstico ou o tratamento realizados por um médico-veterinário.

Na dúvida, procure sempre o profissional que acompanha o seu pet.

COMO USAR ESTE GUIA



Este guia foi feito para ser consultado — não apenas lido uma vez. Cada um dos 10 sinais tem um capítulo próprio, sempre no mesmo formato, para que você encontre a informação em segundos, mesmo com o coração acelerado:

- ◆ **O QUE É** — descrição clara e visual do sinal, para você saber exatamente o que procurar no corpo e no comportamento do seu pet.
- ◆ **O QUE PODE SIGNIFICAR** — as possíveis causas por trás do sinal — sempre como possibilidade, nunca como diagnóstico. Diagnóstico é ato do veterinário, com exame físico e, quando necessário, exames complementares.
- ◆ **NÍVEL DE URGÊNCIA** — a classificação do sinal na escala de três níveis, apresentada na página ao lado — incluindo os agravantes que fazem o nível subir.
- ◆ **O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA** — orientações práticas e seguras de observação e manejo enquanto o atendimento veterinário não acontece.

Três recomendações antes de começar:

- ◆ Leia o guia inteiro uma vez, com calma, num dia tranquilo. O olhar treinado se constrói antes do susto, não durante.
- ◆ Imprima a tabela-resumo do final e deixe em um lugar visível — na porta da geladeira, por exemplo. É o seu mapa rápido.
- ◆ Combine este guia com o e-book de Primeiros Socorros: um ensina a ver antes, o outro ensina a agir durante. Juntos, eles cobrem os dois momentos que mais importam até chegar à clínica veterinária.

A ESCALA DE URGÊNCIA

Todo sinal deste guia é classificado em um de três níveis. Eles indicam a velocidade da sua resposta — e lembre-se: qualquer sinal pode subir de nível se piorar ou se vier acompanhado de outros.



OBSERVAR

monitorar de perto por 24 a 48 horas

O sinal apareceu de forma leve e isolada. Anote o horário, observe água, comida, xixi, cocô e disposição. Se persistir além de 24–48 horas, se piorar ou se surgir um segundo sinal, suba imediatamente para o nível AGENDAR — ou URGENTE, conforme o caso.



AGENDAR

consulta veterinária ainda esta semana

O sinal merece avaliação profissional em poucos dias, mesmo que o pet pareça bem no restante. Não espere “passar sozinho”: quadros importantes costumam começar exatamente assim. Ligue para a clínica, descreva o que observou e garanta um horário.



URGENTE

procurar atendimento veterinário agora

O sinal pode indicar risco imediato. Não aguarde evolução em casa e não tente resolver sozinha: acione a clínica ou o plantão veterinário mais próximo e vá. Nesses casos, o e-book de Primeiros Socorros orienta como agir com segurança até chegar à clínica.

NOTA IMPORTANTE

A escala é uma ferramenta de organização da observação — ela não é triagem clínica. Quem define a gravidade real de um quadro é sempre o médico-veterinário, com o animal em mãos.

SINAL I

PROSTRAÇÃO OU APATIA INCOMUM

O QUE É

É aquele pet que ficou “desligado”: não veio receber você, não reagiu ao barulho do pote de ração, recusou o passeio ou a brincadeira favorita. Ele pode estar deitado em posição normal, de olhos abertos — e mesmo assim algo está diferente: o brilho do olhar, a velocidade de resposta, a vontade de participar da casa.

Atenção ao contraste com o normal DELE. Um cão idoso naturalmente dorme mais; o alerta é a mudança em relação ao padrão de sempre. Prostração verdadeira costuma vir com corpo “mole”, cabeça baixa, cauda parada e desinteresse até pelo que ele mais ama.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Apatia é o sinal mais inespecífico da medicina veterinária — e justamente por isso um dos mais valiosos. Pode acompanhar dor (articular, abdominal, dentária), febre e processos infecciosos, doenças metabólicas, anemia, intoxicações em fase inicial e até quadros emocionais, como estresse por mudança de rotina.

Sozinho, ele não aponta uma causa. Mas funciona como um farol: quando o corpo economiza energia, é porque algo está consumindo essa energia por dentro. É esse “algo” que a avaliação veterinária vai investigar.

NÍVEL DE URGÊNCIA



consulta veterinária ainda esta semana

Sobe para URGENTE se a apatia vier acompanhada de gengivas pálidas, respiração ofegante em repouso, vômitos repetidos, abdômen rígido ou dificuldade para se levantar.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Anote quando começou e o que mudou na rotina nas últimas 48 horas (alimento novo, produto de limpeza, passeio diferente, acesso a lixo ou plantas).
- ◆ Ofereça água fresca e observe se ele bebe; registre se comeu e quanto.
- ◆ Mantenha-o em ambiente calmo e confortável, sem forçar brincadeira, passeio ou esforço físico nesse período.
- ◆ Toque o corpo com delicadeza procurando reação de dor — sem insistir se ele se retrair.
- ◆ Se em 24 horas não houver melhora clara, ou se qualquer outro sinal deste guia aparecer, antecipe a consulta.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL II

GENGIVAS PÁLIDAS OU ARROXEADAS

O QUE É

A gengiva saudável de cães e gatos é rosa-chiclete, úmida e brilhante. O sinal de alerta é a mudança de cor: rosa muito claro, quase branco (pálida) ou com tom azulado/roxo (cianótica), principalmente na região acima dos dentes caninos.

Para checar, levante o lábio com o pet calmo e compare com o que você conhece dele — vale criar o hábito de olhar a gengiva em dias normais, para ter a referência. Em pets de gengiva pigmentada (escura), observe a parte interna da pálpebra ou a língua.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Gengiva pálida pode indicar quadros que cursam com anemia ou má circulação: perda de sangue (inclusive interna e invisível), doenças que destroem células do sangue, choque e algumas intoxicações — como as causadas por certos venenos de rato.

O tom arroxeado sugere oxigenação insuficiente, que pode acompanhar problemas respiratórios e cardíacos. Nos dois cenários, o corpo está avisando que o transporte de oxigênio foi comprometido — e isso nunca é detalhe.

NÍVEL DE URGÊNCIA



procurar atendimento veterinário agora

Este sinal já nasce URGENTE. Com apatia, fraqueza, respiração acelerada ou desmaio junto, o tempo passa a ser o fator mais importante do quadro.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Acione imediatamente a clínica ou o plantão veterinário mais próximo e avise que está a caminho.
- ◆ Mantenha o pet aquecido e em repouso absoluto — no colo ou em caixa de transporte forrada.
- ◆ Não ofereça alimento, remédio caseiro ou medicação humana em hipótese alguma.
- ◆ Se possível, fotografe a gengiva antes de sair: a imagem com horário ajuda o veterinário a avaliar a evolução.
- ◆ No trajeto, siga as orientações de transporte seguro do e-book de Primeiros Socorros.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL III

RESPIRAÇÃO OFEGANTE EM REPOUSO

O QUE É

Ofegar depois de correr, brincar ou no calor é normal — é assim que o cão regula a temperatura. O sinal silencioso é outro: respiração rápida, curta ou com esforço com o animal parado, em ambiente fresco, sem exercício recente.

Repare em barriga e costelas trabalhando demais, pescoço esticado para respirar, cotovelos afastados do corpo, respiração de boca aberta — que em GATOS é sempre anormal — e ruídos como chiado ou ronco novo. Uma referência prática: em repouso ou dormindo, mais de 40 movimentos respiratórios por minuto merece atenção imediata.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Esforço respiratório em repouso pode acompanhar quadros cardíacos, acúmulo de líquido no pulmão ou no tórax, crises respiratórias (como broncoespasmo em gatos), dor intensa, febre alta, anemia e intoxicações.

Em gatos, o sinal é ainda mais traiçoeiro: eles compensam em silêncio por dias e descompensam de uma vez. Gato respirando de boca aberta ou com a barriga “bombeando” é situação de atendimento imediato, sem exceções.

NÍVEL DE URGÊNCIA



procurar atendimento veterinário agora

Este sinal já nasce URGENTE. Língua ou gengiva arroxeadas, pescoço esticado e incapacidade de deitar (o pet fica sentado ou em pé para respirar) tornam o quadro crítico.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Acione o atendimento veterinário agora e desloque-se com calma — estresse piora o esforço respiratório.
- ◆ Transporte em caixa ventilada ou no colo, sem apertar tórax e pescoço; retire coleiras de enforcamento.
- ◆ Mantenha o ambiente fresco e evite qualquer esforço: nada de escadas ou caminhada até o carro, se puder carregá-lo.
- ◆ Não ofereça água ou comida durante a crise — o risco de engasgo aumenta.
- ◆ Se souber, informe ao veterinário a frequência respiratória que você contou e desde quando o esforço começou.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL IV

ABDÔMEN INCHADO OU RÍGIDO

O QUE É

É a barriga visivelmente maior, estufada ou dura ao toque, muitas vezes de evolução rápida — em horas. O pet pode ficar inquieto, andar de um lado para o outro, tentar vomitar sem colocar nada para fora, salivar e adotar a “posição de prece”: peito abaixado e traseira levantada, sinal clássico de dor abdominal.

Diferencie do pet que apenas comeu demais: a barriga do exagero é macia e ele segue confortável. A barriga de alarme é tensa como um tambor, dolorida, e vem com mudança de comportamento.

O QUE PODE SIGNIFICAR

O aumento súbito de volume abdominal pode indicar quadros que exigem avaliação imediata, como a dilatação e torção do estômago — mais associada a cães de porte grande e peito profundo —, além de acúmulo de líquido, sangramentos internos, obstruções e processos inflamatórios intensos.

Nem toda barriga aumentada é catástrofe: verminose em filhotes, prisão de ventre e até gestação mudam o volume. Mas a combinação inchaço rápido + rigidez + dor + tentativa de vômito improdutivo é um dos avisos mais sérios que um tutor pode presenciar.

NÍVEL DE URGÊNCIA



procurar atendimento veterinário agora

Este sinal já nasce URGENTE. Tentativas de vômito sem retorno, salivação intensa, gengiva pálida e fraqueza súbita indicam que cada minuto conta.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Vá imediatamente ao atendimento veterinário — este é um dos quadros em que a rapidez do tutor mais muda o desfecho.
- ◆ Não ofereça água, comida ou qualquer medicação; não massageie nem comprima a barriga.
- ◆ Retire o acesso à comida no ambiente e transporte o pet com o mínimo de movimento possível.
- ◆ Ligue avisando que está a caminho e descreva o que vê: isso permite que a equipe se prepare para recebê-lo.
- ◆ Anote o horário da última refeição e se houve exercício logo após comer — informação valiosa para o veterinário.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL V

MUDANÇA NA INGESTÃO DE ÁGUA

O QUE É

O sinal tem duas direções. Beber demais: você enche o pote com mais frequência, o pet procura água em lugares incomuns (torneira, vaso sanitário, balde) e urina mais volume. Beber de menos: a água fica intocada, a urina escurece e diminui, e a gengiva pode ficar pegajosa ao toque.

O segredo é medir, não estimar. Encha o pote com quantidade conhecida de manhã e meça o que sobrou no dia seguinte, por dois ou três dias. Como referência geral de conversa (não de diagnóstico), a ingestão usual gira em torno de 40 a 60 ml por quilo por dia, variando com calor, exercício e tipo de alimento.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Sede aumentada e persistente pode acompanhar quadros hormonais e metabólicos — como alterações compatíveis com diabetes —, doenças renais e uterinas (em fêmeas não castradas), além do uso de alguns medicamentos.

A recusa de água preocupa pelo risco de desidratação, especialmente em filhotes, idosos e gatos, e pode acompanhar náusea, dor oral e quadros febris. Nos dois sentidos, a mudança sustentada por dias é o que transforma detalhe em aviso.

NÍVEL DE URGÊNCIA



monitorar de perto por 24–48 horas

Sobe para AGENDAR se a mudança persistir por mais de 48 horas ou vier com mais xixi que o normal. Sobe para URGENTE se houver recusa total de água por 24 horas, vômitos ou apatia intensa junto.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Meça a ingestão por 2–3 dias e anote (foto do pote ajuda). Leve esse registro à consulta.
- ◆ Mantenha água fresca, limpa e em mais de um ponto da casa; gatos costumam beber mais em fontes ou potes largos.
- ◆ Não restrinja água de um pet que está bebendo muito — a restrição por conta própria pode ser perigosa.
- ◆ Observe em paralelo o volume e a cor da urina: os dois sinais se leem juntos.
- ◆ Se houver recusa de água, teste oferecer água levemente morna ou o caldo do sachê — sem forçar com seringa.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL VI

ESCONDER-SE OU ISOLAMENTO SÚBITO

O QUE É

O pet sociável que de repente prefere o fundo do armário, o vão atrás do sofá ou o quarto vazio. Ele evita contato, se afasta quando você se aproxima, deixa de dormir nos lugares de sempre. Em gatos, o esconderijo prolongado é um clássico; em cães, aparece como “sumir” pelos cantos da casa.

O que pesa aqui é o contraste e a persistência: não é o gato que tira uma soneca no guarda-roupa, é o animal que mudou o padrão de convivência sem nenhum gatilho óbvio — sem visita, obra, mudança ou animal novo na casa.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Esconder-se é o jeito ancestral de cães e gatos lidarem com dor e vulnerabilidade: na natureza, demonstrar fraqueza é perigoso. Por isso, o isolamento súbito pode acompanhar dor de qualquer origem, febre, náusea e o início de muitas doenças — antes de qualquer outro sinal visível.

Também pode ter causa emocional: medo, estresse e ansiedade. A diferença raramente é óbvia de fora — e é exatamente isso que a avaliação veterinária ajuda a esclarecer.

NÍVEL DE URGÊNCIA



monitorar de perto por 24–48 horas

Sobe para AGENDAR se passar de 24 horas ou vier com recusa de comida. Sobe para URGENTE se, ao encontrá-lo, você notar respiração esforçada, gengiva pálida, vocalização de dor ao toque ou incapacidade de andar normalmente.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Localize o pet e faça uma checagem visual calma: postura, respiração, olhos, interesse por você.
- ◆ Ofereça, perto do esconderijo, água e o petisco favorito — a reação a eles é um termômetro valioso.
- ◆ Não force a retirada do esconderijo nem o pegue de surpresa; dor + susto é receita para acidente.
- ◆ Revise as últimas 48 horas: queda, briga, acesso à rua, produto novo, mudança na casa.
- ◆ Registre desde quando ele está isolado e mostre esse histórico na consulta.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL VII

VOCALIZAÇÃO ANORMAL

O QUE É

É a mudança na “voz” e no padrão: o cão silencioso que passou a chorar à noite, o gato que mia alto e sem direção pela casa, gemidos ao se levantar, ao pular ou ao ser tocado em um ponto específico do corpo, rosnado novo durante o carinho de sempre.

Inclua aqui também o oposto: o pet “falante” que emudeceu, ou a voz que mudou de timbre — latido ou miado rouco, falhado. Vocalização se lê sempre em contexto: quando acontece, em que posição, associada a qual movimento.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Vocalizar ao movimento ou ao toque pode acompanhar dor articular, na coluna ou abdominal. A vocalização noturna em gatos idosos pode acompanhar alterações hormonais, pressóricas ou cognitivas que merecem investigação. Rouquidão persistente pode envolver vias aéreas e laringe.

Rosnar ou reagir ao carinho de sempre raramente é “mau comportamento” repentino — com frequência é um mapa de dor que o pet está desenhando para você. Mudança de comportamento sem causa aparente pede exame físico antes de qualquer rótulo.

NÍVEL DE URGÊNCIA



consulta veterinária ainda esta semana

Sobe para URGENTE se houver grito de dor agudo e repetido, vocalização com incapacidade de se mover ou de apoiar as patas, ou choro contínuo com abdômen tenso.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Mapeie o gatilho: filme o momento em que a vocalização acontece — vídeo curto vale mais que mil descrições.
- ◆ Anote horário e situação (ao pular, ao ser tocado na lombar, de madrugada) para levar à consulta.
- ◆ Evite manipular a região que dispara a reação; não teste repetidamente “para confirmar”.
- ◆ Suspenda temporariamente saltos e escadas se a queixa parecer ligada ao movimento.
- ◆ Nunca medique por conta própria: analgésicos e anti-inflamatórios humanos podem ser tóxicos para cães e gatos.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL VIII

ALTERAÇÃO DE APETITE

O QUE É

Nas duas direções, de novo. Comer de menos: deixar sobras incomuns, cheirar e abandonar o pote, aceitar só petisco, mastigar de um lado só, derrubar comida da boca. Comer demais: fome que parece insaciável, roubar comida, vasculhar lixo — especialmente se for comportamento novo.

Observe também o “querer sem conseguir”: o pet que se aproxima do pote com interesse, tenta comer e desiste. Esse padrão sugere que o problema pode estar na boca, nos dentes ou na deglutição, e não na fome.

O QUE PODE SIGNIFICAR

A queda de apetite acompanha uma lista enorme de quadros: dor dentária e oral, náusea, doenças digestivas, renais e hepáticas, processos infecciosos e até estresse. Em gatos, dias seguidos sem comer trazem um risco adicional e específico ao fígado — por isso a janela de tolerância é curta.

O apetite exagerado e recente também informa: pode acompanhar alterações hormonais e metabólicas, parasitas ou má absorção de nutrientes — o animal come mais e aproveita menos. Fome nova com emagrecimento é combinação que sempre merece investigação.

NÍVEL DE URGÊNCIA



monitorar de perto por 24–48 horas

Sobe para AGENDAR se durar mais de 24–36 horas em cães ou vier com emagrecimento. Em GATOS, mais de 24 horas sem comer nada já vale contato com o veterinário no mesmo dia; com apatia ou vômito, trate como URGENTE.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Quantifique: pese ou fotografe a porção servida e a sobra. “Comeu pouco” vira dado quando vira número.
- ◆ Teste o interesse com o alimento favorito levemente aquecido — aceitar petisco e recusar ração é informação, não solução.
- ◆ Olhe a boca com delicadeza: mau hálito forte, gengiva vermelha, tártaro, salivação ou dente quebrado.
- ◆ Não troque de ração várias vezes em sequência tentando “acertar” — isso atrasa a consulta e bagunça a leitura.
- ◆ Registre o peso atual, se tiver balança: a curva de peso é um dos dados mais úteis da consulta.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL IX

URINA E FEZES ALTERADAS

O QUE É

No xixi: mudança de cor (muito escuro, alaranjado, avermelhado), de volume (muito mais ou muito menos), de frequência, esforço na posição sem produzir nada, xixi em locais errados, lambedura insistente da região genital.

No cocô: diarreia que persiste, fezes com sangue vivo ou escuras como borra de café, muco, esforço sem resultado, ou ausência de fezes por mais de 48 horas. A caixa de areia e o quintal são exames de rotina diários que custam zero — aprenda a lê-los.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Alterações urinárias podem acompanhar cistites, cristais e cálculos, doenças renais e distúrbios metabólicos. Nas fezes, as mudanças podem acompanhar parasitas, indiscrições alimentares, doenças inflamatórias intestinais e infecções.

Um cenário merece destaque pela gravidade: o animal — em especial o GATO MACHO — que tenta urinar repetidamente e não produz nada pode estar com obstrução urinária, quadro que coloca a vida em risco em poucas horas e exige atendimento imediato.

NÍVEL DE URGÊNCIA



consulta veterinária ainda esta semana

Sobe para URGENTE se houver esforço sem produzir urina (sobretudo em gatos machos), sangue em quantidade, vômitos junto com a alteração, fezes pretas ou prostração associada.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Fotografe. Xixi no tapete, cocô alterado, areia da caixa: imagens com horário são ouro na consulta.
- ◆ Se possível, colete uma amostra fresca de urina em pote limpo (ou peça orientação à clínica sobre a coleta).
- ◆ Na diarreia sem sinais de alarme, mantenha água sempre disponível e suspenda petiscos — sem medicar por conta própria.
- ◆ Conte as idas ao tapete higiênico ou à caixa de areia por 24 horas: frequência é dado clínico.
- ◆ Gato macho fazendo força no vaso sem sair nada: não observe, não espere — vá agora.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

SINAL X

PUPILAS OU OLHOS COM APARÊNCIA ANORMAL

O QUE É

Olho saudável é brilhante, úmido, aberto e simétrico. Os avisos: pupilas de tamanhos diferentes entre si, pupilas muito dilatadas em ambiente claro (ou muito contraídas no escuro), olho fechado ou semicerrado, vermelhidão, secreção amarelada ou esverdeada, aspecto azulado ou “fumaçado” na superfície, terceira pálpebra aparecendo no canto interno.

Inclua o comportamento visual: esbarrar em móveis, hesitar em escadas à noite, pupila que não reage à luz. Compare sempre um olho com o outro — a assimetria é um dos sinais mais fáceis de flagrar.

O QUE PODE SIGNIFICAR

Como oftalmologia é uma das minhas áreas de dedicação, deixo um recado direto: olho não espera. Alterações de pupila podem acompanhar quadros neurológicos, pressóricos e intoxicações; olho fechado com dor pode acompanhar úlceras na córnea; vermelhidão intensa e aspecto azulado podem acompanhar aumentos de pressão dentro do olho.

Muitos desses quadros evoluem de “tratável” para “sequela definitiva” em pouquíssimo tempo. Nenhum colírio de gaveta é inocente aqui: o produto errado, no quadro errado, pode custar a visão.

NÍVEL DE URGÊNCIA



consulta veterinária ainda esta semana

Sobe para URGENTE se houver dor evidente (olho fechado, lacrimejamento intenso, pata esfregando o olho), mudança súbita de cor ou de tamanho do olho, trauma, ou cegueira aparente de instalação rápida.

O QUE FAZER ATÉ A CONSULTA

- ◆ Impeça que o pet coce o olho — o colar elizabetano é o item mais protetor que existe nesse momento.
- ◆ Não pingue nenhum colírio por conta própria, nem os “de uso humano inofensivos”. Aguarde a prescrição.
- ◆ Fotografe os dois olhos de frente, com boa luz, e registre o horário do início.
- ◆ Limpe apenas secreções externas com gaze umedecida em soro fisiológico, sem tocar o globo ocular.
- ◆ Reduza luz forte se o pet demonstrar desconforto e mantenha-o em ambiente seguro até a consulta.



Na dúvida, ligue para o veterinário que acompanha o seu pet e descreva o que você observou. Este guia orienta a observação — quem avalia, diagnostica e trata é sempre o profissional.

TABELA-RESUMO DOS 10 SINAIS

Imprima esta página e deixe em um lugar visível da casa.

SINAL	NÍVEL	FIQUE ATENTA A / ATÉ A CONSULTA
I. Prostração / apatia incomum	AGENDAR	Desinteresse pelo que ele ama; corpo “desligado”. Urgente se vier com gengiva pálida, ofego ou vômitos.
II. Gengivas pálidas ou arroxeadas	URGENTE	Compare com o rosa habitual. Aqueça, repouse e vá ao atendimento agora — sem comida nem remédio.
III. Respiração ofegante em repouso	URGENTE	Esforço parado, +40 mov./min dormindo, gato de boca aberta. Transporte calmo e imediato.
IV. Abdômen inchado ou rígido	URGENTE	Barriga dura + ânsia sem vômito + inquietação: vá agora. Não ofereça nada, não massageie.
V. Mudança na ingestão de água	OBSERVAR	Meça o pote por 2–3 dias. Agendar se persistir 48h; urgente se recusa total por 24h.
VI. Esconder-se / isolamento súbito	OBSERVAR	Cheque postura, respiração e interesse por petisco. Agendar se passar de 24h ou recusar comida.
VII. Vocalização anormal	AGENDAR	Filme o gatilho (movimento, toque, madrugada). Urgente se houver grito de dor ou perda de movimento.
VIII. Alteração de apetite	OBSERVAR	Quantifique porção e sobra. Gato 24h sem comer: contato no mesmo dia; com apatia, urgente.
IX. Urina e fezes alteradas	AGENDAR	Fotografe e colete amostra. Esforço sem urina (gato macho!) ou fezes pretas: urgente, agora.
X. Pupilas / olhos anormais	AGENDAR	Compare os dois olhos; nada de colírio por conta. Dor ocular, trauma ou mudança súbita: urgente.

Qualquer sinal sobe de nível se piorar ou se aparecer acompanhado de outro. Na dúvida, ligue para o seu veterinário.

O OLHAR QUE PROTEGE



Se você chegou até aqui, algo já mudou: você nunca mais vai olhar para o seu pet do mesmo jeito. Vai reparar na gengiva durante o carinho, contar a respiração numa tarde de sono, perceber o pote de água como um instrumento — e não apenas como uma tigela. Esse olhar é a forma mais silenciosa e mais poderosa de amor que existe na tutoria.

Mas quero deixar registrada a lição mais importante deste guia: o olhar treinado da tutora não substitui o acompanhamento veterinário próximo e contínuo — ele o potencializa. O check-up regular, mesmo com o pet aparentemente saudável, é o que cria a linha de base que dá sentido a tudo o que você aprendeu aqui. É comparando com o “normal documentado” do seu animal que os sinais silenciosos gritam mais cedo.

Cães e gatos envelhecem rápido: um ano sem consulta equivale, na prática, a vários anos da vida deles sem avaliação. Encontre um veterinário de confiança, crie vínculo, leve suas anotações, suas fotos, seus vídeos. A medicina veterinária funciona melhor quando o profissional e a tutora observadora trabalham juntos — cada um enxergando o que só ele pode enxergar.

O seu pet avisa. Agora você sabe escutar. E quando o aviso vier, você já sabe o caminho: observar com método, agir com calma e procurar quem estudou a vida inteira para cuidar dele com você.

— *Dr. Eduardo*

Médico-Veterinário • CRMV-MT 6412

NOTA IMPORTANTE

Este material tem finalidade exclusivamente educativa, voltada à observação e ao cuidado responsável. Ele não substitui a consulta, o diagnóstico ou o tratamento realizados por um médico-veterinário.

Diante de qualquer sinal descrito neste guia — e sempre que houver dúvida —, procure atendimento veterinário.