

**UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS
BACHARELADO EM MATEMÁTICA**

**LABORATÓRIO DE FÍSICA I
RELATÓRIO IV**

**Fabício Yuri Costa da Silva - 21454545
Gabriel Bezerra de M. Armelin - 21550325
Jonas Miranda Cascais Júnior - 21553844
Laise Alves Pimentel - 21202395**

Professor: José Pedro Cordeiro

**Manaus
2016**

Sumário

1	Introdução	3
2	Parte Experimental	4
3	Análise de Dados	5
	Coleta das amostras	5
4	Conclusão	8
	Referências	9

1. Introdução

Este relatório descreve e analisa o experimento realizado em sala de aula na disciplina *Laboratório de Física I* do curso de Bacharelado em Matemática no dia 01 de julho de 2016.

A próxima seção explicará detalhadamente o experimento realizado.

2. Parte Experimental

O experimento consiste em caracterizar o movimento retilíneo uniforme através da análise de dados e gráficos. Para isto foram utilizados os seguintes materiais e aparelhos:

- Trilho de ar e carrinho: aparelho formado por um trilho posicionado horizontalmente responsável pela trajetória retilínea do carrinho e um carrinho encarrilhado neste trilho. O carrinho se movimenta quando um compressor injeta ar por burachinhos no trilho. A massa do carrinho é 0.1898 kg.
- Compressor de ar: responsável pela injeção de ar no trilho de ar. A injeção de ar causa a movimentação do carrinho.
- Sensores de movimento: Há dois sensores de movimento. Um no início da trajetória e é responsável por registrar o posicionamento inicial. O segundo sensor foi utilizado para registrar o posicionamento final da medição.
- Cronômetro digital: aparelho responsável por iniciar a marcação de tempo a partir do recebimento das informações dos sensores de movimento.
- Outros materiais utilizados foram: barbante, porta-peso, peso e polia. O barbante foi preso ao carrinho e ao porta-peso através de uma polia. A massa do porta-peso é 0.01 kg.

O experimento consiste de duas etapas:

1. A primeira etapa consistiu em medir o tempo que o carrinho demorou para se deslocar de um ponto inicial a uma sequência de pontos finais iniciando em 120cm e terminando 170cm.
2. A segunda etapa consistiu em medir o tempo que o carrinho demorou para se deslocar de um ponto inicial a um ponto final variando a quantidade de pesos no porta-peso.

A próxima seção explicará em detalhes cada uma destas etapas.

3. Análise de Dados

Esta seção apresenta os dados e cálculos em cada atividade descrita na seção *Parte Experimental*.


Coleta das amostras

Na etapa 1, coletamos amostras de tempo para vários deslocamentos do carrinho. O carrinho foi amarrado ao barbante que foi amarrado ao porta-peso. Nesta etapa, o porta-peso não recebeu nenhum peso adicional. Os valores coletados estão na tabela a seguir:

Tabela 3.1: Amostras dos deslocamentos e tempos de duração.

Deslocamentos (m)	Tempos (s)
0.0	0.00000
0.1	0.68166
0.2	0.74200
0.3	1.11600
0.4	1.24900
0.5	1.44900
0.6	1.70900

A seguir, é apresentado o gráfico destas duas variáveis:



Agora que temos os dados de deslocamento e tempo, podemos calcular a aceleração utilizando a fórmula abaixo:

$$\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2 \quad (3.1)$$

Onde:

Δx : representa o deslocamento percorrido pelo carrinho. Os valores estão apresentados na tabela anterior para a posição final. A posição inicial é 0;

v_0 : representa a velocidade inicial. Neste caso, ela é 0;

t : representa o momento que se deseja determinar a aceleração;


a : a aceleração que desejamos calcular a partir do deslocamento e tempo;

Após realizarmos estes cálculos, obtemos o seguinte resultado para a aceleração:

Tabela 3.2: Aceleração X Tempo

Δx (m)	t (s)	a (m/s^2)
0.1	0.68166	0.4304219148
0.2	0.74200	0.7265277061
0.3	1.11600	0.4817512622
0.4	1.24900	0.5128201841
0.5	1.44900	0.4762809696
0.6	1.70900	0.4108630830

A seguir, é apresentado o gráfico da aceleração por intervalo de tempo:



Agora que temos a aceleração, podemos calcular a velocidade utilizando a seguinte fórmula:

$$v^2 = v_0^2 + 2a\Delta x \quad (3.2)$$

Onde:

v^2 : representa a velocidade que desejamos obter;

v_0 : representa a velocidade inicial. Neste caso, ela é 0;

$2a$: representa 2 vezes a aceleração;


Δx : representa o deslocamento que obtemos no experimento.

Após realizarmos estes cálculos, obtemos o seguinte resultado para a velocidade:

Tabela 3.3: Velocidade m/s

Δx (m)	t (s)	a (m/s^2)	v (m/s)
0.1	0.000	0.4304219148	0.2934014025
0.2	0.742	0.7265277061	0.5390835580
0.3	1.116	0.4817512622	0.5376344086
0.4	1.249	0.5128201841	0.6405124099
0.5	1.449	0.4762809696	0.6901311249
0.6	1.709	0.4108630830	0.7021650088

A seguir, é apresentado o gráfico da velocidade por intervalo de tempo:



————— (Incompleto)

Na etapa 2, coletamos amostras de tempo para vários pesos no porta-peso. A próxima tabela apresenta os valores obtidos.

Tabela 3.4: Amostras dos pesos e tempos de duração.

Pesos (kg)	Tempos (s)
0.000	0.00000
0.011	1.11600
0.012	1.09560
0.013	1.04860
0.014	1.00760
0.015	0.95660
0.016	0.92263
0.017	0.91466

4. Conclusão

Referências

- Halliday, R.; Krane, D.; Resnick. 1996. *Física*. Vol. 1. Livros Técnicos e Científicos Editora.
- Nussenzveig, H.M. 1997. *Curso de Física Básica*. Vol. 1. Edgard Bucher Ltda.
- Tipler, G., P.A. e MOSCA. 2005. *Física*. Vol. 1. McGraw-Hill.