

II appello 2 febbraio 2021

Nome:

Cognome:

Bonus: sì' no

- Scrivere in modo CHIARO. Elaborati illegibili non saranno considerati.
- NON si contano le BRUTTE copie.
- Si ricorda di ESPlicitARE l'uso della regola dello scambio sia a destra che a sinistra del sequente.
- Si ricorda di ETICHETTARE LE DERIVAZIONI CON LE REGOLE USATE (se non lo fate perdetevi punti!)
- Si esplicitino le eventuali regole derivate usate che non sono menzionate nel foglio allegato al compito.
- ATTENZIONE: se si risolvono correttamente TUTTI gli esercizi con il segno ++ si prende il voto 30 indipendentemente dall'avere o meno un bonus accumulato.
- non si supera l'appello operando solo formalizzazioni a meno che non siano completati correttamente il primo e terzo esercizio qui di seguito.
- Per chi NON ha bonus il I e III esercizio sono obbligatori.

- Mostrare se i sequenti elencati sotto sono tautologie, opinioni o paradossi in logica classica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente proposizionale non valido si indichi la riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità si assegna il doppio dei punti indicati).

- (obbligatorio per chi NON ha bonus)

3 punti

$$\neg(A \rightarrow B) \vdash \neg A \ \& \ \neg B$$

- (++)

6 punti

$$\exists y \exists z y \neq z \vdash b = a \vee \neg \forall y y = c$$

- (obbligatorio per chi NON ha bonus)

5 punti

$$\exists x \neg A(x) \ \& \ \forall z A(z) \vdash \forall z (A(z) \vee \neg A(z))$$

- Formalizzare le seguenti asserzioni e stabilire se i sequenti ottenuti sono tautologie, opinioni o paradossi nella logica classica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità si assegna il doppio dei punti indicati).

- (6 punti)

Chi ascolta non parla senza riflettere.

Se uno non ascolta non è saggio.

I saggi non parlano senza riflettere.”

si consiglia di usare:

$P(y)$ = “y parla senza riflettere”

$A(x)$ = “x ascolta”

$S(x)$ = “x è saggio. ”

- (++) (6 punti)

Gloria ascolta ma non impara.

Tutti imparano.

si consiglia di usare:

$A(y)$ = “y ascolta”

$I(x)$ = “x impara”

g = Gloria ”

- (8 punti)

Gloria non ha alcun fratello gemello.

Non si dà il caso che Gloria abbia un’unico fratello gemello.

si consiglia di usare:

$F(x, y)$ = x è fratello gemello di y

g = Gloria

- (++) (14 punti)

“Non esiste alcuno che se ascolta e impara allora tutti ascoltano.”

si consiglia di usare:

$A(y)$ = “y ascolta”

$I(x)$ = “x impara”

- (29 punti) Sia T_{pas} la teoria ottenuta estendendo $LC_{=}$ con la formalizzazione dei seguenti assiomi:

1. Se Penelope non va a passeggiare allora pure Mia non ci va e neanche Ernesto.
2. Sia Ernesto che Ludovica vanno a passeggiare se non ci va Mia.
3. Solo se sia Ernesto che Penelope non vanno a passeggiare Mia non va a passeggiare.
4. Mia va a passeggiare se e solo se, o Ludovica ci va oppure Penelope non ci va.
5. Solo se Penelope va a passeggiare ci va pure Ludovica.

Si consiglia di usare:

$P(x)$ = x va in a passeggiare e =Ernesto b =Ludovica p =Penelope m =Mia.

Formalizzare le seguenti affermazioni e dedurne la validità in T_{pas} :

- (6 punti) Mia va a passeggiare.
- (4 punti) Penelope va a passeggiare.
- (5 punti) Ludovica va a passeggiare.
- (4 punti) Se Ludovica non va a passeggiare allora Ernesto ci va.
- (5 punti) O tutti vanno a passeggiare oppure qualcuno non ci va.

- (49 punti) Sia T_{con} la teoria ottenuta estendendo $LC_{=}$ con la formalizzazione dei seguenti assiomi:

- (1 punto) Violetta si confida con Tatiana.
- (3 punti) Violetta si confida al più con Tatiana.
- (1 punto) Tatiana non è Rosa.
- (3 punti) Nessuno si confida con nessuno.
- (2 punti) Nessuno si confida con Patrizia.
- (3 punti) Se uno si confida con un altro qualsiasi, quest'altro si confida con il primo.

Si consiglia di usare:

$C(x, y)$ = x si confida con y

p ="Patrizia" r ="Rosa" t ="Tatiana" v ="Violetta"

Dopo aver formalizzato le frasi seguenti mostrarne una derivazione nella teoria in T_{con} :

- (6 punti) Violetta non si confida con Patrizia.
- (6 punti) Tatiana si confida con Violetta.
- (12 punti) Violetta non si confida con Rosa.
- (12 punti) Patrizia non si confida con nessuno.

- (++) : Dall'affermazione

Ip La domenica non tutti non lavorano.

si dica quali delle seguenti affermazioni si possono dedurre (la classificazione di ciascuna vale 8 punti se è deducibile e 14 punti se NON lo è):

- A **Se nessuno lavora allora non è domenica.**
- B **Di domenica qualcuno lavora.**
- C **Se nessuno non lavora non è domenica.**

Si giustifichi la risposta corretta producendo una sua derivazione nella teoria predicativa

$$\mathbf{T_{Ip}} = \mathbf{LC_{=}} + \mathbf{Ip}$$

dopo aver formalizzato ciascuna affermazione utilizzando:

L(x) = x lavora

D = è domenica

Inoltre si giustifichi le risposte “affermazione X” non corrette classificando in **LC₌** il seguente **Ip** ⊢ “affermazione X” .

- Stabilire se la seguente regola è sicura rispetto alla semantica classica (nel caso di regola non sicura si analizzi entrambe le inverse):

- (++) solo sicurezza della regola) (15 punti)

$$\frac{\neg F \vdash \neg C \ \& \ M \quad C \vdash M \ \vee \ F}{C \vdash \neg \neg F} \ 1$$

- (++) (32 punti) (*Esercizio facoltativo*)

In un gioco due amiche fanno un'affermazione, che è vera o falsa.

Un'affermazione è mancante e l'altra è riportata sotto:

Celeste:

Morgana: **Se Celeste afferma il falso anch'io affermo il falso.**

Si può dedurre, anche se non si conosce l'affermazione di Celeste, quante affermazioni sono vere?

- a) No
- b) Sì, sono vere tutte e due le affermazioni.
- c) Sì, è vera solo l'affermazione di Morgana.
- d) Sì, è vera solo l'affermazione di Celeste.
- e) Nessuna affermazione è vera.

Si analizzino le varie affermazioni nella teoria proposizionale $T_{Morgana}$ ottenuta estendendo **LC_p** con la formalizzazione di ciò che dice Morgana (formalizzazione 2 punti) tramite:

M = l'affermazione di Morgana è vera

C = l'affermazione di Celeste è vera

Logica classica con uguaglianza- $\text{LC}_=$

ax-id	$\text{ax-}\perp$	ax-tt
$\Gamma, A, \Gamma' \vdash \Delta, A, \Delta'$	$\Gamma, \perp, \Gamma' \vdash \nabla$	$\Gamma \vdash \nabla, \text{tt}, \nabla'$
$\frac{\Sigma, \Gamma, \Theta, \Gamma', \Delta \vdash \Sigma'}{\Sigma, \Gamma', \Theta, \Gamma, \Delta \vdash \Sigma'} \text{sc}_{\text{sx}}$	$\frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta, \Theta, \Delta', \nabla}{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta', \Theta, \Delta, \nabla} \text{sc}_{\text{dx}}$	
$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \& B \vdash \Delta} \&\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \& B, \Delta} \&-\text{D}$	
$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \vee-\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A, B, \Delta}{\Gamma \vdash A \vee B, \Delta} \vee\text{D}$	
$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} \neg-\text{S}$	$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg A, \Delta} \neg-\text{D}$	
$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \rightarrow B \vdash \Delta} \rightarrow-\text{S}$	$\frac{\Gamma, A \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Delta} \rightarrow-\text{D}$	
$\frac{\Gamma, \forall x A(x), A(t) \vdash \nabla}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash \nabla} \forall-\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A(w), \nabla}{\Gamma \vdash \forall x A(x), \nabla} \forall-\text{D} \ (w \notin VL(\Gamma, \forall x A(x), \nabla))$	
$\frac{\Gamma, A(w) \vdash \nabla}{\Gamma, \exists x A(x) \vdash \nabla} \exists-\text{S} \ (w \notin VL(\Gamma, \exists x A(x), \nabla))$	$\frac{\Gamma \vdash A(t), \exists x A(x), \nabla}{\Gamma \vdash \exists x A(x), \nabla} \exists-\text{D}$	
$\frac{\Sigma, t_{\text{ter}} = s_{\text{ter}}, \Gamma(t_{\text{ter}}) \vdash \Delta(t_{\text{ter}}), \nabla}{\Sigma, \Gamma(s_{\text{ter}}), t_{\text{ter}} = s_{\text{ter}} \vdash \Delta(s_{\text{ter}}), \nabla} =-\text{S}$	$\frac{}{\Gamma \vdash t_{\text{ter}} = t_{\text{ter}}, \Delta} =-\text{ax}$	

TAUTOLOGIE CLASSICHE

associatività \vee	$(A \vee B) \vee C$	\leftrightarrow	$A \vee (B \vee C)$
associatività $\&$	$(A \& B) \& C$	\leftrightarrow	$A \& (B \& C)$
commutatività \vee	$A \vee B$	\leftrightarrow	$B \vee A$
commutatività $\&$	$A \& B$	\leftrightarrow	$B \& A$
distributività \vee su $\&$	$A \vee (B \& C)$	\leftrightarrow	$(A \vee B) \& (A \vee C)$
distributività $\&$ su \vee	$A \& (B \vee C)$	\leftrightarrow	$(A \& B) \vee (A \& C)$
idempotenza \vee	$A \vee A$	\leftrightarrow	A
idempotenza $\&$	$A \& A$	\leftrightarrow	A
leggi di De Morgan	$\neg(B \vee C)$	\leftrightarrow	$\neg B \& \neg C$
	$\neg(B \& C)$	\leftrightarrow	$\neg B \vee \neg C$
legge della doppia negazione	$\neg \neg A$	\leftrightarrow	A
implicazione classica	$(A \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$\neg A \vee C$
disgiunzione come antecedente	$(A \vee B \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(A \rightarrow C) \& (B \rightarrow C)$
congiunzione come antecedente	$(A \& B \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(A \rightarrow (B \rightarrow C))$
legge della contrapposizione	$(A \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(\neg C \rightarrow \neg A)$
legge del modus ponens	$A \& (A \rightarrow C)$	\rightarrow	C
legge della NON contraddizione	$\neg(A \& \neg A)$		
legge del terzo escluso	$A \vee \neg A$		
leggi di De Morgan	$\neg(\exists x A(x))$	\leftrightarrow	$\forall x \neg A(x)$
	$\neg(\forall x A(x))$	\leftrightarrow	$\exists x \neg A(x)$

Regola di composizione

$$\frac{\vdash \mathbf{fr} \quad \Gamma, \mathbf{fr}, \Gamma' \vdash \nabla}{\Gamma, \Gamma' \vdash \nabla} \text{comp}$$

Regole derivate o ammissibili per $\mathbf{LC}_=$

si ricorda che $t \neq s \equiv \neg t = s$

$$\frac{}{\Gamma, A, \Gamma', \neg A, \Gamma'' \vdash C} \neg\text{-ax}_{sx1}$$

$$\frac{}{\Gamma, \neg A, \Gamma', A, \Gamma'' \vdash C} \neg\text{-ax}_{sx2}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \Sigma, A, \Sigma', \neg A, \Sigma''} \neg\text{-ax}_{dx1}$$

$$\frac{}{\Gamma \vdash \Sigma, \neg A, \Sigma', A, \Sigma''} \neg\text{-ax}_{dx2}$$

$$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, \neg\neg A \vdash \Delta} \neg\neg\text{-S}$$

$$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma \vdash \neg\neg A, \Delta} \neg\neg\text{-D}$$

$$\frac{\Gamma, \Gamma'' \vdash \Sigma}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \vdash \Sigma} \text{in}_{sx}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Sigma''}{\Gamma \vdash \Sigma, \Sigma', \Sigma''} \text{in}_{dx}$$

$$\frac{\Gamma, A(t) \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash \Delta} \forall\text{-S}_v$$

$$\frac{\Gamma \vdash A(t), \Delta}{\Gamma \vdash \exists x A(x), \Delta} \exists\text{-D}_v$$