

REGOLE DEL CALCOLO DEI SEQUENTI

$$\frac{\text{ax-id}}{\Gamma, \text{pr}, \Gamma' \vdash \Delta, \text{pr}, \Delta'}$$

$$\frac{\text{ax-}\perp}{\Gamma, \perp, \Gamma' \vdash \nabla}$$

$$\frac{\text{ax-}\top}{\Gamma \vdash \nabla, \top, \nabla'}$$

$$\frac{\Sigma, \Gamma, \Theta, \Gamma', \Delta \vdash \Sigma'}{\Sigma, \Gamma', \Theta, \Gamma, \Delta \vdash \Sigma'} \text{sc}_{\text{sx}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta, \Theta, \Delta', \nabla}{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta', \Theta, \Delta, \nabla} \text{sc}_{\text{dx}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta \quad \Gamma \vdash \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \& (\text{pr}_2), \Delta} \&-D$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \& (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \&-S$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \vee (\text{pr}_2), \Delta} \vee-D$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \Delta \quad \Gamma, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \vee (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \vee-S$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg(\text{pr}_1), \Delta} \neg-D$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta}{\Gamma, \neg(\text{pr}_1) \vdash \Delta} \neg-S$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \rightarrow (\text{pr}_2), \Delta} \rightarrow-D$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta \quad \Gamma, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \rightarrow (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \rightarrow-S$$