

## 6. bis Esercizi di formalizzazione e validità dei sequenti

Formalizzare in sequenti le seguenti asserzioni e mostrare se la proposizione ottenuta è valida tramite derivazione nel calcolo dei sequenti classico.

1.

Solo se mi sento stanco rimango a casa.

Non rimango a casa se non mi sento stanco.

R = rimango a casa.

S = mi sento stanco.

$$\begin{array}{c}
 ax - id \\
 \frac{\neg S, R \vdash, R}{\neg S \vdash \neg R, R} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg S \rightarrow \neg R, R}{\vdash R, \neg S \rightarrow \neg R} \rightarrow - D \\
 \frac{\vdash R, \neg S \rightarrow \neg R}{R \rightarrow S \vdash \neg S \rightarrow \neg R} Sc - Dx \\
 \frac{ax - id}{S \vdash S, \neg R} ax - id \\
 \frac{S \vdash S, \neg R}{S, \neg S \vdash \neg R} \neg - S \\
 \frac{S, \neg S \vdash \neg R}{S \vdash \neg S \rightarrow \neg R} \rightarrow - D \\
 \frac{R \rightarrow S \vdash \neg S \rightarrow \neg R}{R \rightarrow S \vdash \neg S \rightarrow \neg R} \rightarrow - S
 \end{array}$$

TAUTOLOGIA

2.

Non si dà il caso che l'affare sia non sicuro o non conveniente.

L'affare è conveniente e sicuro.

A = l'affare è conveniente.

S = l'affare è sicuro.

$$\begin{array}{c}
 ax - id \\
 \frac{A \vdash \neg S, A}{\vdash \neg A, \neg S, A} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg A, \neg S, A}{\vdash \neg S, \neg A, A} Sc - Dx \\
 \frac{\vdash \neg S, \neg A, A}{\vdash \neg S \vee \neg A, A} \vee - D \\
 \frac{\vdash \neg S \vee \neg A, A}{\vdash A, \neg S \vee \neg A} Sc - Dx \\
 \frac{ax - id}{S \vdash S, \neg A} ax - id \\
 \frac{S \vdash S, \neg A}{S \vdash \neg A, S} Sc - Dx \\
 \frac{S \vdash \neg A, S}{\vdash \neg S, \neg A, S} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg S, \neg A, S}{\vdash \neg S \vee \neg A, S} \vee - D \\
 \frac{\vdash \neg S \vee \neg A, S}{\vdash S, \neg S \vee \neg A} Sc - Dx \\
 \frac{\vdash S, \neg S \vee \neg A}{\vdash A \& S, \neg S \vee \neg A} \& - D \\
 \frac{\vdash A \& S, \neg S \vee \neg A}{\vdash \neg S \vee \neg A, A \& S} Sc - Dx \\
 \frac{\vdash \neg S \vee \neg A, A \& S}{\neg(\neg S \vee \neg A) \vdash A \& S} \neg - S
 \end{array}$$

TAUTOLOGIA

3.

Non si dà il caso che l'affare non sia conveniente o sicuro.

L'affare non è conveniente né sicuro.

A = l'affare è conveniente.

S = l'affare è sicuro.

*Non Derivabile*

$$\begin{array}{c}
 \frac{A, A \vdash S}{A \vdash \neg A, S} \neg - D \\
 \frac{A \vdash \neg A, S}{A \vdash S, \neg A} Sc - Dx \\
 \frac{A \vdash S, \neg A}{\vdash \neg A, S, \neg A} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg A, S, \neg A}{\vdash \neg A \vee S, \neg A} \vee - D \\
 \frac{\vdash \neg A \vee S, \neg A}{\neg(\neg A \vee S) \vdash \neg A} \neg - S \\
 \hline
 \neg(\neg A \vee S) \vdash \neg A \quad \neg(\neg A \vee S) \vdash \neg S \\
 \hline
 \neg(\neg A \vee S) \vdash \neg A \& \neg S
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 ax - id \\
 \frac{S \vdash S, \neg A}{\vdash \neg S, S, \neg A} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg S, S, \neg A}{\vdash \neg A, S, \neg S} Sc - Dx \\
 \frac{\vdash \neg A, S, \neg S}{\vdash \neg A \vee S, \neg S} \vee - D \\
 \frac{\vdash \neg A \vee S, \neg S}{\neg(\neg A \vee S) \vdash \neg S} \neg - S \\
 \hline
 \neg(\neg A \vee S) \vdash \neg A \& \neg S
 \end{array}
 \quad
 \& - D$$

Sequente non valido, falso sulla riga A=1 o S=0.

*Non derivabile*

$$\begin{array}{c}
 \frac{\vdash A}{\neg A \vdash} \neg - S \\
 \frac{\neg A \vdash}{\neg A \vee S \vdash} \vee - S \\
 \frac{\neg A \vee S \vdash}{\vdash \neg(\neg A \vee S)} \neg - D \\
 \hline
 \neg(\neg A \vee S) \rightarrow (\neg A \& \neg S) \vdash \\
 \hline
 \vdash \neg(\neg(\neg A \vee S) \rightarrow (\neg A \& \neg S)) \neg - D
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 Non derivabile \\
 \frac{\vdash A, S}{\neg A \vdash S} \neg - S \\
 \frac{\neg A \vdash S}{\neg A, \neg S \vdash} \neg - S \\
 \frac{\neg A, \neg S \vdash}{\neg A \& \neg S \vdash} \& - S \\
 \hline
 \neg A \& \neg S \vdash \rightarrow - S \\
 \hline
 \vdash \neg(\neg(\neg A \vee S) \rightarrow (\neg A \& \neg S)) \neg - D
 \end{array}$$

## OPINIONE

4.

Se Mario è scontento non programma bene.

Mario è contento solo se programma bene.

C = Mario è contento.

P = Mario programma bene.

$$\begin{array}{c}
 ax - id \quad ax - id \\
 \frac{P, C \vdash C}{P \vdash \neg C, C} \neg - D \quad \frac{P \vdash P, C}{P, \neg P \vdash C} \neg - S \\
 \hline
 \frac{P, \neg C \rightarrow \neg P \vdash C}{\neg C \rightarrow \neg P, P \vdash C} \rightarrow - S \\
 \hline
 \frac{\neg C \rightarrow \neg P, P \vdash C}{\neg C \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow C} Sc - Sx \\
 \hline
 \neg C \rightarrow \neg P \vdash P \rightarrow C \rightarrow - D
 \end{array}$$

## TAUTOLOGIA

5.

C'è un'assemblea studentesca o è un giorno festivo solo se le lezioni tacciono.

Non è un giorno festivo e non c'è un'assemblea studentesca, perciò le lezioni non tacciono.

L = le lezioni tacciono.

A = c'è un'assemblea studentesca.

F = è un giorno festivo

$$\begin{array}{c}
 \text{Non derivabile} \\
 \frac{(A \vee F) \rightarrow L \quad \neg F \quad \& \neg A}{(A \vee F) \rightarrow L \quad \neg(F \& \neg A) \quad \& \neg L} \quad \& -D \\
 \frac{\frac{\frac{L, L \vdash}{L \vdash \neg L} \neg - D}{\neg A \vee F, \neg L} \rightarrow -S}{(A \vee F) \rightarrow L \quad \neg(F \& \neg A) \quad \& \neg L} \rightarrow -S
 \end{array}$$

Sequente non valido, falso sulla riga L=1.

$$\begin{array}{c}
 \text{Non derivabile} \\
 \frac{\frac{\frac{L \vdash}{\vdash \neg L} \neg - D}{\neg(A \vee F) \rightarrow L \rightarrow (\neg F \& \neg A)} \rightarrow -S}{(A \vee F) \rightarrow L \rightarrow (\neg F \& \neg A) \quad \& \neg L \vdash} \neg - D
 \end{array}$$

## OPINIONE

6.

Non si da il caso che il fattoriale termini mentre non si esce dal ciclo. Si esce dal ciclo.

Non si da il caso che si esca dal ciclo solo se il fattoriale non termina.

F = il fattoriale termina.

C = si esce dal ciclo.

$$\begin{array}{c}
 \text{Non derivabile} \\
 \frac{\frac{\frac{C \vdash F, F}{C \vdash F \& \neg C, F} \& -D}{C, \neg(F \& \neg C) \vdash F} \neg - S}{\neg(F \& \neg C), C \vdash \neg F} \neg - S \\
 \frac{\frac{\frac{\frac{ax-id}{\neg(F \& \neg C), C \vdash C}}{\neg(F \& \neg C), C, \neg F \vdash} \neg - S}{\neg(F \& \neg C), C, C \rightarrow \neg F \vdash} \rightarrow -S}{\neg(F \& \neg C), C \vdash \neg(C \rightarrow \neg F)} \neg - D
 \end{array}$$

Sequente non valido, falso sulla riga C=1 o F=0.

## OPINIONE

## TAUTOLOGIA

$$\frac{\frac{\frac{ax-id}{S, V \vdash V} \neg - D \quad \frac{ax-id}{S \vdash S, V} \neg - S}{S, \neg \neg V, V} \rightarrow -S}{S, \neg V \rightarrow \neg S \vdash V} Sc - Sx$$

## TAUTOLOGIA

9.

Solo se non dormo la notte la mattina mi alzo stanco.

La mattina non mi alzo stanco se non si dà il caso che non dorma la notte.

D = dormo la notte.

S = la mattina mi alzo stanco.

$$\begin{array}{c} ax-id \\ \frac{\neg\neg D, S \not\vdash S}{\neg\neg D \not\vdash \neg S, S} \neg\neg D \\ \frac{\neg\neg D \not\vdash \neg S, S}{\not\vdash \neg\neg D \rightarrow \neg S, S} \rightarrow -D \\ \frac{\not\vdash \neg\neg D \rightarrow \neg S, S}{\not\vdash S, \neg\neg D \rightarrow \neg S} Sc-Dx \\ \hline S \rightarrow \neg D \not\vdash \neg\neg D \rightarrow \neg S \end{array} \quad \begin{array}{c} ax-id \\ \frac{\neg D \not\vdash \neg D, \neg S}{\neg D, \neg\neg D \not\vdash \neg S} \neg\neg S \\ \frac{\neg D, \neg\neg D \not\vdash \neg S}{\neg D \not\vdash \neg\neg D \rightarrow \neg S} \rightarrow -D \\ \hline \neg D \not\vdash \neg\neg D \rightarrow \neg S \end{array} \rightarrow -S$$

## TAUTOLOGIA

## Test di comprensione: attenzione all'implicazione classica

*In caso di validità specificare per quali valori delle variabili proposizionali la proposizione è falsa, ovvero su quale riga della tabella di verità la proposizione è falsa, poi se la proposizione ottenuta è soddisfacibile e su che valori lo è, oppure se è insoddisfacibile.*

1.

Se passerete l'esame di logica al primo appello, allora a giugno farete una vacanza alle Hawaii, e se a giugno farete una vacanza alle Hawaii allora passerete l'esame di logica al primo appello.

L = passerete l'esame di logica al primo appello.

R = a giugno farete una vacanza alle Hawaii.

*Non derivabile*

$$\frac{\frac{L \vdash R}{\vdash L \rightarrow R} \rightarrow D \quad \vdash R \rightarrow L}{\vdash (L \rightarrow R) \& (R \rightarrow L)} \& -D$$

Sequente non valido, falso sulla riga L=1, R=0.

*Non derivabile*

$$\frac{\frac{\frac{\vdash L, R}{L \rightarrow R \vdash R} \rightarrow -S \quad L \rightarrow R, L \vdash}{L \rightarrow R, R \rightarrow L \vdash} \rightarrow -S}{\frac{(L \rightarrow R) \& (R \rightarrow L) \vdash}{\vdash \neg((L \rightarrow R) \& (R \rightarrow L))} \& -S} \neg -D$$

## OPINIONE

2.

Se passerete l'esame di logica al primo appello, allora a giugno farete una vacanza alle Hawaii, oppure se a giugno farete una vacanza alle Hawaii allora passerete l'esame di logica al primo appello.

L = passerete l'esame di logica al primo appello.

R = a giugno farete una vacanza alle Hawaii.

$$\begin{array}{c}
ax-id \\
\frac{L, R \not\vdash L, R}{L \not\vdash R \rightarrow L, R} \rightarrow -D \\
\frac{L \not\vdash R \rightarrow L, R}{L \not\vdash R, R \rightarrow L} Sc - Dx \\
\frac{L \not\vdash R, R \rightarrow L}{\not\vdash L \rightarrow R, R \rightarrow L} \rightarrow -D \\
\frac{\not\vdash L \rightarrow R, R \rightarrow L}{\not\vdash (L \rightarrow R) \vee (R \rightarrow L)} \vee -D
\end{array}$$

### TAUTOLOGIA

3.

Se non si dà il caso che se sei a Londra allora sei a Padova, allora sei a Londra e non sei a Padova.

L = sei a Londra.

R = sei a Padova.

$$\begin{array}{c}
ax-id \\
\frac{ax-id \quad L, P \not\vdash P}{L \not\vdash L, P \quad L \not\vdash \neg P, P} \neg -D \\
\frac{L \not\vdash L, P \quad L \not\vdash \neg P, P}{L \not\vdash L \& \neg P, P} \& -D \\
\frac{L \not\vdash L \& \neg P, P}{L \not\vdash P, L \& \neg P} Sc - Dx \\
\frac{L \not\vdash P, L \& \neg P}{\not\vdash L \rightarrow P, L \& \neg P} \rightarrow -D \\
\frac{\not\vdash L \rightarrow P, L \& \neg P}{\neg (L \rightarrow P) \not\vdash L \& \neg P} \neg -S \\
\frac{\neg (L \rightarrow P) \not\vdash L \& \neg P}{\not\vdash \neg (L \rightarrow P) \rightarrow (L \& \neg P)} \rightarrow -D
\end{array}$$

### TAUTOLOGIA

4.

Se il tuo vicino di banco non è a Londra allora ne segue che se il tuo vicino di banco è a Londra allora il tuo vicino di banco è un acrobata.

V = il tuo vicino di banco è a Londra.

A = il tuo vicino di banco è un acrobata.

$$\begin{array}{c}
ax-id \\
\frac{V \not\vdash V, A}{V, \neg V \not\vdash A} \neg -S \\
\frac{V, \neg V \not\vdash A}{\neg V, V \not\vdash A} Sc - Sx \\
\frac{\neg V, V \not\vdash A}{\neg V \not\vdash V \rightarrow A} \rightarrow -D \\
\frac{\neg V \not\vdash V \rightarrow A}{\not\vdash \neg V \rightarrow (V \rightarrow A)} \rightarrow -D
\end{array}$$

### TAUTOLOGIA

## Simulazione primo compito logica

Mostrare se i sequenti di seguito sono tautologie, opinioni o paradossi in logica classica, in altri termini, si mostri se sono validi o non validi, se sono soddisfacibili o insoddisfacibili in logica classica. Nel caso il sequente non sia valido esibire una riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e poi, in caso di soddisfacibilità una riga in cui il sequente è vero.

1.

$$\neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \vdash$$

Non derivabile

$$\frac{\frac{\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D) \vdash \quad A \vdash}{(\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A \vdash} \vee -S}{\vdash \neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A)} \neg - D$$

$$\frac{\vdash \neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A)}{\neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \vdash \perp} \neg - S$$

Sequente non valido, falso sulla riga **A=1** e gli altri a piacere.

$$\frac{\frac{\frac{\frac{\neg A \vee \neg D, A, D \vdash A}{\neg A \vee \neg D, A \& D \vdash A} \& -S}{\neg A \vee \neg D \vdash \neg(A \& D), A} \rightarrow -D}{\vdash \neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D), A} \rightarrow -D$$

$$\frac{\vdash \neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D), A}{\vdash (\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A} \vee -D$$

$$\frac{\vdash (\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A}{\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \vdash} \neg - S$$

$$\frac{\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \vdash}{\vdash \neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A)} \neg - D$$

$$\frac{\vdash \neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A)}{\neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \rightarrow \perp \vdash} \rightarrow -S$$

$$\frac{\neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \rightarrow \perp \vdash}{\vdash \neg(\neg\neg((\neg A \vee \neg D \rightarrow \neg(A \& D)) \vee A) \rightarrow \perp)} \neg - D$$

Il sequente di partenza è un **PARADOSSO**.



2.

$$\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \vdash \neg(A \vee \perp)$$

Non derivabile Non derivabile

$$\frac{\frac{\frac{\vdash B, A, A \quad \vdash M, A, A}{\vdash B \& M, A, A} \&-D}{\vdash A, B \& M, A} Sc-Dx \quad \frac{M \rightarrow B \quad \vdash B \& M, A}{\rightarrow -S}}{\frac{A \rightarrow (M \rightarrow B) \vdash \neg(B \& M), A}{\vdash (A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M), A} \rightarrow -D} \neg -S \quad \frac{ax-id}{\perp \vdash} \vee -S$$

$$\frac{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \vdash A}{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)), A \vee \perp \vdash} \vee -S$$

$$\frac{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)), A \vee \perp \vdash}{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \vdash \neg(A \vee \perp)} \neg -D$$

Sequente non valido, falso sulla riga A=B=M=0.

Non derivabile

$$\frac{\frac{\vdash A, \perp}{\vdash A \vee \perp} \vee -D}{\vdash \neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \quad \neg(A \vee \perp) \vdash} \neg -S$$

$$\frac{\vdash \neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \quad \neg(A \vee \perp) \vdash}{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \rightarrow (\neg(A \vee \perp)) \vdash} \rightarrow -S$$

$$\frac{\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \rightarrow (\neg(A \vee \perp)) \vdash}{\vdash \neg(\neg((A \rightarrow (M \rightarrow B)) \rightarrow \neg(B \& M)) \rightarrow (\neg(A \vee \perp)))} \neg -D$$

Il sequente di partenza è un'OPINIONE.

Vero  $\rightarrow A = 1$  Quindi il sequente di partenza è falso.

Falso  $\rightarrow A = 0$  Quindi il sequente di partenza è vero.

Formalizzale in sequente le argomentazioni di seguito. Si provi che il sequente ottenuto è tautologia, opinione o paradosso, in altri termini, si mostri se sono validi o non validi, se sono soddisfacibili o insoddisfacibili rispetto alla semantica della logica classica. Nel caso il sequente non sia valido esibire una riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e poi, in caso di soddisfacibilità una riga in cui il sequente è vero.

1.

Non si dà il caso che se l'edificio è antisismico allora non sia isolato termicamente.  
L'edificio non è antisismico ed è a rischio di crollo, se è isolato termicamente.

A = l'edificio è antisismico

I = l'edificio è isolato termicamente

C = l'edificio è a rischio crollo

*Non derivabile*

$$\begin{array}{c}
 \frac{I, A, A, I \vdash}{I, A, A \vdash \neg I} \neg - D \\
 \frac{I, A \vdash A \rightarrow \neg I}{I, A, \neg(A \rightarrow \neg I) \vdash} \neg - S \\
 \frac{I, \neg(A \rightarrow \neg I), A \vdash}{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A} Sc - Sx \\
 \frac{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A}{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A \& C} \& - D \\
 \frac{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A \& C}{\neg(A \rightarrow \neg I) \vdash I \rightarrow (\neg A \& C)} \rightarrow - D
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{c}
 ax - id \\
 \frac{A, I \vdash I, C}{A \vdash \neg I, I, C} \neg - D \\
 \frac{A \vdash \neg I, I, C}{\vdash A \rightarrow \neg I, I, C} \rightarrow - D \\
 \frac{\vdash A \rightarrow \neg I, I, C}{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash C} \neg - S \\
 \frac{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash C}{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A \& C} \& - D \\
 \frac{\neg(A \rightarrow \neg I), I \vdash \neg A \& C}{\neg(A \rightarrow \neg I) \vdash I \rightarrow (\neg A \& C)} \rightarrow - D
 \end{array}$$

Sequente non valido, falso sulla riga A=I=1.

*Non derivabile*

$$\begin{array}{c}
 \frac{\vdash I}{\vdash A} \neg - S \\
 \frac{\vdash A}{\vdash \neg I} \neg - S \\
 \frac{\vdash \neg I}{A \rightarrow \neg I \vdash} \rightarrow - S \\
 \frac{A \rightarrow \neg I \vdash}{\vdash \neg(A \rightarrow \neg I)} \neg - D \\
 \frac{\vdash \neg(A \rightarrow \neg I)}{\neg(A \rightarrow \neg I) \rightarrow (I \rightarrow (\neg A \& C)) \vdash} \rightarrow - S \\
 \frac{\neg(A \rightarrow \neg I) \rightarrow (I \rightarrow (\neg A \& C)) \vdash}{\vdash \neg(\neg(A \rightarrow \neg I) \rightarrow (I \rightarrow (\neg A \& C)))} \neg - D
 \end{array}$$

Il sequente di partenza è un' **OPINIONE**.

Falso  $\rightarrow A = 0 \vee I = 0$  Quindi il sequente di partenza è vero.

2.

Solo se piove non nevica.

Non si dà il caso che né piova né ci sia vento secco e né nevichi.

Non si dà il caso che piova se c'è vento secco.

P = piove

V = c'è vento secco

N = nevica

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{c}
 ax-id \\
 \frac{P, \neg V \vdash P, N, V}{P, \neg V, \neg P \vdash N, V} \neg-S \\
 \hline
 Sc-Sx
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 ax-id \\
 \frac{\neg N \rightarrow P, P, \neg N, \neg V \vdash P}{\neg N \rightarrow P, P, \neg N, \neg V, \neg P \vdash} \neg-S \\
 \hline
 Sc-Sx
 \end{array}
 \\
 \begin{array}{c}
 ax-id \\
 \frac{\neg P \& \neg V, N \vdash N, V}{\neg P \& \neg V \vdash \neg N, N, V} \neg-D \\
 \frac{P, \neg P, \neg V \vdash N, V}{P, \neg P \& \neg V \vdash N, V} \&-S \\
 \hline
 \neg P \& \neg V, P \vdash N, V \\
 \hline
 \neg P \& \neg V, \neg N \rightarrow P \vdash N, V \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, \neg P \& \neg V \vdash N, V \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, \neg P \& \neg V, \neg N \vdash V \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N \vdash V \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N, V \rightarrow P \vdash \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N \vdash (V \rightarrow P)
 \end{array}
 \qquad
 \begin{array}{c}
 \neg N \rightarrow P, P, \neg N, \neg P, \neg V \vdash \&-S \\
 \neg N \rightarrow P, P, \neg N, \neg P \& \neg V \vdash \\
 \neg N \rightarrow P, P, \neg P \& \neg V, \neg N \vdash \\
 \neg N \rightarrow P, P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N \vdash \\
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N, P \vdash \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N, V \rightarrow P \vdash \\
 \hline
 \neg N \rightarrow P, (\neg P \& \neg V) \& \neg N \vdash (V \rightarrow P)
 \end{array}
 \end{array}$$

TAUTOLOGIA

Si formalizzino le seguenti affermazioni che chiamiamo premesse.

1. Se è giovedì allora Wilma è a lezione.
2. Non si dà il caso che non sia né giovedì e neanche venerdì.
3. Simone non è a lezione se Wilma o Noemi sono a lezione.
4. Solo se Lino e Simone sono a lezione allora è venerdì.
5. Wilma non è a lezione solo se Noemi vi è.
6. Simone è a lezione se Wilma non vi è.
7. Se Noemi non è a lezione allora è giovedì.
8. Se Ilaria è a lezione, non si dà il caso che Simone non sia a lezione oppure Wilma non sia a lezione oppure Noemi non sia a lezione.

Formalizzare le seguenti affermazioni, che chiamiamo conclusioni, e dimostrare che ciascuna conclusione è conseguenza logica  $LC_p$  di una o più affermazioni della lista delle premesse eventualmente unite a una o più conclusioni che precedono la conclusione considerata nella lista delle conclusioni.

1. Se Simone non è a lezione non si dà il caso che Wilma non sia a lezione.
2. Se Simone è a lezione non vi è Wilma.
3. Noemi non è a lezione se Simone è a lezione.
4. Non è a lezione Simone se Wilma non vi è.
5. Wilma è a lezione.
6. Simone non è a lezione.
7. Ilaria non è a lezione.
8. Non è venerdì ma è giovedì.

Formalizzazione

#### Premesse

1.  $G \rightarrow W$
2.  $\neg(\neg G \& \neg V)$
3.  $(W \vee N) \rightarrow \neg S$
4.  $V \rightarrow (L \& S)$
5.  $\neg W \rightarrow N$
6.  $\neg W \rightarrow S$
7.  $\neg N \rightarrow G$
8.  $I \rightarrow \neg(\neg S \vee \neg W) \vee \neg N$

#### Conclusioni

1.  $\neg S \rightarrow \neg(\neg W)$
2.  $S \rightarrow \neg W$
3.  $S \rightarrow \neg N$
4.  $\neg W \rightarrow \neg S$
5.  $W$
6.  $\neg S$
7.  $\neg I$
8.  $\neg V \rightarrow G$

### *La Premessa 6 dimostra la Conclusione 1*

1. Applico sulla Premessa 6 la Regola 1.

$$\neg W \rightarrow S \not\vdash \neg S \rightarrow \neg(\neg W)$$

$$1. \quad \neg S \rightarrow \neg(\neg W) \not\vdash \neg S \rightarrow \neg(\neg W)$$

### *La Premessa 3 dimostra la Conclusione 2*

1. Applico sulla Premessa 3 la Regola 1.

2. Applico sulla Premessa 3 la Legge della doppia negazione.

3. Applico sulla Premessa 3 la Legge di De Morgan.

$$(W \vee N) \rightarrow \neg S \not\vdash S \rightarrow \neg W$$

$$1. \quad \neg \neg S \rightarrow \neg(W \vee N) \not\vdash S \rightarrow \neg W$$

$$2. \quad S \rightarrow \neg(W \vee N) \not\vdash S \rightarrow \neg W$$

$$3. \quad S \rightarrow (\neg W \& \neg N) \not\vdash S \rightarrow \neg W$$

### *La Premessa 3 dimostra la Conclusione 3*

1. Applico sulla Premessa 3 la Regola 1.

2. Applico sulla Premessa 3 la Legge della doppia negazione.

3. Applico sulla Premessa 3 la Legge di De Morgan.

$$(W \vee N) \rightarrow \neg S \not\vdash S \rightarrow \neg N$$

$$1. \quad \neg \neg S \rightarrow \neg(W \vee N) \not\vdash S \rightarrow \neg N$$

$$2. \quad S \rightarrow \neg(W \vee N) \not\vdash S \rightarrow \neg N$$

$$3. \quad S \rightarrow \neg W \& \neg N \not\vdash S \rightarrow \neg N$$

### *La Premessa 3 e 5 dimostrano la Conclusione 4*

1. Applico sulle Premessa 3 e 5 e sulla Conclusione 4 la Regola 1.

2. Applico sulla Premessa 3 e 5 e sulla Conclusione 4 la Legge della doppia negazione.

3. Applico sulla Premessa 3 la Legge di De Morgan.

4. Applico sulla premessa 3 la Regola 6, grazie alla Regola 8 posso dire che il sequente è valido.

$$(W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N \not\vdash \neg W \rightarrow \neg S$$

$$1. \quad \neg(\neg S) \rightarrow \neg(W \vee N), \neg N \rightarrow \neg(\neg W) \not\vdash \neg(\neg S) \rightarrow \neg(\neg W)$$

$$2. \quad S \rightarrow \neg(W \vee N), \neg N \rightarrow W \not\vdash S \rightarrow W$$

$$3. \quad S \rightarrow \neg W \& \neg N, \neg N \rightarrow W \not\vdash S \rightarrow W$$

$$4. \quad S \rightarrow \neg N, \neg N \rightarrow W \not\vdash S \rightarrow W$$

### *La Premessa 6 e la Conclusione 4 dimostrano la Conclusione 5*

1. Applico sulla Premessa 6 l'essenza applicazione.

2. Applico sulla Premessa 6 la Legge della doppia negazione.

3. Applico sulla Conclusione 4 la Regola 1.

4. Applico sulla Conclusione 4 la Legge della doppia negazione.

5. Applico sulla Premessa 6 la Regola 4, poi la Regola 3.

6. Applico sulla Premessa 6 la Regola 6

7. Applico sulla Premessa 6 la Legge della doppia negazione, grazie alla Regola 8 posso dire che il sequente è valido.

$$\neg W \rightarrow S, \neg W \rightarrow \neg S \not\vdash W$$

$$1. \neg\neg W \vee S, \neg W \rightarrow \neg S \not\vdash W$$

$$2. W \vee S, \neg W \rightarrow \neg S \not\vdash W$$

$$3. W \vee S, \neg\neg S \rightarrow \neg\neg W \not\vdash W$$

$$4. W \vee S, S \rightarrow W \not\vdash W$$

$$5. \neg(\neg W \& \neg S), S \rightarrow W \not\vdash W$$

$$6. \neg\neg S, S \rightarrow W \not\vdash W$$

$$7. S, S \rightarrow W \not\vdash W$$

#### *La Premessa 3 e 5 dimostrano la Conclusione 6*

1. Applico sulla Premessa 5 l'essenza applicazione.

2. Applico sulla Premessa 5 la Regola della doppia negazione.

$$(W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N \not\vdash \neg S$$

$$1. (W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg\neg W \vee N \not\vdash \neg S$$

$$2. (W \vee N) \rightarrow \neg S, W \vee N \not\vdash \neg S$$

#### *La Premessa 8 e Conclusione 6 dimostrano la Conclusione 7*

1. Applico sulla Premessa 8 la Regola 1.

2. Applico sulla Premessa 8 la Legge di De Morgan.

3. Applico sulla Premessa 8 la Legge di De Morgan.

4. Applico sulla Premessa 8 la Legge della doppia negazione.

5. Applico sulla Premessa 8 la Regola 6.

6. Applico sulla Premessa 8 la Regola 6, grazie alla Regola 8 posso dire che il sequente è valido.

$$I \rightarrow (\neg(\neg S \vee \neg W) \vee \neg N), \neg S \not\vdash \neg I$$

$$1. \neg(\neg(\neg S \vee \neg W) \vee \neg N) \rightarrow \neg I, \neg S \not\vdash \neg I$$

$$2. \neg(\neg((\neg S \vee \neg W) \& N)) \rightarrow \neg I, \neg S \not\vdash \neg I$$

$$3. \neg(\neg(\neg(S \& W) \& N)) \rightarrow \neg I, \neg S \not\vdash \neg I$$

$$4. (\neg(S \& W) \& N \rightarrow \neg I), \neg S \not\vdash \neg I$$

$$5. (\neg S \& N) \rightarrow \neg I, \neg S \not\vdash \neg I$$

$$6. \neg S \rightarrow \neg I, \neg S \not\vdash \neg I$$

#### *La Premessa 2 dimostra la Conclusione 8*

1. Applico sulla Premessa 2 la Regola 3, poi la Regola 4.

2. Applico sulla Conclusione 8 l'essenza implicazione.

3. Applico sulla Conclusione 8 la Legge della doppia negazione.

4. Applico sulla Premessa 2 la Commutativa  $\vee$ .

$$\neg(\neg G \& \neg V) \vdash \neg V \rightarrow G$$

1.  $G \vee V \vdash \neg V \rightarrow G$
2.  $G \vee V \vdash \neg \neg V \vee G$
3.  $G \vee V \vdash V \vee G$
4.  $V \vee G \vdash V \vee G$

Premessa 6 dimostra Conclusione 1.

$$\begin{array}{c}
 ax-id \\
 \frac{W \vdash W, S}{W, \neg W \vdash S} \neg - S \\
 \frac{W, \neg W \vdash S}{W \vdash \neg(\neg W), S} \neg - D \\
 \frac{W \vdash \neg(\neg W), S}{W \vdash S, \neg(\neg W)} Sc - Dx \\
 \frac{W \vdash S, \neg(\neg W)}{\vdash \neg W, S, \neg(\neg W)} \neg - D \quad \frac{ax-id}{S \vdash S, \neg(\neg W)} \rightarrow - S \\
 \frac{\vdash \neg W, S, \neg(\neg W)}{\neg W \rightarrow S \vdash S, \neg(\neg W)} \neg - S \\
 \frac{\neg W \rightarrow S \vdash S, \neg(\neg W)}{\neg W \rightarrow S, \neg S \vdash \neg(\neg W)} \neg - D \\
 \frac{\neg W \rightarrow S, \neg S \vdash \neg(\neg W)}{\neg W \rightarrow S \vdash \neg S \rightarrow \neg(\neg W)} \rightarrow - D
 \end{array}$$

Otengo come conclusione  $\neg S \rightarrow \neg(\neg W)$ .

Premessa 3 dimostra Conclusione 2.

$$\begin{array}{c}
 ax-id \quad ax-id \\
 \frac{S, W \vdash W, N}{S, W \vdash W \vee N} \quad \frac{S, W \vdash S}{S, W, \neg S \vdash} \neg - S \\
 \frac{S, W \vdash W \vee N \quad S, W, \neg S \vdash}{S, W, (W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash} \rightarrow - S \\
 \frac{S, W, (W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash}{(W \vee N) \rightarrow \neg S, S, W \vdash} Sc - Sx \\
 \frac{(W \vee N) \rightarrow \neg S, S, W \vdash}{(W \vee N) \rightarrow \neg S, S \vdash \neg W} \neg - D \\
 \frac{(W \vee N) \rightarrow \neg S, S \vdash \neg W}{(W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash S \rightarrow \neg W} \rightarrow - D
 \end{array}$$

Otengo come conclusione  $S \rightarrow \neg W$ .

Premessa 3 dimostra Conclusione 3.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} ax-id \\ S, N \not\vdash W, N \\ \hline S, N \not\vdash W \vee N \end{array} \vee -D \quad \begin{array}{c} ax-id \\ S, N \not\vdash S \\ \hline S, N, \neg S \not\vdash \neg S \end{array} \\
\hline S, N, (W \vee N) \rightarrow \neg S \not\vdash \neg S \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, S, N \not\vdash \neg S \quad Sc - Sx \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, S \not\vdash \neg N \quad \neg - D \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S \not\vdash S \rightarrow \neg N \quad \rightarrow -D
\end{array}$$

Otengo come conclusione  $| S \rightarrow \neg N |$ .

Premessa 3 e 5 dimostrano Conclusione 4.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} ax-id \\ N, S, \neg W \not\vdash W, N \\ \hline N, S, \neg W \not\vdash W \vee N \end{array} \vee -D \quad \begin{array}{c} ax-id \\ N, S, \neg W \not\vdash S \\ \hline N, S, \neg W, \neg S \not\vdash \neg S \end{array} \\
\hline N, S, \neg W, (W \vee N) \rightarrow \neg S \not\vdash \neg S \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, S, \neg W \not\vdash \neg W \quad Sc - Sx \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, S, \neg W, \neg W \rightarrow N \not\vdash \neg S \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N, \neg W, S \not\vdash \neg S \quad Sc - Sx \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N, \neg W \not\vdash \neg S \quad \neg - D \\
\hline (W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N \not\vdash \neg W \rightarrow \neg S \quad \rightarrow -D
\end{array}$$

Otengo come conclusione  $| \neg W \rightarrow \neg S |$ .

Premessa 6 e Conclusione 4 dimostrano Conclusione 5.

$$\begin{array}{c}
\begin{array}{c} ax-id \\ \neg W \rightarrow S, W \not\vdash W \\ \hline \neg W \rightarrow S \not\vdash \neg W, W \end{array} \neg - D \quad \begin{array}{c} ax-id \\ S \not\vdash S, W \\ \hline S, \neg S \not\vdash W \end{array} \neg - S \\
\hline \neg S, W \not\vdash W \quad \neg - D \quad \begin{array}{c} ax-id \\ S \not\vdash S, W \\ \hline S, \neg S \not\vdash W \end{array} Sc - Sx \\
\hline \neg S, \neg W \rightarrow S \not\vdash W \quad \rightarrow -S \\
\hline \neg W \rightarrow S, \neg S \not\vdash W \quad Sc - Sx \\
\hline \neg W \rightarrow S, \neg W \rightarrow \neg S \not\vdash W \quad \rightarrow -S
\end{array}$$

Otengo come conclusione  $| W |$ .



Premessa 3 e Conclusione 5 dimostrano Conclusione 6.

$$\begin{array}{c}
 \frac{ax-id}{S, W \vdash W, N} \vee -D \quad \frac{ax-id}{S, W \vdash S} \neg - S \\
 \frac{S, W \vdash W \vee N}{S, W, (W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash} \rightarrow -S \\
 \frac{S, W, (W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash}{(W \vee N) \rightarrow \neg S, W, S \vdash} Sc - Sx \\
 \frac{(W \vee N) \rightarrow \neg S, W, S \vdash}{(W \vee N) \rightarrow \neg S, W \vdash \neg S} \neg - D
 \end{array}$$

Otengo come conclusione  $\neg S$ .

Premessa 3 e Premessa 5 dimostrano Conclusione 6.

$$\begin{array}{c}
 \frac{ax-id}{W \vdash N, W} \vdash \neg W, N, W \\
 \frac{\vdash \neg W, N, W}{\vdash W \vee N, \neg W} \neg S \vdash \neg S \\
 \frac{\vdash W \vee N, \neg W}{(W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash \neg W, \neg S} \rightarrow -S \\
 \frac{(W \vee N) \rightarrow \neg S \vdash \neg W, \neg S}{(W \vee N) \rightarrow \neg S, \neg W \rightarrow N \vdash \neg S} \rightarrow -S
 \end{array}$$

Otengo come conclusione  $\neg S$ .

Premessa 8 e Conclusione 6 dimostrano Conclusione 7.

$$\begin{array}{c}
\frac{ax-id}{I \not\vdash S, I} \neg - D \\
\frac{\not\vdash \neg I, S, I}{\not\vdash I, S, \neg I} Sc - Dx \\
\frac{ax-id}{S \not\vdash \neg W, \neg N, S, \neg I} \neg - D \\
\frac{\not\vdash \neg S, \neg W, \neg N, S, \neg I}{\not\vdash (\neg S, \neg W) \vee \neg N, S, \neg I} \vee - D \\
\frac{\not\vdash (\neg S, \neg W) \vee \neg N, S, \neg I}{\not\vdash (\neg S \vee \neg W) \vee \neg N, S, \neg I} \vee - D \\
\frac{\not\vdash (\neg S \vee \neg W) \vee \neg N, S, \neg I}{\neg((\neg S \vee \neg W) \vee \neg N) \not\vdash S, \neg I} \neg - D \\
\frac{I \rightarrow \neg((\neg S \vee \neg W) \vee \neg N) \not\vdash S, \neg I}{I \rightarrow \neg((\neg S \vee \neg W) \vee \neg N), \neg S \not\vdash \neg I} \rightarrow - S \\
\frac{I \rightarrow \neg((\neg S \vee \neg W) \vee \neg N), \neg S \not\vdash \neg I}{I \rightarrow \neg((\neg S \vee \neg W) \vee \neg N), \neg S \not\vdash \neg I} \neg - S
\end{array}$$

Otengo come conclusione  $\neg I$ .

Premessa 2 dimostra Conclusione 8.

$$\begin{array}{c}
\frac{ax-id}{G \not\vdash V, G} \neg - D \\
\frac{\not\vdash \neg G, V, G}{\not\vdash \neg G \& \neg V, V, G} \& - D \\
\frac{\not\vdash \neg G \& \neg V, V, G}{\neg(\neg G \& \neg V) \not\vdash V, G} \neg - S \\
\frac{\neg(\neg G \& \neg V) \not\vdash V, G}{\neg(\neg G \& \neg V), \neg V \not\vdash G} \neg - S \\
\frac{\neg(\neg G \& \neg V), \neg V \not\vdash G}{\neg(\neg G \& \neg V) \not\vdash \neg V \rightarrow G} \rightarrow - D
\end{array}$$

Otengo come conclusione  $\neg V \rightarrow G$ .