

SIMULAZIONE I appello 20 dicembre 2018

nome:

cognome:

- Scrivere in modo CHIARO. Elaborati illegibili non saranno considerati.
- NON si contano le BRUTTE copie.
- Si ricorda di ESPLICITARE l'uso della regola dello scambio sia a destra che a sinistra del sequente.
- Si ricorda di ETICHETTARE LE DERIVAZIONI CON LE REGOLE USATE (se non lo fate perdete punti!)
- Si esplicitino le eventuali regole derivate usate che non sono menzionate nel foglio allegato al compito.
- ATTENZIONE: se si risolvono correttamente TUTTI gli esercizi con il segno ++ si prende il voto 30 indipendentemente dall'avere o meno un bonus accumulato.
- Mostrare se i sequenti elencati sotto sono tautologie, opinioni o paradossi, ovvero mostrare se sono validi o meno e soddisfacibili o insoddisfacibili in logica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente proposizionale non valido si indichi la riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità i punti vanno aumentati della metà arrotondata per eccesso)

- 3 punti
 $\neg B \vdash \neg (B \rightarrow \neg \neg A)$

- (++) 6 punti
 $\exists w (c = w \ \& \ w \neq d) \vdash \forall z \exists y \ z \neq y$

- 5 punti
 $\exists x (M(x) \vee A(x)) \vdash \exists x (\neg M(x) \rightarrow A(x))$

- Formalizzare le seguenti asserzioni e stabilire se i sequenti ottenuti sono tautologie, opinioni o paradossi, ovvero VALIDI o meno e SODDISFACIBILI o meno rispetto alla logica classica classica con uguaglianza motivando la risposta: nel caso di sequente proposizionale non valido si indichi la riga della tabella di verità in cui il sequente è falso e nel caso di sequente predicativo non valido si mostri un contromodello (nel caso di non validità i punti vanno aumentati della metà arrotondata per eccesso)

- (6 punti)

$$\frac{\text{Nessuno essere vivente si trova su Marte.}}{\text{Quelli che si trovano su Marte non sono esseri viventi.}}$$

si consiglia di usare:

$V(y)$ = “y è un essere vivente”

$A(x, y)$ = “x si trova su y”

m = “Marte”

- (++) (6 punti)

I ricchi non sono poveri.

Esiste un ricco che non è povero.

si consiglia di usare:

$R(x)$ = "x è ricco"

$P(x)$ = "x è povero"

- (8 punti)

Mario beve un'unica bevanda.

Mario beve tè.

Il tè non è caffè.

Mario non beve caffè.

si consiglia di usare:

$B(x,y)$ = "x beve y"

t = tè

c = caffè

m = Mario

- (++) (14 punti)

"Qualcuno loda solo se stesso e loda quelli e soltanto quelli che non si lodano."

si consiglia di usare:

$L(x,y)$ = x loda y

- Sia T_{rec} la teoria ottenuta estendendo $LC_{=}$ con la formalizzazione dei seguenti assiomi:

- Se Beppe recita, Dario non fa la comparsa.
- Luisa non recita se c'è un suggeritore.
- Luisa non recita solo se c'è un suggeritore.
- Se Dario non fa la comparsa allora Beppe e Luisa recitano.
- Dario fa la comparsa se Luisa recita o non c'è un suggeritore.

Si consiglia di usare:

$C(x)$ = x fa la comparsa

$R(x)$ = x recita

$S(x)$ = x un suggeritore

b=Beppe, d=Dario, l=Luisa.

Dedurre poi le seguenti affermazioni nella teoria indicata (ciascuna vale 4 punti quando non altrimenti indicato):

- Non c'è un suggeritore se Luisa recita.
- Se Luisa recita Dario fa la comparsa.
- (6 punti) Dario fa la comparsa.
- Luisa non recita o Beppe non recita.
- Qualcuno non recita.

- (++) Sia T_{mon} la teoria ottenuta estendendo $LC_{=}$ con la formalizzazione dei seguenti assiomi:

- Per ciascuna montagna esiste una montagna più alta di lei.
- Se una montagna è più alta di un'altra montagna, e quest'altra è più alta di una terza montagna, allora la prima montagna è più alta della terza montagna.
- Il Monte Bianco, il Monte Rosa, il Civetta e l'Everest sono montagne.
- Il Monte Rosa è più alto del Civetta.
- Date due montagne o la prima è più alta della seconda o la seconda è più alta della prima.
- Nessuna montagna è più alta di se stessa.
- Non c'è montagna più alta dell'Everest.
- Il Monte Bianco è più alto del Monte Rosa.

Si consiglia di usare:

$A(x,y)$ = "x è più alto di y"

$M(x)$ = "x è una montagna"

b="Monte Bianco" r="Monte Rosa" c="Civetta" e="Everest"

Dedurre poi in T_{am} le seguenti affermazioni (ciascuna vale 8 punti):

- Il Monte Bianco non è più alto dell'Everest.
- Il Monte Bianco è più alto del Civetta.
- L'Everest è più alto del Monte Rosa.
- L'Everest è più alto di tutte le montagne eccetto se stesso.
- Il Monte Rosa non è più alto del Monte Bianco.

- Stabilire se la seguente regola e le sue inverse sono valide rispetto alla semantica classica (l'analisi delle inverse raddoppia il punteggio):

- (6 punti)

$$\frac{D \vdash F \quad \vdash \neg F \ \& \ C}{\vdash \neg D \ \& \ C} \ 1$$

- (facoltativo)

Dire se nell'aritmetica di Peano PA questi sequenti sono validi (nel caso di non validità mostrare che la loro negazione è derivabile)

1. (7 punti) $\vdash \forall y \exists z \exists w \ y + w = z$
2. (7 punti) $\vdash \exists w \exists y \ w \cdot y = 0$

Logica classica con uguaglianza- $\text{LC}_=$

ax-id	$\text{ax-}\perp$	ax-tt
$\Gamma, A, \Gamma' \vdash \Delta, A, \Delta'$	$\Gamma, \perp, \Gamma' \vdash \nabla$	$\Gamma \vdash \nabla, \text{tt}, \nabla'$
$\frac{\Sigma, \Gamma, \Theta, \Gamma', \Delta \vdash \Sigma'}{\Sigma, \Gamma', \Theta, \Gamma, \Delta \vdash \Sigma'} \text{sc}_{\text{sx}}$	$\frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta, \Theta, \Delta', \nabla}{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta', \Theta, \Delta, \nabla} \text{sc}_{\text{dx}}$	
$\frac{\Gamma, A, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \& B \vdash \Delta} \&\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \& B, \Delta} \&-\text{D}$	
$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \vee B \vdash \Delta} \vee-\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A, B, \Delta}{\Gamma \vdash A \vee B, \Delta} \vee\text{D}$	
$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma, \neg A \vdash \Delta} \neg-\text{S}$	$\frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg A, \Delta} \neg-\text{D}$	
$\frac{\Gamma \vdash A, \Delta \quad \Gamma, B \vdash \Delta}{\Gamma, A \rightarrow B \vdash \Delta} \rightarrow-\text{S}$	$\frac{\Gamma, A \vdash B, \Delta}{\Gamma \vdash A \rightarrow B, \Delta} \rightarrow-\text{D}$	
$\frac{\Gamma, \forall x A(x), A(t) \vdash \nabla}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash \nabla} \forall-\text{S}$	$\frac{\Gamma \vdash A(w), \nabla}{\Gamma \vdash \forall x A(x), \nabla} \forall-\text{D} \ (w \notin VL(\Gamma, \forall x A(x), \nabla))$	
$\frac{\Gamma, A(w) \vdash \nabla}{\Gamma, \exists x A(x) \vdash \nabla} \exists-\text{S} \ (w \notin VL(\Gamma, \exists x A(x), \nabla))$	$\frac{\Gamma \vdash A(t), \exists x A(x), \nabla}{\Gamma \vdash \exists x A(x), \nabla} \exists-\text{D}$	
$\frac{\Sigma, t = s, \Gamma(t) \vdash \Delta(t), \nabla}{\Sigma, \Gamma(s), t = s \vdash \Delta(s), \nabla} =-\text{S}$	$\begin{array}{c} =-\text{ax} \\ \Gamma \vdash t = t, \Delta \end{array}$	

TAUTOLOGIE CLASSICHE

associatività \vee	$(A \vee B) \vee C$	\leftrightarrow	$A \vee (B \vee C)$
associatività $\&$	$(A \& B) \& C$	\leftrightarrow	$A \& (B \& C)$
commutatività \vee	$A \vee B$	\leftrightarrow	$B \vee A$
commutatività $\&$	$A \& B$	\leftrightarrow	$B \& A$
distributività \vee su $\&$	$A \vee (B \& C)$	\leftrightarrow	$(A \vee B) \& (A \vee C)$
distributività $\&$ su \vee	$A \& (B \vee C)$	\leftrightarrow	$(A \& B) \vee (A \& C)$
idempotenza \vee	$A \vee A$	\leftrightarrow	A
idempotenza $\&$	$A \& A$	\leftrightarrow	A
leggi di De Morgan	$\neg(B \vee C)$	\leftrightarrow	$\neg B \& \neg C$
	$\neg(B \& C)$	\leftrightarrow	$\neg B \vee \neg C$
legge della doppia negazione	$\neg \neg A$	\leftrightarrow	A
implicazione classica	$(A \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$\neg A \vee C$
disgiunzione come antecedente	$(A \vee B \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(A \rightarrow C) \& (B \rightarrow C)$
congiunzione come antecedente	$(A \& B \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(A \rightarrow (B \rightarrow C))$
legge della contrapposizione	$(A \rightarrow C)$	\leftrightarrow	$(\neg C \rightarrow \neg A)$
legge del modus ponens	$A \& (A \rightarrow C)$	\rightarrow	C
legge della NON contraddizione	$\neg(A \& \neg A)$		
legge del terzo escluso	$A \vee \neg A$		
leggi di De Morgan	$\neg(\exists x A(x))$	\leftrightarrow	$\forall x \neg A(x)$
	$\neg(\forall x A(x))$	\leftrightarrow	$\exists x \neg A(x)$

Regola di composizione

$$\frac{\vdash \mathbf{fr} \quad \Gamma, \mathbf{fr}, \Gamma' \vdash \nabla}{\Gamma, \Gamma' \vdash \nabla} \text{ comp}$$

Regole derivate o ammissibili per $\mathbf{LC}_=$

si ricorda che $t \neq s \equiv \neg t = s$

$$\begin{array}{c} \frac{\neg\text{-ax}_{sx1}}{\Gamma, A, \Gamma', \neg A, \Gamma'' \vdash C} \quad \frac{\neg\text{-ax}_{sx2}}{\Gamma, \neg A, \Gamma', A, \Gamma'' \vdash C} \\[10pt] \frac{\neg\text{-ax}_{dx1}}{\Gamma \vdash \Sigma, A, \Sigma', \neg A, \Sigma''} \quad \frac{\neg\text{-ax}_{dx2}}{\Gamma \vdash \Sigma, \neg A, \Sigma', A, \Sigma''} \\[10pt] \frac{\Gamma, A \vdash \Delta}{\Gamma, \neg\neg A \vdash \Delta} \neg\neg\text{-S} \quad \frac{\Gamma \vdash A, \Delta}{\Gamma \vdash \neg\neg A, \Delta} \neg\neg\text{-D} \\[10pt] \frac{\Gamma, \Gamma'' \vdash \Sigma}{\Gamma, \Gamma', \Gamma'' \vdash \Sigma} \text{in}_{sx} \quad \frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Sigma''}{\Gamma \vdash \Sigma, \Sigma', \Sigma''} \text{in}_{dx} \\[10pt] \frac{\Gamma, A(t) \vdash \Delta}{\Gamma, \forall x A(x) \vdash \Delta} \forall\text{-S}_v \quad \frac{\Gamma \vdash A(t), \Delta}{\Gamma \vdash \exists x A(x), \Delta} \exists\text{-D}_v \\[10pt] \frac{\text{rf}^*}{\Gamma \vdash \Delta, t = t, \Delta'} \\[10pt] \frac{\text{sm}^*}{\Gamma, t = u \vdash u = t, \Delta} \\[10pt] \frac{\text{tra}^*}{\Gamma, t = v, v = u \vdash t = u, \Delta} \quad \frac{\text{cf}^*}{\Gamma, t = u \vdash f(t) = f(u), \Delta} \\[10pt] \frac{\text{cp}^*}{\Gamma, P(t), t = u \vdash P(u), \Delta} \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash t = u, \Delta}{\Gamma \vdash u = t, \Delta} \text{sy-r} \quad \frac{\Gamma, t = u \vdash \Delta}{\Gamma, u = t \vdash \Delta} \text{sy-l} \\[10pt] \frac{\Gamma \vdash t = v, \Delta \quad \Gamma' \vdash v = u, \Delta'}{\Gamma, \Gamma' \vdash t = u, \Delta, \Delta'} \text{tr-r} \end{array}$$

Aritmetica di Peano PA

L'aritmetica di Peano è ottenuta aggiungendo a $LC_{=}$ la regola di composizione

$$\frac{\vdash \mathbf{fr} \quad \Gamma, \mathbf{fr}, \Gamma' \vdash \nabla}{\Gamma, \Gamma' \vdash \nabla} \text{ comp}$$

e i seguenti assiomi:

$$Ax1. \vdash \forall x \ s(x) \neq 0$$

$$Ax2. \vdash \forall x \ \forall y \ (s(x) = s(y) \rightarrow x = y)$$

$$Ax3. \vdash \forall x \ x + 0 = x$$

$$Ax4. \vdash \forall x \ \forall y \ x + s(y) = s(x + y)$$

$$Ax5. \vdash \forall x \ x \cdot 0 = 0$$

$$Ax6. \vdash \forall x \ \forall y \ x \cdot s(y) = x \cdot y + x$$

$$Ax7. \vdash A(0) \& \forall x \ (A(x) \rightarrow A(s(x))) \rightarrow \forall x \ A(x)$$

ove il numerale n si rappresenta in tal modo

$$n \equiv \underbrace{s(s \dots (0))}_{n\text{-volte}}$$

e quindi per esempio

$$1 \equiv s(0)$$

$$2 \equiv s(s(0))$$