

5. Calcolo dei sequenti LC_p della Logica classica proposizionale

Il calcolo LC_p è composto dai seguenti schemi di assiomi e regole:

$$\frac{\text{ax-id}}{\Gamma, \text{pr}_1, \Gamma' \vdash \Delta, \text{pr}_1, \Delta'}$$

$$\frac{\text{ax-}\perp}{\Gamma, \perp, \Gamma' \vdash \nabla}$$

$$\frac{\text{ax-}\top}{\Gamma \vdash \nabla, \top, \nabla'}$$

$$\frac{\Sigma, \Gamma, \Theta, \Gamma', \Delta \vdash \Sigma'}{\Sigma, \Gamma', \Theta, \Gamma, \Delta \vdash \Sigma'} \text{sc}_{\text{sx}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta, \Theta, \Delta', \nabla}{\Gamma \vdash \Sigma, \Delta', \Theta, \Delta, \nabla} \text{sc}_{\text{dx}}$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta \quad \Gamma \vdash \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \& (\text{pr}_2), \Delta} \&-D$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \& (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \&-S$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \vee (\text{pr}_2), \Delta} \vee-D$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \Delta \quad \Gamma, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \vee (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \vee-S$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \Delta}{\Gamma \vdash \neg(\text{pr}_1), \Delta} \neg-D$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta}{\Gamma, \neg(\text{pr}_1) \vdash \Delta} \neg-S$$

$$\frac{\Gamma, \text{pr}_1 \vdash \text{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\text{pr}_1) \rightarrow (\text{pr}_2), \Delta} \rightarrow-D$$

$$\frac{\Gamma \vdash \text{pr}_1, \Delta \quad \Gamma, \text{pr}_2 \vdash \Delta}{\Gamma, (\text{pr}_1) \rightarrow (\text{pr}_2) \vdash \Delta} \rightarrow-S$$

A che serve il calcolo dei sequenti? per costruire derivazioni

Il calcolo dei sequenti serve a costruire **alberi** che occasionalmente sono **alberi di derivazione**

ove

ALBERO di DERIVAZIONE per $\Gamma \vdash \Delta$
=
albero con radice $\Gamma \vdash \Delta$
ottenuto con regole del calcolo
e le cui foglie terminanti sono TUTTE ASSIOMI.

un sequente $\Gamma \vdash \Delta$
è **derivabile** nel calcolo dei sequenti
sse
è **radice di un albero di derivazione**

Esempio di albero di derivazione

$$\frac{\frac{\text{ax-id}}{P, Q \vdash Q} \quad \&-S \quad \frac{\frac{\text{ax-id}}{P, Q \vdash P} \quad \&-S}{P \& Q \vdash P} \quad \&-D}{P \& Q \vdash Q \& P}$$

in cui $P \& Q \vdash Q \& P$ è la RADICE mentre $P, Q \vdash Q$ e $P, Q \vdash P$ sono rispettivamente FOGLIE (che sono ASSIOMI) del ramo di sinistra e di quello di destra.

ATTENZIONE:

Nelle regole dei sequenti
le METAVariabili date da lettere greche MAIUSCOLE Γ e Δ , Σ ..
indicano LISTE DI PROPOSIZIONI anche VUOTE
mentre pr e pr_1 e pr_2 indicano proposizioni qualsiasi.

Quindi tali meta-variabili NON compariranno mai in un sequente ottenuto da una TRADUZIONE
in linguaggio formale di un enunciato in linguaggio naturale!!!!

Per esempio

$$\frac{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{Q} \& \mathbf{P} \quad \mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{C} \vee \mathbf{P}}{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash (\mathbf{Q} \& \mathbf{P}) \& (\mathbf{C} \vee \mathbf{P})} \&-D$$

è una corretta istanza della regola $\&-D$, detta anche *applicazione (dello schema) della regola $\&-D$*

$$\frac{\Gamma \vdash \mathbf{pr}_1, \Delta \quad \Gamma \vdash \mathbf{pr}_2, \Delta}{\Gamma \vdash (\mathbf{pr}_1) \& (\mathbf{pr}_2), \Delta} \&-D$$

ove al posto di \mathbf{pr}_1 c'è $\mathbf{Q} \& \mathbf{P}$ e al posto di \mathbf{pr}_2 c'è $\mathbf{C} \vee \mathbf{P}$ e al posto di Γ c'è la lista di una sola proposizione $\mathbf{P} \& \mathbf{Q}$ e al posto di Δ c'è la lista vuota.

Esercizi:

- il sequente

$$\mathbf{C}, \mathbf{A} \& (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C}), \mathbf{M} \vdash \mathbf{H} \& \mathbf{C}, \mathbf{A} \& (\mathbf{B} \rightarrow \mathbf{C})$$

è un assioma identità?

- la seguente è una derivazione in logica classica proposizionale LC_p

$$\frac{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{Q} \quad \mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{P}}{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{Q} \& \mathbf{P}}$$

???

- la scrittura sotto è un pezzo di albero costruito con un'istanza di una regola del calcolo LC_p

$$\frac{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{C} \quad \mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash \mathbf{Q} \vee \mathbf{P}}{\mathbf{P} \& \mathbf{Q} \vdash (\mathbf{C} \& \mathbf{Q}) \vee \mathbf{P}}$$

???

- Derivare in LC_p

$$\mathbf{A} \& \mathbf{B} \vdash \mathbf{B} \& \mathbf{A}$$

- Derivare in LC_p

$$(\mathbf{A} \& \mathbf{B}) \& \mathbf{C} \vdash \mathbf{A} \& (\mathbf{B} \& \mathbf{C})$$

- Derivare in LC_p

$$\mathbf{A} \& (\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{C}) \vdash (\mathbf{P} \rightarrow \mathbf{C}) \& \mathbf{A}$$

È possibile ottenere una derivazione di questo sequente a partire da quella di $\mathbf{A} \& \mathbf{B} \vdash \mathbf{B} \& \mathbf{A}$?
Come?

- Si derivino in LC_p i sequenti $\vdash \mathbf{pr}$ ottenuti sostituendo \mathbf{pr} con le proposizioni indicanti le leggi della logica classica elencate sotto.

Si ricorda che la scrittura $\mathbf{pr}_1 \leftrightarrow \mathbf{pr}_2$, che si legge “ \mathbf{pr}_1 è **equivalente** a “ \mathbf{pr}_2 ”, è la scrittura abbreviata della proposizione scritta a sinistra del segno di \equiv :

$$\mathbf{pr}_1 \leftrightarrow \mathbf{pr}_2 \equiv (\mathbf{pr}_1 \rightarrow \mathbf{pr}_2) \& (\mathbf{pr}_2 \rightarrow \mathbf{pr}_1)$$

associatività \vee	$(A \vee B) \vee C \leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
associatività $\&$	$(A \& B) \& C \leftrightarrow A \& (B \& C)$
commutatività \vee	$A \vee B \leftrightarrow B \vee A$
commutatività $\&$	$A \& B \leftrightarrow B \& A$
distributività \vee su $\&$	$A \vee (B \& C) \leftrightarrow (A \vee B) \& (A \vee C)$
distributività $\&$ su \vee	$A \& (B \vee C) \leftrightarrow (A \& B) \vee (A \& C)$
idempotenza \vee	$A \vee A \leftrightarrow A$
idempotenza $\&$	$A \& A \leftrightarrow A$
leggi di De Morgan	$\neg(B \vee C) \leftrightarrow \neg B \& \neg C$ $\neg(B \& C) \leftrightarrow \neg B \vee \neg C$
legge della doppia negazione	$\neg\neg A \leftrightarrow A$
implicazione classica	$(A \rightarrow C) \leftrightarrow \neg A \vee C$
disgiunzione come antecedente	$(A \vee B \rightarrow C) \leftrightarrow (A \rightarrow C) \& (B \rightarrow C)$
congiunzione come antecedente	$(A \& B \rightarrow C) \leftrightarrow (A \rightarrow (B \rightarrow C))$
legge della contrapposizione	$(A \rightarrow C) \leftrightarrow (\neg C \rightarrow \neg A)$
legge del modus ponens	$A \& (A \rightarrow C) \rightarrow C$
legge della NON contraddizione	$\neg(A \& \neg A)$
legge del terzo escluso	$A \vee \neg A$

8. Si provi a derivare in LC_p i sequenti $\vdash \mathbf{pr}$ ottenuti sostituendo \mathbf{pr} con le proposizioni elencate sotto.

- (a) $\neg(A \rightarrow B) \vee A$
- (b) $(A \rightarrow B) \& \neg A$
- (c) $P \& Q \rightarrow P \vee R$
- (d) $P \rightarrow P$
- (e) $P \& \neg P$
- (f) $P \vee Q \rightarrow Q$
- (g) $Q \rightarrow (P \& Q) \vee C$
- (h) $P \vee Q \rightarrow (\neg P \rightarrow Q)$
- (i) $(P \rightarrow Q) \vee (Q \rightarrow P)$
- (j) $(P \rightarrow Q) \rightarrow (Q \rightarrow P)$
- (k) $P \rightarrow ((Q \vee R) \rightarrow (P \& Q) \vee (P \& R))$

Provando e riprovando a trovare derivazioni per i sequenti sopra riesci a vedere un legame tra il fatto che il sequente $\vdash \mathbf{pr}$ ha una derivazione e il fatto che \mathbf{pr} è una tautologia o un'opinione o un paradosso??