

Programmazione Lineare e Metodo del Simplexso

Luigi De Giovanni

Dipartimento di Matematica, Università di Padova

Modelli di programmazione matematica

$$\begin{array}{ll}\min(\max) & f(x) \\ \text{s.t.} & g_i(x) = b_i \quad (i = 1 \dots k) \\ & g_i(x) \leq b_i \quad (i = k + 1 \dots k') \\ & g_i(x) \geq b_i \quad (i = k' + 1 \dots m) \\ & \underline{x \in \mathbb{R}^n}\end{array}$$

- $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$ è un vettore (colonna) di n variabili **reali**;
- f e g_i sono funzioni $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$
- $b_i \in \mathbb{R}$

Modelli di Programmazione Lineare (PL)

f e g_i sono funzioni **lineari** di x

$$\begin{array}{ll} \min(\max) & c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.t.} & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots k) \\ & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \leq b_i \quad (i = k + 1 \dots k') \\ & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n \geq b_i \quad (i = k' + 1 \dots m) \\ & x_i \in \mathbb{R} \quad (i = 1 \dots n) \end{array}$$

In questa fase **consideriamo soltanto variabili reali!!!**

Quanto diremo **non vale** in caso di variabili intere o binarie

Soluzione di un problema PL


- *Soluzione ammissibile*: $x \in \mathbb{R}^n$ che soddisfa tutti i vincoli
- *Regione ammissibile*: insieme delle x ammissibili
- *Soluzione ottima* x^* [min]: $c^T x^* \leq c^T x, \forall x \in \mathbb{R}^n, x$ ammissibile.

Risolvere un problema PL significa determinare se:

- è inammissibile
- è illimitato
- ammette soluzione ottima

Geometria della PL


La regione ammissibile è un **poliedro** (intersezione di un numero finito di semispazi chiusi e iperpiani in \mathbb{R}^n)



Problema di PL: $\min(\max)\{c^T x : x \in P\}$, P è un poliedro in \mathbb{R}^n .

Vertici di un poliedro: definizione

- $z \in \mathbb{R}^n$ è **combinazione convessa** di due punti x e y se
 $\exists \lambda \in [0, 1] : z = \lambda x + (1 - \lambda)y$




- $z \in \mathbb{R}^n$ è **combinazione convessa stretta** di due punti x e y se
 $\exists \lambda \in (0, 1) : z = \lambda x + (1 - \lambda)y$.
- $v \in P$ è **vertice del poliedro** P se **non** può essere espresso come **combinazione convessa stretta** di due punti **distinti** dello stesso poliedro: $\nexists x, y \in P, \lambda \in (0, 1) : x \neq y, v = \lambda x + (1 - \lambda)y$

Rappresentazione dei poliedri

$z \in \mathbb{R}^n$ è **combinazione convessa** di x^1, x^2, \dots, x^k se $\exists \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k \geq 0$:

$$\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1 \text{ e } z = \sum_{i=1}^k \lambda_i x^i$$



Teorema di rappresentazione dei poliedri [Minkowski-Weyl] - caso limitato

Poliedro *limitato* $P \subseteq \mathbb{R}^n$, v^1, v^2, \dots, v^k ($v^i \in \mathbb{R}^n$) i vertici di P

se $x \in P$ allora $x = \sum_{i=1}^k \lambda_i v^i$ con $\lambda_i \geq 0, \forall i = 1..k$ e $\sum_{i=1}^k \lambda_i = 1$
(x è combinazione convessa dei vertici di P)

Nota: un poliedro è un insieme convesso!

Vertice ottimo: dall'intuizione grafica alla dimostrazione

Teorema: esistenza di un vertice ottimo (versione "min")

Problema PL $\min\{c^T x : x \in P\}$, P non vuoto e limitato

- PL ammette soluzione ottima
- **esiste almeno un vertice ottimo**

Dimostrazione:

$$V = \{v^1, v^2 \dots v^k\} \quad v^* = \arg \min_{v \in V} c^T v$$

$$c^T x = c^T \sum_{i=1}^k \lambda_i v^i = \sum_{i=1}^k \lambda_i c^T v^i \geq \sum_{i=1}^k \lambda_i c^T v^* = c^T v^* \sum_{i=1}^k \lambda_i = c^T v^*$$

In sintesi: $\forall x \in P, \quad c^T v^* \leq c^T x$ ■

Possiamo limitare la ricerca dell'ottimo ai "solì" vertici!


Come generare ed esplorare (tutti) i vertici? Un esempio

Una piccola ditta di profumi realizza due nuove fragranze a partire da 3 essenze: *rosa*, *mughetto* e *viola*. Per realizzare un litro di fragranza 1 sono richiesti 3 centilitri di rosa, 1 centilitro di mughetto e 3 centilitri di viola. Per realizzare un litro di fragranza 2 sono richiesti 4 centilitri di rosa, 4 centilitri di mughetto e 2 centilitri di viola. La disponibilità in magazzino per le tre essenze è di 24, 20 e 18 centilitri per rosa, mughetto e viola rispettivamente. Sapendo che l'azienda realizza un profitto di 13 e 10 euro per ogni litro venduto di fragranza 1 e 2 rispettivamente, determinare le quantità ottimali delle due fragranze da produrre.

$$\begin{array}{llllll} \max & 13x_1 & + & 10x_2 & & \\ \text{s.t.} & 3x_1 & + & 4x_2 & \leq & 24 \quad (\text{e1}) \\ & x_1 & + & 4x_2 & \leq & 20 \quad (\text{e2}) \\ & 3x_1 & + & 2x_2 & \leq & 18 \quad (\text{e3}) \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$

Esempio: vertici come intersezione

$$\begin{array}{llllll} \max & 13x_1 & + & 10x_2 & & \\ \text{s.t.} & 3x_1 & + & 4x_2 & \leq & 24 \quad (\text{e1}) \\ & x_1 & + & 4x_2 & \leq & 20 \quad (\text{e2}) \\ & 3x_1 & + & 2x_2 & \leq & 18 \quad (\text{e3}) \\ & x_1 & , & x_2 & \geq & 0 \end{array}$$



$$B = e1 \cap e2 \quad (2, 9/2) \quad 71$$

$$C = e1 \cap e3 \quad (4, 3) \quad 82$$

$$E = e3 \cap (x_2 = 0) \quad (6, 0) \quad 78$$

...

C ottimo!


Caratterizzazione algebrica dei vertici

Scriviamo il sistema come **equazioni**

$$\begin{array}{rclclcl} 3x_1 & + & 4x_2 & + & s_1 & & = & 24 \\ & x_1 & + & 4x_2 & & + & s_2 & = & 20 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & & & + & s_3 & = & 18 \end{array}$$

$$\begin{aligned} s_1 &= 24 - 3x_1 - 4x_2 \\ s_2 &= 20 - x_1 - 4x_2 \\ s_3 &= 18 - 3x_1 - 2x_2 \end{aligned}$$

2 gradi di libertà: ponendo a 0 due variabili, sistema quadrato!



$$\begin{array}{ll} s_1 = s_2 = 0 & (2, 9/2, 0, 0, 3) \quad B \\ x_1 = s_2 = 0 & (0, 5, 4, 0, 8) \quad A \end{array}$$

...

$$s_2 = s_3 = 0 \quad (3.2, 4.2, -2.4, 0, 0)$$

non ammissibile!

Forma standard per problemi PL

$$\begin{array}{ll}\min & c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.t.} & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots m) \\ & x_i \in \mathbb{R}_+ \quad (i = 1 \dots n)\end{array}$$

- vincoli sono delle equazioni; (+/- variabili slack/surplus)
- variabili ≥ 0 ; (sostituzione di variabili)
- funzione obiettivo di **minimo** senza cost. addit. e multipl. (X -1);
- $b_i \geq 0$. (X -1)

Forma standard: esempio

$$\begin{array}{ll}\max & 5(-3x_1 + 5x_2 - 7x_3) + 34 \\ \text{s.t.} & -2x_1 + 7x_2 \leq 5 - 6x_3 + 2x_1 \\ & -3x_1 + x_3 + 12 \geq 13 \\ & x_1 + x_2 \leq -2 \\ & x_1 \leq 0 \\ & x_2 \geq 0\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\hat{x}_1 = -x_1 & (\hat{x}_1 \geq 0) \\ x_3 = x'_3 - x''_3 & (x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0)\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}\min & -3\hat{x}_1 - 5x_2 + 7x'_3 - 7x''_3 \\ \text{s.t.} & 4\hat{x}_1 + 7x_2 + 6x'_3 - 6x''_3 + s_1 = 5 \\ & 3\hat{x}_1 + x'_3 - x''_3 - s_2 = 1 \\ & \hat{x}_1 - x_2 - s_3 = 2 \\ & \hat{x}_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0, s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, s_3 \geq 0.\end{array}$$

Richiami di algebra lineare: definizioni

- vettore colonna $v \in \mathbb{R}^{n \times 1}$: $v = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix}$
- vettore riga $v^T \in \mathbb{R}^{1 \times n}$: $v^T = [v_1, v_2, \dots, v_n]$
- matrice $A \in \mathbb{R}^{m \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix}$
- $v, w \in \mathbb{R}^n$, prodotto scalare $v \cdot w = \sum_{i=1}^n v_i w_i = v^T w = w^T v$
- Rango di $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\rho(A)$, max righe/colonne lin. indep.
- $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$ invertibile $\iff \rho(B) = m \iff \det(B) \neq 0$

Sistemi di equazioni lineari

- *Sistemi di equazioni in forma matriciale*: un sistema di m equazioni in n incognite può essere messo in forma matriciale:

$$Ax = b, \text{ con } A \in \mathbb{R}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m \text{ e } x \in \mathbb{R}^n.$$

- *Teorema di Rouché-Capelli*:

$$Ax = b \text{ ammette soluzioni} \iff \rho(A) = \rho(A|b) = r \text{ } (\infty^{n-r} \text{ soluzioni}).$$

- *Operazioni elementari su matrici*:

- ▶ scambiare la riga i con la riga j ;
- ▶ moltiplicare la riga i per uno scalare non nullo;
- ▶ sostituire alla riga i , la riga i più α volte la riga j ($\alpha \in \mathbb{R}$).

Le operazioni elementari sulla matrice aumentata $[A|b]$ non alterano l'insieme delle soluzioni ammissibili del sistema $Ax = b$.

- *Metodo di Gauss-Jordan* per la soluzione di sistemi $Ax = b$: eseguire delle operazioni elementari sulla matrice aumentata $[A|b]$ in modo da ottenere in A una sottomatrice identità di dimensioni pari a $\rho(A) = \rho(A|b)$.

Forma standard: esempio

min $3x_1$

max $5(-3x_1 + 5x_2 - 7x_3) + 34$
s.t. $-2x_1 + 7x_2 \leq 5 - 6x_3 + 2x_1$
 $-3x_1 + x_3 + 12 \geq 13$
 $x_1 + x_2 \leq \underline{-2}$
 $x_1 \leq 0$
 $x_2 \geq 0$

$$\hat{x}_1 = -x_1 \quad (\hat{x}_1 \geq 0)$$
$$x_3 = x'_3 - x''_3 \quad (x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0)$$

min $-3\hat{x}_1 - 5x_2 + 7x'_3 - 7x''_3$
s.t. $4\hat{x}_1 + 7x_2 + 6x'_3 - 6x''_3 + s_1 = 5$
 $3\hat{x}_1 + x'_3 - x''_3 - s_2 = 1$
 $\hat{x}_1 - x_2 - s_3 = 2$
 $\hat{x}_1 \geq 0, x_2 \geq 0, x'_3 \geq 0, x''_3 \geq 0, s_1 \geq 0, s_2 \geq 0, s_3 \geq 0.$

5. std

Soluzioni di base: sistemi di equazioni lineari

- **Assunzioni:** sistema $Ax = b$, $A \in \mathbb{R}^{m \times n}$, $\rho(A) = m$, $m < n$
- **Base di A :** sottomatrice quadrata di rango massimo, $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$
- $A = [B|F]$ $B \in \mathbb{R}^{m \times m}$, $\det(B) \neq 0$
 $x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_F \end{bmatrix}$, $x_B \in \mathbb{R}^m$, $x_F \in \mathbb{R}^{n-m}$
- $Ax = b \implies [B|F] \begin{bmatrix} x_B \\ x_F \end{bmatrix} = Bx_B + Fx_F = b$
- $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Fx_F$
- con $x_F = 0$, una **soluzione di base**: $x = \begin{bmatrix} x_B \\ x_F \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B^{-1}b \\ 0 \end{bmatrix}$
- altre soluzioni di base scegliendo una **diversa base** di A
- **le variabili a 0 sono** $n - m$ (o più: soluzioni di base *degeneri*)

Soluzioni di base e PL in forma standard

$$\min \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$\text{s.t.} \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots m)$$

$$x_i \in \mathbb{R}_+$$

$$\min \quad c^T x$$

$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$

$$x \geq 0$$


- base B , **soluzione di base ammissibile**: $x_B = B^{-1}b \geq 0$

$$3x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$$

$$x_1 + 4x_2 + s_2 = 20$$

$$3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 24 \\ 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$



$$B_1 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = B_1^{-1}b = \begin{bmatrix} 2 \\ 4.5 \\ 3 \end{bmatrix}$$

$$x_F = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^T = (2 \ 9/2 \ 0 \ 0 \ 3) \rightarrow \text{vertex B}$$


Soluzioni di base e PL in forma standard

$$\begin{array}{ll} \min & c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n \\ \text{s.t.} & a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots m) \\ & x_i \in \mathbb{R}_+ \quad (i = 1 \dots n) \end{array} \quad \begin{array}{ll} \min & c^T x \\ \text{s.t.} & Ax = b \\ & x \geq 0 \end{array}$$

- base B , soluzione di base **ammissibile**: $x_B = B^{-1}b \geq 0$

$$\begin{array}{rclcl} 3x_1 & + & 4x_2 & + & s_1 & = & 24 \\ x_1 & + & 4x_2 & & + & s_2 & = & 20 \\ 3x_1 & + & 2x_2 & & & + & s_3 & = & 18 \end{array}$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 24 \\ 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$



$$B_2 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_2 \end{bmatrix} = B_2^{-1}b = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$x_F = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^T = (4 \ 3 \ 0 \ 2 \ 0) \rightarrow \text{vertex C}$$

Soluzioni di base e PL in forma standard

$$\min \quad c_1x_1 + c_2x_2 + \dots + c_nx_n$$

$$\text{s.t.} \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots m)$$

$$x_i \in \mathbb{R}_+$$

$$\min \quad c^T x$$

$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$

$$x \geq 0$$


- base B , **soluzione di base ammissibile**: $x_B = B^{-1}b \geq 0$

$$3x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$$

$$x_1 + 4x_2 + s_2 = 20$$

$$3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$$

$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 24 \\ 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$



$$B_3 = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 3 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = B_3^{-1}b = \begin{bmatrix} 6 \\ 6 \\ 14 \end{bmatrix}$$

$$x_F = \begin{bmatrix} x_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^T = (6 \ 0 \ 6 \ 14 \ 0) \rightarrow \text{vertex E}$$

Soluzioni di base e PL in forma standard

$$\min \quad c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

$$\text{s.t.} \quad a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n = b_i \quad (i = 1 \dots m)$$

$$x_i \in \mathbb{R}_+$$

$$\min \quad c^T x$$

$$\text{s.t.} \quad Ax = b$$

$$x \geq 0$$

- base B , soluzione di base **ammissibile**: $x_B = B^{-1}b \geq 0$

$$3x_1 + 4x_2 + s_1 = 24$$

$$x_1 + 4x_2 + s_2 = 20$$

$$3x_1 + 2x_2 + s_3 = 18$$


$$A = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 4 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} 24 \\ 20 \\ 18 \end{bmatrix}$$

$$B_4 = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 1 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_1 \end{bmatrix} = B_4^{-1}b = \begin{bmatrix} 18/5 \\ 21/5 \\ -18/5 \end{bmatrix}$$

$$x_F = \begin{bmatrix} s_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$x^T = (18/5 \ 21/5 \ -18/5 \ 0 \ 0) \rightarrow \text{n.a.}!$$



Vertici e soluzioni di base

Soluzioni di base ammissibili $\rightsquigarrow n - m$ variabili a 0 \rightsquigarrow
intersezione di un numero opportuno di iperpiani \rightsquigarrow vertici

$$\text{PL } \min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\} \quad P = \{x \in \mathbb{R}^n : Ax = b, x \geq 0\}$$

Teorema: corrispondenza tra vertici e soluzioni ammissibili di base
(caratterizzazione algebrica dei vertici di un politopo)

$$x \text{ soluzione ammissibile di base di } Ax = b \iff x \text{ vertice di } P$$

Corollario: soluzione ammissibile di base ottima

Se P non vuoto e limitato, allora **esiste almeno una soluzione ottima coincidente con una soluzione ammissibile di base**

Algoritmo per PL (caso limitato): schema di principio

Algoritmo esaustivo delle soluzioni ammissibili di base:

- ① metti il problema in forma standard $\min\{c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$
- ② $incumbent = +\infty$
- ③ **repeat**
- ④ genera una combinazione di m colonne di A
- ⑤ sia B la relativa sottomatrice di A
- ⑥ **if** $\det(B) \neq 0$ **then** calcola $x_B = B^{-1}b$ **else continue**
- ⑦ **if** $x_B \geq 0$ **and** $c_B^T x_B + c_{N-B}^T 0 < incumbent$ **then** aggiorna la soluzione
- ⑧ **until**(combinazioni di colonne esaurite)

Complessità: fino a $\binom{n}{m} = \frac{n!}{m!(n-m)!}$ possibili soluzioni di base!!!

⇒ **metodo del simplesso:** esplorazione più efficiente delle soluzioni di base (solo soluzioni **ammissibili** e **miglioranti**)

Esempio

Problema dei profumi in **forma standard**:

$$\begin{array}{llllllllll} \min & z = & -13x_1 & - & 10x_2 & & & & & \\ \text{s.t.} & & 3x_1 & + & 4x_2 & + & s_1 & & & = & 24 \\ & & x_1 & + & 4x_2 & & & + & s_2 & = & 20 \\ & & 3x_1 & + & 2x_2 & & & & + & s_3 & = & 18 \\ & & x_1 & , & x_2 & , & s_1 & , & s_2 & , & s_3 & \geq & 0 \end{array}$$

una **soluzione ammissibile di base** iniziale (vertice B):

$$\bullet \quad B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 9/2 \\ 3 \end{bmatrix} \quad x_F = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\bullet \quad z_B = c^T x = c_B^T x_B + c_F^T x_F = -71$$

Esempio

$$x_{B_1} = 7 + \sum_j a_{1j} x_{Fj}$$
$$x_{B_2} = 10 + \sum_j a_{2j} x_{Fj}$$

Nuova base \Rightarrow variabile fuori base aumenta con **effetti su** x_B e **su** z_B

$$x_B = B^{-1}b - B^{-1}F x_F$$
$$z = c^T x = c_B^T x_B + c_F^T x_F = \boxed{c_B^T B^{-1}b} + (c_F^T - c_B^T B^{-1}F) x_F$$

Esprimere x_B e z in funzione delle variabili **fuori** base

Per semplificare i calcoli a mano, usiamo metodo di Gauss-Jordan:

$$Ax = b \rightsquigarrow [B \ F \mid b] \rightsquigarrow [I \ \bar{F} \mid \bar{b}]$$

$$x_B = \bar{b} - \bar{F} x_F \quad z = \dots$$

Esempio

Nuova base \Rightarrow variabile fuori base aumenta con **effetti su** x_B **e su** z_B

$$\begin{aligned}x_B &= B^{-1}b - B^{-1}F x_F \\z &= c^T x = c_B^T x_B + c_F^T x_F = c_B^T B^{-1}b + (c_F^T - c_B^T B^{-1}F) x_F\end{aligned}$$

Esprimere x_B e z in funzione delle variabili **fuori** base

Per semplificare i calcoli a mano, usiamo metodo di **Gauss-Jordan**:

$$Ax = b \quad \rightsquigarrow \quad [B \ F \mid b] \quad \rightsquigarrow \quad [I \ \bar{F} \mid \bar{b}]$$

$$x_B = \bar{b} - \bar{F} x_F \quad z = \dots$$

Esempio

$$\begin{array}{cccccc|c}
 & x_1 & x_2 & s_3 & s_1 & s_2 & \bar{b} \\
 \left(\begin{array}{cccccc|c}
 3 & 4 & 0 & 1 & 0 & 24 \\
 1 & 4 & 0 & 0 & 1 & 20 \\
 3 & 2 & 1 & 0 & 0 & 18
 \end{array} \right.
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (R_1/3) \\
 (R_2 - R_1/3) \\
 (R_3 - R_1)
 \end{array}
 \begin{array}{cccccc|c}
 1 & 4/3 & 0 & 1/3 & 0 & 8 \\
 0 & 8/3 & 0 & -1/3 & 1 & 12 \\
 0 & -2 & 1 & -1 & 0 & -6
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l}
 (R_1 - 1/2 R_2) \\
 (3/8 R_2) \\
 (R_3 + 3/4 R_2)
 \end{array}
 \begin{array}{cccccc|c}
 1 & 0 & 0 & 1/2 & -1/2 & 2 \\
 0 & 1 & 0 & -1/8 & 3/8 & 9/2 \\
 0 & 0 & 1 & -5/4 & 3/4 & 3
 \end{array}$$

$$\begin{array}{lcl}
 x_1 & = & 2 - 1/2 s_1 + 1/2 s_2 \\
 x_2 & = & 9/2 + 1/8 s_1 - 3/8 s_2 \\
 s_3 & = & 3 + 5/4 s_1 - 3/4 s_2
 \end{array}$$

$$z = -13x_1 - 10x_2 = -71 + 21/4 s_1 - 11/4 s_2$$

Esempio

$$z = -71 + 21/4 s_1 - 11/4 s_2$$

- Conviene aumentare s_2 (e lasciare s_1 a 0)
- Per mantenere i vincoli di uguaglianza:

$$\begin{aligned}x_1 &= 2 + 1/2 s_2 \\x_2 &= 9/2 - 3/8 s_2 \\s_3 &= 3 - 3/4 s_2\end{aligned}$$

- Per mantenere i vincoli di non negatività:

$$\begin{aligned}x_1 \geq 0 &\Rightarrow 2 + 1/2 s_2 \geq 0 \Rightarrow s_2 \geq -4 \quad \text{sempre!} \\x_2 \geq 0 &\Rightarrow 9/2 - 3/8 s_2 \geq 0 \Rightarrow s_2 \leq 12 \\s_3 \geq 0 &\Rightarrow 3 - 3/4 s_2 \geq 0 \Rightarrow s_2 \leq 4\end{aligned}$$

- **Soluzioni ammissibili** e miglioranti ponendo $s_1 = 0$ e $0 \leq s_2 \leq 4$
- $s_2 = 4$ $\Rightarrow s_3 = 0$: soluzione ammissibile di base e migliorante

Esempio

Nuova base ammissibile (s_2 al posto di s_3 in base):

$$B = \begin{bmatrix} 3 & 4 & 0 \\ 1 & 4 & 1 \\ 3 & 2 & 0 \end{bmatrix} \quad F = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \text{ (vertice C)} \quad x_B = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ s_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$$
$$x_F = \begin{bmatrix} s_1 \\ s_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad z_B = c^T x = c_B^T x_B + c_F^T x_F = -82$$

Iteriamo il ragionamento: x_B e z **in funzione di** x_F :

$$\begin{aligned} x_1 &= 4 + \frac{1}{3} s_1 - \frac{2}{3} s_3 \\ x_2 &= 3 - \frac{1}{2} s_1 - \frac{1}{2} s_3 \\ s_3 &= 4 + \frac{5}{3} s_1 - \frac{4}{3} s_3 \\ z &= -82 + \frac{2}{3} s_1 + \frac{11}{3} s_3 \end{aligned}$$

Soluzione ottima! Visitate 2 delle $\binom{5}{3} = 10$ possibili basi

Forma canonica di un problema PL

PL $\min\{z = c^T x : Ax = b, x \geq 0\}$ è in **forma canonica rispetto alla base B** di A se tutte le variabili in base e la funzione obiettivo sono scritte esplicitamente **nei termini delle sole variabili fuori base**:

$$\begin{aligned} z &= \bar{z}_B + \bar{c}_{F_1} x_{F_1} + \bar{c}_{F_2} x_{F_2} + \dots + \bar{c}_{F_{(n-m)}} x_{F_{(n-m)}} \\ x_{B_i} &= \bar{b}_i - \bar{a}_{iF_1} x_{F_1} - \bar{a}_{iF_2} x_{F_2} - \dots - \bar{a}_{iF_{(n-m)}} x_{F_{(n-m)}} \quad (i = 1 \dots m) \end{aligned}$$

\bar{z}_B scalare (valore f.o. per la soluzione di base)

\bar{b}_i scalare (valori variabili di base)

B_i indice della i -esima variabile in base (ce ne sono m)

F_j indice della j -esima variabile fuori base (ce ne sono $n - m$)

\bar{c}_{F_j} coefficiente della j -esima variabile fuori base in funzione obiettivo (**costo ridotto della variabile rispetto alla base B**)

$-\bar{a}_{iF_j}$ coefficiente della j -esima variabile fuori base nel vincolo che esprime la i -esima variabile in base