UPA 24h Exemplo

Rua Um, 100 – Centro · Cidade Exemplo · (00) 0000-0000

Receituário · 1ª via · paciente

Paciente	Idade	Sexo
Paciente Fictício de Teste	**34 anos**	**Feminino**

Uso oral

1. **Amoxicilina 500 mg** cápsula — **21 cápsulas**
   Tomar 1 cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias.

2. **Ibuprofeno 600 mg** comprimido — **15 comprimidos**
   Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas, após as refeições, por 5 dias.

3. **Dipirona 500 mg** comprimido — **10 comprimidos**
   Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Uso nasal

4. **Cloreto de sódio 0,9%** solução nasal — **1 frasco**
   Aplicar em cada narina de 4 a 6 vezes ao dia.

Orientações

Aumentar a ingestão de líquidos e manter repouso.
Retornar ao serviço se houver piora, falta de ar ou febre por mais de 72 horas.

Fim da prescrição

Antimicrobiano · válida por 10 dias

Dra. Teste Exemplo
CRM-SP 000000
Clínica Médica

Cidade Exemplo, 14 de outubro de 2026

Receita de teste, gerada para demonstração do sistema. Sem validade.

UPA 24h Exemplo

Rua Um, 100 – Centro · Cidade Exemplo · (00) 0000-0000

Receituário · 2ª via · retenção na farmácia

Paciente	Idade	Sexo
Paciente Fictício de Teste	**34 anos**	**Feminino**

Uso oral

1. **Amoxicilina 500 mg** cápsula — **21 cápsulas**
   Tomar 1 cápsula de 8 em 8 horas por 7 dias.

2. **Ibuprofeno 600 mg** comprimido — **15 comprimidos**
   Tomar 1 comprimido de 8 em 8 horas, após as refeições, por 5 dias.

3. **Dipirona 500 mg** comprimido — **10 comprimidos**
   Tomar 1 comprimido de 6 em 6 horas se dor ou febre.

Uso nasal

4. **Cloreto de sódio 0,9%** solução nasal — **1 frasco**
   Aplicar em cada narina de 4 a 6 vezes ao dia.

Orientações

Aumentar a ingestão de líquidos e manter repouso.
Retornar ao serviço se houver piora, falta de ar ou febre por mais de 72 horas.

Fim da prescrição

Antimicrobiano · válida por 10 dias

Dra. Teste Exemplo
CRM-SP 000000
Clínica Médica

Cidade Exemplo, 14 de outubro de 2026

Receita de teste, gerada para demonstração do sistema. Sem validade.