

FICHA CLÍNICA ADOLESCENTE, ADULTO Y ADULTO MAYOR

No. Expediente: _____

Fecha: ____/____/____

I. IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

PS ☐ PSF ☐ C/S "B" ☐ CENAPA ☐ C/S "A" ☐ CAP ☐ CAIMI ☐ CUM ☐ HOSPITAL ☐

Nombre del distrito: _____ Área de Salud: _____

II. DATOS GENERALES DEL PACIENTE

Nombre: _____ Edad: _____ años Fecha de nacimiento: ____/____/____

Nombre de la madre o responsable: _____ Tel.: _____

Dirección: _____

Sexo: F ☐ M ☐ Migrante: SI ☐ NO ☐ Ocupación: _____

III. EVALÚE SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL PELIGRO

Marque en los cuadros correspondientes de SI o NO lo encontrado en la evaluación. (De acuerdo al nivel de resolución, trate o refiera)

	SI	NO		SI	NO
Dificultad respiratoria:	☐	☐	Cefalea Intensa	☐	☐
Inconsciencia, letargia, comportamiento extraño	☐	☐	Vómitos	☐	☐
Dolor u opresión precordial	☐	☐	Otros (describir)	☐	☐
Convulsiones o rigidez de cuello	☐	☐			

IV. REGISTRE MANEJO Y ESTABILIZACIÓN DEL PACIENTE REFERIDO

V. MOTIVO DE LA CONSULTA

VI. HISTORIA DE LA ENFERMEDAD ACTUAL:

VII. ANTECEDENTES (Marque con una "X" o complete la información solicitada)

MÉDICOS

Asma bronquial:	SI ☐ NO ☐	Diabetes:	SI ☐ NO ☐	Hipertensión arterial:	SI ☐ NO ☐
Cardiopatía:	SI ☐ NO ☐	Cáncer:	SI ☐ NO ☐	Tb:	SI ☐ NO ☐
ITS:	SI ☐ NO ☐	Neuropatía:	SI ☐ NO ☐	Chagas:	SI ☐ NO ☐
Infecciones Urinarias:	SI ☐ NO ☐	Desnutrición:	SI ☐ NO ☐		
Toma medicamentos:	SI ☐ NO ☐	Cuál: _____			
Trastorno Psico social:	SI ☐ NO ☐	Violencia intrafamiliar:	SI ☐ NO ☐		
Violencia basada en género:	SI ☐ NO ☐	Conductas anormales (suicidas, alimentarias, etc.):	SI ☐ NO ☐		
Antecedente de vacuna Td:	SI ☐ NO ☐	# dosis: _____ Fecha de última dosis: ____/____/____		SR SI ☐ NO ☐ No aplica ☐	

GINECO/OBSTÉTRICOS

FUR: _____ # Gestas: _____ Partos: _____ AB: _____ Detección de cáncer de cérvix: _____

Papanicolaou ☐ IVAA ☐ Fecha: _____ Resultado Normal: SI ☐ NO ☐

Utiliza o ha utilizado algún método de Planificación Familiar: SI ☐ NO ☐ Píldora: ☐ Inyección: ☐ Condón: ☐ T de cobre: ☐ AQP: ☐ Otro: ☐

Tipo de Sangre: Grupo _____ RH (+) ☐ RH (-) ☐

QUIRÚRGICOS

Anote: _____

FAMILIARES

Diabetes: SI ☐ NO ☐ HTA: SI ☐ NO ☐ Cáncer: SI ☐ NO ☐

Tuberculosis: SI ☐ NO ☐ Nefropatía: SI ☐ NO ☐ Otro: SI ☐ NO ☐ Especificar: _____

HÁBITOS

Fuma: SI ☐ NO ☐ # al día: _____ Ingiere bebidas alcohólicas: SI ☐ NO ☐ Consumo de drogas: SI ☐ NO ☐

Múltiples parejas sexuales (más de 1 pareja en los últimos tres meses): SI ☐ NO ☐ Usa condón en las relaciones sexuales: SI ☐ NO ☐

Realiza actividad física: Menos de 60 minutos/semana SI ☐ NO ☐ De 60-149 minutos/semana SI ☐ NO ☐

Más de 150 minutos/semana SI ☐ NO ☐ Consume 5 porciones diarias de frutas y verduras: SI ☐ NO ☐

VIII. EXAMEN FÍSICO

SIGNOS VITALES: Temperatura: _____ °C P/A: _____ mmHg Pulso: _____ x min. Respiraciones: _____ x min.

ANTROPOMETRIA: Peso: _____ Lb. Talla: _____ mt. IMC (Índice de masa corporal): _____ Circunferencia de cintura: _____ cms

IX. REVISIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMAS A INVESTIGAR		EVALUAR (Pregunte y observe. Subraye los signos encontrados)	DIAGNOSTICAR/ CLASIFICAR (Subraye el diagnóstico o clasificación)	CONDUCTA/ TRATAMIENTO (Indique medicamento, dosis y días de tratamiento; Referencia)
1. Tos o dificultad para respirar	SI ☐ NO ☐	Sibilancia, Tos Crónica Estridores	Neumonía grave, Neumonía, Resfriado, Tuberculosis, Asma, Otro: _____	Medicamento 1: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
2. Oído y garganta	SI ☐ NO ☐	Tumefacción atrás de la oreja Dolor de oído con supuración visible Menos o más de 14 días Puntos sépticos en amígdalas Ganglios linfáticos en el cuello	Mastoiditis Otitis Media Aguda Otitis media Crónica Amigdalitis bacteriana Amigdalitis viral	Medicamento 2: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
3. Bucodental	SI ☐ NO ☐	Caries, inflamación de encías, lesiones destructivas avanzadas, Masas - úlceras, Placas blandas en boca y garganta	Caries dental, Gingivitis, periodontitis Sospecha de Cáncer buco faringeo Otro: _____	Medicamento 3: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
4. Diarrea	SI ☐ NO ☐	Deshidratación Heces sanguinolentas Más de 14 días	Diarrea con DHE grave Diarrea con DHE Diarrea sin DHE Diarrea persistente Disentería	Medicamento 4: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
5. Fiebre	SI ☐ NO ☐	En zona de alto riesgo de Malaria o Dengue: Fiebre recurrente - dolor retroorbitario, Rash cutáneo, Hemorragias, Ictericia, heces blanquecinas, orina oscura. Adenopatía, Linfadenopatía Hepatomegalia	Malaria Dengue Hepatitis Chagas Leptospirosis Otro: _____	Medicamento 5: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
6. Piel	SI ☐ NO ☐	Nódulos, Granos, Úlceras, Ampollas Rash, Ronchas	Leishmaniasis Dermatitis Pió dermitis Otro: _____	Medicamento 6: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
7. ITS	SI ☐ NO ☐	Dolor o ardor al orinar, Secreción Uretral, Secreción Vaginal, Secreción anal, Papilomas genitales, Papilomas orales, Papilomas anales, Prurito vaginal, Úlceras orales o en genitales, Ganglios Inguinales, Dolor abdominal inferior, Lesiones en piel y/o mucosas	Clasificar y tratar de acuerdo a enfoque sindrómico: _____ Ofertar consejería a pruebas de VIH y/o referir a nivel correspondiente	Medicamento 7: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
8. Suplementación con micro nutrientes	SI ☐ NO ☐	Palidez palmar, conjuntivas y mucosas de la boca, Problemas de alimentación. Peso inadecuado	Anemia Grave Anemia Bajo peso, Sobrepeso, Obesidad	Medicamento 8: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
9. Signos de alerta de Diabetes	SI ☐ NO ☐	Sed intensa, Disminución de peso Aumento de apetito, Orina frecuente Deshidratación, Respiración rápida	Diabetes a descartar	Medicamento 9: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
10. Signos de alerta de Hipertensión/ Insuficiencia cardíaca	SI ☐ NO ☐	Por cualquiera de estos signos: Letargia, Sudoración excesiva, convulsiones, dolor precordial, Edema, Palidez generalizada, Anuria, Epistaxis Dificultad para respirar al estar acostado, edema en pies al final del día	Hipertensión Arterial Sospecha de insuficiencia cardíaca Problemas renales Otros: _____	Medicamento 10: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
11. Signos de alerta para diagnóstico precoz de Cáncer	SI ☐ NO ☐	Por cualquiera de estos signos: Tos crónica, Ronquera inexplicable Pérdida de peso, Sangrados anormales, Masas, Heces planas y delgadas, Indigestiones o dificultad para tragar, Fiebres sin causa aparente, dificultad para orinar	Sospecha de cáncer Otro: _____	Medicamento 11: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
12. Necesidades Planificación Familiar	SI ☐ NO ☐	Necesidad de espaciar otro embarazo Deseo de no tener más hijos	Planificación Familiar temporal o definitiva	Medicamento 12: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
13. Psicosociales	SI ☐ NO ☐		De acuerdo a hallazgo encontrado	Medicamento 13: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____
14. Otros	SI ☐ NO ☐	Intoxicaciones, traumas, mordeduras de perros, etc. Otros: _____	De acuerdo a hallazgo encontrado	Medicamento 14: _____ Dosis: _____ Días de tratamiento _____

X. CONSEJERIA

TRATAMIENTO: Puede apoyarse con medicina Polpular Tradicional de las Normas de atención.

Nombre y cargo de la persona que atendió: _____