ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 01

Corrections — Applications de cours

25 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LA RÉGULATION DES NAISSANCES · CORRIGÉS 01

6 *corrigés détaillés*

Voici les corrigés rédigés des six exercices de la partie 01. Pour chaque exercice : rappel des données, démarche étape par étape, résultat encadré et pièges à éviter. Compare ta rédaction au modèle plutôt que de recopier : c'est le raisonnement qui rapporte des points au Bac.

⏱ 25 min | ✏️ 6 corrigés | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Méthode : essaie d'abord l'exercice seul, puis compare ta rédaction au modèle. Note dans ton cahier les étapes de raisonnement et les formules encadrées.

DANS CETTE PARTIE — 6 CORRIGÉS · 2 THÈMES

01 Méthodes contraceptives : reconnaître et classer (exercices 1 à 3)

02 Efficacité, contragestion et méthodes naturelles (exercices 4 à 6)

01 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Méthodes contraceptives : reconnaître et classer

✏️ EXERCICE 1 — LE TABLEAU DES MÉTHODES (★)

Données : tableau des 5 méthodes à compléter avec la banque a) à m) ; préservatif = a) barrière (exemple donné).

1 **Les familles.** Le préservatif est un barrage physique → barrière (a). La pilule combinée et l'implant diffusent des hormones → hormonale (b). Le DIU au cuivre est un dispositif posé dans l'utérus, sans hormones → mécanique (c). La ligature est une opération → chirurgicale (d).

2 **Les principes.** Préservatif → e) barrage entre spermatozoïdes et ovule. Pilule → f) bloque l'ovulation. Implant → f) bloque l'ovulation (progestatif continu). DIU au cuivre → g) ion cuivre toxique pour les spermatozoïdes. Ligature → h) trompes obturées définitivement.

3 **L'efficacité.** Préservatif → i) 18 % ; pilule → j) 9 % ; DIU → k) 0,8 % ; implant → l) 0,05 % ; ligature → m) 0,5 %.

4 **Les IST.** Seul le préservatif (barrière) protège des IST ; les quatre autres méthodes ne protègent pas des IST.

MÉTHODE	FAMILLE	PRINCIPE D'ACTION	INDICE DE PEARL	IST
Préservatif masculin	a) barrière	e) barrage physique	18 %	protège
Pilule combinée	b) hormonale	f) bloque l'ovulation	9 %	ne protège pas
Implant contraceptif	b) hormonale	f) bloque l'ovulation	0,05 %	ne protège pas
DIU au cuivre (stérilet)	c) mécanique	g) ion cuivre toxique	0,8 %	ne protège pas
Ligature des trompes	d) chirurgicale	h) trompes obturées	0,5 %	ne protège pas

Implant (0,05 %) et DIU au cuivre (0,8 %) : les plus efficaces du tableau.

La ligature des trompes est la seule méthode définitive ; le préservatif est la seule méthode qui protège des IST.

Piège : la pilule et l'implant sont tous deux hormonaux (lettre f utilisée deux fois). Ne confonds pas le DIU (mécanique, sans hormones) avec la pilule (hormonale).

✏️ EXERCICE 2 — QCM : UNE SEULE BONNE RÉPONSE (★)

Données : six questions, une seule bonne réponse chacune.

1 **Q1 → b.** Le DIU au cuivre est un dispositif placé dans l'utérus, sans hormones : méthode mécanique.

2 **Q2 → b.** Les hormones de la pilule combinée bloquent l'ovulation (rétrocontrôle sur l'hypophyse).

3 **Q3 → b.** La contragestion agit après un rapport à risque, dans un délai limité (environ 72 h pour la pilule du lendemain classique, jusqu'à 5 jours selon la méthode). Ce n'est pas une contraception régulière.

4 **Q4 → b.** En droit nigérien, l'IVG n'est admise que pour des raisons thérapeutiques (danger pour la vie ou la santé de la femme), sur avis médical. En dehors de ce cadre, elle est illégale et dangereuse (avortements clandestins).

5 **Q5 → c.** Seul le préservatif, méthode barrière, empêche le contact des secrétions : il protège à la fois de la grossesse et des IST.

6 **Q6 → b.** Ogino = calcul par le calendrier des jours fertiles. La méthode symptothermique y ajoute la température et l'observation de la glaire.

Piège : contragestion ≠ IVG. La contragestion empêche une grossesse de s'installer après un rapport à risque ; l'IVG interrompt une grossesse déjà installée.

✏️ EXERCICE 3 — VRAI OU FAUX ? (★)

Données : huit affirmations à noter V ou F, avec correction des fausses.

N°	AFFIRMATION	V / F	CORRECTION
1	La ligature des trompes est définitive.	**V**	—
2	Le DIU au cuivre protège contre les IST.	**F**	Seul le préservatif protège des IST.
3	La pilule du lendemain remplace une contraception régulière.	**F**	Réservée aux urgences ; moins efficace qu'une contraception régulière.
4	L'implant est posé sous la peau du bras et agit environ 3 ans.	**V**	—
5	Les méthodes naturelles conviennent à tous les couples.	**F**	Fiabilité faible (Ogino : 25 % en usage courant) et aucune protection contre les IST.
6	Un préservatif bien utilisé protège de la grossesse et des IST.	**V**	—
7	L'IVG est un moyen de contraception comme un autre.	**F**	Elle interrompt une grossesse installée ; cadre légal très strict (raisons thérapeutiques au Niger).
8	La méthode symptothermique associe dates, température et glaire.	**V**	—

1 On lit chaque affirmation ligne à ligne et on la confronte à une notion précise du cours (famille, principe, efficacité, IST).

2 Les fausses (2, 3, 5, 7) sont corrigées avec la notion exacte : préservatif seul contre les IST ; contragestion = urgence ; méthodes naturelles peu fiables ; IVG ≠ contraception.

02 CORRIGÉS · APPLICATIONS DE COURS

Efficacité, contragestion et méthodes naturelles

✏️ EXERCICE 4 — L'INDICE DE PEARL EN SITUATIONS (★★)

Données : préservatif 18 %, pilule 9 % (parfait 0,3 %), DIU 0,8 %, implant 0,05 %, Ogino 25 % ; effectifs 1 000 et 2 500.

Formule clé

nombre de grossesses = (indice de Pearl × effectif) / 100

L'indice de Pearl s'exprime en % par an : il compte les grossesses survenues pour 100 utilisatrices pendant un an.

1. **Préservatif (usage courant).** N = (18 × 1 000) / 100 = **180 grossesses** en 1 an.

2. **Pilule combinée (usage courant).** N = (9 × 2 500) / 100 = **225 grossesses** en 1 an.

3. **Implant contre préservatif.** Rapport des indices : 18 / 0,05 = **360**. Une utilisatrice de l'implant a 360 fois moins de risque de grossesse.

4. **Usage parfait contre usage courant (pilule).** 9 / 0,3 = **30**. L'usage courant est 30 fois moins efficace : la prise quotidienne régulière est déterminante.

5. **Classement (usage courant).** implant (0,05 %) < DIU (0,8 %) < pilule (9 %) < préservatif (18 %) < Ogino (25 %).

180 grossesses · 225 grossesses · 360 fois · 30 fois

Classement final : implant > DIU > pilule > préservatif > Ogino.

Piège : l'indice de Pearl est un % par an ; ne le convertis jamais en % par mois. Divise toujours le grand indice par le petit pour comparer deux méthodes.

✏️ **EXERCICE 5 — LIRE UN GRAPHIQUE D'EFFICACITÉ (★★)**

Données : figure 1 (barres) — Ogino, préservatif, pilule, DIU, implant ; échelle 0 à 25 %.

1. **Lecture.** Ogino : 25 % ; préservatif : 18 % ; pilule : 9 % ; DIU au cuivre : 0,8 % ; implant : 0,05 %. Plus la barre est longue, plus la méthode laisse passer de grossesses.

2. **Ogino contre pilule.** 25 / 9 ≈ 2,78 ≈ **3 fois** moins efficace (arrondi à l'unité).

3. **Choix « à poser puis oublier ».** L'implant : une seule pose sous la peau du bras, efficace 3 ans, indice 0,05 %, le plus faible du graphique. Le DIU (0,8 %, 10 ans) est aussi une excellente réponse.

4. **Le préservatif reste indispensable.** C'est la seule méthode barrière qui protège aussi des IST. On l'associe à une méthode très efficace (pilule, implant, DIU) : c'est la **double protection**.

25 / 9 ≈ 3 fois moins efficace

Ogino est la méthode la moins fiable du graphique ; l'implant la plus fiable.

✏️ **EXERCICE 6 — MÉTHODES NATURELLES : LE CAS DE SALI ET IBRAHIM (★★★)**

Données : cycles de 27 à 29 jours ; règle d'Ogino (– 18 et – 11) ; ovule viable 24 h ; spermatozoïdes 3 à 5 jours.

1. **Premier jour fertile.** 27 – 18 = 9 → jour J9 (le cycle le plus court donne la borne la plus précoce).

2. **Dernier jour fertile.** 29 – 11 = 18 → jour J18.

3. **Durée et proportion.** Du J9 au J18 : 18 – 9 + 1 = 10 jours d'abstinence. Proportion : 10 / 28 ≈ 0,36 ≈ 36 % du cycle.

4. **Symptothermique.** Elle ajoute au calendrier la prise quotidienne de la température (montée d'environ 0,3 à 0,5 °C après l'ovulation) et l'observation de la glaire cervicale.

5 **Conseils.** Couple mobile → implant (0,05 %, 3 ans) ou DIU (0,8 %, jusqu'à 10 ans) : aucune contrainte quotidienne, réversibles. Si risque d'IST → préservatif obligatoire (seule méthode barrière), en double protection.

Période fertile : J9 → J18, soit 10 jours ≈ 36 % du cycle

Un tiers du cycle en abstinence : c'est ce qui rend les méthodes naturelles difficiles à suivre.

Piège : compte le jour inclus (J9 et J18 compris) : 10 jours, pas 9. Et n'oublie pas que les spermatozoïdes survivent plusieurs jours : d'où la marge de la règle 18-11.



Corrigés 01 terminés !

Passe aux corrigés de synthèse (corr_p2.html) après avoir tenté les exercices de la partie 02.