ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 01

Exercices — Applications de cours

30 min · Partie 1 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · LA RÉGULATION DES NAISSANCES · EXERCICES 01

6 *exercices progressifs*

Ces six exercices te font classer les méthodes contraceptives (préservatif, pilule, implant, DIU, ligature), exploiter l'indice de Pearl en situations chiffrées et raisonner sur la contragestion, le cadre légal de l'IVG et les méthodes naturelles. Chaque énoncé est autonome : toutes les données nécessaires y figurent. Cherche d'abord seul, puis compare ta réponse au corrigé rédigé (corr_p1.html).

⏱ 35 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir *corr_p1.html*. Difficulté : ★ = application directe, ★★ = raisonnement, ★★★ = synthèse.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

01 Méthodes contraceptives : reconnaître et classer (exercices 1 à 3)

02 Efficacité, contragestion et méthodes naturelles (exercices 4 à 6)

Méthodes contraceptives : reconnaître et classer

✏️ EXERCICE 1 — LE TABLEAU DES MÉTHODES (★)

MÉTHODE	FAMILLE	PRINCIPE D'ACTION	INDICE DE PEARL (USAG
Préservatif masculin	a) barrière (exemple)	…	…
Pilule combinée	…	…	…
Implant contraceptif	…	…	…
DIU au cuivre (stérilet)	…	…	…
Ligature des trompes	…	…	…

Banque d'informations : a) barrière · b) hormonale · c) mécanique · d) chirurgicale · e) barrage physique entre les spermatozoïdes et l'ovule · f) bloque l'ovulation · g) ion cuivre toxique pour les spermatozoïdes : empêche leur rencontre avec l'ovule et la nidation · h) obture définitivement les trompes · i) 18 % · j) 9 % · k) 0,8 % · l) 0,05 % · m) 0,5 %

— Recopie et complète le tableau ; chaque lettre sert une seule fois, sauf f (à utiliser deux fois).

— Ajoute pour chaque méthode la mention « protège des IST » ou « ne protège pas des IST ».

— Cite les deux méthodes les plus efficaces du tableau, puis précise laquelle est définitive.

✏️ EXERCICE 2 — QCM : UNE SEULE BONNE RÉPONSE (★)

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Le DIU au cuivre appartient aux méthodes…

CORRECTION

Q1 — Le DIU au cuivre appartient aux méthodes...

1. hormonales.
2. mécaniques.
3. chirurgicales.
4. naturelles.

Exercice 2

La pilule combinée agit surtout en...

CORRECTION

Q2 — La pilule combinée agit surtout en...

1. tuant les spermatozoïdes.
2. bloquant l'ovulation.
3. obturant les trompes.
4. empêchant tout rapport.

Exercice 3

La contragestion (pilule du lendemain) se pratique...

CORRECTION

Q3 — La contragestion (pilule du lendemain) se pratique…

1. avant tout rapport.
2. dans les heures ou les jours qui suivent un rapport à risque.
3. uniquement après un test de grossesse positif.
4. tous les jours du cycle.

Exercice 4

En droit nigérien, l'IVG n'est admise que…

CORRECTION

Q4 — En droit nigérien, l'IVG n'est admise que…

1. librement, à la demande de la femme.
2. pour des raisons thérapeutiques, sur avis médical.
3. pour les adolescentes.
4. jamais, dans aucun cas.

Exercice 5

La méthode qui protège à la fois de la grossesse et des IST est…

CORRECTION

Q5 — La méthode qui protège à la fois de la grossesse et des IST est...

1. la pilule.
2. le DIU.
3. le préservatif.
4. l'implant.

Exercice 6

La méthode d'Ogino repose sur...

CORRECTION

Q6 — La méthode d'Ogino repose sur...

1. la mesure quotidienne de la température.
2. le calcul, par le calendrier, des jours fertiles du cycle.
3. l'observation de la glaire cervicale seule.
4. la prise d'un comprimé hormonal.

✏️ EXERCICE 3 — VRAI OU FAUX ? (★)

Recopie le tableau : écris V ou F, puis corrige chaque affirmation fausse.

N°	AFFIRMATION	V OU F	CORRECTION SI FAUSSE
1	La ligature des trompes est une méthode définitive.	…	…
2	Le DIU au cuivre protège contre les IST.	…	…
3	La pilule du lendemain peut remplacer une contraception régulière.	…	…
4	L'implant est posé sous la peau du bras et agit environ 3 ans.	…	…
5	Les méthodes naturelles conviennent à tous les couples, car elles sont toujours fiables.	…	…
6	Un préservatif bien utilisé protège de la grossesse et des IST.	…	…
7	L'IVG est un moyen de contraception comme un autre.	…	…
8	La méthode symptothermique associe calcul des dates, température et observation de la glaire.	…	…

02 THÈME 02 · APPLICATIONS DE COURS

Efficacité, contragestion et méthodes naturelles

✏️ EXERCICE 4 — L'INDICE DE PEARL EN SITUATIONS (★★)

Rappel : l'indice de Pearl est le pourcentage de femmes utilisatrices qui, en moyenne, débutent une grossesse non désirée en 1 an. Un indice de 18 % signifie : 18 grossesses pour 100 utilisatrices en un an.

MÉTHODE	INDICE DE PEARL (USAGE COURANT)	INDICE DE PEARL (USAGE PARFA
Préservatif masculin	18 %	2 %
Pilule combinée	9 %	0,3 %
DIU au cuivre	0,8 %	0,6 %
Implant	0,05 %	0,05 %
Méthode d'Ogino	25 %	5 %

- Sur 1 000 couples utilisant le préservatif (usage courant), combien de grossesses attendues en 1 an ?
- Sur 2 500 femmes sous pilule combinée (usage courant), combien de grossesses attendues en 1 an ?
- En usage courant, une utilisatrice de l'implant a combien de fois moins de risque de grossesse qu'une femme dont le partenaire utilise le préservatif ?
- Pour la pilule combinée, calcule combien de fois l'usage courant est moins efficace que l'usage parfait. Que conclusion en tires-tu sur la prise quotidienne ?
- Classe les cinq méthodes de la plus efficace à la moins efficace (usage courant).

✏️ EXERCICE 5 — LIRE UN GRAPHIQUE D'EFFICACITÉ (★★)




Figure 1 — Efficacité comparée de cinq méthodes contraceptives (indice de Pearl, usage courant).

— Relis sur la figure l'indice de Pearl des cinq méthodes.

— La méthode d'Ogino est environ combien de fois moins efficace que la pilule combinée ? (arrondis à l'unité)

— Une étudiante sait qu'elle oubliera une prise quotidienne ; elle veut une méthode « à poser puis oublier », très efficace. Laquelle choisir d'après la figure ? Justifie avec les valeurs.

— Malgré son indice de Pearl moyen, pourquoi le préservatif reste-t-il indispensable chez les jeunes ? Cite la notion de double protection.

✏️ EXERCICE 6 — MÉTHODES NATURELLES : LE CAS DE SALI ET IBRAHIM (★★★)

Données : règle d'Ogino (cycles réguliers) : premier jour fertile = (cycle le plus court − 18) ; dernier jour fertile = (cycle le plus long − 11). Les spermatozoïdes survivent jusqu'à 3 à 5 jours dans les voies génitales féminines ; l'ovule vit environ 24 h. Chez Sali, les cycles durent de 27 à 29 jours.

— Calcule le premier et le dernier jour fertile de ce couple.

— Combien de jours d'abstinence cela représente-t-il par cycle ? Quelle proportion du cycle (arrondie au % près) si le cycle dure 28 jours ?

— La méthode symptothermique ajoute quelles observations au simple calcul des dates ?

— Sali et Ibrahim se déplacent souvent et ne peuvent pas s'abstenir aussi longtemps : conseille-leur deux méthodes d'efficacité élevée en justifiant.

— Un autre couple veut aussi se protéger des IST : quelle méthode s'impose alors, et pourquoi ?

🎯

Exercices 01 terminés !

Vérifie tes réponses dans corr_p1.html, puis affronte les synthèses type Bac de la partie 02 (exo_p2.html).