ARVEXA SCHOOL

SVT · TERMINALE D

La régulation des naissances

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 1 sections

📘 TERMINALE D · LA RÉGULATION DES NAISSANCES · EXERCICES 02

5 *exercices de synthèse*

Cinq exercices pour raisonner comme au Bac : un dossier de planning familial, une comparaison de méthodes de longue durée, une étude chiffrée sur la double protection contre les IST et les grossesses, une critique des méthodes naturelles, puis une rédaction organisée. Appuie-toi sur les documents fournis et sur tes connaissances de cours ; les corrigés rédigés se trouvent dans corr_p2.html.

⏱ 40 min | ✏️ 5 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi : cherche AVANT d'ouvrir *corr_p2.html*. Ici, l'essentiel est la qualité du raisonnement et de la rédaction, pas seulement le résultat.

DANS CETTE PARTIE — 5 EXERCICES · 1 THÈME

02 Synthèse type Bac : conseils, comparaisons et rédaction (exercices 1 à 5)

02 THÈME 02 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Conseils, comparaisons et rédaction

✏️ EXERCICE 1 — CONSEIL DE PLANNING FAMILIAL (★★)

Dossier. Aïcha a 28 ans et trois enfants (6 ans, 4 ans et 1 an). Elle allaite encore le petit dernier, ses cycles sont réguliers et elle ne fume pas. Avec son conjoint, ils souhaitent espacer les naissances d'au moins 3 ans avant d'envisager un quatrième enfant. Le couple consulte le planning familial du district.

DOCUMENT — MÉTHODE	POINTS CLÉS FOURNIS PAR LE CENTRE
Pilule combinée	Très efficace ; prise quotidienne ; peut diminuer la production de lait ; ne protège pas des IST.
Microprogestative	Compatible avec l'allaitement ; prise quotidienne à heure fixe ; ne protège pas des IST.
Implant	Indice de Pearl 0,05 % ; agit 3 ans ; compatible avec l'allaitement ; posé sous la peau du bras.
DIU au cuivre	Indice de Pearl 0,8 % ; agit jusqu'à 10 ans ; compatible avec l'allaitement.
Ligature des trompes	Méthode chirurgicale définitive et irréversible.

— Rappelle les quatre grandes familles de méthodes contraceptives, avec un exemple pour chacune.

— D'après le dossier, propose deux méthodes adaptées à Aïcha ; donne deux arguments pour chacune.

— Le médecin écarte la pilule combinée pour le moment : justifie ce choix à partir du document.

— Pourquoi la ligature des trompes est-elle écartée dans ce dossier ?

— Rédige en 3 à 4 lignes le conseil que l'infirmière du planning familial donne au couple.

✏️ EXERCICE 2 — TROIS MÉTHODES À COMPARER (★★)

Banque : mécanique · hormonale · jusqu'à 10 ans · 3 ans · une prise quotidienne · 0,8 % · 0,05 % · 9 % · retrait par un soignant · arrêt de la prise · non.

CRITÈRE	DIU AU CUIVRE	IMPLANT	PILULE COMBINÉE
Famille	…	…	…
Durée d'action	…	…	…
Indice de Pearl (usage courant)	…	…	…
Comment cesse-t-elle d'agir ?	…	…	…
Protège des IST ?	…	…	…

— Recopie et complète le tableau ; certaines réponses de la banque servent plusieurs fois.

— Une femme oublie souvent sa pilule : quelle méthode lui conseiller ? Donne deux arguments.

— Laquelle de ces trois méthodes demande le moins de surveillance ? Justifie.

✏️ EXERCICE 3 — DOUBLE PROTECTION : IST ET GROSSESSE (★★★)

Document. Dans une ville, on suit 1 000 personnes ayant des rapports non protégés avec des partenaires multiples : 120 contractent une IST par an. On suit aussi 1 000 personnes utilisant systématiquement le préservatif : 12 contractent une IST par an. Indice de Pearl du préservatif en usage courant : 18 %.

— Calcule l'incidence annuelle des IST en % dans chaque groupe.

— De combien de % le risque diminue-t-il grâce au préservatif (réduction relative) ?

— Sur 5 000 personnes du premier groupe, combien de cas attendus par an ? Si elles adoptaient toutes le préservatif, combien de cas ? Combien de cas évités chaque année ?

— Pour 500 couples utilisant le préservatif comme seule contraception, calcule le nombre de grossesses attendues en 1 an.

— Explique alors la stratégie de « double protection » et rédige la conclusion de l'étude en 2 lignes.

✏️ EXERCICE 4 — MÉTHODE D'OGINO : UN COUPLE DÉSACCORDÉ (★★★)

Données. Règle d'Ogino : premier jour fertile = (cycle le plus court − 18) ; dernier jour fertile = (cycle le plus long − 11). Le couple Djibrilla–Ramatou a des cycles irréguliers, de 25 à 35 jours. Indice de Pearl de la méthode en usage courant : 25 %.




Figure 1 — Période fertile calculée par la règle d'Ogino pour des cycles de 25 à 35 jours.

- Calcule le premier et le dernier jour fertile de ce couple.
- Quelle est la durée de la période fertile ainsi délimitée ?
- Sur le cycle le plus court (25 jours), calcule la proportion du cycle (%) pendant laquelle l'abstinence est nécessaire.
- Explique pourquoi cette méthode est peu fiable pour ce couple ; appuie-toi sur la figure et sur l'indice de Pearl.
- Propose deux méthodes plus adaptées et justifie brièvement.

✏️ EXERCICE 5 — RESTITUTION ORGANISÉE (★★★)

Rédige (15 à 20 lignes) une restitution organisée répondant au sujet : **« Le choix d'une méthode de régulation des naissances dépend de son efficacité, de la situation de la personne ou du couple et de la protection contre les IST. »**

- **Introduction :** définir la régulation des naissances ; annoncer le plan.
- **Développement 1 — efficacité comparée :** classement par l'indice de Pearl (valeurs utiles, usage courant : implant 0,05 % ; DIU 0,8 % ; pilule 9 % ; préservatif 18 % ; Ogino 25 %) ; rôle de l'observance (usage parfait et usage courant).
- **Développement 2 — situations de vie :** allaitement, oublis fréquents, âge, projet d'enfants (espacement ou arrêt définitif) ; exemples de conseils de planning familial.

— **Développement 3 — protection contre les IST :** seul le préservatif protège des IST ; notion de double protection.

— **Conclusion :** le choix résulte d'un compromis ; rôle du planning familial.



Exercices 02 terminés !

Corrigés rédigés dans corr_p2.html — à lire seulement après avoir rédigé tes réponses !