

# 1 Conceitos Fundamentais

## 1.1 Divisão Euclidiana

Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $b \neq 0$ , a divisão euclidiana de  $a$  por  $b$  consiste na identidade

$$a = b \cdot q + r \quad q, r \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq r < b$$

## 1.2 Divisibilidade

Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $b \neq 0$ , dizemos que  $b$  divide  $a$ , denotando  $b \mid a$ , se

$$\exists c \in \mathbb{Z} : a = b \cdot c$$

Propriedades:

- $\forall a \in \mathbb{Z} : a \mid 0$
- $\forall a \in \mathbb{Z} : \pm 1 \mid a$
- $\forall a \in \mathbb{Z} : \pm a \mid a$
- $\forall c \in \mathbb{Z} : a \mid b \implies ac \mid bc$
- $\forall x, y \in \mathbb{Z} : a \mid b \wedge a \mid c \implies a \mid (bx + cy)$
- $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \mid b \wedge b \mid a \implies b = \pm a$

## 1.3 Máximo Divisor Comum

Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $(a, b) \neq (0, 0)$ , o máximo divisor comum de  $a$  e  $b$  é um inteiro  $d$  tal que

$$d \mid a \wedge d \mid b$$

$$\forall d' : d' \mid a \wedge d' \mid b \implies d' \mid d$$

Lema: Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $(a, b) \neq (0, 0)$ , e  $q, r \in \mathbb{Z}$  com  $a = b \cdot q + r$ .

O  $\text{mdc}(a, b)$ , se existe, é igual a  $\text{mdc}(b, r)$ .

Identidade de Bézout: Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $(a, b) \neq (0, 0)$ , então

$$\exists \alpha, \beta \in \mathbb{Z} : \alpha \cdot a + \beta \cdot b = \text{mdc}(a, b)$$

Lema de Euclides: Sejam  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  com  $a, b, c \neq 0$ . Se  $a \mid bc$  e  $\text{mdc}(a, b) = 1$ , então  $a \mid c$ .

Propriedades: Sejam  $a, b, c \in \mathbb{Z}$  com  $a, b, c \neq 0$

- $\text{mdc}(a, c) = \text{mdc}(b, c) \iff \text{mdc}(ab, c) = 1$
- $\text{mdc}(a, b) = d \iff \text{mdc}\left(\frac{a}{d}, \frac{b}{d}\right) = 1$
- $a \mid c \wedge b \mid c \implies \left(\frac{ab}{\text{mdc}(a, b)}\right) \mid c$
- $(a \mid c \wedge b \mid c \wedge \text{mdc}(a, b) = 1) \implies ab \mid c$

## 1.4 Mínimo Múltiplo Comum

Sejam  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $(a, b) \neq (0, 0)$ , o mínimo múltiplo comum de  $a$  e  $b$  é um inteiro  $m$  tal que

$$a \mid m \wedge b \mid m$$

$$\forall m' : a \mid m' \wedge b \mid m' \implies m \mid m'$$

Teorema:  $\forall a, b \in \mathbb{Z}, (a, b) \neq (0, 0) : \text{mmc}(a, b) = \frac{ab}{\text{mdc}(a, b)}$

## 1.5 Fatoração

Lema: Seja  $n = ab \in \mathbb{Z}$  com  $n \neq 0, \pm 1$ , então  $a \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor \vee b \leq \lfloor \sqrt{n} \rfloor$ .

## 1.6 Números Primos

Um número  $p$  é primo se os únicos divisores de  $p$  são  $\pm 1$  e  $\pm p$ .

Lema: Seja  $p \in \mathbb{Z}$  primo, e  $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$ .

Se  $p \mid (x_1 \cdot \dots \cdot x_n)$ , então  $p \mid x_i$  para ao menos algum  $i \in [1, n] \subset \mathbb{Z}$ .

Teorema: Qualquer número natural  $n \geq 2$  é produto de um conjunto único e finito de números primos.

Corolário: Seja  $a \in \mathbb{Z}$  com  $a \neq 0, \pm 1$ .

Sejam  $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$  primos.

Sejam  $h_1, \dots, h_n \in \mathbb{Z}$  maiores que 0.

$a$  pode ser escrito como  $a = \pm \left( p_1^{h_1} \cdot \dots \cdot p_n^{h_n} \right)$

Corolário: Seja  $a, b \in \mathbb{Z}$  com  $a$  e  $b \neq 0, \pm 1$ .

Sejam  $\forall i : h_i, k_i \geq 0$ , e  $p_1, \dots, p_n \in \mathbb{Z}$  primos tais que

$$a = \pm p_1^{h_1} \cdot \dots \cdot p_n^{h_n}$$

$$b = \pm p_1^{k_1} \cdot \dots \cdot p_n^{k_n}$$

Então:

- $\text{mdc}(a, b) = p_1^{d_1} \cdot \dots \cdot p_n^{d_n}$ , onde  $d_i = \min(h_i, k_i)$
- $\text{mmc}(a, b) = p_1^{d_1} \cdot \dots \cdot p_n^{d_n}$ , onde  $d_i = \max(h_i, k_i)$

Teorema: Há um número infinito de números primos.

Corolário: Seja  $p \in \mathbb{Z}$  primo com  $p > 0$ , então  $\sqrt{p} \in \mathbb{Q}$ .

Teorema: Não há forma polinomial que gere apenas números primos.

Teorema: Sejam  $a, b \in \mathbb{N}^+$  com  $\text{mdc}(a, b) = 1$ , então a sequência  $(an + b)_{n=0}^{\infty}$  contém infinitos primos.

A função para o número de primos menores que  $x \in \mathbb{R}$  é

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}$$

### 1.6.1 Números de Fermat

Os números de Fermat são dados pela função

$$F : \mathbb{N}^+ \rightarrow \mathbb{N}^+ \\ F(n) = 2^{2^n} + 1$$

Teorema: Nem todos números de Fermat são primos.

Teorema: Seja  $a \geq 2 \in \mathbb{Z}$  e  $a^2 + 1$  primo. Então  $a$  é par e  $n = 2^m$ .

Teorema:  $\forall k \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}^+ : \text{mdc}(F(n), F(n+k)) = 1$ .

Ou seja, todos números de Fermat são co-primos entre si.

Corolário: Como  $F(1), \dots, F(n)$  são co-primos, entre seus fatores há ao menos  $n$  números primos distintos.

### 1.6.2 Números de Mersenne

Os números de Mersenne são dados pela função

$$M : \mathbb{P} \rightarrow \mathbb{N}^+ \\ M(p) = 2^p - 1$$

Teorema: Nem todos números de Mersenne são primos.

Teorema: Seja  $a \in \mathbb{Z}$  com  $a \geq 1$ . Então  $a^n - 1$  é primo se e somente se  $a = 2$  e  $n$  é primo.

## 2 Congruências

### 2.1 Relações de Equivalência

Uma relação sobre um conjunto  $A$  é um subconjunto  $R \subset A \times A$ .

Dizemos que  $aRb$  se  $(a, b) \in R$ .

Uma relação pode ter as seguintes propriedades:

- Reflexividade: se  $\forall a \in A : aRa$ .
- Simetria: se  $\forall a, b \in A : aRb \implies bRa$ .
- Transitividade:  $\forall a, b, c \in A : aRb \wedge bRc \implies aRc$ .
- Antissimetria: se  $\forall a, b \in A : aRb \wedge bRa \implies a = b$ .
- Totalidade: se  $\forall a, b \in A : aRb \oplus bRa$ .

Definição: Uma relação  $R$  sobre  $A$  é de equivalência se ela é reflexiva, simétrica e transitiva.

## 2.2 Classes de Equivalência

Seja  $a \in A$  e  $R$  uma relação de equivalência sobre  $A$ . Definimos a classe de equivalência de  $a$  como

$$[a]_R := \{x \in A \mid aRx\} = \{x \in A \mid xRa\}$$

Propriedades:

- $\forall a \in A : a \in [a]_R$
- $[a]_R = [b]_R \iff aRb$
- $[a]_R \cap [b]_R = \emptyset \iff a \not R b$
- As classes de equivalência de um conjunto formam uma partição deste:  $\forall A : A = \bigsqcup_{a \in A} [a]_R$

Seja  $R$  uma relação de equivalência sobre  $A$ . Denotamos o conjunto das classes de equivalência de  $R$

$$A/R := \{[a]_R \mid a \in A\}$$

## 2.3 Congruência

Seja  $m \in \mathbb{Z}$  com  $m > 1$ . Dizemos que  $a$  é congruente  $b$  módulo  $m$  se  $m \mid (a - b)$ . Denota-se

$$a \equiv_m b$$

Teorema: Para qualquer  $m > 1$ ,  $\equiv_m$  forma uma relação de equivalência sobre  $\mathbb{Z}$ .

- $\forall a \in \mathbb{Z} : a \equiv_m a$ .
- $\forall a, b \in \mathbb{Z} : a \equiv_m b \implies b \equiv_m a$ .
- $\forall a, b, c \in \mathbb{Z} : a \equiv_m b \wedge b \equiv_m c \implies a \equiv_m c$ .

Propriedades:

- $a \equiv_m 0 \iff m \mid a$ .
- $a \equiv_m b \iff -a \equiv_m -b$ .
- $a \equiv_m b \wedge a' \equiv_m b' \implies (a + a') \equiv_m (b + b')$ .
- $a \equiv_m b \wedge a' \equiv_m b' \implies (a \cdot a') \equiv_m (b \cdot b')$ .
- $\forall k \neq 0 \in \mathbb{Z} : a \equiv_m b \iff ka \equiv_m kb$ .

Teorema: Seja  $m \in \mathbb{Z}$  com  $m > 1$ . Então  $\mathbb{Z}/m = \{[0]_m, [1]_m, \dots, [m-1]_m\}$

Portanto,  $|\mathbb{Z}/m| = m$ .

Corolário: Seja  $p(x)$  um polinômio com coeficientes inteiros. Então  $a \equiv_m b \implies p(a) \equiv_m p(b)$ .

### 2.3.1 Inverso Aritmético

Sejam  $a, n \in \mathbb{Z}$ . O inverso mod  $n$  de  $a$  é um número  $a'$  tal que

$$a \cdot a' \equiv_n 1$$

Teorema: O inverso de  $a$  existe se e somente se  $\text{mdc}(a, n) = 1$ .

### 2.3.2 Equações Lineares de Congruência

Sejam  $a, b, n \in \mathbb{Z}$  com  $n \neq 0$ . Uma equação linear de congruência é da forma

$$ax \equiv_n b$$

Duas equações lineares de congruência são equivalentes se o conjunto solução de ambas é o mesmo.

Teorema: Uma equação linear de congruência  $ax \equiv_n b$  possui solução inteira se e somente se

$$\text{mdc}(a, n) \mid b$$

Se a equação possui uma ou mais soluções inteiras, e seja  $d = \text{mdc}(a, n)$ .

Então, esta equação é equivalente à equação reduzida

$$\frac{a}{d} \cdot x \equiv_{\frac{n}{d}} \frac{b}{d}$$

Seja  $ax \equiv_n b$  uma equação de congruência reduzida ( $\text{mdc}(a, n) = 1$ ).

Seja  $a'$  um inverso aritmético mod  $n$  de  $a$ .

Então, a equação é equivalente a

$$x \equiv_n a \cdot a'$$

## 3 Resíduo

Seja  $n \in \mathbb{N}^*$  e  $a \in \mathbb{Z}$ . O resíduo  $r$  de  $a$  mod  $n$  é o resto da divisão euclidiana de  $a$  por  $n$ .

$$r \equiv_n a$$

Portanto, o resíduo é único e mínimo.