

LOCALIZACIÓN

Extensión territorial:


Es de 1882.60 km², lo que representa el 2.95% de la superficie estatal.
Está ubicado a orillas del océano Pacífico, que lo limita al sur.

Coordenadas:

- Latitud norte 16°50'41.59"
- Longitud oeste 99°53'48.28

Colindancias:

- Al norte colinda con los municipios de Chilpancingo y Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
- Al sur con el océano Pacífico.
- Al este con el municipio de San Marcos.
- Al oeste con el de Coyuca de Benítez.




DESCRIPCIÓN

La localidad urbana de Acapulco de Juárez se ubica en el municipio con el mismo nombre y es parte de una de las ocho regiones en las que está dividido el estado de Guerrero, específicamente en la Región Acapulco, de acuerdo con lo establecido en el Plan de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Guerrero y el Marco Geoestadístico Municipal del Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática (INEGI).

El municipio de Acapulco de Juárez, a pesar de su extensa historia y economía turística, actualmente enfrenta diversos desafíos y oportunidades únicos en términos de desarrollo urbano. La urbanización en esta región no sólo debe responder a la necesidad de infraestructura adecuada para su población residente, sino también a la demanda de servicios turísticos que atraen a millones de visitantes cada año.

Para abordar estos desafíos se realizó en primera instancia un diagnóstico y vocación de uso de suelo para determinar las áreas con mejores características en cuando al medio físico natural con el objetivo de evaluar y obtener una zona específica que sea susceptible para la planificación urbana y el desarrollo urbano sostenible.



PLANO BASE

SIMBOLOGÍA TEMATICA

SIMBOLOGÍA BÁSICA

- Acapulco de Juárez**

 - Curvas de nivel
 - Traza urbana
 - Límite municipal

Escurrimientos

 - Flujo virtual
 - Intermitente
 - Perenne
 - Cuerpos de agua
 - Subestación Eléctrica
 - Zona Arqueológica

Vialidades

 - Avenida
 - Carretera

**FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES
ACATLÁN**

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ,
GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN



LOCALIZACIÓN



DESCRIPCIÓN

La temperatura atmosférica es uno de los elementos constitutivos del clima. Indica la cantidad de energía calorífica que hay acumulada en el aire en un momento y lugar determinados, así como su evolución temporal y espacial en las distintas zonas climáticas.

El clima cálido subhúmedo se caracteriza por tener una temperatura media anual superior a los 20 °C, suele presentar poca oscilación térmica durante el día y precipitación anual mayor a los 800 mm.

El clima semicálido subhúmedo se caracteriza por tener una temperatura media anual superior a los 18 °C, con precipitación anual entre 500 y 2,500 mm y porcentaje de lluvia invernal entre 5 y 10.2.


INTERPRETACIÓN

En definición, el confort térmico en invierno es de 20°C mínimo y en verano es de 25°C máximo.

Los rangos de temperatura que presenta la zona (18-22°C), al estar casi en el límite del confort, generan condicionantes para los aspectos de diseño urbano y arquitectónico, con objeto de aprovechar los recursos naturales para controlar los niveles de confort requeridos.

Estos rangos (18-22°C) generan condicionantes para acondicionar los espacios.

El territorio denota una división de clima en donde el norte presenta una variación climática con respecto a la parte sur.



CLIMAS

SIMBOLOGÍA TEMATICA

CLIMAS

- Cálido subhúmedo
- Semicálido subhúmedo del grupo C

SIMBOLOGÍA BÁSICA

Acapulco de Juárez	Escurreimientos
Curvas de nivel	Flujo virtual
Traza urbana	Intermitente
Límite municipal	Perenne
Vialidades	Cuerpos de agua
Avenida	Subestación Eléctrica
Carretera	Zona Arqueológica

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN	LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Suelo aluvial: Es un suelo sedimentario que se ha formado a partir de material que ha sido transportado por corrientes de agua.

Suelo granodiorita: Es una roca ígnea intrusiva que presenta una textura fanerítica de grano medio, de color gris claro a veces con tendencia a ser rosado; está compuesta principalmente de cuarzo, plagioclasas sódicas y anfíboles.

Suelo lacustre: Es un tipo de suelo que se forma en lagos y se compone de sedimentos finos como limos y arcillas.

Suelo caliza: Roca sedimentaria compuesta principalmente de carbonato de calcio, se forma principalmente a partir de los restos de organismos marinos como corales y moluscos que se han acumulado en ambientes acuáticos.

Suelo gneis: De tipo metamórfica se produce una segregación de silicatos claros y oscuros dando lugar al aspecto de bandas que contienen fundamentalmente minerales alargados y granulares.

Suelo mármol: De tipo metamórfica formada a partir del metamorfismo de calizas o dolomías, compuesto esencialmente por calcita. La coloración que presentan algunos se debe a la presencia de impurezas.

Suelo litoral: Formaciones rocosas en zonas costeras, son moldeadas y erosionadas por la acción constante de olas, corrientes y la marea.

Suelo tonalita: Rocas transformadas por el calor y la presión, formando afloramiento metamórficos.

Suelo conglomerado: De tipo de roca sedimentaria que se compone de fragmentos de roca grandes y redondeados contenidos dentro de una matriz de sedimentos de grano más pequeño.

Suelo esquiso: Roca metamórfica de grano medio que muestra una esquistosidad bien desarrollada, contiene más de un 50% de minerales planos y alargados.

Suelo toba ácida: Tipo de ígnea extrusiva compuesta de rocas piroclásticas de composición silícea.


USOS

Las rocas ígneas extrusivas e intrusivas se usan para áreas urbanizables de media y alta densidad.

Las rocas sedimentarias para áreas agrícolas, zonas de conservación, y áreas urbanas de baja densidad.

Las rocas metamórficas para áreas urbanas de baja y media densidad, así como áreas de explotación minera.

Un suelo aluvial, por su baja capacidad de carga, se tiene que identificar para ubicar áreas urbanas de baja densidad y agrícolas.



GEOLOGÍA

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

Fallas y Fracturas

— Falla

----- Fractura

Geología

Aluvial

Sedimentaria Conglomerado

Metamórfica Esquisto

Lacustre

Litoral

Ígn. Intrusiva Tonalita

Sedimentaria Caliza

Metamórfica Gneis

Ígn. Intrusiva Granito

Ígn. Intrusiva Granito-Granodiorita

Ígn. Intrusiva Granodiorita

Metamórfica Mármol

Ígn. Intrusiva Toba ácida

SIMBOLOGÍA BÁSICA

Acapulco de Juárez

Curvas de nivel

Traza urbana

Límite municipal

Escurrimientos

Flujo virtual

Intermitente

Perenne

Cuerpos de agua

Subestación Eléctrica

Zona Arqueológica

Vialidades

Avenida

Carretera

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Acrisol: Tipo de suelo caracterizado por su alta concentración de arcilla en los horizontes inferiores, así como por su acidez y bajo contenido de nutrientes.

Cambisol: Tipo de suelo que se caracteriza un horizonte o capa superficial que ha experimentado un proceso de cambio significativo debido a la alteración física, química o biológica.

Feozem: Suelos que se pueden presentar presentar en cualquier relieve y clima, excepto en regiones tropicales lluviosas o zonas muy desérticas. Se caracterizan por tener una capa superficial oscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes, son de profundidad variable.

Fluvisol: Son suelos fértiles, formados por depósitos recientes de agua, con gran variabilidad en su composición y texturas, lo que los hace ideales para la agrocultura, pero también susceptibles a inundaciones.

Litosol: Suelos poco desarrollados y extremadamente delgados, cn una profundidad menor a 10cm. Se encuentran en relieves accidentados, laderas y zonas montañosas, donde la roca madre está expuesta o muy cerca de la superficie.

Luvisol: Tipo de suelo que se caracteriza por una acumulación de arcilla en sus capas más profundas, lo que le otorga varias propiedades distintivas.

Regosol: Suelos ubicados en muy diversos tipos de clima, vegetación y relieve. Tienen poco desarrollo y por ello no presentan capas muy diferenciadas entre sí. En general son claros o pobres en materia orgánica, se parecen bastante a la roca que les da origen.

Solonchak: Son suelos salinos. Se presentan en zonas donde se acumula el salitre, tales como lagunas costeras y lechos de lagos, o en las partes más bajas de los valles y llanos.

Ranker: Son suelos ácidos, poco evolucionados, con alta materia orgánica pero baja fertilidad. Se encuentran en regiones montañosas y se usan más para pastos y bosques que para cultivos.

USOS

Acrisol: Los acrisoles son suelos ácidos, con alta concentración de arcilla en sus capas inferiores, los que los hace de textura pesada y baja fertilidad natural. Son comunes en regiones tropicales y requieren un manejo adecuado, como la corrección de acidez y la fertilización, para ser productivos en la agricultura.

Cambisol: Son suelos aptos para la agricultura y actividades pecuarias, también son adecuados para el desarrollo urbano.

Feozem: Son suelos que se recomiendan para la agricultura y pastizales. Es recomendable condicionarlos para el desarrollo urbano.

Fluvisol: Son suelos adecuados para agricultura, porque son blandos y son poco adecuados para urbanizar porque son de baja resistencia y nivel alto de los mantos acuíferos.


Litosol: Suelos delgados y poco desarrollados, con roca madre cercana. Se recomiendan para pastizales y conservación ecológica, pero su baja estabilidad limita la agricultura y urbanización.

Luvisol: Son suelos con vegetación arbustiva y matorrales, son pocos aptos para la agricultura. Si están en pendientes son inestables y pueden tener deslaves. En caso de urbanizarlos se deberá retirar el material del suelo y construir sobre material subyacente.

Regosol: Predominan los usos forestales y pecuarios por lo accidentado de la topografía, es de poca utilidad para la agricultura y recomendable para usos urbanos.

Solonchak: No son recomendables para actividades agropecuarias y presentan alto riesgo para desarrollo urbano, debido a que el salitre es corrosivo para las tuberías, las instalaciones, elementos metálicos y acero. Se recomienda su uso en ganadería extensiva y reforestación con especies resistentes, pero requieren desalinización para agricultura y urbanización.

Ranker: Estos suelos se caracterizan por ser delgados y tener una limitada capacidad para almacenar nutrientes. Este tipo de suelo es común en regiones montañosas y en zonas donde la dinámica de erosión y descomposición del material orgánico es muy activa.



EDAFOLOGÍA

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

Acrisol

Cambisol

Feozem

Fluvisol

Litosol

Luvisol

N/A

Regosol

Solonchak

Ranker

SIMBOLOGÍA BÁSICA

Acapulco de Juárez

Curvas de nivel

Traza urbana

Límite municipal

Escurremientos

Flujo virtual

Intermitente

Perenne

Cuerpos de agua

Vialidades

Avenida

Carretera

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO

GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ

GALILEO CABRERA GARIBALDI

RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA:

1:300,000

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Pendiente 0-3%: Es una pendiente que presenta problemas de encharcamientos por agua, representa problemas para el tendido de redes subterráneas, debido a que se incrementa el costo.

Pendiente 3-5%: Es una pendiente óptima para usos urbanos, no presenta problemas de drenaje natural, ni de tendido de redes subterráneas. Tampoco representa problemas en la construcción de vialidades y obra civil.

Pendiente 5-10%: Adecuada pero no óptima para usos urbanos, porque el costo en la construcción y obra civil se eleva.

Pendiente 10-15%: Son zonas accidentadas por sus variables pendientes. Suelo accesible para la construcción, requiere de movimientos de tierra, presenta dificultades para la planeación de redes de servicios, vialidades y construcción.

Pendiente 15-49%: A partir del 25% de pendiente se consideran inadecuados para la mayoría de los usos urbanos por sus pendientes extremas, son laderas frágiles, zonas de deslaves, zonas de erosión fuerte.

USOS


Pendiente 0-3%: Su uso es para usos agrícolas, preservación ecológica. Los terrenos planos presentan dificultades para los desarrollos.

Pendiente 3-5%: Su uso recomendable es para usos agrícolas, zonas de recarga acuífera, usos habitacionales de alta y media densidad.

Pendiente 5-10%: Se recomienda para usos habitacionales de densidad media, usos industriales y recreativos.

Pendiente 10-15%: Es recomendable para usos habitacionales de media densidad, zonas de reforestación y zonas de preservación ecológica.

Pendiente 15-49%: Es recomendable para reforestación, recreación pasiva y zonas de conservación.



PENDIENTES

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

	Pendiente 0-1%
	Pendiente 1-3%
	Pendiente 3-5%
	Pendiente 5-10%
	Pendiente 10-15%
	Pendiente 15-49%

SIMBOLOGÍA BÁSICA

	Acapulco de Juárez		Escurremientos
	Curvas de nivel		Flujo virtual
	Traza urbana		Intermitente
	Límite municipal		Perenne
Vialidades			Cuerpos de agua
	Avenida		Subestación Eléctrica
	Carretera		Zona Arqueológica

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

Corriente Perenne: Ríos que conservan agua todo el año y desembocan en otro río, en un lago o el mar.

Corriente Intermite: Corriente que tiene agua sólo durante alguna parte del año (por lo general, en la época de lluvias o deshielo).


Flujo Virtual: Corrientes virtuales realizadas para completar la conexión entre las diferentes corrientes dentro de una cuenca.

USOS

Corriente Intermite: Zona que se utilizan como dren natural, para encauzar de ser necesario hacia un lugar determinado.

Cuerpos de agua Perenne: Zonas que se recomiendan para almacenar agua para utilizarse en época de sequía. También para usos agrícolas, pecuarias y para riego.

Corriente Virtual: Su uso recomendable es para zonas de riego, y zonas de protección contra la erosión de suelos.



HIDROGRAFÍA

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

COEFICIENTES DE ESCURRIMIENTO

- 05-10
- 10-20
- 20-30
- Más de 30

CUERPOS DE AGUA

FLUJO VIRTUAL

INTERMITENTE

PERENNE

SIMBOLOGÍA BÁSICA

Acapulco de Juárez	Escurreimientos
Curvas de nivel	Flujo virtual
Traza urbana	Intermitente
Límite municipal	Perenne
Vialidades	Cuerpos de agua
Avenida	Subestación Eléctrica
Carretera	Zona Arqueológica

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN

La agricultura de riego es un sistema de cultivo donde la producción se basa a partir de la aplicación del agua; la aspersión, goteo, o cualquier otra técnica.

La agricultura de temporal es un sistema de cultivo donde la producción depende del agua de lluvia, por lo que su éxito está en función de la cantidad de precipitación y de la capacidad del suelo para retener el agua. Su uso es recomendable para producción de alimentos de subsistencia, rotación de cultivos y aprovechamiento de ciclos naturales de lluvia.

Los bosques son comunidades vegetales distribuidas en las zonas montañosas del país, en climas cálidos, cálidos subhúmedos, semicálidos subhúmedos, con temperaturas anuales que van de los 6 a 26°C (dependiendo del tipo de bosque) y una precipitación media anual que varía de 350 a 2,700mm (dependiendo del tipo de bosque). Sus usos serán para reservas naturales, usos forestales o zonas de conservación natural.

El manglar es una comunidad vegetal compuesta por árboles y arbustos adaptados a suelos inundados y con alta salinidad, ubicados en zonas costeras, estuarios y deltas de ríos. Sus raíces permiten la oxigenación y estabilidad del suelo, protegiendo contra la erosión y huracanes. Su uso es recomendable para protección de ecosistemas costeros, pesca sustentable y conservación de biodiversidad.

Los pastizales son comunidades de gramíneas y graminoides, algunos se ha introducido intencionalmente en una región (cultivado), otros se desarrollan sobre suelos salino-sódicos (halófilo) y otros aparecen como consecuencia del desmonte de cualquier tipo de vegetación, en áreas agrícolas abandonadas o bien como producto de áreas que se incendian con frecuencia (inducido). Su uso es agrícola, ganadero, industrial y para urbanizar, este último sus densidades e intensidades dependerán de las características físico-geográficas que garanticen su seguridad.

El sabanoide es pastizal con vegetación arbórea dispersa, creciendo sobre terrenos con drenaje deficiente y nivel freático superficial; se inundan en época de lluvias y en la de secas los suelos se endurecen y se agrietan. Su uso es principalmente para la ganadería y el pastoreo.

La selva baja caducifolia es una comunidad vegetal conformada por árboles con una altura de 4 a 15 metros, cuyas hojas caen en la época seca para reducir la pérdida de agua. Se encuentra en climas tropicales, predominando en suelos secos y pedregosos. Su uso es recomendable para aprovechamiento de madera, ganadería extensiva y conservación de biodiversidad.


La selva mediana es una comunidad vegetal conformada por árboles con una altura de 15 a 30 metros, algunos de los componentes arbóreos de este tipo vegetación pierden estacionalmente su follaje en un 25 a 50% (subperennifolia) y otros no son tan abundantes hasta la época de mayor desarrollo de follaje, cuando la cobertura puede ser lo suficientemente densa para disminuir fuertemente la incidencia de la luz solar en el suelo (subcaducifolia). Su uso es principalmente para la preservación de biodiversidad por su papel en la regulación del clima y el agua.

El tular es una comunidad de plantas acuáticas que se desarrolla en lagunas y lagos de agua dulce o salada y de escasa profundidad. Se usa como hábitat para animales, y para extraer contaminantes del agua.

La vegetación de dunas costeras es una comunidad vegetal que se establece a lo largo de las costas, se caracteriza por plantas pequeñas y suculentas. Su uso radica en fijar la arena, estabilizar las dunas y proteger la costa.

La vegetación secundaria se refiere al estado sucesional de la vegetación en el que hay indicios de que ha sido eliminada o perturbada a un grado que ha sido modificada sustancialmente.

Los asentamientos humanos son una porción geográfica altamente poblada, característica de las grandes ciudades acompañadas del comercio y la tecnología, el turismo y muchas veces, las desigualdades sociales. Es para usos de suelo urbanos de diversas densidades e intensidades, considerando las características físico-geográficas del territorio en que se encuentra emplazado.



USO DE SUELO Y VEGETACIÓN

SIMBOLOGÍA TEMÁTICA

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| AGR. RIEGO | S.M. SUBPERENNIFOLIA |
| AGR. TEMPORAL | SIN VEGETACIÓN |
| AGR. TEMPORAL | TULAR |
| AGR. TEMPORAL | VEG. DUNAS COSTERAS |
| AGR. TEMPORAL | VEG. SEC. ARBÓREA |
| BOS. ENCINO | VEG. SEC. ARBÓREA |
| BOS. ENCINO-PINO | VEG. SEC. ARBÓREA |
| BOS. PINO | VEG. SEC. ARBÓREA |
| BOS. PINO-ENCINO | VEG. SEC. ARBÓREA |
| BOS. MESÓFILO DE M. | VEG. SEC. ARBÓREA |
| DESPROVISTO DE VEGETACIÓN | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| MANGLAR | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| PAS. CULTIVADO | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| PAS. HALÓFILO | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| PAS. INDUCIDO | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| SABANOIDE | VEG. SEC. ARBUSTIVA |
| S.B. CADUCIFOLIA | ASENTAMIENTOS HUMANOS |
| S.M. SUBCADUCIFOLIA | |

SIMBOLOGÍA BÁSICA

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| Acapulco de Juárez | Escurrimientos |
| Curvas de nivel | Flujo virtual |
| Traza urbana | Intermitente |
| Límite municipal | Perenne |
| Vialidades | Cuerpos de agua |
| Avenida | Subestación Eléctrica |
| Carretera | Zona Arqueológica |

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO
GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ
GALILEO CABRERA GARIBALDI
RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA: 1:300,000

ORIENTACIÓN	LOCALIZACIÓN
-------------	--------------

DESCRIPCIÓN

Acapulco se encuentra en una bahía natural, con un acceso directo al océano Pacífico, lo que le ha otorgado una ubicación privilegiada para el desarrollo de su puerto y su sector turístico. Esta característica ha sido una de las principales fortalezas de la ciudad, promoviendo su crecimiento como un destino turístico internacional desde mediados del siglo XX. Desde su época de esplendor en los años 50 y 60, Acapulco se consolidó como uno de los destinos turísticos más importantes de México. El diseño de su infraestructura, en particular la Zona Dorada y la Costera Miguel Alemán, ha logrado atraer a miles de turistas anualmente.

Se ha invertido en su red vial, con importantes avenidas como la Costera Miguel Alemán y la carretera hacia las montañas que conecta Acapulco con otros puntos del estado. Esto facilita el acceso al turismo nacional e internacional, además de favorecer la conectividad entre diferentes zonas de la ciudad.


A pesar del crecimiento que Acapulco ha experimentado, el desarrollo urbano ha sido a menudo desordenado. En varias áreas, el crecimiento ha sido irregular, con una expansión desmedida en zonas vulnerables, como las colinas cercanas a la costa. Esto ha generado problemas relacionados con la infraestructura y la sustentabilidad, como la falta de drenaje adecuado y el crecimiento descontrolado de asentamientos irregulares.

Conclusión:

Con base en los mapas anteriores se puede hacer un análisis de las características geográficas del terreno (geológicas,hidrológicas, edafológicas). Marcando una notoria división entre la zona Norte/Oriente (mayormente accidentada por la sierra y ser un clima más cálido) y la zona Sur/Poniente (igualmente accidentada pero con zonas más planas y un clima cálido-sub humedo por su cercanía a la costa), siendo que esta última presenta propiedades más adecuadas para poder urbanizar. Razón por la cual, es la mostrada en el mapa.

Otro argumento a destacar, es la comunicación vial que existe en la zona. La carretera principal tiene límite en la zona norte/poniente y atraviesa la mitad de la sierra, facilitando nuestra delimitación.

01020 km



Síntesis

SIMBOLOGÍA TEMATICA

CLIMAS

Calido subhumedo

Semicalido subhumedo del grupo C

PENDIENTES

Pendiente 0-1%

Pendiente 1-3%

Pendiente 3-5%

Pendiente 5-10%

Pendiente 10-15%

Pendiente 15-49%

Cambisol

Feozem

Fluvisol

Litosol

Luvisol

N/A

Regosol

Solonchak

SIMBOLOGÍA BÁSICA

Acapulco de Juárez

Curvas de nivel

Traza urbana

Límite municipal

Vialidades

Avenida

Carretera

Escurrimientos

Flujo virtual

Intermitente

Perenne

Cuerpos de agua

Subestación Eléctrica

Zona Arqueológica

FACULTAD DE ESTUDIOS SUPERIORES ACATLÁN

ALUMNOS:

MITZY BOLAÑO ESPEJO

GABRIELA NATIVITAS VÁZQUEZ

GALILEO CABRERA GARIBALDI

RUBÉN HUERTA CASTRO

LOCALIDAD URBANA DE ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO

ESCALA:

1:178000

ORIENTACIÓN

LOCALIZACIÓN