DURANTE O USO DO GLP-1

Programa 1 de 3

PROTEGER.

Programa de treino e alimentação para preservar músculo e força enquanto o peso cai











MÉTODO ANTIRREGANHO · TREINO + ALIMENTAÇÃO

A MISSÃO DESTA FASE · ENQUANTO DURAR O TRATAMENTO (MÍN. 12 SEMANAS)

Perder gordura, não músculo. O sucesso desta fase é chegar ao fim do tratamento com a mesma força do início.

O QUE ACONTECE NO SEU CORPO

1

O apetite despenca

O GLP-1 reduz a fome e esvazia o estômago mais devagar. Come-se pouco, e normalmente falta proteína.

2

O músculo vira alvo

Em déficit e sem estímulo mecânico, até 25–40% do peso perdido pode ser massa magra. O corpo entende que o músculo é dispensável.

3

O metabolismo desacelera

Menos músculo significa menos gasto diário. Essa é a origem do reganho que aparece quando a medicação sai.

PRINCÍPIOS INEGOCIÁVEIS

As 4 regras do programa Proteger

Releia esta página sempre que a motivação oscilar.

1

Treino é tratamento

A musculação é o sinal fisiológico de que o músculo é necessário. Não é estética nem gasto calórico.

2

Proteína primeiro

Em toda refeição, coma a proteína antes do resto. Com pouco apetite, ela não pode sobrar no prato.

3

Mínimo eficaz

De 30 a 45 min, 2 a 4 vezes por semana, sem ir à falha. Estímulo regular vale mais que intensidade extrema.

4

Manter, não bater recorde

Carga mantida já é vitória. Queda de força é o principal alerta da fase.

ESTRUTURA DO TREINO


Parâmetros e semana-modelo

FREQUÊNCIA 3x/semana (mín. 2, máx. 4)	**DURAÇÃO** 30–45 minutos	**FORMATO** Corpo inteiro: A / B alternados	**SÉRIES** 2–3 por exercício
REPETIÇÕES 8–12	**ESFORÇO** Sobrar 2–3 reps (RIR 2–3)	**DESCANSO** 60–90 s	**CADÊNCIA** 2 s descendo · 1 s subindo

SEG	TER	QUA	QUI	SEX	SÁB	DOM
Treino A	Caminhada 20–30 min	Treino B	Mobilidade + caminhada	Treino A	Lazer ativo	Descanso

Na semana seguinte inverta para B · A · B. Meta diária: 7.000 passos ou mais.

Treino A • Corpo inteiro · padrões básicos



EXERCÍCIO 01

Leg press 45°

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Desça até ~90° de joelho sem tirar o quadril do banco.



EXERCÍCIO 02

Supino na máquina

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Escápulas encaixadas; empurre sem travar os cotovelos.



EXERCÍCIO 03

Puxada frontal

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Leve a barra até o queixo puxando os cotovelos para baixo.

Treino A • Corpo inteiro · padrões básicos



EXERCÍCIO 04

Stiff com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Quadril para trás, coluna neutra, halteres rentes às pernas.



EXERCÍCIO 05

Desenvolvimento na máquina

SÉRIES × REPS	DESCANSO
2 × 10–12	60 s

Execução: Abdômen firme; não arqueie a lombar ao empurrar.



EXERCÍCIO 06

Prancha

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 20–30 s	45 s

Execução: Corpo em linha reta; contraia glúteos e abdômen.

Treino B • Corpo inteiro · variações




EXERCÍCIO 01

Agachamento goblet

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Halter junto ao peito, tronco alto, joelhos na direção dos pés.




EXERCÍCIO 02

Remada sentada na polia

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Puxe até o abdômen, unindo as escápulas no final.



EXERCÍCIO 03

Supino inclinado com halteres

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10	90 s

Execução: Banco a 30°; desça controlando até a linha do peito.

Treino B • Corpo inteiro · variações



EXERCÍCIO 04

Elevação pélvica

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 10–12	90 s

Execução: Suba até alinhar tronco e coxas; segure 1 s no topo.




EXERCÍCIO 05

Subida no step

SÉRIES × REPS	DESCANSO
2 × 8 cada perna	60 s

Execução: Empurre pelo calcanhar da perna de cima, sem impulso da de baixo.



EXERCÍCIO 06

Dead bug

SÉRIES × REPS	DESCANSO
3 × 8 cada lado	45 s

Execução: Lombar colada no chão enquanto braço e perna opostos descem.

AERÓBICO E MOVIMENTO DIÁRIO

O aeróbico apoia, a musculação sustenta

Complementar, nunca central. Na fase de déficit, aeróbico em excesso compete com a recuperação muscular.



Caminhada

20–30 min · 2–3x/sem · ritmo de conversa



Bike ergométrica

15–25 min · leve · ótima em dias de pouca energia

Metas da fase

- 7.000+ passos/dia (NEAT)
- Zona 2: dá para conversar
- Nunca em jejum se houver tontura
- Nunca no lugar da musculação

PROGRESSÃO

Como evoluir semana a semana

Sem. 1–2	**Adaptação**	2 séries · RIR 3 · aprender a técnica e registrar as cargas
Sem. 3–6	**Construção**	3 séries · RIR 2–3 · subir carga só se fizer o topo das reps com folga
Sem. 7+	**Manutenção**	3 séries · RIR 2 · meta: manter as cargas da semana 6 até o fim do tratamento

Atenção: Dia de náusea ou pouca energia: faça o TREINO MÍNIMO de 20 min com Leg press, Supino, Puxada e Prancha, 2 séries cada. Treinar pouco é melhor que não treinar.

ALIMENTAÇÃO

Metas nutricionais da fase

PROTEÍNA

1,2–1,6 g/kg/dia

Ex.: 80 kg = 100–130 g, divididos em 4–5 refeições de 25–30 g

ÁGUA

35 ml/kg/dia

Ex.: 80 kg = 2,8 L. A desidratação piora náusea, constipação e tontura

FIBRAS


25 g/dia

Legumes cozidos, frutas, aveia e chia, aumentando aos poucos

REFEIÇÕES

4–5 pequenas

Comer devagar e parar no primeiro sinal de saciedade



O PRATO-MODELO

- Evite frituras e preparações gordurosas: pioram a náusea
- Líquidos entre as refeições, não junto
- Whey ou shake quando não houver fome para comida sólida
- Creatina 3–5 g/dia ajuda a preservar a massa magra (com orientação)
- Peça ao médico para checar vitamina D, B12 e ferro

CARDÁPIO-MODELO

Um dia de alimentação na prática

Monte o dia com 4–5 destas refeições. Ajuste a porção ao apetite, mas nunca corte a proteína.



Omelete proteica de espinafre e cottage

290 kcal · 30 g proteína



Iogurte natural com whey, morango e chia

260 kcal · 30 g proteína



Frango desfiado, purê de abóbora e brócolis

330 kcal · 40 g proteína



Shake proteico de banana e aveia

350 kcal · 34 g proteína



Sopa de frango com legumes

250 kcal · 28 g proteína



Tilápia grelhada, arroz e legumes

380 kcal · 42 g proteína

Valores aproximados por porção. O nutricionista ajusta as quantidades ao seu peso, objetivo e exames.

Como montar cada prato



Omelete proteica de espinafre e cottage

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
290	30g	5g	16g

- 2 ovos + 3 claras
- 50 g de queijo cottage
- 1 xíc. de espinafre refogado
- Tomate fatiado à vontade
- Café sem açúcar

Bata ovos e claras, despeje em frigideira antiaderente, recheie com espinafre e cottage e dobre.



Iogurte natural com whey, morango e chia

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
260	30g	20g	7g

- 170 g de iogurte natural (sem açúcar)
- 15 g de whey (½ scoop)
- 100 g de morango
- Mirtilos a gosto
- 1 col. sopa de chia

Misture o whey ao iogurte até ficar cremoso e cubra com as frutas e a chia.



Frango desfiado, purê de abóbora e brócolis

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
330	40g	20g	9g

- 120 g de peito de frango cozido
- 150 g de purê de abóbora cabotiá
- 100 g de brócolis no vapor
- 1 col. chá de azeite

Prato pequeno, macio e fácil de digerir. Coma a proteína primeiro.

Como montar cada prato



Shake proteico de banana e aveia

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
350	34g	45g	4g

- 200 ml de leite desnatado (ou vegetal)
- 1 scoop de whey (30 g)
- 1 banana
- 2 col. sopa de aveia
- Gelo e canela

Bata tudo. Use como lanche ou pós-treino quando não houver fome para comida sólida.



Sopa de frango com legumes

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
250	28g	18g	6g

- 100 g de frango desfiado
- 200 g de legumes (cenoura, abobrinha, chuchu)
- 300 ml de caldo caseiro
- Salsinha e cebolinha

Ideal em dias de náusea ou pouco apetite: hidrata e entrega proteína em volume pequeno.



Tilápia grelhada, arroz e legumes

KCAL	PROT.	CARB.	GORD.
380	42g	32g	9g

- 150 g de filé de tilápia
- 4 col. sopa de arroz (80 g)
- 150 g de cenoura e vagem cozidas
- Limão e 1 col. chá de azeite

Tempere o peixe com limão, alho e sal; grelhe 3–4 min de cada lado.

MONITORAMENTO

O que medir e quando acender o alerta

INDICADOR	COMO ACOMPANHAR	SINAL DE ALERTA
Força	Registrar as cargas em todo treino	Queda de 10% ou mais em 2 semanas
Composição	Bioimpedância ou dobras 1x/mês	Massa magra caindo rápido
Peso	Média semanal, mesmo dia e horário	Perda acima de 1,5% do peso por semana
Bem-estar	Sono, disposição, tontura, náusea	Tontura em treino: pare, hidrate-se e coma

EVITE

Os erros que mais causam perda muscular e reganho

- Treinar só aeróbico para emagrecer mais rápido
- Pular refeições porque não sente fome
- Treinar até a falha em toda série
- Usar o treino como punição alimentar
- Ignorar tontura e fraqueza

"Mais não é melhor quando o corpo está em adaptação metabólica."

Princípio do mínimo eficaz: volume moderado, intensidade controlada e frequência sustentável.

ENCERRAMENTO · PROGRAMA 1

Um corpo que se movimenta com força aprende que o novo peso é funcional.

Quando o médico iniciar a redução de dose, siga para o PROGRAMA 2 · ESTABILIZAR (desmame).

Programa aplicado com acompanhamento do médico prescritor, do nutricionista e do personal trainer. A dose, o desmame e os ajustes individuais são definidos pela equipe.