החומר הפעיל וריכוזו:

על חלק מהמרכיבים של התרופה" וסעיף 6 "מידע נוסף" בעלון.

מכיל מידע חשוב עבורך. עלון זה מכיל מידע תמציתי על התרופה. שמור על העלוו. ייתכו שתצטרר לעייו בו שוב. אם יש לר שאלות נוספות. פנה אל הרופא או אל הרוקח.

להם אפילו אם נראה לר כי מחלתם דומה.

אם מופיעות אצלר תופעות לוואי. כולל תופעות לוואי שלא מוזכרות בעלון זה בסעיף 4, יידע את הרופא או את הרוקח.

אריקסטרה היא תרופה המסייעת במניעת היווצרותם של קרישי דם **בכלי הדם** (גורם נוגד קרישי דם).

קרישי דם לא רצויים (פקקת) בכלי הדם.

• מניעת היווצרותם של קרישי דם בכלי הדם של הרגליים או של הריאות אחרי ניתוח אורטופדי (כגון ניתוח בירך או בברך) או ניתוח בבטן

מוגבלת עקב מחלה חריפה

• טיפול בסוגים מסוימים של התקף לב ובתעוקת חזה חמורה (כאב הנגרם

• אתה רגיש (אלרגי) לחומר הפעיל פונדפרינוקס סודיום או לכל אחד מהמרכיבים הנוספים אשר מכילה התרופה והמפורטים בסעיף 6

על ידי הפריו). אתה נמצא בסיכון לדימום לא מבוקר, לרבות:

■כיב בקיבה

דימום תוך מוחי שארע בזמן האחרון (דימום תוך-גולגולתי)

• אתה סובל ממחלת כבד חמורה

• אתה בן 75 שנה או יותר

ילדים ומתבגרים

אריקסטרה לא נבחנה בילדים ובמתבגרים מתחת לגיל 17 שנים.

אחרות כולל תרופות ללא מרשם ותוספי תזונה, ספר על כך לרופא או לרוקח. תרופות מסוימות אחרות עלולות להשפיע על אופו פעולתה של אריקסטרה או להיות מושפעות מאריקסטרה.

תמיסה להזרקה

5 מ"ג פונדפרינוקס סודיום (Fondaparinux sodium) ב- 1 מ"ל תמיסה להזרקה

1. למה מיועדת התרופה?

אריקסטרה משמשת ל:

עקב היצרות של העורקים בלב)

• אתה סובל מזיהום חיידקי בלב

אם כן, אין להשתמש באריקסטרה.

אזהרות מיוחדות הנוגעות לשימוש בתרופה

לפני הטיפול באריקסטרה ספר לרופא אם:

• הפרעות הקשורות לדימומים

• אתה סובל ממחלת כליות

• אתה שוקל פחות מ- 50 ק"ג

אינטראקציות/תגובות ביו תרופתיות

התרופה משווקת על פי מרשם רופא בלבד

קרא בעיון את העלון עד סופו בטרם תשתמש בתרופה, מכיוון שהוא

אריקסטרה מכילה חומר סינטטי בשם פונדפרינוקס סודיום העוצר את פעילותו של גורם קרישה ten-A") Xa") בדם, וכך מונע היווצרותם של

נוגד קרישה.

2. לפני שימוש בתרופה

אין להשתמש בתרופה אם:

• אתה מדמם באופן מופרז

אתה סובל ממחלת כליות חמורה מאוד

אם אתה לוקח, אם לקחת לאחרונה, או אם ייתכן שתיקח תרופות

הריון והנקה

עלון לצרכן לפי תקנות הרוקחים (תכשירים) התשמ"ו – 1986

אריקסטרה 2.5 מ"ג/ 0.5 מ"ל

חומרים בלתי פעילים ואלרגניים בתרופה - ראה סעיף 2 "מידע חשוב

תרופה זו נרשמה עבורך. אל תעביר אותה לאחרים. היא עלולה להזיק

• מניעת היווצרותם של קרישי דם במהלך או מיד לאחר תקופה של ניידות

קבוצה תרפויטית:

דווח לרופא שלך אם אתה סבור שאחת מתופעות אלו חלה עליך.

• היו לך סיבוכים קודמים במהלך טיפול בהפרין או בתרופות דמויות-הפרין שגרמו לירידה במספר טסיות הדם (תרומבוציטופניה שנגרמה

ניתוח במוח, בעמוד השדרה או בעין שעברת בזמן האחרון **• ניתוח**

דווח לרופא שלך אם אחת מתופעות אלה חלה עליך.

.(10.000

אין לרשום אריקסטרה לנשים הרות אלא אם אין ספק שהדבר חיוני. הנקה אינה מומלצת במהלך הטיפול באריקסטרה. אם הינך בהריון או מניקה, סבורה שאת הרה או מתכננת להרות, יש להיוועץ ברופא או ברוקח לפני השימוש בתרופה.

> מידע חשוב על חלק מהמרכיבים של התרופה אריקסטרה מכילה נתרו

מוצר רפואי זה מכיל פחות מ- 23 מ"ג נתרן בכל מנה ולכן למעשה הוא נטול נתרן.

מזרק האריקסטרה עשוי להכיל לטקס מגן המחט של המזרק עשוי להכיל לטקס, שעלול לגרום לתגובות

אלרגיות בקרב אנשים הרגישים ללטקס. דווח לרופא שלך אם אתה אלרגי ללטקס לפני תחילת הטיפול באריקסטרה.

3. כיצד תשתמש בתרופה?

יש להשתמש בתרופה תמיד בהתאם להוראות הרופא. עליך לבדוק עם הרופא או הרוקח אם אינר בטוח בנוגע למינוו ואופו הטיפול בתרופה. המינוו ואופו הטיפול ייקבעו על ידי הרופא בלבד.

המינון המקובל בדרך כלל הוא 2.5 מ"ג פעם ביום, המוזרק בערך באותה השעה בכל יום.

איו לעבור על המנה המומלצת.

משך הטיפול

עליר להמשיך את הטיפול באריקסטרה למשך הזמן שהרופא הורה לר. מכיווו שאריקסטרה מונעת את התפתחותו של מצב רפואי חמור.

• אריקסטרה ניתנת בהזרקה מתחת לעור (תת-עורית) לתור קפל בעור באזור הבטו התחתונה. המזרקים מלאים מראש במנה המדויקת לה אתה זקוק. **להוראות מפורטות ראה מעבר לדף.** לצורר טיפול בסוגים מסוימים של התקף לב, ייתכן שאיש צוות רפואי יתן לך את המנה הראשונה לתוך הווריד (תוך-ורידית).

• אין להזריק אריקסטרה לתוך שריר. **אם נטלת בטעות מינון גבוה יותר** עליך ליצור קשר בהקדם האפשרי עם הרופא או הרוקח להתייעצות. בגלל הסיכוו המוגבר לדימום. אם נטלת מנת יתר או אם בטעות בלע ילד או מישהו אחר מו התרופה. פנה מיד לרופא או לחדר מיון של בית חולים והבא את אריזת התרופה

אם שכחת ליטול את התרופה

• קח את התרופה ברגע שנזכרת. אל תזריק מנה כפולה כדי לפצות על מנה שהוחמצה.

• אם אינך בטוח מה לעשות, שאל את הרופא או הרוקח. יש להתמיד בטיפול כפי שהומלץ על ידי הרופא. גם אם חל שיפור במצב בריאותֹך, אין להפסיק הטיפול בתרופה ללא

התייעצות עם הרופא או הרוקח.

אם אתה מפסיק את נטילת התרופה אם אתה מפסיק את הטיפול לפני שהרופא הורה לך לעשות כן, אתה נמצא בסיכון להתפתחות קריש דם בווריד ברגל שלך או בריאה. צור

קשר עם הרופא או הרוקח לפני הפסקת הטיפול. אין ליטול תרופות בחושר! בדוק את התווית והמנה בכל פעם שהנך נוטל תרופה. הרכב משקפיים אם הנך זקוק להם.

אם יש לך שאלות נוספות בנוגע לשימוש בתרופה, היוועץ ברופא או

4. תופעות לוואי

כמו בכל תרופה. השימוש באריקסטרה עלול לגרום לתופעות לוואי בחלק מהמשתמשים. אל תיבהל למקרא רשימת תופעות הלוואי. ייתכן שלא תסבול מאף אחת מהן.

מצבים הדורשים את התייחסותר באנשים הנוטלים אריקסטרה (מופיעות בפחות ממשתמש אחד מתוך

הסימנים כוללים: נפיחות, לפעמים בפנים או בפה (אנגיואדמה), הגורמת לקשיים בבליעה

התמוטטות צור קשר מיידי עם הרופא אם מופיעים אצלך התסמינים הללו. הפסק ליטול אריקסטרה.

תופעות לוואי נוספות

תופעות לוואי שכיחות (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 100) • דימום (לדוגמה ממקום ניתוח, מכיב קיבה קיים, מהאף, מהחניכיים) • אנמיה (ירידה במספר תאי הדם האדומים)

תופעות לוואי שאינן שכיחות (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך (1,000)

חבורה או נפיחות (בצקת); בחילה או הקאה; כאב בחזה; קוצר נשימה; פריחה או גרד בעור; נזילה מתוך פצע ניתוח; חום; ירידה או עליה במספר טסיות הדם (תאי דם הנחוצים לקרישת דם); עליה ברמה של כימיקלים (*אנזימים*) המיוצרים על ידי הכבד.

תופעות לוואי נדירות (מופיעות ב- 1-10 משתמשים מתוך 10,000) תגובה אלרגית (כולל גרד, נפיחות, פריחה); דימום פנימי במוח או בבטו: חרדה או בלבול: כאב ראש: התעלפות או סחרחורת. לחץ דם נמור: נמנום או עייפות: הסמקה: שיעול: כאב ברגל או כאב בטו: שלשול או עצירות; קשיי עיכול; הזדהמות פצע; עליה ברמת הבילירובין חומר המיוצר על ידי הכבד) בדם: ירידה ברמת האשלגו בדם שלר.

אם הופיעה תופעת לוואי, אם אחת מתופעות הלוואי מחמירה, או כאשר אתה סובל מתופעת לוואי שלא צוינה בעלון, עליך להתייעץ עם הרופא.

דיווח על תופעות לוואי:

ניתו לדווח על תופעות לוואי למשרד הבריאות באמצעות לחיצה על הקישור "דיווח על תופעות לוואי עקב טיפול תרופתי" שנמצא בדף הבית של אתר משרד הבריאות (www.health.gov.il) המפנה לטופס המקווו לדיווח על תופעות לוואי. או על ידי כניסה לקישור: https://sideeffects.health.gov.il

בנוסף, ניתן לדווח לחברה באמצעות הכתובת הבאה: Padagis.co.il

5. איר לאחסו את התרופה?

• מנע הרעלה! תרופה זו וכל תרופה אחרת יש לשמור במקום סגור מחוץ להישג ידם וטווח ראייתם של ילדים ו/או תינוקות ועל ידי כך תמנע הרעלה. אל תגרום להקאה ללא הוראה מפורשת מהרופא. • אין להשתמש בתרופה אחרי תאריך התפוגה (exp. date) המופיע על גבי האריזה. תאריך התפוגה מתייחס ליום האחרון של אותו חודש.

• אחסן מתחת ל- 25°C. אין להקפיא.

אין להשתמש בתרופה אם: • אתה מבחין בחלקיקים כלשהם בתמיסה, או אם לתמיסה צבע דהוי.

• אתה מבחיו שהמזרק פגום.

• פתחת מזרק ואינך משתמש בו מיד.

השלכת המזרקים: אין לזרוק תרופות או מזרקים למי הביוב או לפסולת הביתית. שאל את הרוקח כיצד להשליך תרופות שאינך משתמש בהן יותר. כך תסייע

לשמור על הסביבה.

6. מידע נוסף • נוסף על המרכיב הפעיל התרופה מכילה גם:

Sodium chloride, water for injection, hydrochloric acid and sodium hydroxide to adjust the pH (2 ראה סעיף). אריקסטרה אינה מכילה כל מוצר מן החי.

כיצד נראית התרופה ומה תוכו האריזה: אריקסטרה היא תמיסה צלולה וחסרת צבע להזרקה. היא מסופקת במזרק חד פעמי מלא מראש הכולל מערכת בטיחות המסייעת למנוע

• מספר רישום התרופה בפנקס התרופות הממלכתי במשרד הבריאות:

פציעות מדקירת מחט אחרי השימוש. התרופה מגיעה באריזות של 2, 7, 10 ו- 20 מזרקים מלאים מראש. • ייתכן שלא כל גדלי האריזות משווקים.

• בעל הרישום: פאדאגיס ישראל סוכנויות בע"מ. רח' רקפת 1. שוהם. • יצרן: אספן נוטרה דאם דה בונדוויל, נוטרה דאם דה בונדוויל, צרפת. • נערך במרץ 2022 בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

תגובות אלרגיות חמורות (אנפילקסיס): תגובות אלה נדירות ביותר • לשם הפשטות ולהקלת הקריאה, עלון זה נוסח בלשון זכר. על אף זאת, התרופה מיועדת לשני המינים.



מדריך מפורט לשימוש באריקסטרה

הוראות שימוש

חלקי המזרק:

מגן המחט 🛈

מאחז אצבע ③

שרוול בטיחות ④

🛭 בוכנה

איור א



• תאריך התפוגה לא חלף • התמיסה צלולה וחסרת צבע ושאינה מכילה חלקיקים

> • המזרק לא נפתח או ניזוק 3. שב או שכב בתנוחה נוחה. בחר מקום באזור הבטן התחתונה, לפחות 5 ס"מ מתחת לטבור שלר (איור א). בכל זריקה הזרק לצד אחר של הבטן התחתונה. פעם לימיו ופעם **לשמאל**. זה יעזור להפחית



איור ב 1

ברופא. 4. נקה את אזור ההזרקה בפד אלכוהול.

• אל תיגע במחט ואל תניח לה לגעת בכל משטח לפני ההזרקה.

• זה תקיו להבחיו בבועת אוויר קטנה בתור המזרק. אל תנסה להוציא

את בועת האוויר הזאת לפני ההזרקה – אתה עלול לאבד חלק

התחתונה, היוועץ באחות או

5. הסר את מגו המחט. ראשית סובב אותו (איור **ב1**) ואז משוך אותו בקו ישר מגוף

המזרק (איור **ב2**).

השלך את מגן המחט.

הערה חשובה

מהתרופה אם תעשה זאת.

ההזרקה.





איור ב 2



ותיכנס חזרה לשרוול הבטיחות ושם תינעל באופו קבוע (איור ו).

自

איור ו

איור ה

איור ד

אין לזרוק את המזרק המשומש לפסולת הביתית. השלך אותו לפי הנחיותיו של הרופא או הרוקח.

איור 1. מזרק עם מערכת אוטומטית להגנת מחט

6. צבוט בעדינות את אזור העור

המורה לכל אורך ההזרקה

7. אחוז את המזרק ביציבות

במאחז האצבעות. החדר

את המחט לכל אורכה בזוויות

ישרות לקפל העור (איור **ד**).

8. הזרק את כל תכולת המזרק

באמצעות לחיצה כלפי מטה

על הבוכנה עד גבול יכולת

התנועה שלה (איור ה).

.(איור **ג**).

שנוקה ליצירת קפל. אחוז את

קפל העור בין האגודל לאצבע

60762