¿OR o razón de prevalencias?

ÚSALO CUANDO

- Estudio transversal.
- Desenlace binario (sí/no) y frecuente: más del 10 %.
- Datos sin diseño muestral complejo (hospital, muestra simple).

CÓMO LEERLO

- RP: cuántas veces más frecuente es el desenlace en los expuestos.
- Si el IC 95 % no incluye el 1, los datos no son compatibles con la ausencia de asociación.
- El OR se parece a la RP solo si el desenlace es raro (menos del 10 %).

CÓDIGO CLAVE

```
library(epiR); library(sandwich); library(lmtest)
epi.2by2(tab, method = "cross.sectional")   # RP y OR con IC 95 %
m <- glm(desenlace ~ exposicion + edad, data = d,
         family = poisson(link = "log"))
exp(cbind(RP = coef(m),
          coefci(m, vcov. = vcovHC(m, type = "HC0"))))
```

HALLAZGO DEL EJEMPLO

Obesidad abdominal, mujeres vs. hombres (muestra de la ENDES 2024, n = 30 493): RP 3,44 (IC 95 %: 3,31 a 3,58); OR 6,92.

CÓMO REPORTARLO

En la muestra de la ENDES 2024 (n = 30 493 personas de 15 y más años), la prevalencia de obesidad abdominal fue 58,7 % en mujeres y 17,0 % en hombres; la razón de prevalencias fue 3,44 (IC 95 %: 3,31 a 3,58), estimada con regresión de Poisson con varianza robusta.

EVITA

- Leer el OR como «veces más frecuente».
- Usar Poisson sin varianza robusta: los intervalos salen demasiado anchos.
- Analizar una encuesta compleja sin su diseño: ver la dosis plena.