¿OR o razón de prevalencias?

ÚSALO CUANDO

- Estudio transversal con desenlace binario frecuente (más del 10 %).
- Encuesta con diseño muestral complejo: pesos, conglomerados y estratos (ENDES, ENAHO).
- Protocolo con regresión logística: reporta la RP por estandarización marginal.

CÓMO LEERLO

- svyby(): la columna del desenlace es la prevalencia en proporción; se, su error estándar con el diseño.
- svyglm(): exp(coef) es la RP; el IC usa la varianza del diseño.
- avg_comparisons(): estimate es la RP estandarizada; conf.low y conf.high, su IC 95 %.

CÓDIGO CLAVE

```
library(survey); options(survey.lonely.psu = "adjust")
dis <- svydesign(ids = ~HV001, strata = ~HV022, weights = ~peso,
                 data = d, nest = TRUE)
dis_a <- subset(dis, !is.na(desenlace))        # no filtres antes
m <- svyglm(desenlace ~ exposicion + edad, design = dis_a,
            family = quasipoisson(link = "log"))
exp(cbind(RP = coef(m), confint(m)))
# desde una logística (m_logit):
marginaleffects::avg_comparisons(m_logit, variables = "exposicion",
  comparison = "ratioavg", wts = "(weights)")
```

HALLAZGO DEL EJEMPLO

Obesidad abdominal, mujeres vs. hombres (ENDES 2024, con diseño): RP 3,05 (IC 95 %: 2,86 a 3,24); OR 6,38. RP estandarizada desde la logística ajustada: 2,97.

CÓMO REPORTARLO

En la población peruana de 15 y más años (ENDES 2024), la prevalencia de obesidad abdominal fue 62,0 % en mujeres y 20,3 % en hombres; la razón de prevalencias fue 3,05 (IC 95 %: 2,86 a 3,24). Las estimaciones consideraron el diseño muestral complejo de la encuesta.

EVITA

- Filtrar la base antes de svydesign(): usa subset() sobre el diseño.
- comparison = "ratio" en marginaleffects: promedia cocientes individuales.
- Esperar que el log-binomial converja con desenlaces frecuentes.
- Usar el peso y la talla de CSALUD01 en mujeres de 15 a 49 años: están en otro módulo.

Anthony Romero Cerdán · Médico cirujano