

- 授予 (2) ... 药物在临床应用时, 对轻度与局部感染患者应首先选用 (5) 抗菌药 C. 用餐后1小时服用
- A. 非限制使用级  
B. 限制使用级  
C. 特殊使用级;1答案: B
3. [1]1) 具有高级专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (1) 抗菌药物处方权; 具有中级以上专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (2) ... 药物在临床应用时, 对轻度与局部感染患者应首先选用 (5) 抗菌药物进行治疗;
- A. 非限制使用级  
B. 限制使用级  
C. 特殊使用级;2答案: A
4. [1]1) 具有高级专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (1) 抗菌药物处方权; 具有中级以上专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (2) ... 药物在临床应用时, 对轻度与局部感染患者应首先选用 (5) 抗菌药物进行治疗;
- A. 非限制使用级  
B. 限制使用级  
C. 特殊使用级;3答案: A
5. [1]1) 具有高级专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (1) 抗菌药物处方权; 具有中级以上专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (2) ... 药物在临床应用时, 对轻度与局部感染患者应首先选用 (5) 抗菌药物进行治疗;
- A. 非限制使用级  
B. 限制使用级  
C. 特殊使用级;4答案: A
6. [1]1) 王奶奶一年前体检发现患了骨质疏松症, 医师开了阿仑膦酸钠片(福善美), 服药一年来, 一贯无胃病的王奶奶发觉服药后时有胃痛、恶心的感觉, 食管仿...前半小时服用
- B. 宜在早上空腹以200ml水送服, 服药30分
- D. 用水充分溶解或消泡后再使用;0答案: B
7. [1]1) 王奶奶一年前体检发现患了骨质疏松症, 医师开了阿仑膦酸钠片(福善美), 服药一年来, 一贯无胃病的王奶奶发觉服药后时有胃痛、恶心的感觉, 食管仿...前半小时服用
- B. 宜在早上空腹以200ml水送服, 服药30分
- D. 用水充分溶解或消泡后再使用;1答案: A
8. [1]1) 王奶奶一年前体检发现患了骨质疏松症, 医师开了阿仑膦酸钠片(福善美), 服药一年来, 一贯无胃病的王奶奶发觉服药后时有胃痛、恶心的感觉, 食管仿...前半小时服用
- B. 宜在早上空腹以200ml水送服, 服药30分
- D. 用水充分溶解或消泡后再使用;2答案: A
9. [1]1) 王奶奶一年前体检发现患了骨质疏松症, 医师开了阿仑膦酸钠片(福善美), 服药一年来, 一贯无胃病的王奶奶发觉服药后时有胃痛、恶心的感觉, 食管仿...前半小时服用
- B. 宜在早上空腹以200ml水送服, 服药30分
- D. 用水充分溶解或消泡后再使用;3答案: C
10. [1]1) 王奶奶一年前体检发现患了骨质疏松症, 医师开了阿仑膦酸钠片(福善美), 服药一年来, 一贯无胃病的王奶奶发觉服药后时有胃痛、恶心的感觉, 食管仿...前半小时服用
- B. 宜在早上空腹以200ml水送服, 服药30分
- C. 用餐后1小时服用
- D. 用水充分溶解或消泡后再使用;4答案: D
11. [1]1) 只能在具有药品经营许可证, 配备执业药师或药师以上技术人员的社会药房和医疗机构药房零售的非处方药是 (1) 。  
2) 除了社会药房和医疗机构...红色OTC标志的药品是 (4) 。  
5) 绿色OTC标志的药品是 (5) 。
- 备选项:  
A. 处方药  
B. 乙类非处方药  
C. 甲类非处方药;0答案: C
12. [1]1) 只能在具有药品经营许可证, 配备执业药师或药师以上技术人员的社会药房和医疗机构药房零售的非处方药是 (1) 。  
2) 除了社会药房和医疗机构...红色OTC标志的药品是 (4) 。  
5) 绿色OTC标志的药品是 (5) 。
- 备选项:  
A. 处方药  
B. 乙类非处方药  
C. 甲类非处方药;1答案: B
13. [1]1) 只能在具有药品经营许可证, 配备执业药师或药师以上技术人员的社会药房和医疗机构药房零售的非处方药是 (1) 。  
2) 除了社会药房和医疗机构...红色OTC标志的药品是 (4) 。  
5) 绿色OTC标志的药品是 (5) 。
- 备选项:  
A. 处方药  
B. 乙类非处方药  
C. 甲类非处方药;2答案: A
14. [1]1) 只能在具有药品经营许可证, 配备执业药师或药师以上技术人员的社会药房和医疗机构药房零售的非处方药是 (1) 。  
2) 除了社会药房和医疗机构...红色OTC标志的药品是 (4) 。  
5) 绿色OTC标志的药品是 (5) 。

## 国开电大 2025《11425 调剂学(本)》期末考

### 试题库小抄(按字母排版)

总题量 (374): 单选题(330) 填空题(24) 主观题(20)

单选题(330) 微信号: zydz\_9527

1. [1]1) 具有高级专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (1) 抗菌药物处方权; 具有中级以上专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (2) ... 药物在临床应用时, 对轻度与局部感染患者应首先选用 (5) 抗菌药物进行治疗;

A. 非限制使用级  
B. 限制使用级  
C. 特殊使用级;0答案: C

2. [1]1) 具有高级专业技术职务任职资格的医师, 可授予 (1) 抗菌药物处方权; 具有中级以上专业技术职务任职资格的医师, 可

备选项：

- A. 处方药
- B. 乙类非处方药
- C. 甲类非处方药;3答案: C

15. [1]只能在具有药品经营许可证，配备执业药师或药师以上技术人员的社会药房和医疗机构药房零售的非处方药是（1）。

2)除了社会药房和医疗机构...红色OTC标志的药品是（4）。

5)绿色OTC标志的药品是（5）。

备选项：

- A. 处方药
- B. 乙类非处方药
- C. 甲类非处方药;4答案: B

16. [2]2007年5月1日起施行的《处方管理办法》对小儿处方的书写有明确要求，第六条规定新生儿、婴幼儿写日、月龄，必要时要注明（）。答案：体重

17. [2]2018版国家基本药物目录增加覆盖临床的重点病种是（）。答案：癌症、儿童疾病、慢性病

18. [2]2018年版《国家基本药物目录》增加覆盖的临床重点病种是（）。答案：癌症、儿童疾病、慢性病

19. [2]21, 用于研磨的瓷质研钵不适用于（）。答案：少量混合细粉的药物

20. UDD的目的不是（）。答案：降低药品消耗

21. [A]按《抗菌药物临床应用管理办法》，价格昂贵的抗菌药物是（）。答案：特殊使用级

22. [A]按照《处方管理办法》，处方类别应标明在处方的（）。答案：右上角

23. [B]并开药名即一名多药，疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名，多药包含的药物种类有（）答案：2~3 种

24. [B]并开药名即一名多药，是将多种疗效

基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名。多种包含的药物种类有（）。答案：2~3种

25. [B]并开药名即一名多药，是将（）疗效基本相似或有协同作用的饮片缩写在一起而构成的药名。答案：2~3种

26. [B]不属于电子处方系统的特点的是（）。答案：便于监控医生处方行为

27. [B]不属于电子处方系统的特点的是（）。答案：便于统计药品收入

28. [B]不属于电子处方系统特点的是（）。答案：便于监控医师处方行为

29. [B]不属于调配环节用药安全的控制措施的是（）。答案：确认患者的身份，以确保药品发给相应的患者

30. [B]不属于降低用药安全风险的环境因素的是（）。答案：严格执行标准调剂操作规程，及时发现和避免工作缺陷

31. [B]不属于降低用药安全风险的环境因素的是（）。答案：严格执行标准调剂操作规程，及时发现和避免工作缺陷

32. [B]不属于降低用药安全风险的环境因素的是（）。答案：严格执行标准调剂操作规程，及时发现和避免工作缺陷

33. [B]不属于门诊药房调剂智能化系统的特点的是（）答案：提高经济效益

34. [B]不属于门诊药房调剂智能化系统特点的是（）。答案：提高经济效益

35. [B]不属于调剂学的工作范畴和研究领域的是（）。答案：开展临床研究，为临床提供新的药物治疗方案

36. [B]不属于药师对患者用药教育的基本内容的是（）。答案：使患者掌握疾病的诊断和鉴别诊断

37. [B]不属于药师对患者用药教育的基本内容的是（）。答案：使患者掌握疾病的诊断和鉴别诊断

38. [B]不属于药学信息服务范围的是

（）。答案：建立和维护药学信息硬件系统

39. [B]不属于药学信息服务范围的是（）。答案：建立和维护药学信息硬件系统

40. [B]不属于住院药房调剂剂智能化系统的特點的是（）。答案：减少不合理用药現象

41. [B]不属于住院药房调剂剂智能化系统特點的是（）。答案：減少不合理用药現象

42. [B]不同剂型药物对药效的发挥起着重要的作用，下述说法错误的是（）。答案：剂型不能改变药物的作用性质

43. [B]不需要分开摆放或陈列的药品是（）。答案：作用相同的药品

44. [B]不需要分开摆放或陈列的药品是（）。答案：作用相同

45. [B]不宜与川乌、草乌、附子同用的药物是（）。答案：半夏

46. [《》]《处方管理办法》对处方定义为，由注册的执业医师和执业助理医师在诊疗活动中为患者开具的、由药学技术人员（），并作为发药凭证的医疗用药的医疗文书。答案：审核、调配、核对

47. [C]处方前记内容正确的是（）。答案：处方编号、姓名、年龄

48. [C]处方前记应标明的是（）。答案：临床诊断

49. [C]处方审核的内容不包括（）。答案：价格合理性

50. [C]处方书写不符合规则的是（）。答案：开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过3种药品

51. [C]处方书写不符合规则的是（）。答案：开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过3种药品

52. [C]处方药的调剂流程通常为（）。答案：收方→审方→调配→贴签→复核→发药

53. [C]处方中常见缩写词不正确的是（）。答案：p.e. 口服

答案：p.e. 口服

54. [C]处方中常见缩写词错误的是（）。

答案：e. 口服

55. [C]从事门诊药房的调剂人员应是（）。答案：药学专业院校毕业，并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师

56. [C]从事门诊药房调剂的人员应是（）。答案：药学专业院校毕业，并取得相应的药学专业技术职务任职资格的药师

57. [C]促进处方开具、调剂、使用、保存的规范化管理，提高处方质量，促进合理用药，保障患者用药安全的法规是（）。答案：《处方管理办法》

58. [C]错误造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施；这类错误属于（）答案：E类

59. [C]错误造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施，这属于哪类错误？（）答案：E类

60. [D]待分装的药品描述，不正确的是（）。答案：一种药品分装完毕后可立即分装另一药物

61. [D]单剂量调剂的目的，不包括（）。答案：保证调配及时性

62. [D]当需要准确量取更小体积的液体时，正确的做法是（）。答案：用移液管和吸耳球

63. [D]当需要准确量取更小体积的液体时，正确做法是（）。答案：用移液管和吸耳球

64. [D]滴鼻剂的使用方法正确的是（）。答案：以上均正确

65. [D]滴鼻剂使用方法正确的是（）。答案：以上均正确

66. [D]滴眼剂使用方法不正确的是（）。答案：先滴患眼，后滴健眼

67. [D]滴眼剂使用方法不正确的是（）。答案：先滴患眼，后滴健眼

68. [D]电子处方系统的特点，不包括（）。答案：增加药品使用量

69. [D]调配环节用药安全的控制措施，不包括（）。答案：确认患者的身份，以确保药品发

给相应的患者

70. [D] 对处方中有（ ）药物，需要临时捣碎，以利于有效成分的煎出。答案：矿物、贝壳、果实种子类坚硬

71. [D] 对于待分装的药品，描述错误的是（ ）。答案：一种药品分装完毕后可立即分装另一种药品

72. [E] 二级以上医疗机构从事处方调剂工作的药师获得抗菌药物调剂资格须经（ ）。答案：县级以上地方卫生行政部门组织相关培训和考核

73. [F] 法规规定不得在社会药房销售的药品是（ ）。答案：麻醉药品

74. [F] 法规规定不得在社会药房销售的药品是（ ）。答案：麻醉药品

75. [F] 防范用药错误最有效的措施是（ ）。答案：采取限制性措施

76. [F] 非处方药分甲、乙两类，分类依据是药品的（ ）。答案：安全性

77. [F] 非处方药分甲、乙两类，分类依据是药品的（ ）。答案：安全性

78. [“】 “非限制使用级”抗菌药物描述不正确的是（ ）。答案：价格相对较高

79. [F] 非药学技术人员在经过药学专业知识培训后，可从事的药学工作是（ ）。答案：处方统计

80. [F] 服清热药时不宜吃（ ）的食物。答案：辛辣助热类

81. [F] 服清热药时不宜吃的食品是（ ）。答案：辛辣助热类

82. [G] 个月的男婴调剂青霉素针剂的处方，下列说法正确的是（ ）。答案：药师须审核是否有过敏试验结果

83. [G] 给患儿使用滴眼剂的做法，不正确的是（ ）。答案：给药前应向患儿简单介绍操作过程

84. [G] 给患儿使用滴眼剂，做法不正确的是（ ）。答案：先滴眼疾较重一侧，再滴眼疾较轻一侧

85. [G] 根据《抗菌药物临床应用管理办法》（卫生部令第84号），抗菌药物调剂资格取消后，在多久内不得恢复其药物调剂资格（ ）。答案：半年内

86. [G] 根据药品相关的法律法规要求，不得在零售药店销售的药品是（ ）。答案：麻醉药品

87. [G] 关于MTM不正确的叙述是（ ）。答案：MTM的主要目的是减少患者的药费支出

88. [G] 关于处方审核的描述正确的是（ ）。答案：处方审核是指药师在处方调配前对处方进行审核和安全用药检查把关的工作过程

89. [G] 关于处方审核，正确的描述是（ ）。答案：处方审核是指药师在处方调配前对处方进行审核和安全用药检查把关的工作过程

90. [G] 关于处方药和非处方药的分类管理，说法正确的是（ ）。答案：按药品品种、包装规格、适应证、剂量和给药途径的不同分类

91. [G] 关于处方药和非处方药的分类管理，以下说法正确的是（ ）。答案：按药品品种、包装规格、适应证、剂量及给药途径的不同分类

92. [G] 关于处方种类与处方颜色，以下表述正确的是（ ）。答案：儿科处方为淡绿色

93. [G] 关于处方种类与处方颜色，以下表述正确的是（ ）。答案：儿童处方为淡绿色

94. [G] 关于待分装的药品描述，不正确的是（ ）。答案：一种药品分装完毕后可立即分装另一药物

95. [G] 关于非处方药品，以下描述不正确的是（ ）。答案：乙类非处方药须在药房由执业药师或药师指导下购买和使用

96. [G] 关于非处方药品，以下描述错误的是（ ）。答案：乙类非处方药须在药房由执业药师或药师指导购买和使用

97. [G] 关于非限制使用级抗菌药物，以下描述不正确的是（ ）。答案：价格相对较高

98. [G] 关于特殊使用级抗菌药物，以下描述不正确的是（ ）。答案：抗菌谱窄

99. [G] 关于限制使用级抗菌药物，以下描述不正确的是（ ）。答案：进口药品

100. [G] 关于药品分装胶囊，不正确的叙述是（ ）。答案：胶囊规格越大的装载量越大

101. [G] 关于药品分装胶囊，不正确的叙述是（ ）。答案：胶囊号越大的装载量越大

102. [G] 关于药品分装时待分装的药品描述，描述不正确的是（ ）。答案：一种药品分装完毕后可立即分装另一药物

103. [G] 关于药物漏服的说法正确的是（ ）。答案：药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服

104. [G] 关于药物重整作用的叙述正确的是（ ）。答案：以上都是

105. [G] 关于药物重整作用的正确叙述是（ ）。答案：以上都是

106. [G] 关于《医疗机构处方审核规范》要求开展处方审核的医疗机构应当满足的条件，不正确的是（ ）。答案：处方审核人员是调剂人员即可

107. [G] 关于《医疗机构处方审核规范》要求开展处方审核的医疗机构应当满足的条件，下列说法错误的是（ ）。答案：处方审核人员是调剂人员即可

108. [G] 关于用药错误与不良反应的区别：（1）属于药品固有的自然属性的是（ ）。

（2）受人、系统、政策和文化等多种因素影响的是（ ）的措施，对药物治疗系统进行控制、跟踪评估和持续改进，可以预防其发生的是（ ）。

A. 用药错误

B. 药品不良反应

;0 答案：B

109. [G] 关于用药错误与不良反应的区别：

（1）属于药品固有的自然属性的是（ ）。

（2）受人、系统、政策和文化等多种因素影响的是（ ）的措施，对药物治疗系统进行控制、跟踪评估和持续改进，可以预防其发生的是（ ）。

A. 用药错误  
B. 药品不良反应

;1 答案：A

110. [G] 关于用药错误与不良反应的区别：

（1）属于药品固有的自然属性的是（ ）。

（2）受人、系统、政策和文化等多种因素影响的是（ ）的措施，对药物治疗系统进行控制、跟踪评估和持续改进，可以预防其发生的是（ ）。

A. 用药错误  
B. 药品不良反应

;2 答案：B

111. [G] 关于用药错误与不良反应的区别：

（1）属于药品固有的自然属性的是（ ）。

（2）受人、系统、政策和文化等多种因素影响的是（ ）的措施，对药物治疗系统进行控制、跟踪评估和持续改进，可以预防其发生的是（ ）。

A. 用药错误  
B. 药品不良反应

;3答案: A

112. [G]关于用药错误与不良反应的区别:

(1) 属于药品固有的自然属性的是  
(1)。

(2) 受人、系统、政策和文化等多种因素影响的是(…效的措施,对药物治疗系统进行控制、跟踪评估和持续改进,可以预防其发生的是(5)。

- A. 用药错误
- B. 药品不良反应

;4答案: A

113. [G]关于用药咨询服务,叙述不正确的是( )。答案:帮助患者判断医师诊断是否正确

114. [G]关于住院药房医嘱审核的叙述,正确是( )。答案:药师应对医嘱的药物过敏相关问题、药物用法用量相关问题、给药途径相关问题、有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

115. [G]关于住院药房医嘱审核,正确的叙述是( )。答案:药师应对医嘱的药物过敏相关问题,药物用法用量相关问题,给药途径相关问题,有无重复用药、药物相互作用和配伍禁忌等问题进行审核

116. [G]国家对药品实行分类管理制度,将药品分为( )。答案:处方药和非处方药

117. [G]国家药物政策的基本目标不包括( )。答案:促进药品使用量

118. [H]核对发药环节必须采取的用药安全控制措施是( )。答案:确认患者的身份,以确保药品发给相应的患者

119. [J]家长给患儿服药,正确的做法是( )。答案:患儿服药后要多加鼓励和安慰

120. [J]家长给患儿服药,正确的做法是( )。答案:患儿服药后要多加鼓励和安慰

121. [J]家长给患儿喂口服药时,正确的做法

是( )。答案:药物从嘴角灌入,使药贴标签的反面再倾倒液体到达舌根部后即可咽下

122. [J]家长给患儿喂口服液体药,正确的做法是( )。答案:混悬剂使用前应充分摇匀

123. [J]家长给患儿喂口服液体药,正确的做法是( )。答案:混悬剂使用前应充分摇匀

124. [J]健康的用药安全文化认为( )。答案:用药错误随时都可能发生

125. [J]将需另煎的饮片单独煎煮30~40分钟后,药渣并入群药同煎,滤取的煎液兑入群药的煎液同服的称为( )。答案:另煎

126. [J]将饮片单独煎煮30~40分钟后,药渣并入群药同煎,滤取的煎液兑入群药的煎液同服的煎法称为( )。答案:另煎

127. [K]开具处方的药品名称使用( )。答案:药品通用名

128. [K]开具处方的药品名称使用( )。答案:药品通用名称

129. [K]抗菌药物实行分级管理,以下不属于抗菌药物分级的是( )。答案:一般使用级

130. [K]抗菌药物调剂资格取消后,在多久内不得恢复其调剂资格( )。答案:半年内

131. [K]可以腔道给药的剂型有( )。答案:以上均可

132. [K]口服下列药品时对饮水量有要求的是( )。答案:阿伦膦酸钠

133. [K]口服下列药品时对饮水量有要求的是( )。答案:阿伦膦酸钠

134. [K]口服下列药物时不宜多饮水的是( )。答案:川贝止咳糖浆

135. [K]喹诺酮类药物的禁用范围是( )。答案:18岁以下儿童

136. [L]量取液体时的注意事项,不正确的是( )。答案:用手握住盛装原溶液容器

案:县级以上地方卫生行政部门组织相关培训和考核

150. [Q]腔道给药剂型可以用于( )。答案:以上均可

151. [R]妊娠禁用中药为毒性中药,凡禁用的中药绝不能使用,下列中药材或饮片属于妊娠禁用的是( )。答案:巴豆

152. [R]妊娠禁用中药为毒性中药,凡禁用的中药绝不能使用,下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用的是( )。答案:巴豆

153. [R]妊娠禁用中药为毒性中药,凡禁用的中药绝不能使用,下列中药材或中药饮片属于妊娠禁用的是( )。答案:巴豆

154. [R]溶液量取要求不正确的是( )。答案:量取15ml的液体,应选用容量为50ml的量筒

155. [R]溶液量取要求不正确的是( )。答案:量取15ml的液体,应选用容量为50ml的量筒

156. [R]瑞士奶酪模型要说明的是( )。答案:错误一旦发生,极有可能抵达患者

157. [R]瑞士奶酪模型要说明的是( )。答案:错误一旦发生,极有可能抵达患者

158. [S]社会药房处方审核人员是( )。答案:执业药师

159. [S]社会药房处方审核人员是( )。答案:执业药师

160. [S]社会药房的开办条件不包括( )。答案:执业医师执业许可证

161. [S]社会药房的药品陈列不正确的是( )。答案:内服药可与外用药一起存放

162. [S]社会药房调剂模式:

1) 不得采用开架自选销售方式,也不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式的药品是(1)

2) 药师应当凭…买和使用的药品是(4)

5) 一般可采用开架和柜台两种调剂模式的药品是(5)  
备选项:

A. 处方药

B. 非处方药;0答案: A

163. [S]社会药房调剂模式:

1) 不得采用开架自选销售方式,也不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式的药品是 (1)

2) 药师应当凭...买和使用的药品是 (4)

5) 一般可采用开架和柜台两种调剂模式的药品是 (5)

备选项:

A. 处方药

B. 非处方药;1答案: A

164. [S]社会药房调剂模式:

1) 不得采用开架自选销售方式,也不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式的药品是 (1)

2) 药师应当凭...买和使用的药品是 (4)

5) 一般可采用开架和柜台两种调剂模式的药品是 (5)

备选项:

A. 处方药

B. 非处方药;2答案: A

165. [S]社会药房调剂模式:

1) 不得采用开架自选销售方式,也不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式的药品是 (1)

2) 药师应当凭...买和使用的药品是 (4)

5) 一般可采用开架和柜台两种调剂模式的药品是 (5)

备选项:

A. 处方药

B. 非处方药;3答案: B

166. [S]社会药房调剂模式:

1) 不得采用开架自选销售方式,也不得采用有奖销售、附赠药品或礼品销售等销售方式的药品是 (1)

2) 药师应当凭...买和使用的药品是 (4)

5) 一般可采用开架和柜台两种调剂模式的药品是 (5)

备选项:

A. 处方药

B. 非处方药;4答案: B

167. [S]社会药房须遵守的法律、法规及行业规范不包括 ( ) 。**答案: 《抗菌药物临床应用指导原则》**

168. [S]社会药房须遵守的法律、法规及行业规范不包括 ( ) 。**答案: 《麻醉药品和精神药品管理条例》**

169. [S]审核处方正文是否分列药品名称、剂型、规格、数量及用法用量属于审核处方的 (1) 。

审核处方是否符合本单位相关管理制度属于审核处方的...的 (4) 。

审核处方用药与临床诊断是否相符属于审核处方的 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;0答案: B

170. [S]审核处方正文是否分列药品名称、剂型、规格、数量及用法用量属于审核处方的 (1) 。

审核处方是否符合本单位相关管理制度属于审核处方的...的 (4) 。

审核处方用药与临床诊断是否相符属于审核处方的 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;1答案: A

171. [S]审核处方正文是否分列药品名称、剂型、规格、数量及用法用量属于审核处方的 (1) 。

审核处方是否符合本单位相关管理制度属于审核处方的...的 (4) 。

审核处方用药与临床诊断是否相符属于审核处方的 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;2答案: A

172. [S]审核处方正文是否分列药品名称、剂型、规格、数量及用法用量属于审核处方的 (1) 。

168. [S]社会药房须遵守的法律、法规及行业审核处方是否符合本单位相关管理制度属于审核处方的...的 (4) 。

审核处方用药与临床诊断是否相符属于审核处方的 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;3答案: C

173. [S]审核处方正文是否分列药品名称、剂型、规格、数量及用法用量属于审核处方的 (1) 。

审核处方是否符合本单位相关管理制度属于审核处方的...的 (4) 。

审核处方用药与临床诊断是否相符属于审核处方的 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;4答案: C

174. [S]生石膏、龟甲等质地坚硬,有效成分不易煎出的需 (1) ;薄荷、苏叶等含挥发性有效成分的饮片需 (2) ;车前子、菟丝子等可致...);阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

备选项:

A. 炙化

B. 后下

C. 先煎

D. 另煎

E. 包煎;0答案: C

175. [S]生石膏、龟甲等质地坚硬,有效成分不易煎出的需 (1) ;薄荷、苏叶等含挥发性有效成分的饮片需 (2) ;车前子、菟丝子等可致...);阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

备选项:

A. 合法性

B. 规范性

C. 适宜性;4答案: A

子、菟丝子等可致...) ;阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

A. 炙化

B. 后下

C. 先煎

D. 另煎

E. 包煎;1答案: B

176. [S]生石膏、龟甲等质地坚硬,有效成分不易煎出的需 (1) ;薄荷、苏叶等含挥发性有效成分的饮片需 (2) ;车前子、菟丝子等可致...);阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

A. 炙化

B. 后下

C. 先煎

D. 另煎

E. 包煎;2答案: E

177. [S]生石膏、龟甲等质地坚硬,有效成分不易煎出的需 (1) ;薄荷、苏叶等含挥发性有效成分的饮片需 (2) ;车前子、菟丝子等可致...);阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

A. 炙化

B. 后下

C. 先煎

D. 另煎

E. 包煎;3答案: D

178. [S]生石膏、龟甲等质地坚硬,有效成分不易煎出的需 (1) ;薄荷、苏叶等含挥发性有效成分的饮片需 (2) ;车前子、菟丝子等可致...);阿胶、鹿角胶、饴糖、蜂蜜等胶质、黏性大且易溶解的药物需 (5) 。

A. 炙化

B. 后下

C. 先煎

D. 另煎

E. 包煎;4答案: A

179. [S]属于十八反配伍禁忌内容的是

( )。答案：甘草不宜与海藻、京大戟、芫花、甘遂同用

180. [S]属于特殊药品的有( )。答案：医疗用毒性药品、麻醉药品、放射性药品

181. [S]属于特殊药品的有( )。答案：毒性药品、麻醉药品、放射性药品

182. [S]随着医疗卫生体制改革的深入，医院调剂模式已转变成( )。答案：以患者为中心

183. [T]调剂柜台是调配处方的操作工作台，一般宽为( )，高为( )，长度可按中药调剂室大小而定。答案：60~70cm, 90~100cm

184. [T]调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的(1)，其目的是为患者提供安全、高效的(2)，即：①通过(3)及发药，为患者提供安…包括配售卫生用具、医疗器械等任务。

备选项：

- A. 药学服务
- B. 正确合理使用
- C. 药物合理应用的方法
- D. 审核、调配处方
- E. 患者咨询;0答案：B

185. [T]调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的(1)，其目的是为患者提供安全、高效的(2)，即：①通过(3)及发药，为患者提供安…包括配售卫生用具、医疗器械等任务。

备选项：

- A. 药学服务
- B. 正确合理使用
- C. 药物合理应用的方法
- D. 审核、调配处方
- E. 患者咨询;1答案：A

186. [T]调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的(1)，其目的是为患者提供安全、高效的(2)，即：①通过(3)及发药，为患者提供安…包括配售卫生用具、医

疗器械等任务。

备选项：

- A. 药学服务
- B. 正确合理使用
- C. 药物合理应用的方法
- D. 审核、调配处方
- E. 患者咨询;2答案：D

187. [T]调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的(1)，其目的是为患者提供安全、高效的(2)，即：①通过(3)及发药，为患者提供安…包括配售卫生用具、医疗器械等任务。

备选项：

- A. 药学服务
- B. 正确合理使用
- C. 药物合理应用的方法
- D. 审核、调配处方
- E. 患者咨询;3答案：C

188. [T]调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的(1)，其目的是为患者提供安全、高效的(2)，即：①通过(3)及发药，为患者提供安…包括配售卫生用具、医疗器械等任务。

备选项：

- A. 药学服务
- B. 正确合理使用
- C. 药物合理应用的方法
- D. 审核、调配处方
- E. 患者咨询;4答案：E

189. [T]调剂药房整体环境要求不包括( )。答案：区域内的卫生间

190. [T]调剂业务持续改进的质量管理指标不包括( )。答案：每月调剂处方增长率

191. [X]下列处方书写不符合规则的是( )。答案：开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方不得超过3种药品

192. [X]下列处方书写要求不符合《处方管理办法》的是( )。答案：开具西药、中成药处方，每一种药品应当另起一行，每张处方

不得超过6种药品

193. [X]下列斗谱编排原则正确的是( )。答案：常用饮片放在斗架的中层，便于调剂时称取

194. [X]下列斗谱编排原则正确的是( )。答案：用饮片放在斗架的中层，便于调剂时称取。

195. [X]下列关于住院药房调剂智能化系统的叙述，不正确的是( )。答案：口服药品单剂量分包机将1粒药片或胶囊自动准确装入1个药袋内

196. [X]下列规范性文件中法律效力最强的是( )。答案：《麻醉药品和精神药品管理条例》

197. [X]下列剂型起效最快的是( )。答案：注射剂

198. [X]下列属于“十八反”配伍禁忌的是( )。答案：甘草不宜与海藻、京大戟、芫花、甘遂同用

199. [X]下列特殊中药的存放错误的是( )。答案：配伍相反的饮片可以放在同一药斗或邻近存放

200. [X]下列药品中，在药品标签和说明书中不需要印有特殊标识的是( )。答案：含特殊药品的复方制剂

201. [X]下面对调剂学的描述正确的是( )。答案：一门以患者为中心、以处方(或医嘱)为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础的综合性、应用性学科

202. [X]下面对调剂学的描述正确的是( )。答案：以患者为中心、以处方(或医嘱)为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础的综合性、应用性学科

203. [X]下面哪项是对调剂学正确的描述？( )答案：是一门以患者为中心、以处方(或医嘱)为导向，以药学诸学和相关人文科学为基础的综合性、应用性学科

204. [X]下述关于药物治疗管理的叙述不正

确的是( )。答案：药物治疗管理的主要目的是为了减少患者的药费支出

205. [X]下述关于住院药房调剂智能化系统的叙述不正确是( )。答案：自动摆药机只能将1粒药片或胶囊自动准确装入1个药袋内

206. [X]需要单独设库储存的药品是( )。答案：饮片

207. [X]需要单独设库储存的药品是( )。答案：中药饮片

208. [Y]药房药品应按其特性和管理要求进行保管，描述正确的是( )。答案：以上均正确

209. [Y]药房药品应按其特性和管理要求进行保管，以下描述正确的是( )。答案：以上均正确。

210. [Y]药房整体环境要求不包括( )。答案：有区域内的卫生间

211. [Y]药品的质量特性不包括( )。答案：持续性

212. [Y]药品分装胶囊的叙述，不正确的是( )。答案：胶囊号越大的装载量越大

213. [ ]《药品管理法》适用于( )。答案：所有有关药品生产、经营、使用、检验、科研的单位和个人

214. [Y]药师的工作职责不包括( )。答案：建立患者病历

215. [Y]药师的基本专业技能是( )。答案：调剂技能

216. [Y]药师对肝功能不全患者用药的调剂原则，不正确的是( )。答案：要对肝功能不全患者进行用药教育，告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物

217. [Y]药师对肝功能不全患者用药的调剂原则，不正确的是( )。答案：要对肝功能不全患者进行用药教育，告知患者绝对不能使用对肝脏有损害的药物

218. [Y]药师对患者用药教育的基本内容，不包括( )。答案：使患者掌握疾病的诊断和鉴别诊断

219. [Y]药师对肾功能不全患者进行药品调剂时, 不正确的是( )。答案: 青霉素、头孢菌素和异烟肼等药物, 应调整剂量或监测血药浓度
220. [Y]药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时, 不正确的是( )。答案: 青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄, 对肾脏毒性较大, 应调整剂量或监测血药浓度
221. [Y]药师对肾功能不全患者使用对肾脏损害的药物进行调剂时, 不正确的是( )。答案: 青霉素、头孢菌素、林可霉素和异烟肼等药物通过肾脏排泄, 对肾脏毒性较大, 应调整剂量或监测血药浓度
222. [Y]药师对于妊娠期和哺乳期妇女的用药指导, 不正确的是( )。答案: 药品说明书标明“怀孕妇女服用本品是否安全尚不确定”的药品, 在怀孕期及哺乳期内绝对不能使用
223. [Y]药师对于妊娠期和哺乳期妇女的用药指导, 不正确的是( )。答案: 药品说明书标明: “怀孕妇女服用本品是否安全尚不确定。”的药品, 在怀孕期及哺乳期内绝对不能使用
224. [Y]药师审核处方时, 如处方存在用药安全性问题, 应( )。答案: 拒绝调配, 并及时与医师沟通, 但不得擅自更改或配发代用药品
225. [Y]药师誓言不包括的是( )。答案: 追求新知, 提升自我实现能力
226. [Y]药师调剂处方时必须做到“四查十对”: 四查指: 查( ), 对科别、姓名、年龄; 查( ), 对药名、剂型、规格、数量; 查( ), 对药品性状、用法用量; 查( ), 对临床诊断。答案: 处方、药品、配伍禁忌、用药合理性
227. [Y]药师调剂小儿处方时需要注意的事项, 不正确的是( )。答案: 为方便患儿服用, 可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服
228. [Y]药师调剂小儿处方时需要注意的事项中, 不正确的是( )。答案: 为方便患儿服用, 可提示家长将肠溶片研碎给孩子冲服
229. [Y]药师一定要加强对小儿禁止使用药品的审核, 如喹诺酮类(1)禁用、四环素类(2)禁用、吲哚美辛(3)禁用、地西泮(4)禁用和甲氧氯普胺(5)等禁用。
- A. 婴幼儿  
B. 18岁以下  
C. 8岁以下  
D. 14岁以下  
E. 6个月以下; 0答案: B
230. [Y]药师一定要加强对小儿禁止使用药品的审核, 如喹诺酮类(1)禁用、四环素类(2)禁用、吲哚美辛(3)禁用、地西泮(4)禁用和甲氧氯普胺(5)等禁用。
- A. 婴幼儿  
B. 18岁以下  
C. 8岁以下  
D. 14岁以下  
E. 6个月以下; 1答案: C
231. [Y]药师一定要加强对小儿禁止使用药品的审核, 如喹诺酮类(1)禁用、四环素类(2)禁用、吲哚美辛(3)禁用、地西泮(4)禁用和甲氧氯普胺(5)等禁用。
- A. 婴幼儿  
B. 18岁以下  
C. 8岁以下  
D. 14岁以下  
E. 6个月以下; 2答案: D
232. [Y]药师一定要加强对小儿禁止使用药品的审核, 如喹诺酮类(1)禁用、四环素类(2)禁用、吲哚美辛(3)禁用、地西泮(4)禁用和甲氧氯普胺(5)等禁用。
- A. 婴幼儿  
B. 18岁以下  
C. 8岁以下  
D. 14岁以下  
E. 6个月以下; 3答案: D
233. [Y]药师一定要加强对小儿禁止使用药品的审核, 如喹诺酮类(1)禁用、四环素类(2)禁用、吲哚美辛(3)禁用、地西泮(4)禁用和甲氧氯普胺(5)等禁用。
- A. 婴幼儿  
B. 18岁以下  
C. 8岁以下  
D. 14岁以下  
E. 6个月以下; 4答案: A
234. [Y]药师在发药时, 对患儿家长进行必要的发药交代, 不正确的是( )。答案: 告知家长可自行增加小儿的用药剂量和用药次数
235. [Y]药师在给老年人调剂处方时, 不正确的做法是( )。答案: 老年患者由于记忆力减退, 口头交代后很快忘记, 故可不进行口头交代
236. [Y]药师在给老年人调剂处方时, 不正确的做法是( )。答案: 老年患者由于记忆力减退, 口头交代后很快忘记, 故可不进行口头交代
237. [Y]药师咨询服务借助的科技手段不包括( )。答案: 咨询窗口
238. [Y]药师咨询服务借助的科技手段不包括( )。答案: 咨询窗口
239. [Y]药味称取应按处方所列顺序及药物的外形、质地、颜色, 逐味单列排放, 药味间隔平摆, 不得混放一堆, 下列排放错误的是( )。答案: 鲜药类品种可取后放在松泡药之上
240. [Y]药物调剂资格取消后, 在多久内不得恢复其药物调剂资格? ( )答案: 半年内
241. [Y]药学人员从事调剂工作不包括( )。答案: 疾病的诊断
242. [Y]药学信息服务范围, 不包括( )。答案: 建立和维护药学信息硬件系统
243. [Y]医疗机构的药剂人员调配处方, 不正确的是( )。答案: 更改有错误的处方
244. [Y]医生欲开具氧氟沙星片0.1X35片, 5片, qd, 结果写成氧氟沙星片0.5X35片, 5片, qd。按技术类型分, 这属于( )。答案: 剂量错误
245. [Y]医生欲开具氧氟沙星片0.1g × 35片, 5片, qd, 结果写成氧氟沙星片0.5g × 35片, 5片, qd。按技术类型分, 这属于( )。答案: 剂量错误
246. [Y]医生欲开具氧氟沙星片0.1gx35片, 5片, qd, 结果写成氧氟沙星片0.5gx35片, 5片, qd。按技术类型分, 这属于( )。答案: 剂量错误
247. [Y]医生在开具处方时点错了小数点, 可能是属于( )。答案: 剂量错误
248. [Y]医师开具处方和药师调剂处方应当遵循( )。答案: 安全、有效、经济和适宜的原则
249. [Y]医师欲开具氧氟沙星片0.1g×35片, 5片, qd, 结果写成氧氟沙星片0.5g×35片, 5片, qd。按技术类型分, 这属于( )。答案: 剂量错误
250. [Y]医师在开具处方时点错了小数点属于( )。答案: 剂量错误
251. [Y]医院药房的开办条件不包括( )。答案: 执业药师许可证
252. [Y]医院药房开办条件不包括( )。答案: 执业药师许可证
253. [Y]医院药房遵守的有关处方管理法规不包括( )。答案: 《药品注册管理办法》
254. [Y]医院药师工作模式转型要以( )。答案: 患者为中心
255. [Y]医院药师工作模式转型要以( )。答案: 患者为中心
256. [Y]医院药师要承担的工作不包括

- ( )。答案: 和临床医师一起诊断患者
257. [Y]医院药师要承担的工作不包括( )。答案: 和临床医生一起诊断患者
258. [Y]医院药师要承担的工作一般不包括( )答案: 和临床医生一起诊断患者
259. [Y]医院药学工作不包括( )答案: 建立患者病历
260. [Y]一个10ml的量杯可以量取的最小体积是( )。答案: 1ml
261. [Y]以下不属于门诊药房调剂剂智能化系统的特点的是( )。答案: 提高经济效益
262. [Y]以下不正确的论述是( )。答案: 如果系统知识库自动审核结果为不规范处方、用药不适宜处方及超常的处方，则会自动记录并提交作为最终结果
263. [Y]以下不正确的论述是( )。答案: 如果系统知识库自动审核结果为不规范处方、用药不适宜处方及超常的处方，则会自动记录并提交作为最终结果
264. [Y]以下不正确的说法是( )。答案: 现代调剂工作强调以药物为中心，注重人文服务
265. [Y]以下不正确的叙述是( )。答案: 病区智能药柜可以管理麻醉和精神药品、贵重药品，但不能涵盖所有病区药品
266. [Y]以下不正确的叙述是( )。答案: 病区智能药柜可以管理麻醉和精神药品、贵重药品，但不能涵盖所有病区药品
267. [Y]以下处方保存时限不正确的是( )。答案: 麻醉药品处方保存5年
268. [Y]以下调剂服务模式反映了当代调剂学发展方向的是( )。答案: 知识与技术服务和科研教学型
269. [Y]以下对高警示药品的描述，不正确的是( )。答案: C级是高警示药品管理的最高级别
270. [Y]以下对高警示药品描述，不正确的是( )。答案: C级是高警示药品管理的最高级别
271. [Y]以下对缓/控释制剂特点的描述不正确的是( )。答案: 增加了用药总剂量
272. [Y]以下对缓释、控释制剂特点的描述错误的是( )。答案: 增加了用药总剂量
273. [Y]以下关于贴膏剂的描述正确的是( )。答案: 以上均正确
274. [Y]以下关于药学信息化与智能化的叙述不正确的是( )。答案: 药学信息服务的基本任务主要是满足医生、药师和护士对药学信息的需求
275. [Y]以下剂型中，不能用水直接吞服的剂型是( )。答案: 泡腾片
276. [Y]以下剂型中，用水吞服时易发生危险的是( )。答案: 泡腾片
277. [Y]以下可以掰开服用的剂型是( )。答案: 中间有划痕的控释片
278. [Y]以下可以嚼碎服用的剂型是( )。答案: 以上均不可
279. [Y]以下论述不正确的论述是( )。答案: 调剂学基本任务是为了创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、最小的不良反应和最为适宜的给药系统，为满足医疗卫生工作的需要提供质量优良的药物制剂
280. [Y]以下论述不正确的是( )。答案: 调剂学的基本任务是创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、最小的不良反应和最为适宜的给药系统，为满足医疗卫生工作的需要而提供质量优良的药物制剂
281. [Y]以下论述不正确的是( )。答案: 静脉药物集中配置能够降低医院药物使用成本，增加医院效益
282. [Y]以下论述不正确的是( )。答案: 调剂学基本任务是为了创造在一定时间内用最少的药物剂量提供最大的疗效、小的不良反应和最为适宜的给药系统，为满足医疗卫生工作的需要提供质量优的药物制剂
283. [Y]以下论述不正确的是( )。答案: 静脉药物集中配置能够降低医院药物使用成本，增加医院效益
284. [Y]以下名词的英文缩写不正确的是( )。答案: 优良药房工作规范缩写GMP
285. [Y]以下名词的英文缩写不正确的是( )。答案: 优良药房工作规范GMP
286. [Y]以下哪一个名词的英文缩写是不正确的？( )答案: 优良药房工作规范(GMP)
- E. 晨起;1答案: B
289. [Y]以下是一张门诊处方，请审方。
- 1). 诊断与用药不符：诊断是高血压，却开了降血脂药(1)。
  - 2). 处方书写不规范：不应该写药品的商品名，应...用名是(2)，拜新同的药品通用名(3)。
  - 3). 用法不准确：阿托伐他汀钙应(4)口服；硝苯地平控释片应一天一次，(5)口服。
- 处方签**

姓名: 潘某 性别: 女 年龄: 52岁  
门诊号: 111111 科别: 中西医结合科  
临床诊断: 高血压  
过敏试验: 0

Rp:

立普妥 20mg×7 1盒  
用法: 20mg 立即口服  
拜新同 30mg×7 1盒  
用法: 30mg 立即口服  
药费: ×××元 医师: ×××  
审核发药: ××× 调配药师: ×××  
注: 请勿丢失, 处方当日有效。请当面核对好药品名称、规格、数量。
- 普通处方**
- 备选项:**

  - A. 阿托伐他汀钙
  - B. 立普妥
  - C. 睡前
  - D. 硝苯地平控释片
  - E. 晨起;1答案: A
- 备选项:**
290. [Y]以下是一张门诊处方，请审方。

  - 1). 诊断与用药不符：诊断是高血压，却开了降血脂药(1)。
  - 2). 处方书写不规范：不应该写药品的商品名，应...用名是(2)，拜新同的药品通用名(3)。
  - 3). 用法不准确：阿托伐他汀钙应(4)口服；硝苯地平控释片应一天一次，(5)口服。

处方签

姓名：潘某 性别：女 年龄：52岁  
门诊号：111111 科别：中西医结合科  
临床诊断：高血压  
过敏试验：0  
Rp：  
立普妥 20mg×7 1盒  
用法：20mg 立即口服  
拜新同 30mg×7 1盒  
用法：30mg 立即口服  
药费：×××元 医师：×××  
审核发药：××× 调配药师：×××  
注：请勿遗失，处方当日有效。请当面核对好药品名称、规格、数量。

普通处方

- 选项：
- A. 阿托伐他汀钙
  - B. 立普妥
  - C. 睡前
  - D. 硝苯地平控释片
  - E. 晨起；2答案：D

291. [Y]以下是一张门诊处方，请审方。  
 1) . 诊断与用药不符：诊断是高血压，却开了降血脂药（1）。  
 2) . 处方书写不规范：不应该写药品的商品名，应...用名是（2），拜新同的药品通用名（3）。  
 3) . 用法不准确：阿托伐他汀钙应（4）口服；硝苯地平控释片应一天一次，（5）口服。

处方签

姓名：潘某 性别：女 年龄：52岁  
门诊号：111111 科别：中西医结合科  
临床诊断：高血压  
过敏试验：0  
Rp：  
立普妥 20mg×7 1盒  
用法：20mg 立即口服  
拜新同 30mg×7 1盒  
用法：30mg 立即口服  
药费：×××元 医师：×××  
审核发药：××× 调配药师：×××  
注：请勿遗失，处方当日有效。请当面核对好药品名称、规格、数量。

普通处方

- 备选项：
- A. 阿托伐他汀钙
  - B. 立普妥
  - C. 睡前
  - D. 硝苯地平控释片
  - E. 晨起；4答案：E

293. [Y]以下说法不正确的是（ ）。答案：现代调剂工作强调以药物为中心，注重人文服务  
 294. [Y]以下说法不正确的是（ ）。答案：处方审核、调配、复核、发药均完成之后，再统一由操作者签字或签章

- 选项：
- A. 阿托伐他汀钙
  - B. 立普妥
  - C. 睡前
  - D. 硝苯地平控释片
  - E. 晨起；3答案：C

292. [Y]以下是一张门诊处方，请审方。  
 1) . 诊断与用药不符：诊断是高血压，却开了降血脂药（1）。  
 2) . 处方书写不规范：不应该写药品的商品名，应...用名是（2），拜新同的药品通用名（3）。  
 3) . 用法不准确：阿托伐他汀钙应（4）口服；硝苯地平控释片应一天一次，（5）口服。

处方签

姓名：潘某 性别：女 年龄：52岁  
门诊号：111111 科别：中西医结合科  
临床诊断：高血压  
过敏试验：0  
Rp：  
立普妥 20mg×7 1盒  
用法：20mg 立即口服  
拜新同 30mg×7 1盒  
用法：30mg 立即口服  
药费：×××元 医师：×××  
审核发药：××× 调配药师：×××  
注：请勿遗失，处方当日有效。请当面核对好药品名称、规格、数量。

295. [Y]以下说法不正确的是（ ）。答案：现代调剂工作强调以药物为中心，注重人文服务

296. [Y]以下说法不正确的是（ ）。答案：现代调剂工作强调以药物为中心，注重人文服务

297. [Y]以下说法不正确的是（ ）。答案：处方审核、调配、复核、发药均完成之后，再统一由操作者签字或签章

298. [Y]以下说法正确的是（ ）。答案：药物漏服后应视漏服的药品和漏服的时间来确定是否需要补服

299. [Y]以下叙述不正确的是（ ）。答案：药学信息服务的基本任务主要是满足医师、药师和护士对药学信息的需求

300. [Y]以下叙述不正确的是（ ）。答案：药学信息服务的基本任务主要是填报药品不良反应报告

301. [Y]以下叙述不正确的是（ ）。答案：药学信息服务的基本任务主要是满足医生、药师和护士对药学信息的需求

302. [Y]以下正确的叙述是（ ）。答案：合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查

303. [Y]以下正确的叙述是（ ）。答案：合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查

304. [Y]以下正确的叙述是（ ）。答案：合理用药监测系统可以进行药物过敏史和注射剂配伍审查

305. [Y]饮片调配是调剂中最重要的环节，在进行剂量检查时，每剂药总量的误差率正负不得超过（ ）。答案：5%

306. [Y]饮片调剂流程正确的是（ ）。答案：审方、计价、调配、复核、发药

307. [Y]影响药物经皮渗透吸收的因素有（ ）。答案：以上都是

308. [Y]用药错误可能涉及医务人员的（ ）。答案：专业知识和实践经验

309. [Y]用药错误造成患者暂时性伤害，需要采取预防措施；这类错误属于（ ）。答案：E类

310. [Y]用药咨询服务需重点关注的患者是（ ）。答案：以上都是

311. [Y]用药咨询服务需重点关注的患者是（ ）。答案：以上都是

312. [Y]用于研磨的瓷质研钵不适用于被研磨固体的性质和粗细程度是（ ）。答案：易吸附瓷质研钵的药物

313. [Y]有关药品分装室不正确的描述是（ ）。答案：室温25~30℃

314. [Y]有关药品分装室的描述不正确的是（ ）。答案：室温25~30℃

315. [Y]与川乌、草乌、附子不宜同用的药物是（ ）。答案：半夏

316. [Z]在处方点评管理中，根据《处方管理办法》处理不正当的是（ ）。答案：一年中开具超常处方10次以上且无正当理由的医师，应认定为医师定期考核不合格，离岗参加培训

317. [Z]在处方组成中，药品名称、规格属于（ ）。答案：处方正文的内容

318. [Z]在药房中不需专柜（专区）储存的药物是（ ）。答案：限制使用级抗菌药物

319. [Z]在药房中不需专柜（专区）贮存的药物是（ ）。答案：限制使用级抗菌药物

320. [Z]执业药师在社会药房调剂药品时不正确的做法是（ ）。答案：调配处方时如所列药品缺货，执业药师可以选择其他药品代用

321. [Z]执业药师在社会药房调剂药品时不正确的做法是（ ）。答案：调配处方时如所列药品缺货，执业药师可以选择其他药品代用

322. [Z]执业药师在社会药房调剂药品时的做法不正确的是（ ）。答案：调配处方时如所列药品缺货，执业药师可以选择其他药品代用

323. [Z]制备液体药物制剂首选的溶剂是（ ）。答案：蒸馏水

324. [Z]制定本机构药品处方集的是（ ）。答

案：医疗机构药事管理与药物治疗委员会职责 四环素类药物禁用于（）。答案：D;C;B;A  
325. [《中华人民共和国药品管理法》适用于（）。答案：所有有关药品生产、经营、使用、检验、科研的单位和个人

326. [《中华人民共和国药品管理法》适用于在中华人民共和国境内（）。答案：从事药品研制、生产、经营、使用和监督管理活动

327. [Z] 中药品不良反应的定义为：在中医药理论指导下应用合格中药预防、诊断、治疗疾病时，在（）用法用量情况下，出现与用药目的（）的有害反应。答案：正常、无关

328. [Z] 装填胶囊，不正确的叙述是（）。答案：药粉厚度为囊体高度的1/5~1/4

329. [Z] 装填胶囊的操作，不正确的叙述是（）。答案：药粉厚度为囊体高度的1/5~1/4

330. [Z] 装填胶囊的操作，不正确的叙述是（）。答案：药粉厚度为囊体高度的1/5~1/4

填空题(24) 微信号：zydz\_9527

- 1. A. 8岁以下患者
- B. 18岁以下患者
- C. 6个月以下患者
- D. 14岁以下患者

吲哚美辛禁用于（）

地西洋禁用于（）

四环素类药物禁用于（）

喹诺酮类药物禁用于（） 答案：D C

A B

2. A. 8岁以下患者 B. 18岁以下患者 C. 6个月以下患者 D. 14岁以下患者

吲哚美辛禁用于（）。

地西洋禁用于（）。

左氧氟沙星禁用于（）。

四环素类药物禁用于（）。答案：D;C;B;A 物是（）。

3. A. 白色 B. 淡绿色 C. 淡黄色 D. 淡红色 具有明显或严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物是（）。答案：A;C;B

8. A. 麻醉药品 B. 抗菌药物 C. 高警示药物 D. 饮片

普通处方印刷用纸的颜色为（）。

急诊处方印刷用纸的颜色为（）。

儿科处方印刷用纸的颜色为（）。

麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸的颜色为（）。答案：A;C;B;D

4. A. 玻棒

B. 瓷质研钵

C. 天平

D. 量筒

液体与固体混和制备混悬剂时用于研磨的是（）

液体与固体混和制备溶液剂时用于研磨的是（） 答案：B A

5. A. 玻棒 B. 瓷质研钵 C. 天平 D. 量筒

液体与固体混和制备溶液剂时用于研磨的是（）。

液体与固体混和制备混悬剂时用于研磨的是（）。答案：A;B

6. A. 车前子 B. 人参 C. 阿胶 D. 薄荷

需包煎的饮片是（）。

需烊化的饮片是（）。

需另煎的饮片是（）。答案：A;C;B

7. A. 非限制使用级 B. 特殊使用级 C. 限制使用级

经长期临床应用证明安全、有效，对病原菌耐药性影响较小，价格相对较低的抗菌药物是（）。

经长期临床应用证明安全、有效，对病原菌耐药性影响较大，或价格相对较高的抗菌药

物是（）。

具有明显或严重不良反应，不宜随意使用的抗菌药物是（）。答案：A;C;B

8. A. 麻醉药品 B. 抗菌药物 C. 高警示药物 D. 饮片

应单独设库储存的是（）。

根据安全性、疗效、细菌耐药等因素进行分级管理的是（）。

使用不当或用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的高危药是（•）。

社会药房不得经营的药品是（•）。答案：D;B;C;A

9. A. 每天1次 B. 用法 C. 请予或授予 D. 饭前

处方中常用缩写词Rp. 表示（）

处方中常用缩写词Sig. /S. 表示（）

处方中常用缩写词q. d. 表示（）

处方中常用缩写词a. c表示（） 答案：C

B A D

10. A. 泡腾片 B. 注射剂 C. 片剂 D. 栓剂

用水吞服易发生危险的剂型是（）。

起效最快的剂型是（）。答案：A;B

11. A. 审核处方用药的适宜性 B. 审核处方格式的规范性 C. 理解处方医师的治疗方案

D. 确认处方的合法性

审核处方必须符合本单位相关管理制度是（）。

审核处方后记中是否有医师手签名或者加盖专用签章是（）。

审核存在有药物相互作用疑义的处方是（）。

审核处方用药与临床诊断的相符性是（）。答案：D;B;C;A

12. A. 生石膏 B. 阿胶 C. 车前子 D. 薄荷

需先煎的饮片是（）。

需后下的饮片是（）。

需包煎的饮片是（）。

需烊化的饮片是（）。答案：A;D;C;B

13. A. 乙类非处方药 B. 甲类非处方药 C. 处方药 D. 高警示药

可以自行判断、购买和使用，红色OTC标志的药品是（）。

可以自行判断、购买和使用，绿色OTC标志的药品是（）。

必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是（）。答案：B;A;C

14. A. 乙类非处方药 B. 甲类非处方药 C. 处方药

可以自行判断、购买和使用，红色OTC标志的药品是（）。

可以自行判断、购买和使用，绿色OTC标志的药品是（）。

必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是（）。答案：B;A;C

15. [B] 必须凭执业医师和执业助理医师处方方可购买、调配和使用的药品是（）。答案：处方药

16. [G] 给糖尿病患者开具了加替沙星，导致处方选药用药决策失误的原因可能是（）。答案：药物知识信息缺失

17. [G] 根据安全性、疗效、细菌耐药等因素进行分级管理的是（） 答案：抗菌药物

18. [K] 可以自行判断、购买和使用，红色OTC标志的药品是（）。答案：甲类非处方药

19. [K]可以自行判断、购买和使用，绿色OTC  
标志的药品是（）。答案：乙类非处方药

20. [R]若使用不当或发生用药错误会对患者造成严重伤害甚至死亡的药品是（）。答案：  
高警示药

21. [S]社会药房不得经营的药品是（）答  
案：麻醉药品

22. [S]使用不当或用药错误会对患者造成严  
重伤害甚至死亡的药品是（）答案：高警示药  
物

23. [Y]一位消化科医师为腹泻的27岁女患者  
开具了莫西沙星片，但医师并不清楚这位患者  
应经妊娠2个月，导致处方选药用药决策失误  
的原因可能是（）。答案：对患者情况和疾病  
状况了解不够

24. [Y]应单独设库储存的是（）。答案：饮  
片

主观题(20)微信号: zydz\_9527

1. A. 8岁以下患者 B. 18...  
2. A. 8岁以下患者 B. 18岁以下患者 C. 6个  
月以下...

3. A. 白色 B. 淡绿色 C. 淡黄色 D. 淡红色  
1. 普通处  
方印刷用纸的...  
4. A. 车前子 B. 人参 C. 阿胶 D. 薄荷  
1. 需包煎的饮  
片是（）2....

5. A. 对患者情况和疾病状况了解不够 B. 药物知  
识信息缺失 C. 药品...

6. A. 每天1次 B. 用法 C. 请予或授予 D. 饭  
前1处...

7. A. 每天1次 B. 用法 C. 请予或授予 D.  
饭前...

8. A. 审核处方用药的适宜性 B. 审核处方格式的  
规范性 C. 理解处方...

9. 简述单剂量调剂的重要意义。

10. 简述发药交代的重要意义。

11. 简述发药交待的重要意义。

12. 简述社会药房的调剂模式。

13. 简述正确调配药品的基本要点。

14. 简述准确调配药品的基本要点。

15. 展开用药咨询的必要性是什么？

16. 审核处方用药的适宜性包括哪些方面？

17. 调剂学的任务是什么？

18. 调剂学的主要任务是什么？

19. 影响调剂安全的药物因素有哪些？

20. 张某，65岁，因患有消化性溃疡，医师开

具的处方为奥美拉唑肠溶...

1. A. 8岁以下患者

以下患者

C. 6个月以下患者

患者

1. 噻诺酮类药物禁用于（）。

2. 四环素类药物禁用于（）。

答案：B

2. A

2. A. 8岁以下患者

B. 18岁以下患者

C. 6个月以下患者

D. 14岁以下患者

1. 吲哚美辛禁用于（）

2. 地西洋禁用于（）

3. 四环素类药物禁用于（）

4. 噻诺酮类药物禁用于（）

答案：1D 2C 3A 4B

3. A. 白色

B. 淡绿色

C. 淡黄色

D. 淡红色

1. 普通处方印刷用纸的颜色为（）

2. 急诊处方印刷用纸的颜色为（）

3. 儿科处方印刷用纸的颜色为（）

4. 麻醉药品和第一类精神药品处方印刷用纸  
的颜色为（）

答案：1A

2C

3B

4D

4. A. 车前子

B. 人参

C. 阿胶

D. 薄荷

1. 需包煎的饮片是（）

2. 需烊化的饮片是（）

3. 需另煎的饮片是（）

B. 18岁 答案：1A

2C

D. 14岁以下 3B

5. A. 对患者情况和疾病状况了解不够

B. 药物知识信息缺失

C. 药品名称混淆

D. 药品剂型错误

1. 给糖尿病患者开具了加替沙星，导致处方选  
药用药....

2. 一位消化科医师为腹泻的27岁女患者开具  
了莫西沙星片，但医师并不清楚这位患者应经  
妊娠2个月，导致处方选药用药决策失误的原  
因可能是（）。

答案：1B

2A

6. A. 每天1次

B. 用法

C. 请予或授予

D. 饭前

1. 处方中常用缩写词Rp. 表示（）

2. 处方中常用缩写词Sig. /S. 表示（）

3. 处方中常用缩写词q. d. 表示（）

答案：1C 2B 3A

7. A. 每天1次 B. 用法 C. 请予或授予

饭前

处方中常用缩写词Rp. 表示（）。

处方中常用缩写词Sig. /S. 表示（）。

处方中常用缩写词qd. 表示（）。

处方中常用缩写词a. c. 表示（）。

答案：C

B

A

D

8. A. 审核处方用药的适宜性

B. 审核处方格式的规范性

C. 理解处方医师的治疗方案

D. 确认处方的合法性

1. 审核处方必须符合本单位相关管理制度是  
（）。

2. 审核处方后记中是否有医师手签名或者加盖  
专用签章是（）。

3. 审核存在有药物相互作用疑义的处方是（）。

4. 审核处方用药与临床诊断的相符性是（）。

答案：1D

2B

3C

5A

9. [J]简述单剂量调剂的重要意义。

答案：（1）减少发药差错。

（2）保证药品质量。

（3）提高用药知情权。

（4）把护士“还给”患者。

（5）提高药师业务水平和药学服务水平。

10. [J]简述发药交代的重要意义。

答案：发药交代是药师的职责，是药师与患者  
沟通的重要内容。发药交代对指导患者合理用  
药、减少药品不良反应及增加患者用药依从性  
等起着重要的作用。药师通过发药交代，一方  
面使患者掌握正确的用药方法，另一方面使患  
者知道什么情况下不能用药、出现什么情况时  
D. 应该停药。

11. [J]简述发药交待的重要意义。

答案：发药交代是药师的职责，是药师与患者  
沟通的重要内容。发药交代对指导患者合理用  
药、减少药品不良反应及增加患者用药依从性  
等起着重要的作用。药师通过发药交代，一方  
面使患者掌握正确的用药方法，另一方面使患

者知道什么情况下不能用药、出现什么情况时 服务工作的持续改进。

应该停用。

12. [J] 简述社会药房的调剂模式。

答案：（1）处方药调剂：《处方管理办法》规定：药师应当凭医师处方调剂处方药品，非经医师处方不得调剂。处方药必须凭执业医师或执业助理医师处方销售、购买和使用。社会药店药师调剂处方药的模式和操作规程与医院药房没有明显区别。

（2）非处方药调剂：甲类非处方药、乙类非处方药可不凭医师处方销售、购买和使用，因此社会药房的非处方药一般可采用开架和柜台两种调剂模式。但无论何种模式，患者都应该在执业药师或药师的指导下购买和使用。

13. [J] 简述正确调配药品的基本要点。

答案：（1）认真审核处方。  
（2）准确调配药品。  
（3）正确书写药袋或粘贴标签。  
（4）集合处方药品。  
（5）核对发药。

14. [J] 简述准确调配药品的基本要点。

答案：（1）认真审核处方。  
（2）准确调配药品。  
（3）正确书写药袋或粘贴标签。  
（4）集合处方药品。  
（5）核对发药。

15. [K] 开展用药咨询的必要性是什么？

答案：（1）为咨询者寻求药物治疗相关信息提供畅通渠道，使其能及时获得有效的药学服务。

（2）作为药学调剂业务的补充服务，可进一步为个体患者提供用药教育和指导；进一步帮助患者掌握正确使用药物的方法，提高药物治疗的有效性和安全性。

（3）通过用药咨询服务，药师可发现和了解药品使用中的相关问题，及时采取干预措施，可降低药品不良事件的发生率。

（4）通过用药咨询服务，药师可及时获知患者或医务人员的实际需求所在，从而引导药学

16. [S] 审核处方用药的适宜性包括哪些方面？

答案：（1）对于规定必须做皮试的药品，药师应审核处方医师是否注明过敏试验及其结果。

（2）处方用药与临床诊断的相符性。  
（3）剂量、用法的正确性。  
（4）选用药物剂型与给药途径的合理性。  
（5）是否有重复给药的现象。  
（6）是否有潜在临床意义的药物相互作用和配伍禁忌。  
（7）其他用药不适宜情况。

17. [T] 调剂学的任务是什么？

答案：调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用，其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。

即：  
（1）通过审核、调配处方及发药，为患者提供安全、有效及经济的药品；  
（2）解说药物合理应用的方法及相关知识；  
（3）回答患者咨询、开展患者教育，为患者提供相关药学服务；  
（4）社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具，医疗器械等任务。

18. [T] 调剂学的主要任务是什么？

答案：调剂学在医疗卫生事业中的任务是研究和指导药品的正确合理使用，其目的是为患者提供安全、高效的药学服务。

即：  
（1）通过审核、调配处方及发药，为患者提供安全、有效及经济的药品；  
（2）解说药物合理应用的方法及相关知识；  
（3）回答患者咨询、开展患者教育，为患者提供相关药学服务；  
（4）社会药房的调剂工作还要担负配售卫生用具，医疗器械等任务。

19. [Y] 影响调剂安全的药物因素有哪些？

答案：答：（1）同一药品不同规格；

（2）药品名称的易混淆；

（3）同一药品不同厂家；  
（4）同一药品不同剂型或含量；  
（5）药品的别名误读；  
（6）药品包装易混淆；  
（7）近有效期药品管理不到位。

20. [Z] 张某，65岁，因患有消化性溃疡，医师开具的处方为奥美拉唑肠溶胶囊、硫糖铝混悬液和多潘立酮片。张某没记住医师当时说的用法，也没看明白说明书，于是来到药房询问药师。请问药师该如何做用药指导？

答案：答：对于消化系统疾病，医师常常给予患者联合用药，对于这些药物的用药时间与先后顺序患者经常弄不清楚。因此，医师或药师进行用药交代时除了详细说明用药方法外，还要将服用顺序交代清楚，并且粘贴用药标签。药师应告诉患者，这三种药不能同时服用，服药的方法和顺序是：餐前半小时服用促胃动力药多潘立酮片及胃黏膜保护剂硫糖铝混悬液，用餐后1小时服用抑酸剂奥美拉唑肠溶胶囊。