

7. [B]不会导致气道峰值压增高的是（ ）。答案：伤口可涂任何药水或消炎药  
答案：气管导管气囊漏气
8. [B]不符合体外循环后低心排综合征的表现是（ ）。答案：中枢性高热
9. [B]不属于肠梗阻病人出现肠绞窄的表现的是（ ）。答案：病情发展迅速，早期出现休克，休克治疗后症状改善显著
10. [C]肠梗阻病人非手术治疗后，肠梗阻解除的标志是（ ）。答案：肛门有排气、排便
11. [C]肠梗阻病人非手术治疗期间最重要的护理措施是（ ）。答案：观察有无肠管血运障碍
12. [C]肠痿病人瘘口周围使用氧化锌软膏的目的是（ ）。答案：减少肠液对皮肤的刺激
13. [C]肠痿病人最常见的电解质紊乱是（ ）。答案：低钾、低钠
14. [C]肠痿最常见的电解质紊乱是（ ）。答案：低钾、低钠
15. [C]肠内营养输注护理，正确的是（ ）。答案：采用半卧位，床头应抬高30°~45°，尽量减少误吸的可能性
16. [C]肠内营养支持最严重的并发症是（ ）。答案：误吸
17. [C]长期胃肠外营养的病人置管的部位宜选择（ ）。答案：上腔静脉
18. [C]长期胃肠外营养支持的病人置管的部位首选（ ）。答案：上腔静脉
19. [C]肠外痿病人瘘口周围皮肤护理最关键的措施是（ ）。答案：及时清除外漏肠液
20. [C]肠外营养的护理方法正确的是（ ）。答案：不可经营养导管取血
21. [C]肠外营养支持的护理方法正确的是（ ）。答案：不可经营养导管取血
22. [C]处理原则 断肢（指）再植的时限与离断平面有关，原则上越早越好，一般时限为（ ）。答案：6~8小时
23. [C]创口包扎和患肢固定，错误的是
24. [D]单纯性肠梗阻病人的主要治疗措施是（ ）。答案：胃肠减压，矫正水电解质失衡
25. [D]单纯性肠梗阻的主要治疗措施是（ ）。答案：胃肠减压，矫正水电解质失衡
26. [D]单纯性肠梗阻与绞窄性肠梗阻的主要区别是（ ）。答案：肠管壁有无血运障碍
27. [D]单纯性肠梗阻与较窄性肠梗阻的主要区别是（ ）。答案：肠管壁有无血运障碍
28. [D]胆道T管引流的病人胆道远端通畅的表现是（ ）。答案：食欲好转，黄疸消退，引流量减少
29. [D]胆绞痛的表现不包括（ ）。答案：疼痛常放射至左肩或左背部
30. [D]断肢再植病人再植肢体动脉血管受阻表现，不包括（ ）。答案：指甲毛细血管充盈时间缩短
31. [D]断肢再植病人再植肢体动脉血管受阻缓解方法，不包括（ ）。答案：应用抗生素类药物抗炎治疗
32. [D]对ARDS病人的诊断和病情判断有重要意义的检查是（ ）。答案：心电图检测
33. [D]对ARDS的诊断和病情判断有重要意义的检查是（ ）。答案：血气分析
34. [D]对怀疑为胰腺癌的病人可作为首选诊断方法的是（ ）。答案：消化酶制剂或止泻剂
35. [F]法洛四联症（tetralogy of Fallot, TOF）是一种发绀型先天性心血管复杂畸形，畸形不包括（ ）。答案：二尖瓣狭窄
36. [F]放疗引起局部皮肤红斑、灼痛时，错误的护理措施是（ ）。答案：局部外涂碘酊
37. [F]肺癌病人出现一侧眼睑下垂，瞳孔缩小，眼球内陷，额部与胸部少汗的原因是

- （ ）。答案：交感神经受压
38. [F]肺癌病人术后24小时内最常见的并发症是（ ）。答案：出血
39. [F]肺癌术后24小时内最常见的并发症是（ ）。答案：出血
40. [F]肺癌术后病人24小时内最常见的并发症是（ ）。答案：出血
41. [F]肺动脉压（PAP）降低多见于（ ）。答案：低血容量
42. [F]风湿性心脏病病人尤其应注意的电解质紊乱类型是（ ）。答案：低钾血症
43. [G]该病人术后护理，不正确的是（ ）。答案：将患肢固定在胸壁上
44. [G]肝叶切除术后避免过早活动的目的是（ ）。答案：避免肝断面出血
45. [G]肝叶切除术后病人避免过早活动的目的是（ ）。答案：避免肝断面出血
46. [G]高钾血症病人出现心律失常时，给予病人10%葡萄糖酸钙的目的是（ ）。答案：对抗钾离子对心肌的抑制作用
47. [G]高钾血症病人出现心律失常时，首先应给予（ ）。答案：10%葡萄糖酸钙
48. [G]高渗性缺水病人最突出的临床表现是（ ）。答案：口渴
49. [G]高渗性缺水最突出的临床表现是（ ）。答案：口渴
50. [G]高渗性脱水最突出的临床表现是（ ）。答案：口渴
51. [G]高血压脑出血最好发的部位是（ ）。答案：基底节壳部
52. [G]股骨颈骨折病人，行皮牵引时抬高床尾的主要目的是（ ）。答案：设置对抗力量
53. [G]股骨颈骨折病人行皮牵引时应采取的体位是（ ）。答案：30°外展中立位
54. [G]骨牵引病人出现患肢麻木，皮温低，足背动脉搏动减弱和被动伸指剧痛等表现，可能的原因是（ ）。答案：牵引重量过大
55. [G]骨肉瘤病人残肢功能锻炼方法，错误的是

国开电大 2025《1324 外科护理学（本）》期末考试题库小抄（按字母排版）

总题量（325）：单选题（265）主观题（60）

单选题（265）微信号：zydz\_9527

1. ARDS病人主要的特征性临床表现为（ ）。答案：进行性呼吸困难
2. ARDS病人主要特征性的临床表现为（ ）。答案：进行性呼吸困难
3. Charcot三联症的表现，正确的是（ ）。答案：腹痛、寒战高热和黄疸
4. T管拔管前先行夹管1~2天，夹管期间应注意观察的内容是（ ）。答案：腹痛、发热、黄疸
5. T管留置期间的护理，错误的是（ ）。答案：引流管的水平高度超过腹部切口
6. [B]病人术后功能锻炼的方法正确的是（ ）。答案：术后10~12天开始全范围关节活动

( )。答案: 通常要避免对残端的压迫

56. [G]骨折牵引时, 预防过度牵引的措施是( )。答案: 定时测定肢体长度

57. [G]骨肿瘤术后早期避免患肢过度活动, 开始肌肉的等长收缩锻炼的时间( )。答案: 一般在术后48小时

58. [G]观察急腹症病人的腹部体征中最重要的( )。答案: 腹膜刺激征的产生

59. [G]关节脱位的表现, 不包括( )。答案: 骨擦音或骨擦感

60. [G]关于Horner征的叙述, 错误的是( )。答案: 又称为上叶顶部肺癌

61. [G]关于T管护理的叙述, 正确的是( )。答案: 胆总管下段阻塞时引流量增多

62. [G]关于T管护理叙述正确的是( )。答案: 胆总管下段阻塞时引流量增多

63. [G]关于骨肉瘤的描述, 错误的是( )。答案: 恶性度低, 转移较晚

64. [G]关于关节脱位的叙述, 错误的是( )。答案: 关节脱位多见于老年人

65. [G]关于结肠造口袋的正确使用, 错误的是( )。答案: 造口袋内充满1/2排泄物时, 应及时倾倒

66. [G]关于可控性膀胱术后代膀胱的训练, 错误的叙述是( )。答案: 40~60天拔除尿管, 自行导尿

67. [G]关于颅内动脉瘤破裂的相关知识, 错误的是( )。答案: 病人要加强运动, 运动程度不限

68. [G]关于膀胱癌的叙述, 错误的是( )。答案: 膀胱肿瘤不易复发

69. [G]关于蛇咬伤缚扎法的叙述, 不正确的是( )。答案: 咬伤超过24小时后则不需要进行缚扎

70. [G]关于肾盂造瘘管的护理不正确的是( )。答案: 每次冲洗引流管的液量为20~40ml

71. [G]关于晚期倾倒综合征的叙述, 错误的

是( )。答案: 表现为在进餐后1小时左右, 病人出现心慌、无力、面色苍白、出冷汗等

72. [G]关于胃肠减压的叙述, 错误的是( )。答案: 每天用5%葡萄糖溶液冲洗胃管

73. [G]关于下肢动脉硬化性闭塞症的叙述, 正确的是( )。答案: 间歇性跛行是下肢动脉供血不足的特征性表现

74. [G]关于腰椎间盘突出症的叙述, 错误的是( )。答案: 手术治疗是基本治疗方法

75. [G]关于脂肪栓塞综合征的叙述, 错误的是( )。答案: 肌肉和神经因急性缺血而发生系列征候群

76. [G]关于肿瘤化疗的护理方法不正确的是( )。答案: 若出现药液外渗, 应立即热敷

77. [H]呼吸功能监测最直接的指标是( )。答案: 血气分析

78. [H]呼吸机高压报警的原因, 不包括( )。答案: 病人情绪安静, 病情稳定

79. [H]患儿, 男, 10岁, 玩耍奔跑时跌倒, 手部着地, 左肩不敢动, 随来院就诊。查体左肩关节肿胀、局部空虚感, 压痛+, 活动受限, Dugas征+。诊断: 左肩关节脱位。在局部麻醉下行手牵足蹬法复位并固定。以下对患儿进行肩关节功能锻炼的指导, 不正确的是( )。答案: 肩部固定期间, 锻炼活动程度以肩部微微疼痛为宜

80. [H]患者, 男, 25岁, 1小时前因车祸撞伤腹部。诉腹痛, 伴恶心、呕吐, 呕吐物量。该病人未明确诊断前应禁用( )。答案: 哌替啶

81. [H]患者, 男, 25岁, 1小时前因车祸撞伤腹部。诉腹痛, 伴恶心、呕吐, 呕吐物量少X线透视可见膈下游离气体。拟诊断为胃肠道穿孔。医嘱先行保守治疗。该病人在保守治疗期间, 不正确的措施是

( )。答案: 使用止痛剂

82. [H]患者, 男, 25岁, 1小时前因车祸撞伤腹部。诉腹痛, 伴恶心、呕吐, 呕吐物量少X线透视可见膈下游离气体。拟诊断为胃肠道穿孔。医嘱先行保守治疗。下列表现中, 不属于手术指征的是( )。答案: 病人出现疲困、无力

83. [J]急腹症病人未明确诊断前应禁用( )。答案: 哌替啶

84. [J]急腹症的叙述, 错误的是( )。答案: 发病急、进展慢、病情重

85. [J]急性排斥反应较为常见的早期症状是( )。答案: 移植物肿大和疼痛

86. [J]急性肾功能衰竭少尿期病人早期死亡的最常见原因是( )。答案: 高钾血症

87. [J]急性肾功能衰竭少尿期病人早期最常见的电解质失衡的类型是( )。答案: 高钾血症

88. [J]急性消化道失液的病人, 医嘱静脉给予下列液体输注, 作为其责任护士, 你考虑首先给其输入( )。答案: 5%葡萄糖盐水

89. [J]甲状腺部分切除术后病人麻醉清醒后, 护士鼓励其讲话的主要目的是判断( )。答案: 有无神经损伤

90. [J]甲状腺大部分切除手术后第3天, 出现手足疼痛, 指尖针刺感并有轻微抽搐, 此时病人可能出现( )。答案: 低钙血症

91. [J]甲状腺大部分切除手术后第3天, 出现手足疼痛, 指尖针刺感并有轻微抽搐, 护士应备好( )。答案: 葡萄糖酸钙

92. [J]甲状腺大部分切除术后第3天, 出现手足疼痛, 指尖针刺感并有轻微抽搐, 护士应备好( )。答案: 葡萄糖酸钙

93. [J]甲状腺大部分切除术后回到病房, 护士为评估病人有无神经损伤方法是( )。答案: 让病人讲话

94. [J]甲状腺大部分切除术后一回到病房, 护士就要求病人回答问题, 目的是为了评估

其有无( )。答案: 神经损伤

95. [J]甲状腺大部切除病人术后出现饮水呛咳的原因是( )。答案: 喉上神经内支损伤

96. [J]甲状腺大部切除术后病人术后出现声音嘶哑的原因是( )。答案: 喉返神经损伤

97. [J]甲状腺手术后, 有可能发生的最危急的并发症是( )。答案: 呼吸困难与窒息

98. [J]甲状腺手术术前体位练习, 正确的是( )。答案: 颈过伸位

99. [J]肩关节脱位病人在肩部固定期的功能锻炼方法, 不包括( )。答案: 患肢可自然下垂时做手臂画圈运动

100. [J]鉴别腹膜内型和腹膜外型的膀胱破裂, 最好的方法是( )。答案: 膀胱造影

101. [J]结肠癌症病人最早出现的症状是( )。答案: 排便习惯及粪便性状改变

102. [J]结肠癌最早出现的症状是( )。答案: 排便习惯及粪便性状改变

103. [J]经鼻胃管为病人灌注要素饮食时, 将病人取半卧位的目的是( )。答案: 避免误吸

104. [J]经鼻胃管为病人灌注要素饮食时, 最好让病人取( )。答案: 半卧位

105. [J]经鼻胃管为病人灌注要素饮食时, 最好使病人取( )。答案: 半卧位

106. [J]颈椎病发生的基本原因是( )。答案: 颈椎间盘退行性变

107. [J]静脉补钾的注意事项, 错误的是( )。答案: 40mmol相当于氯化钾4g

108. [K]开颅手术最危险的并发症是( )。答案: 颅内出血

109. [K]开颅术后病人最危险的并发症是( )。答案: 颅内出血

110. [K]可出现肺动脉压降低的是( )。答案: 低血容易休克

111. [K]可出现平均肺动脉压降低的是( )。答案: 肺动脉狭窄

112. [K]可能导致急性肾功能衰竭少尿期病人死亡的电解质失衡是( )。答案: 高钾血症



113. [L] 颅脑手术后留置脑室引流，通常情况下每日引流量不宜超过（ ）。答案：500 ml
114. [L] 颅内动静脉畸形病人最常见的首发症状是（ ）。答案：出血
115. [L] 颅内动静脉畸形最常见的首发症状是（ ）。答案：出血
116. [M] 慢性排斥反应的特点是（ ）。答案：移植器官功能逐渐减退
117. [M] 某病人毕Ⅱ式胃大部切除术后第5天，突发右上腹剧痛，伴有腹膜刺激征，应考虑为（ ）。答案：十二指肠残端破裂
118. [M] 某放疗病人，局部照射部位皮肤出现水肿，糜烂、渗出。可使用（ ）。答案：2%甲紫
119. [M] 某放疗病人，局部照射部位皮肤出现水肿，糜烂、渗出。可使用（ ）。答案：2%甲紫
120. [M] 某重症监护病人，出现肺动脉压（PAP）降低，首先考虑的原因是（ ）。答案：低血容量
121. [N] 男，39岁，司机，3小时前因两车相撞，上腹部被方向盘撞伤，出现腹部剧痛，不能行走，不能直立，头晕心慌，眼前发黑，并有呕吐。查体：T 36.0...白，出冷汗，腹式呼吸弱，全腹压痛、反跳痛、肌紧张，左上腹明显，移动性浊音（+），肠鸣音减弱。血常规检查示：Hb 50g/L，RBC  $2 \times 10^{12}$ /L。诊断性腹腔穿刺：抽出不凝固血液18ml。诊断为闭合性腹部损伤，脾破裂？低血容量性休克早期。以下相关处理及护理措施，不当的是（ ）。答案：采取半坐卧位
122. [N] 男性，20岁，因急性肠胃炎，呕吐、腹泻，不能进食，自述口干、尿少色黄。查体：口舌干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷。实验室检查：尿比重1.028，血清钠浓度为148mmol/L。考虑病人出现（ ）。答案：等渗性脱水
123. [N] 男性，25岁，因高热2日未能进食，自述口渴、口干、尿少色黄。查体：口舌干燥，皮肤弹性差，眼窝凹陷。实验室检查：尿比重1.028，血清钠浓度为155mmol/L。考虑病人出现（ ）。答案：中度高渗性脱水
124. [N] 男性，30岁，下肢被汽车压伤后4天，尿量小于200 ml/24h，伴有恶心、呕吐、嗜睡、昏迷、抽搐等症状。化验：血肌酐460 μmol/L，尿素氮26 mmol/L。诊断为急性肾功能衰竭，拟行透析疗法。透析疗法的护理要点不包括（ ）。答案：限制脂肪的摄入
125. [N] 男性，36岁，肾移植病人，术后36小时，出现少尿，血肌酐持续升高，并伴高热、寒战，应考虑其出现（ ）。答案：超急排异
126. [N] 男性，38岁，肾移植术，术中肾血循环恢复15分钟后，移植的肾脏由红转为暗红，出现青紫，坏死，该病人出现的是（ ）。答案：超急排异
127. [N] 男性，39岁，因脊髓型颈椎病接受手术治疗，对其的出院指导中正确的是（ ）。答案：避免猛力转头动作
128. [N] 男性，50岁，毕Ⅰ式胃大部切除术后第5天，突发右上腹剧痛。检查：痛苦面容，右上腹有压痛、反跳痛、肌紧张。该病人最可能发生的并发症是（ ）。答案：十二指肠残端破裂
129. [N] 男性，50岁，毕Ⅰ式胃大部切除术后第5天，突发右上腹剧痛。检查：痛苦面容，右上腹有压痛、反跳痛、肌紧张。目前的处理方法是（ ）。答案：手术置引流管作连续引流
130. [N] 男性，50岁，毕Ⅰ式胃大部切除术后第5天，突发右上腹剧痛。检查：痛苦面容，右上腹有压痛、反跳痛、肌紧张。目前首选的检查是（ ）。答案：立位腹部X线透视
131. [N] 男性，55岁，有慢性肝炎史10余年。因肝区隐痛3个月，食欲减退，消瘦、乏力就诊。体检：贫血貌，肝右肋下可触及，质硬，轻度压痛。实验室检查示：AFP500 ug/L。B超示肝右叶一5cm大小的占位。诊断为原发性肝癌，拟行肝部分切除术。术后肝断面出血及肝功能衰竭的预防措施，不包括（ ）。答案：术后鼓励病人早期活动
132. [N] 男性，60岁，诊断为原发性肝癌，行肝叶切除术后第3天，出现嗜睡、烦躁不安、黄疸、少尿等，应考虑（ ）。答案：肝性脑病
133. [N] 男性，65岁，肝癌肝叶切除术后第1天，病人感腹痛、心慌、气促、出冷汗，血压12/8kPa，首先应考虑为（ ）。答案：肝断面出血
134. [N] 男性，67岁。完全胃肠外营养支持病人，该病人护理方法正确的是（ ）。答案：不可经营养导管取血
135. [N] 男性，68岁，脑肿瘤实施颅内手术，已清醒、且血压平稳。为了利于颅内静脉回流，宜抬高床头（ ）。答案：15°～30°
136. [N] 男性，8岁，在小区院内逗狗时被狗咬伤右手背部，家长将其送至医院急诊。十分担心其出现狂犬病。以下是预防狂犬病的正确措施，除了（ ）。答案：做完清创消毒后，立即进行缝合包扎
137. [N] 男性病人，食管癌切除，食管胃吻合术后第5天，突然出现高热、寒战、呼吸困难、胸痛，白细胞 $20 \times 10^9$ /L，高度怀疑发生了（ ）。答案：吻合口瘘
138. [N] 男性，完全性胃肠外营养病人，滴注后2小时出现口渴、头痛、尿多，首先处理是，该病人可能出现（ ）。答案：血钠升高
139. [N] 男性，完全性胃肠外营养支持病人，营养液滴注后2小时出现口渴、头痛、尿多，该病人可能出现（ ）。答案：血糖升高
140. [N] 脑出血最常见的原因是（ ）。答案：高血压脑动脉硬化
141. [N] 尿酸结石者不宜服用含嘌呤高的食物。含嘌呤高的食物不包括（ ）。答案：鸡蛋
142. [N] 女，40岁。胆道手术后，T管引流2周，拔管前先试行夹管1~2天，夹管期间应注意观察的内容是（ ）。答案：腹痛、发热、黄疸
143. [N] 女，50岁。右乳腺癌根治术后上肢活动受限。护士指导其患侧肢体康复锻炼，应达到的目的是（ ）。答案：手经头摸到对侧耳朵
144. [N] 女，50岁。右乳腺癌根治术后上肢活动受限。护士指导其患侧肢体康复锻炼，应达到的最终目标是（ ）。答案：手经头摸到对侧耳朵
145. [N] 女性，18岁，因骨肉瘤行右大腿截肢术，术后出现幻肢痛，护理人员向病人的解释中不正确的是（ ）。答案：残肢制动以避免疼痛
146. [N] 女性，18岁，因骨肉瘤行右大腿截肢术，术后出现幻肢痛，护理人员在向病人解释时，错误的说法是（ ）。答案：残肢制动以避免疼痛
147. [N] 女性，23岁，颅内动脉瘤，脑血管造影显示动脉瘤位于Willis环前部，此病人术前最重要的练习是（ ）。答案：压迫颈动脉
148. [N] 女性，27岁，教师，婚后1年，因大便次数增多，肛门坠胀感，血便、脓血便2年，到医院就诊，直肠指诊：距肛缘4cm触及一环行肿物，质硬、活动度差，推指指套有染血。病理检查示“直肠低分化腺癌”。拟行经腹会阴联合直肠癌切除术。以下是术前准备工作，除了（ ）。答案：呼吸道准备
149. [N] 女性，29岁，因风湿性心脏病行二尖瓣瓣膜置换。术后服用法华林，对其健康教育中重要的是（ ）。答案：定期检查凝血功能
150. [N] 女性，30岁，哮喘持续状态2天，动脉血气分析pH7.35，PaCO<sub>2</sub>9.3kPa，PaO<sub>2</sub>6.6kPa，BE+2mmol/L，HCO<sub>3</sub>-25mmol/L，其酸碱失衡的类型是（ ）。答案：呼吸性酸中毒代偿期
151. [N] 女性，34岁，因甲状腺腺瘤行甲状腺部分切除术，术后病人出现饮水呛咳，可能的原因是（ ）。答案：喉上神经内支损伤

152. [N] 女性, 37岁, 甲状腺大部切除术, 术后3h突然出现窒息, 面部青紫, 颈部切口下肿胀, 其原因是 ( ) **答案: 出血**
153. [N] 女性, 37岁, 因右乳乳腺癌在全麻下行乳腺癌改良根治术, 现为术后第1天, 病人T37.4℃、P88次/分、R24次/分、BP125/80mmHg..., 病人诉伤口疼痛, 且现在不能自己洗漱、进餐、如厕等, 病人向家人和护士诉说不能接受一侧乳房切除的事实。以下主要护理诊断/问题, 错误的是 ( ) 。**答案: 营养失调 (低于机体需要量) : 与无法进食有关。**
154. [N] 女性, 39岁, 左前臂行石膏绷带包扎后1小时, 出现手指剧痛, 苍白发凉, 桡动脉搏动减弱, 应首先采取的措施是 ( ) 。**答案: 适当松解石膏绷带**
155. [N] 女性, 39岁, 左前臂行石膏绷带包扎后1小时, 出现手指剧痛, 苍白发凉, 桡动脉搏动减弱, 应首先采取的措施是 ( ) **答案: 适当松解石膏绷带**
156. [N] 女性, 40岁, 因甲状腺癌行甲状腺大部分切除术及局部淋巴结清扫术, 术后10小时, 病人出现颈部肿大, 烦躁不安, 呼吸困难, 发绀, 脉搏102次/分, 伤口纱布上有渗血。考虑出现了呼吸困难、窒息。根据临床表现分析原因是 ( ) 。**答案: 切口内出血**
157. [N] 女性, 45岁, 急性右上腹绞痛6小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。急诊行胆囊切除、胆总管探查、T管引流术。术后观察病人排便情况的最主要目的是 ( ) 。**答案: 判断病人胆总管通畅情况**
158. [N] 女性, 45岁, 突发上腹痛6小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往: 胆总管结石2年。体检: 一般情况差, T39.8℃, P126次/分, R24次/分, ...+, Murphy征 (+), 肠鸣音弱。诊断为急性梗阻性化脓性胆管炎, 拟在抗休克基础上, 行胆总管切开减压手术。以下护理措施, 不恰当的是 ( ) 。**答案: 半坐卧位**
159. [N] 女性, 45岁, 突发上腹痛6小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往: 胆总管结石2年, 体检: 一般情况差, T39.8℃, P126次/分, R24次/分, B...四肢湿冷, 皮肤发热, 心肺 (一), 腹软, 右上腹压痛 (+), 反跳痛 (+), 肌紧张 (+), Murphy征 (+), 肠鸣音弱  
此病人最可能的诊断是 ( ) **答案: 急性梗阻性化脓性胆管炎**
160. [N] 女性, 45岁, 突发上腹痛6小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往: 胆总管结石2年, 体检: 一般情况差, T39.8℃, P126次/分, R24次/分, B..., 皮肤发热, 心肺 (一), 腹软, 右上腹压痛 (+), 反跳痛 (+), 肌紧张 (+), Murphy征 (+), 肠鸣音弱  
目前最重关键的治疗原则是 ( ) **答案: 紧急胆道减压手术**
161. [N] 女性, 45岁, 突发上腹痛6小时, 伴高热, 皮肤巩膜发黄。既往: 胆总管结石2年, 体检: 一般情况差, T39.8℃, P126次/分, R24次/分, B...腹软, 右上腹压痛 (+), 反跳痛 (+), 肌紧张 (+), Murphy征 (+), 肠鸣音弱  
若此病人采用手术治疗, 预计该病人术后引流管至少留置 ( ) 。**答案: 14天**
162. [N] 女性, 45岁, 因脑肿瘤进行手术切除, 在残留的创腔内放置引流物进行创腔引流。正确护理措施不包括 ( ) 。**答案: 引流袋高度一定要低于头部创腔**
163. [N] 女性, 45岁, 因脑肿瘤、颅内压增高, 行脑室引流术后3小时, 引流管无脑脊液流出, 不正确的处理方法是 ( ) 。**答案: 生理盐水冲洗**
164. [N] 女性, 45岁, 因乳腺癌行局部放疗, 胸前壁皮肤出现水疱时, 可局部使用 ( ) 。**答案: 硼酸软膏**
165. [N] 女性, 45岁, 因乳腺癌行局部放疗, 胸前壁皮肤出现水疱时, 可局部使用 ( ) 。**答案: 硼酸软膏**
166. [N] 女性, 46岁, 因颅内压增高行脑室外引流术, 该宜超过 ( ) **答案: 500ml**
167. [N] 女性, 48岁, 胆囊切除、胆总管探查, T管引流术后, 提示该病人胆道远端通畅的表现是 ( ) **答案: 食欲好转, 黄疸消退, 引流量减少**
168. [N] 女性, 48岁, 近两个月来出现消瘦、乏力、巩膜黄染。查体: T37.5℃, P84次/分, R20次/分, BP120/80mmHg, 身高160cm, 体重45kg。皮肤轻度黄染。B超显示胆管扩张、胰头占位。诊断为胰腺癌。拟行胰头十二指肠根治性切除术。以下为改善该病人的营养状态的措施, 其中不当的是 ( ) 。**答案: 术前有黄疸者, 静脉补充维生素E以改善凝血功能**
169. [N] 女性, 50岁, 腹胀、腹痛, 大便不成形, 每日3~4次, 有脓血便。查体: 左中腹可扪及包块, 边界不清, 为明确诊断应做 ( ) **答案: 乙状结肠镜检查**
170. [N] 女性, 56岁, 风湿性心脏病病人, 手术前后尤其应注意其出现 ( ) **答案: 低钾血症**
171. [N] 女性, 56岁, 乳腺癌术后病人, 术后10小时, 出现患侧皮肤青紫、皮温降低、脉搏不能扪及, 提示 ( ) **答案: 腋部血管受压**
172. [N] 女性, 59岁, 河南林县人, 农民。从5岁开始, 以吃咸菜和玉米面糊为主的饮食有30年, 近20年来以面食为主, 吃蔬菜水果较少。父亲和母亲因食管癌去...症状时轻时重。用带网气囊食管细胞采集器作食管拉网检查脱落细胞时为阳性。门诊以食管癌收住院。以下是该病人与食管癌发病有关的因素, 除了 ( ) 。**答案: 爱吃面食**
173. [N] 女性, 60岁, 半月前无意发现左乳肿物, 位于外上象限, 约花生米大小, 质硬, 活动度小, 边界不清楚。入院进一步检查诊断为左乳癌, 行左乳癌根治术。该病人术后护理, 不正确的是 ( ) 。**答案: 将患肢固定在胸壁上**
174. [N] 女性, 60岁, 半月前无意发现左乳肿物, 位于外上象限, 约花生米大小, 质硬, 活动度小, 边界不清楚。入院进一步检查诊断为左乳癌, 行左乳癌根治术。病人术后进行功能锻炼的方法正确的是 ( ) **答案: 术后10—12天开始全范围关节活动**
175. [N] 女性, 67岁, 急性肾功能衰竭少尿期, 出现呼吸困难, 头痛、软瘫、心律不齐、心动过缓, 腹胀, 应考虑 ( ) **答案: 高钾血症**
176. [N] 女性, 69岁, 重度脑损伤昏迷病人, 医嘱给予鼻饲饮食, 灌注食物时, 应给予病人取 ( ) 。**答案: 半卧位**
177. [N] 女性病人, 50岁。胃大部切除术后2周, 病人进食后约15分钟出现上腹饱胀, 恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。应考虑并发了 ( ) 。**答案: 倾倒综合征**
178. [N] 女性病人, 50岁。胃大部切除术后2周, 病人进食后约15分钟出现上腹饱胀, 恶心、呕吐、头晕、心悸、出汗、腹泻等。最主要的护理措施是 ( ) **答案: 嘱病人平卧片刻**
179. [N] 女性病人, 毕Ⅱ式胃大部切除术后第5天, 突发高热、脉速、腹痛, 伴有腹膜刺激征, 应考虑 ( ) 。**答案: 胃肠吻合口破裂**
180. [N] 女性病人, 毕Ⅱ式胃大部切除术后第5天, 突发右上腹剧痛, 伴有腹膜刺激征, 应考虑 ( ) **答案: 十二指肠残端破裂**
181. [N] 女性, 心脏瓣膜置换术后病人, 提示其可能出现心脏压塞的表现是 ( ) 。**答案: 静脉压升高**
182. [P] 判断呼吸性酸碱失衡的唯一指标是 ( ) 。**答案: PaCO<sub>2</sub>**
183. [P] 膀胱癌最常见、最早出现的症状是 ( ) 。**答案: 血尿**
184. [P] 膀胱灌注药物的护理, 错误的叙述是 ( ) 。**答案: 嘱病人保留1小时, 每15分钟俯、左、右更换体位, 后排尿**



185. [P]膀胱造瘘管护理，错误的是（ ）。答案：保持引流管通畅，必要时可用清水冲洗
186. [Q]器官移植术后病人出现慢性排斥反应的特点是（ ）答案：移植器官功能逐渐减退
187. [Q]青年男性，不慎从高空坠落，急诊送往医院。体检：臀部及右腰部疼痛明显，右腰部有压痛，无包块，腹肌柔软，无压痛，无反跳痛。有明显血尿，血压100 / 60mmHg，心率100次/分。B超检查提示肾包膜完整、部分肾实质损伤。医生决定为其行非手术治疗。以下是病人非手术治疗期间的病情观察要点，不正确的是（ ）。答案：随时复查尿常规
188. [Q]全肺切除术后放置胸腔闭式引流的目的的是（ ）。答案：调节两侧胸腔压力
189. [Q]全肺切除术后应控制钠盐摄入量，24小时补液量应控制在2000ml内，速度应控制在（ ）。答案：20~30滴/分为宜
190. [Q]全胃肠外营养支持病人可能发生的最严重的代谢并发症是（ ）。答案：高渗性非酮症昏迷
191. [Q]犬咬伤后，要用肥皂水或清水彻底冲洗伤口至少（ ）。答案：15分钟
192. [R]人工瓣膜置换术后病人术后指导中关于抗凝药物使用的内容不正确的是（ ）答案：凝血功能正常时可暂停药
193. [R]人工瓣膜置换术后病人术后最常用的抗凝药物是（ ）答案：法华林
194. [R]人机呼吸对抗原因，不包括（ ）。答案：自主呼吸过弱
195. [R]乳癌病人局部皮肤出现“酒窝征”的原因是（ ）。答案：癌肿侵及Cooper韧带
196. [R]乳癌病人局部皮肤出现“橘皮征”的原因是（ ）答案：癌细胞堵塞表浅淋巴管
197. [R]乳癌根治术后第2天护理措施不正确的是（ ）。答案：指导肩关节的活动
198. [R]乳癌根治术术后病人的护理措施中不正确的是（ ）答案：早期活动患肢
199. [R]乳腺癌病人术后进行功能锻炼的方法，正确的是（ ）。答案：术后10~12天进行全范围关节活动
200. [S]蛇咬伤后，在绑扎的同时可局部冰敷，使血管及淋巴管收缩，减慢蛇毒的吸收。也可将伤肢或伤指浸入4~7℃的冷水3~4小时，后再改用冰袋冷敷，持续（ ）。答案：24~36小时
201. [S]深静脉血栓形成的急性期时应（ ）。答案：绝对卧床休息2周
202. [S]肾癌三联症表现为（ ）。答案：血尿、腰痛和肿块
203. [S]肾损伤病人保守治疗期间的处理，错误的是（ ）。答案：绝对卧床休息1~2周
204. [S]肾损伤病人保守治疗期间的护理，错误的是（ ）。答案：绝对卧床休息1~2周
205. [S]肾损伤出现明显血尿可见于（ ）。答案：肾实质深度裂伤、破入肾盂肾盂
206. [S]肾损伤出现明显血尿时见于（ ）。答案：肾实质深度裂伤、破入肾盂肾盂
207. [S]肾移植术后病人应采取（ ）。答案：平卧位
208. [S]生长迅速的骨肿瘤最显著的症状是（ ）。答案：疼痛
209. [S]食管癌病人的典型临床表现是（ ）答案：进行性吞咽困难
210. [S]食管癌病人的典型症状是（ ）答案：进行性吞咽困难
211. [S]食管癌病人术后第3天，拔除胃管后口服流质，第5天病人体温升高到39℃，呼吸困难、胸痛、脉速，胸透发现手术侧胸腔积液，应首先考虑并发（ ）。答案：食管吻合口瘘
212. [S]食管癌的典型症状是（ ）。答案：持续性胸背疼痛
213. [S]食管癌食管梗阻的病人术前给予温盐水洗胃的目的是（ ）答案：减轻食管黏膜水肿
214. [S]食管癌食管明显梗阻的病人术前减轻食管黏膜水肿的措施是（ ）。答案：术前3天温盐水洗胃
215. [S]食管癌、食管明显梗阻的病人术前准备中，减轻食管黏膜水肿的措施是（ ）。答案：术前3天温盐水洗胃
216. [S]食管癌手术后第3天拔除胃管后口服流质，第5天体温升高到39℃，呼吸困难、胸痛、脉速，胸透发现手术侧胸腔积液，应首先考虑并发（ ）。答案：食管吻合口瘘
217. [S]食管癌术后饮食护理措施中正确的是（ ）。答案：胃管拔除3周后若无不适可进普食
218. [S]首次被犬咬伤后狂犬病疫苗接种，正确的是（ ）。答案：原则上是越早注射狂犬病疫苗越好
219. [S]输尿管结石病人绞痛发作时，最重要处理方法是（ ）。答案：解痉止痛
220. [S]属于肾性肾功能衰竭的病因是（ ）。答案：肾中毒
221. [S]术中发现肿块为恶性，行甲状腺全切手术，术后医嘱给予甲状腺素片口服。在指导用药时，不正确的是（ ）。答案：药量终身不能改变
222. [T]体外冲击波碎石病人的护理措施，错误的是（ ）。答案：碎石后应多活动，加速结石排出
223. [T]体外循环手术病人术后的电解质浓度的监测尤其应注意（ ）。答案：血钾浓度
224. [T]同种异体器官移植时最常见的一种排斥反应是（ ）。答案：急性排斥反应
225. [W]外科急腹症在未明确诊断前，应严格执行四禁。四禁不包括（ ）。答案：禁用抗生素
226. [W]完全性肠梗阻病人非手术治疗期间，反映病情缓解最重要的表现（ ）答案：肛门有排气、排便
227. [W]完全性肠梗阻病人非手术治疗期间，提示肠梗阻解除的标志性表现是（ ）。答案：肛门有排气，排便
228. [W]胃大部切除术后需要及早手术的梗阻类型是（ ）答案：输入段完全梗阻
229. [W]为了避免诱发下肢放射痛，腰椎间盘突出症病人直腿抬高一般不能超过（ ）答案：60°
230. [X]下肢深静脉血栓病人最主要的治疗方法是（ ）。答案：抗凝疗法
231. [X]下肢深静脉血栓术后的体位与活动，正确的是（ ）。答案：鼓励术后早下床活动
232. [X]下肢深静脉血栓形成最严重的并发症是（ ）。答案：肺动脉栓塞
233. [X]下肢深静脉血栓形成最严重的并发症是（ ）答案：肺栓塞
234. [X]胸腔内上、下腔静脉或右心房内的压力是（ ）。答案：中心静脉压
235. [X]血管危象由血管栓塞或痉挛所致，一般容易在手术后（ ）。答案：48小时内发生
236. [Y]腰椎间盘突出症病人术后行直腿抬高练习，最主要的目的是为了预防（ ）。答案：神经根粘连
237. [Y]腰椎间盘突出症的基本病因是（ ）。答案：椎间盘退行性变
238. [Y]腰椎间盘突出症患者术后为防止患者神经根粘连，最主要的做法是（ ）答案：直腿抬高练习
239. [Y]腰椎间盘突出症患者术后行直腿抬高练习的最主要的目的是为了预防（ ）。答案：神经根粘连
240. [Y]腰椎间盘突出最常压迫的神经根是（ ）。答案：L5和S1神经根
241. [Y]胰头癌病人最常见的临床表现是（ ）答案：进行性黄疸
242. [Y]胰头癌常见首发症状是（ ）。答案：黄疸
243. [Y]胰腺癌病人最常见的首发症状是（ ）答案：上腹痛及上腹饱胀不适

244. [Y]胰腺癌最常见的首发症状是（ ）。  
答案：上腹痛及上腹饱胀不适

245. [Y]胰腺切除术后，胰外分泌功能严重减退，应根据胰腺功能给予（ ）。  
答案：消化酶制剂或止泻剂

246. [Y]以下是按照发病原因进行的关节脱位分类，除了（ ）。  
答案：新鲜性脱位

247. [Y]以下是食管癌术前护理措施，除了（ ）。  
答案：皮肤护理

248. [Y]因结石、血块等原因或引起输尿管完全梗阻时，出现肾绞痛。肾绞痛特点不包括（ ）。  
答案：疼痛可放射至大腿外侧

249. [Y]用于保护瘘口周围皮肤的常用药膏是（ ）。  
答案：氧化锌软膏

250. [Y]用于保护瘘口周围皮肤的最常用药膏是（ ）。  
答案：氧化锌软膏

251. [Y]右上肺叶切除术后第一天病人最适宜的体位是（ ）。  
答案：半坐卧位

252. [Y]预计该病人术后引流管至少留置（ ）。  
答案：14天

253. [Y]原发性肝癌病人最常见的首发症状是（ ）。  
答案：肝区疼痛

254. [Y]原发性肝癌最常见的首发症状是（ ）。  
答案：肝区疼痛

255. [Z]在肿瘤病人化疗或放疗期间，最主要的观察项目是（ ）。  
答案：血象

256. [Z]早期倾倒综合征的处理，正确的是（ ）。  
答案：进餐后平卧10~20分钟

257. [Z]诊断椎管内肿瘤最有价值的辅助检查方法是（ ）。  
答案：脊髓MRI

258. [Z]肢体断端有大动脉出血者可采用止血带止血，但应每小时放松（ ）。  
答案：5~10分钟

259. [Z]直肠癌根治术能否保肛门取决于（ ）。  
答案：肿瘤距肛门的距离

260. [Z]直肠癌根治术能否保留肛门取决于（ ）。  
答案：肿瘤距肛门的距离

261. [Z]直肠癌最常见的临床症状是（ ）。  
答案：黏液血便
262. [Z]中心静脉营养导管的护理，正确的是（ ）。  
答案：不要在配好的静脉营养液中添加任何成分

263. [Z]肿瘤病人放疗局部的皮肤有水疱时可局部使用（ ）。  
答案：弱酸软膏

264. [Z]左半结肠癌病人的主要症状是（ ）。  
答案：肠梗阻

265. [Z]左半结肠癌的主要症状是（ ）。  
答案：肠梗阻
- 主观题 (60) 微信号：zydz\_9527

1. Beck三联征

2. Horner征

3. Pancoast肿瘤

4. 病理性脱位

5. 肠内营养

6. 肠内营养支持

7. 肠外营养

8. 肠外营养支持

9. 等渗性缺水

10. 低渗性缺水

11. 多器官功能障碍综合征

12. 腹膜内型膀胱损伤

13. 腹膜内型膀胱破裂

14. 腹膜内型膀胱肌裂

15. 腹膜外型膀胱破裂

16. 腹膜外型膀胱损伤

17. 高渗性缺水

18. 骨筋膜室综合征

19. 急腹症

20. 简述T管留置期间的护理。

21. 简述肠梗阻病人出现肠绞窄的表现。

22. 简述断肢再植病人再植肢体动脉血管受阻表现及缓解方法。

23. 简述放疗病人放射区局部皮肤护理。

24. 简述骨肉瘤病人残肢功能锻炼方法。

25. 简述骨肉瘤病人截肢后残肢功能锻炼方法。

26. 简述骨折后功能锻炼方法

27. 简述肩关节脱位病人功能锻炼方法。

28. 简述静脉补钾的注意事项。

29. 简述尿石症病人饮食注意事项。

30. 简述乳癌根治术病人术后患肢功能锻炼方法。

31. 简述肾损伤病人保守治疗期间的护理。

32. 简述肾盂造瘘病人的护理。

33. 简述体外冲击波碎石病人的护理。

34. 简述胃大部切除术后病人出现晚期倾倒综合征的原因及处理方法。

35. 简述因骨肉瘤截肢病人残肢功能锻炼方法。

36. 简述预防化疗病人出现局部组织坏死的护理措施。

37. 简述中心静脉营养导管的护理。

38. 进行性吞咽困难

39. 酒窝征

40. 橘皮征

41. 列举呼吸机过程中高压报警与低压报警的常见的原因。

42. 列举呼吸机使用过程中出现人机对抗的原因。

43. 列举呼吸机使用过程中高压报警与低压报警的常见的原因。

44. 列举使用呼吸机过程中出现人机对抗的原因。

45. 男，39岁，司机，3小时前因两车相撞，上腹部被方向盘撞击，出...

46. 男性，20岁，1周前无明显诱因出现右上腹胀痛，伴间断恶心、呕...

47. 女性，27岁，教师，婚后1年，因大便次数增多，肛门坠胀感，血...

48. 女性，37岁，因右乳乳腺癌在全麻下行乳腺癌改良根治术，现为术...

49. 女性，40岁，因甲状腺癌行甲状腺大部分切除术及局部淋巴清扫...

50. 女性，45岁，突发上腹痛6小时，伴高热，皮肤巩膜发黄。既往：...

51. 倾倒综合征

52. 肾癌三联症

53. 肾绞痛

54. 体外循环

55. 习惯性脱位

56. 脂肪栓塞综合征

57. 直腿抬高试验阳性

58. 中心静脉压

59. 中心型肺癌

60. 周围型肺癌
1. Beck三联征  
答案：Bck三联征是指病人出现静脉压升高、心音遥远、心搏微弱、脉压小，动脉压降低，提示心脏压塞。

2. Horner征  
答案：又称颈交感神经综合征，因颈交感神经受侵犯产生同侧上眼睑下垂、瞳孔缩小、眼球内陷、面部无汗等。

3. Pancoast肿瘤  
答案：上叶顶部肺癌，亦称为Pancoast肿瘤，可侵入纵隔和压迫位于胸廓上口的器官或组织，如第1肋间、锁骨下动静脉、臂丛神经、颈交感神经等。

4. [B]病理性脱位  
答案：病变使关节结构遭到破坏，在轻微外力作用下即可发生脱位。如化脓性关节炎所致的关节脱位。

5. [C]肠内营养  
答案：肠内营养：肠内营养支持是指经口或各种胃肠内置管将维持人体代谢所需的营养物质供给病人的一种方式。

6. [C]肠内营养支持  
答案：肠内营养支持是指经口或各种胃肠内置管将维持人体代谢所需的营养物质供给病人的一种方式。

7. [C]肠外营养  
答案：肠外营养支持是指经静脉将维持人体代谢所需的营养物质供给病人的一种方式。

8. [C]肠外营养支持  
答案：肠外营养支持是指经静脉将维持人体代



谢所需的营养物质供给病人的一种方式。

9. [D]等渗性缺水

答案：水和钠成比例丧失，血清钠和细胞外液渗透压维持在正常范围：因细胞外液量迅速减少，故又称急性缺水或混合性缺水。是外科病人最常见的缺水类型。

10. [D]低渗性缺水

答案：因失钠多于失水，血清钠和细胞外液渗透压降低：又称继发性缺水或慢性缺水。

11. [D]多器官功能障碍综合征

答案：多器官功能障碍综合征是急性疾病过程中同时或序贯继发，两个或更多的重要器官的功能障碍或衰竭。

12. [F]腹膜内型膀胱损伤

答案：多发生于膀胱顶部，大量尿液进入腹腔可引起尿性腹膜炎。

13. [F]腹膜内型膀胱破裂

答案：多发生于膀胱顶部，大量尿液进入腹腔可引起尿性腹膜炎。

14. [F]腹膜内型膀胱破裂

答案：多发生于膀胱顶部，大量尿液进入腹腔可引起尿性腹膜炎。

15. [F]腹膜外型膀胱破裂

答案：破裂多发生在膀胱前壁的下方，尿液渗至耻骨后间隙，沿筋膜浸润腹壁或蔓延到腹后壁，如不及时引流，可发生组织坏死、感染，引起严重的蜂窝组织炎。

16. [F]腹膜外型膀胱损伤

答案：破裂多发生在膀胱前壁的下方，尿液渗至耻骨后间隙，沿筋膜浸润腹壁或蔓延到腹后壁，如不及时引流，可发生组织坏死、感染，引起严重的蜂窝组织炎。

17. [G]高渗性缺水

答案：因失水多于失钠，血清钠和细胞外液渗透压升高：又称原发性缺水。

18. [G]骨筋膜室综合征

答案：骨筋膜室综合征是四肢骨筋膜室内的肌肉和神经因急性缺血而发生的一系列早期征候群，好发生于前臂掌侧和小腿。

19. [J]急腹症

答案：由于腹腔内、盆腔内和腹膜后组织或脏器发生急性生理病理变化，而产生以腹部症状和体征为主，同时伴全身反应的临床表现，称为急腹症。

20. [J]简述T管留置期间的护理。

答案：（1）妥善固定，注意翻身、活动、搬动时勿牵拉导管，防止T管脱出。（2）保持通畅、有效引流：T管不可受压、扭曲、折叠，经常予以挤捏，保持通畅。注意引流管的水平高度不要超过腹部切口高度以免引流液反流。（3）观察记录胆汁的量及性状。预防感染：严格无菌操作，每周定期更换外接的引流管、引流瓶。

21. [J]简述肠梗阻病人出现肠绞窄的表现。

答案：（1）腹痛发作急骤，起始即为持续性剧烈疼痛，或在阵发性加重之间仍有持续性疼痛，呕吐出现早、频繁而剧烈。（2）病情发展迅速，早期出现休克，抗休克治疗后症状改善不显著。（3）有明显的腹膜刺激征，体温上升、脉率增快、白细胞计数增高。（4）腹胀不对称，腹部有局限性隆起，或触及有压痛的包块（胀大的肠袢）。（5）呕吐物、胃肠减压抽出液、肛门排出物为血性，或腹腔穿刺抽出血性液体。（6）经积极非手术治疗，症状、体征无明显改善。（7）腹部X线检查见孤立、胀大的肠样，不因体位、时间而改变位置，或有假瘤状阴影。

22. [J]简述断肢再植病人再植肢体动脉血管受阻表现及缓解方法。

答案：若再植肢（指）体末端紫灰色，皮温下降，指腹瘪陷，皮纹加深，动脉搏动减弱或消失，指甲毛细血管充盈时间延长，则提示动脉血管受阻。应首先解除血管外的压迫因素，包括完全松解包扎：若血液循环无好转，再拆除部分缝线，清除积血降低局部张力：采用臂丛麻醉或硬膜外麻醉：应用解痉药物如露粟碱、妥拉唑林等。有条件者可行高压氧治疗。经短时间处理仍未好转者，多

为血管栓塞，应尽早手术探查，除去血栓或重新吻合血管，有可能保住再植肢（指）体。

23. [J]简述放疗病人放射区局部皮肤护理。

答案：（1）保护皮肤：选择宽松、柔软、吸湿性强的内衣；照射部位保持干燥，清洗时应轻柔，勿用力擦洗和使用肥皂；避免照射部位冷、热刺激和日光直射；（2）促进皮肤反应修复：干反应可涂0.2%薄荷淀粉或羊毛脂止痒。湿反应可涂2%甲紫或氢化可的松霜，不必包扎；有水疱时，涂硼酸软膏，包扎1~2天，待渗出吸收后改用暴露疗法。

24. [J]简述骨肉瘤病人残肢功能锻炼方法。

答案：用弹性绷带每天包扎数次，对残端给予经常性的均匀压迫，以促进残端软组织收缩。此外还可对残端进行按摩、拍打，锻炼初期用残端蹬踩柔软物品，以后逐渐过渡到蹬踩较硬物体。鼓励病人使用扶车、拐杖、手杖和吊架等辅助设备，反复进行肌肉强度、关节活动范围和平衡锻炼。

25. [J]简述骨肉瘤病人截肢后残肢功能锻炼方法。

答案：用弹性绷带每天包扎数次，对残端给予经常性的均匀压迫，以促进残端软组织收缩。此外还可对残端进行按摩、拍打，锻炼初期用残端蹬踩柔软物品，以后逐渐过渡到蹬踩较硬物体。鼓励病人使用扶车、拐杖、手杖和吊架等辅助设备，反复进行肌肉强度、关节活动范围和平衡锻炼。

26. [J]简述骨折后功能锻炼方法

答案：骨折后1~2周内以患肢肌肉的主动舒缩活动为主，以消除肿胀，防止肌肉萎缩。原则上，骨折部位上下的关节不活动，身体其他关节应坚持锻炼。骨折2周后，局部疼痛消失，骨折处已有纤维连接，开始骨折部位上下的关节活动，活动强度和范围逐渐增加。骨折达临床愈合，外固定解除，是功能锻炼的关键时期。此时应逐渐开始全方位活动骨折部位上下的关节，患肢增加负重，以恢复

关节活动范围和肌力，促进骨痂改造塑形。

27. [J]简述肩关节脱位病人功能锻炼方法。

答案：肩部固定期间做握拳、腕部旋转和患肢肌肉舒缩活动，缓慢推动患肢外展和内收，活动程度以不引起肩部疼痛为宜。三周后解除固定，练习弯腰垂肩，即当病人弯腰90°患肢可自然下垂时做手臂画圈运动，范围从小到大。四周后指导病人面对或侧对墙，患侧手指交替上爬直至肩关节上举完全正常，或患侧手经过头顶摸对侧耳朵，或患侧手从背后摸对侧肩胛骨。

28. [J]简述静脉补钾的注意事项。

答案：（1）掌握总量，一般每日补钾40~80mmol，相当于氯化钾3~6g；（2）控制浓度，每升液体含钾量不超过40mmol（相当于氯化钾3g）；（3）限定速度，输注含钾溶液每小时不超过20mmol（相当于含0.3%氯化钾溶液500ml）；（4）尿畅补钾，成人尿量超过每小时40ml后，才可输注含钾溶液。

29. [J]简述尿石症病人饮食注意事项。

答案：草酸钙结石者宜食用含纤维素丰富的食物，限制含钙、草酸成分多的食物，如浓茶、菠菜、番茄、土豆、芦笋、核桃、甜菜、豆腐、油菜、雪菜、榨菜、海带、牛奶、奶制品、豆类及豆制品、巧克力、坚果、芝麻酱、虾米等不宜过多食用，宜多吃水果和蔬菜以碱化尿液。磷酸钙和磷酸镁铵结石宜低钙、低磷饮食及酸化尿液，如蛋类、动物内脏、鱼卵、沙丁鱼、豆类、花生等不宜多吃。尿酸结石者不宜服用含嘌呤高的食物，如动物内脏、豆制品、海鲜、菠菜、香菇、芦笋等，宜多吃鸡蛋、牛奶，多吃蔬菜和水果。

30. [J]简述乳腺癌根治术病人术后患肢功能锻炼方法。

答案：为避免患侧上肢功能障碍，应鼓励和协助病人早期开始患侧上肢的功能锻炼。术后24小时内，活动手指及腕部，可作伸指、握拳、屈腕等锻炼；术后3~5日，开始肘部活动：术后7日，上举，10天外展。腋下引流管拔除之后，

术后10~12天左右可教病人逐渐作上臂的全范围关节活动，直至患侧手指能高举过头，能自行梳理头发。

31. [J]简述肾损伤病人保守治疗期间的护理。

答案：（1）心理护理。（2）绝对卧床休息2~4周。（3）纠正水、电解质紊乱。（4）缓解疼痛。（5）病情观察：密切监测病人的生命体征、血尿及腰部肿块变化，及时发现并准确记录。

32. [J]简述肾盂造瘘病人的护理。

答案：（1）妥善固定造瘘管；（2）鼓励病人多饮水，若冲洗每次冲洗量应小于5—8ml；（3）观察并记录引流的量及性质；（4）定期更换引流袋；（5）通常管道放置2周左右，拔管前先明确下尿路通畅：拔管后病人取健侧卧位，防止尿液自瘘口流出影响愈合。

33. [J]简述体外冲击波碎石病人的护理。

答案：治疗前向病人讲明治疗方法及注意事项。治疗后漏病人多饮水可增加尿量，促进结石排出。若排石引起的绞痛，使用解痉止痛药缓解症状：治疗后出现血尿，嘱病人多饮水，必要时用止血药。巨大肾结石碎石后因短时间内大量碎石突然充填输尿管而发生堵塞，可引起“石街”和继发感染，严重者引起肾功能损害；因此，碎石后应平卧、患侧卧位，以免结石过快排出。

34. [J]简述胃大部切除术后病人出现晚期倾倒综合征的原因及处理方法。

答案：晚期倾倒综合征，又称低血糖综合征，由于胃排空快，高渗食物迅速进入小肠、快速吸收，引起高血糖，致胰岛素大量分泌，继而发生反应性低血糖综合征。出现症状时稍进饮食，尤其是糖类即可缓解，饮食中减少糖类含量，增加蛋白质比例，少量多餐可防止其发生。

35. [J]简述因骨肉瘤截肢病人残肢功能锻炼方法。

答案：用弹性绷带每天包扎数次，对残端给予

经常性的均匀压迫，以促进残端软组织收缩。此外还可对残端进行按摩、拍打，锻炼初期用残端蹬踩柔软物品，以后逐渐过渡到蹬踩较硬物体。鼓励病人使用扶车、拐杖、手杖和吊架等辅助设备，反复进行肌肉强度、关节活动范围和平衡锻炼。

36. [J]简述预防化疗病人出现局部组织坏死的护理措施。

答案：应了解药物的刺激性，并熟练掌握静脉穿刺和注射刺激性药物的技术。如不慎药液溢出需立即：①停止注药或输液，保留针头接注射器回抽后，注入解毒药再拔针；②皮下注入解毒药；③局部涂氢化可的松，冰敷24小时；④报告医师并记录。

37. [J]简述中心静脉营养导管的护理。

答案：（1）穿刺后观察患者有无感气、呼吸困难，穿刺侧呼吸音减弱、肢体活动障碍等。

（2）穿刺成功后常规拍摄胸片。

（3）每班记录导管刻度，出现移位或脱出应拔除。

（4）监测病人有无感染的症状/体征，

（5）每日更换输人管道及静脉营养袋。

（6）不要通过静脉营养液输人管道输人其他药物，输血或测中心静脉压。

（7）不要在配好的静脉营养液中添加任何成分。

（8）如果可疑有与管道有关的感染发生，协助医师在新的部位重新进行静脉穿刺，使用新的静脉营养液，管道和滤器。并对导管尖端做细菌培养及药敏测试。同时，遵医嘱输人抗生素。

38. [J]进行性吞咽困难

答案：是食管癌病人最常见和最典型的症状，先是难咽干硬食物，继而只能进半流质，最后水和唾液难以咽下。

39. [J]酒窝征

答案：若乳腺肿瘤累及Cooper韧带，可使其缩短而致乳房表面皮肤凹陷，形成“酒窝

征”。

40. [J]橘皮征

答案：若皮下淋巴管被乳腺癌细胞堵塞，引起淋巴回流障碍，出现真皮水肿，乳房皮肤呈“橘皮样”改变。

41. [L]列举呼吸机过程中高压报警与低压报警的常见的原因。

答案：高压报警常见原因：呼吸道分泌物增多：湿化效果不好刺激呼吸道：呼吸机管道受压或打折，管道内积水过多：病人气道痉挛或有病情变化（气胸、支气管痉挛、肺水肿等）：病人激动、烦躁：气道内痰堵、异物堵塞或气囊脱落堵塞气管插管（后者见于老式气管插管）。低压报警常见原因：气囊稀气、充气不足或破裂造成：呼吸机管路（包括接水瓶、湿化罐等）破裂、断开或接头衔接不紧造成稀气：气源不足造成通气量下降：病人通气量不足时，设置方式参数不正确。

42. [L]列举呼吸机使用过程中出现人机对抗的原因。

答案：人机呼吸对抗原因：开始用机不适应：自主呼吸过强，烦躁不配合：咳嗽、疼痛；通气不足或通气过度：出现气胸、肺不张、气管痉挛、循环功能异常等并发症：呼吸机故障。

43. [L]列举呼吸机使用过程中高压报警与低压报警的常见的原因。

答案：高压报警常见原因：呼吸道分泌物增多：湿化效果不好刺激呼吸道：呼吸机管道受压或打折，管道内积水过多：病人气道痉挛或有病情变化（气胸、支气管痉挛、肺水肿等）：病人激动、烦躁：气道内痰堵、异物堵塞或气囊脱落堵塞气管插管（后者见于老式气管插管）。低压报警常见原因：气囊漏气、充气不足或破裂造成：呼吸机管路（包括接水瓶、湿化罐等）破裂、断开或接头衔接不紧造成漏气：气源不足造成通气量下降：病人通气量不足时，设置方式参数不

正确，

44. [L]列举使用呼吸机过程中出现人机对抗的原因。

答案：人机呼吸对抗原因：开始用机不适应，自主呼吸过强，烦躁不配合：咳嗽、疼痛：通气不足或通气过度：出现气胸，肺不张、气管痉挛、循环功能异常等并发症：呼吸机故障。

45. [N]男，39岁，司机，3小时前因两车相撞，上腹部被方向盘撞击，出现腹部剧痛，不能行走，不能直立，头晕心慌，眼前发黑，并有呕吐。查体：T36.0℃...L，RBC2X10<sup>10</sup>/L。诊断性腹腔穿刺抽出不凝固血液18ml。

问：（1）目前医疗诊断是什么？（2）如何处理？（3）目前的护理措施有哪些？

答案：（1）闭合性腹部损伤，脾破裂？低血容量性休克早期。

（2）抗休克的同时准备急诊手术。

（3）密切观察病情变化开放快速补液，平卧位或仰卧中凹位，禁食、胃肠减压，术前准备，心理护理，对症护理。

46. [N]男性，20岁，1周前无明显诱因出现右上腹胀痛，伴间断恶心、呕吐，吐胃内容物。入院前3天起，疼痛加重，呕吐次数增加，伴少量排气排便，查体：T3...尾炎行阑尾切除术。

问：（1）该病人目前的医疗诊断是什么？

（2）目前的治疗原则是什么？（3）列出2个主要护理诊断。（4）主要护理措施有哪些？

答案：（1）粘连性肠梗阻，等渗性缺水。

（2）非手术治疗。

（3）护理诊断：疼痛：与肠梗阻有关；体液不足：与呕吐、失液有关。

护理措施：禁食，半卧位，胃肠减压护理，腹痛的护理，呕吐的护理，补液的护理，抗菌药的应用，病情的观察。

47. [N]女性，27岁，教师，婚后1年，因大便次数增多，肛门坠胀感，血便、脓血便2年，到医院就诊，直肠指诊：距肛缘4cm触及一环行肿物，质硬、活动度差，推指指套有染血。病理检查示“直肠低分化腺癌”。问：可能选择的



手术方式？为什么？术前应做哪些准备？

答案：可能行经腹会阴联合直肠癌切除术，因病理检查示“直肠低分化腺癌”，且肿块距肛缘4cm。术前准备：心理护理，加强营养；肠道准备：阴道冲洗；术日晨放置胃管及尿管；选择合适的造口位置。

48. [N] 女性，37岁，因右乳乳腺癌在全麻下行乳腺癌改良根治术，现为术后第1天，病人T37.4℃、P88次/分、R24次/分、BP125/80mmHg... 家人和护士诉说不能接受一侧乳房切除的事实。

问：（1）列出病人目前2个主要的护理诊断/问题。（2）叙述病人患侧上肢的护理要点及功能锻炼方法。

答案：护理诊断：（1）疼痛：与手术切有关。（2）（进食、卫生、如厕）自理缺陷：与术后患侧上肢活动受限有关。（3）自我形象紊乱：与乳癌根治术切除一侧乳房有关。（4）潜在并发症：出血、患侧上肢水肿、皮下积液、皮瓣坏死等。

患侧上肢的护理要点：术后3日内患侧上肢制动，避免外展，保持内收姿势；注意观察患侧上肢末端皮肤颜色、温度、有无肿胀；抬高患肢，避免在患上肢进行穿刺、量血压等操作。

49. [N] 女性，40岁，因甲状腺癌行甲状腺大部分切除术及局部淋巴结清扫术，术后10小时，病人出现颈部肿大，烦躁不安，呼吸困难，发绀，脉搏102次/分，伤口纱布上有渗血。问：病人现在出现了哪种并发症？可能的原因？应如何处理？

答案：病人出现了呼吸困难、窒息，可能的原因包括：①切口内出血：②喉头水肿：③痰液阻塞：④气管塌陷（甲状腺被大部分切除后，长期受压软化的气管失去支撑而塌陷）：⑤双侧喉返神经损伤。该病人出现颈部肿大，烦躁不安，呼吸困难、发绀，伤口渗血，考虑应是切口出血引起。应立即查看伤口，查明原因，通知医师，必要时散开伤口清除血肿，结扎血管，若情况仍不能改善，可进行环甲膜穿刺或

气管切开。

50. [N] 女性，45岁，突发上腹痛6小时，伴高热，皮肤巩膜发黄。既往：胆总管结石2年。体检：一般情况差，T39.8℃，P126次/分，R24次/分，B... urphy征（+），肠鸣音弱。问：（1）医疗诊断是什么？（2）目前治疗原则是什么？（3）列举目前2个护理诊断/问题。（4）护理要点有哪些？

答案：（1）急性梗阻性化脓性胆管炎。（2）应在抗休克基础上，行胆总管切开减压手术。（3）护理诊断：疼痛：与急性梗阻性化脓性胆管炎有关。体温过高：与急性梗阻性化脓性胆管炎有关。潜在并发症：感染性休克。（4）护理措施：立即开放静脉，补充液体，纠正休克，遵医嘱应用抗菌药物，观察病情变化，尽快进行术前准备。

51. [Q] 倾倒综合征

答案：系由于胃大部切除术后，失去原有的控制胃排空的幽门窦、幽门括约肌及十二指肠球部解剖结构，又因部分病人胃肠吻合口过大，导致胃排空过速所产生的一系列综合征。

52. [S] 肾癌三联症

答案：肾癌病人出现血尿、腰痛和肿块，在临床上常称为“肾癌三联症”。

53. [S] 肾绞痛

答案：因结石、血块等原因引起输尿管完全梗阻时，出现肾绞痛。典型的绞痛位于腰部或上腹部，沿输尿管走向向小腹和会阴部放射，可至大腿内侧；性质为阵发性绞痛，程度剧烈。

54. [T] 体外循环

答案：是指使用特殊装置将人体静脉血引出体外，进行人工气体交换、温度调节和过滤等处理，再泵入人体动脉内的一项生命支持技术。

55. [X] 习惯性脱位

答案：创伤性脱位后，关节囊及韧带松弛或在骨附着处被撕脱，使关节不稳定，轻微外

力即可导致反复多次再脱位。

56. [Z] 脂肪栓塞综合征

答案：股骨干等粗大骨发生骨折时，髓腔内血肿张力过大，骨髓被破坏，脂肪滴经破裂的静脉窦进入血液循环，导致肺或脑脂肪栓塞综合征。病人可有进行性呼吸困难、发绀、心率加快、血压降低等表现，严重时甚至导致病人死亡。

57. [Z] 直腿抬高试验阳性

答案：腰椎间盘突出症病人由于神经根受压或粘连影响了活动度，仰卧被动直腿抬高患肢60°以内即出现坐骨神经痛，称直腿抬高试验阳性。

58. [Z] 中心静脉压

答案：中心静脉压是指胸腔内上、下腔静脉或右心房内的压力，主要反映右心功能与静脉回心血量之间的平衡关系。

59. [Z] 中心型肺癌

答案：起源于主支气管、肺叶支气管的癌肿，位置靠近肺门者称为中心型肺癌。

60. [Z] 周围型肺癌

答案：上系指发生于肺段以下支气管直到细小支气管的肺癌。