

国开电大 2025《园艺基础》期末考试题库小抄（按字母排版）

总题量 (272): 单选题(135) 多选题(15) 判断题(122)

单选题(135) 微信号: zydz\_9527

1. [A] 安全级别最高的食品是( )。答案: 有机食品
2. [A] 按波士顿分类分析法划分出的四个不同的产品中最应淘汰的是( )。答案: 瘦狗产品
3. [A] 按果树栽培学分类, 橄榄属于( )。答案: 核果类果树
4. [A] 按果树栽培学分类, 杠果属于( )。答案: 核果类果树
5. [A] 按果树栽培学分类, 柠檬属于( )。答案: 柑果类果树
6. [A] 按生态适应性分类, 苹果属于( )。答案: 温带果树
7. [A] 按生长习性分类, 猕猴桃属于( )。答案: 藤本果树
8. [A] 按生长习性分类, 无花果属于( )。答案: 灌木果树
9. [B] 白菜、甘蓝是( )。答案: 异花授粉植物
10. [B] 播种深度一般为种子横径的( )。答案: 2~5倍
11. [B] 播种深度一般为种子横径的( )倍。答案: 2~5
12. [B] 不允许使用化肥和化学合成农药的食品是( )。答案: 有机食品
13. [C] 菜豆、豇豆的支架常采用( )。答案: 篱架
14. [C] 草本植物扦插的插条一般长( )。答案: 7~10cm
15. [C] 常见的整形修剪技术不包括( )。答案: 断根
16. [C] 常在设施栽培中用于防止茄果类蔬菜落花落果。答案: 2, 4-D
17. [C] 春季修剪时, 为促进新梢萌发可以采用( )方法。答案: 刻芽
18. [D] 大白菜属于( )。答案: 结球叶菜类
19. [D] 大葱属于( )。答案: 耐寒性植物
20. [D] 地下水位高的地块适宜做成( )栽培植物。答案: 高畦
21. [D] 对控制土传病害最有效的轮作方式是( )。答案: 粮菜轮作
22. [D] 对于多数园艺植物种子来说, 发芽条件中( )不是必须的。答案: 光照
23. [D] 对于干旱地块或栽培较深的植物, 适宜做成( )。答案: 沟畦
24. [E] 二年生植物的营养生长时期中, 只有( )和一年生植物的生长发育特点是一样的。答案: 发芽期

25. [F] 番茄、菜豆属于( )。答案: 喜温植物
26. [F] 番茄的分枝属于( )。答案: 合轴分枝
27. [F] 番茄的分枝属于( )。答案: 合轴分枝
28. [F] 肥效发挥最快的施肥方法是( )。答案: 叶面喷施
29. [G] 干旱地块或栽培根系较深的植物适宜做成( )。答案: 沟畦
30. [G] 钢材或钢管结构大棚可以没有( )。答案: 立柱
31. [G] 观赏树木整形时很少采用的树形是( )。答案: 小冠疏层形
32. [G] 观赏树木整形时很少采用的树形是( )。答案:
33. [G] 果树或观赏树木的定植穴深度和直径一般要求达到( )。答案: 80cm
34. [G] 果树施基肥的最佳时期是( )。答案: 秋季
35. [H] 花粉采集后暂时存放的适宜温度是( )。答案: 0~4°C
36. [H] 花卉种植面积排名不在前五位的国家是( )。答案: 以色列
37. [H] 黄瓜的花芽分化属于( )。答案: 不定期分化型
38. [J] 茄果类、瓜类、豆类等, 在( )就已经进行花芽分化。答案: 幼苗期
39. [J] 茄果类、瓜类、豆类等, 在( )进行花芽分化。答案: 幼苗期
40. [J] 减轻连作障碍最好的方法是( )。答案: 轮作
41. [J] 较为理想的土壤组成为固相占( )。答案: 50%
42. [J] 解决连作障碍最有效的方法是( )。答案: 轮作
43. [J] 芥菜属于( )。答案: 辛香叶菜类
44. [J] 可以促进分生新枝。答案: 短截
45. [M] 名词解释(匹配题); 顶端优势答案: 指活跃的顶端分生组织(顶芽或顶端的腋芽)抑制下部侧芽发育的现象。
46. [M] 名词解释(匹配题); 分株育苗答案: 就是把某些植物的鳞茎、球茎、吸芽、匍匐茎与走茎、珠芽、蘖芽、块根、根茎及块茎等, 从母株上分割下来, 将其部分或整个另行栽植而使其独立形成新植株的繁殖方式。
47. [M] 名词解释(匹配题); 花期调控答案: 是根据植物开花习性与生长发育规律, 人为地改变花卉生长环境条件并采取某些特殊技术措施, 使之提前或推迟开花, 这种技术措施称为花期调控。
48. [M] 名词解释(匹配题); 花芽分化答案: 指叶芽的生理和组织状态向花芽的生理和组织状态转化的过程, 是植物从营养生长向生殖生长过渡的形态标志。
49. [M] 名词解释(匹配题); 嫁接答案: 指将植物体的一部分枝或芽, 接到另一植物体上, 培育成为一株新的植株的繁殖方法。
50. [M] 名词解释(匹配题); 节水栽培答案: 是在农作物增产、稳产的前提下, 探求最充分地利用天然降水和土壤蓄水, 减少灌溉用水量的栽培技术措施。
51. [M] 名词解释(匹配题); 绿色食品答案: 是遵循可持续发展原则, 按照特定生产方式, 经过专门机构认定, 许可使用绿色食品标志商标的无污染的安全、优质、营养类食品。
52. [M] 名词解释(匹配题); 免耕法答案: 是指对土壤表面不耕作或极少耕作, 利用化学除草剂来控制杂草生长的土壤管理方法。

56. [M] 名词解释（匹配题）；  
农产品地理标志答案：是指标示农产品来源于特定地域，产品品质和相关特征主要取决于自然生态环境和历史人文因素，并以地域名称冠名的特有农产品标志。
57. [M] 名词解释（匹配题）；  
扦插答案：指利用植物营养器官（茎、叶、根）的再生能力或分生机能，将其从母体上切取，在适宜条件下，促使其发生不定芽和不定根，成为新植株的繁殖方法。
58. [M] 名词解释（匹配题）；  
生草法答案：是在果树的行间种植草类而不进行耕作的土壤管理方法。种植多年生草（经过筛选的）或只行间带状种草，定期刈割控制其生长。
59. [M] 名词解释（匹配题）；  
生命周期答案：植物的生长发育存在着明显的周期现象，从生到死的生长发育全过程称为生命周期。
60. [M] 名词解释（匹配题）；  
土壤物理性状答案：是指那些凭外貌和触感就可获知的土壤性质，如土层厚度、矿物质颗粒大小、通透性等。
61. [M] 名词解释（匹配题）；  
无土栽培答案：指不用天然土壤，而用营养液浇灌栽培的方法。
62. [M] 名词解释（匹配题）；  
休眠答案：指植物体或其器官在发育的某个时期生长和代谢暂时停顿的现象，是植物为适应不良环境（低温、高温、干旱等）在长期的个体发育进程中形成的一种特性。
63. [M] 名词解释（匹配题）；  
有机食品答案：是指来自于有机农业生产体系，根据国际有机农业生产要求和相应标准生产、加工，符合国际或国家有机食品要求和标准，并通过独立的有机食品认证机构认证的一切农副产品及其加工品。
64. [M] 名词解释（匹配题）；  
园艺学答案：是研究园艺植物生长发育规律和
- 栽培管理技术的科学，是园艺产业的理论基础。
65. [M] 名词解释（匹配题）；  
园艺植物植株管理答案：就是对园艺植物植株生长的控制，包括对植株大小、植株形状、生长势强弱等的控制。
66. [M] 名词解释（匹配题）；  
植物组织培养答案：指在无菌条件下，将离体的植物器官（如茎、叶、花、果、茎尖等）、组织（如形成层、表皮、皮层、髓部细胞、胚乳等）、细胞（如大孢子、小孢子及体细胞）以及原生质体，培养在人工培养基上和人工控制的环境中，使其生长、分化、增殖，甚至长出新植株的过程和技术。
67. [M] 名词解释（匹配题）；  
种植制度答案：亦称“栽培制度”，是在当地自然条件、经济条件、生产条件下，根据作物的生态适应性确定一年或几年内所采用的作物种植体系。
68. [M] 木本花卉不包括（ ）。答案：芍药
69. [N] 南瓜、西瓜是典型的（ ）。答案：耐旱植物
70. [N] 能自叶上发生不定芽及不定根的园艺植物繁殖方式是（ ）。答案：叶插
71. [P] 苹果套袋一般在（ ）进行。答案：6月生理落果后
72. [P] 葡萄的茎属于（ ）。答案：攀缘茎
73. [Q] 企业派推销员直接同目标市场的顾客建立联系的促销方式叫（ ）。答案：人员推销
74. [Q] 企业为了鼓励顾客大量购货、淡季购货，常降低基本价格，这种定价策略叫（ ）。答案：折扣策略
75. [Q] 茄子的分枝属于（ ）类型。答案：假二叉分枝
76. [Q] 全球70%的（ ）来自中国。答案：梨
77. [R] 仁果类和核果类的四次落果中，（ ）落果也叫月落果。答案：第三次
78. [S] 设施栽培中需人工辅助授粉的是（ ）。答案：西瓜
79. [S] 设施栽培中需人工辅助授粉的蔬菜为（ ）。答案：西瓜
80. [S] 生产者直接将产品销售给消费者而无任何中间商介入的销售属于（ ）。答案：短渠道
81. [S] 生长季内多次浅耕耘，松土除草的土壤管理方法称为（ ）。答案：清耕法
82. [S] 使用同类中间商越少的销售叫（ ）。答案：窄渠道
83. [S] 适于绿化园林中水面或浅水沼泽地的观赏植物是（ ）。答案：荷花
84. [S] 适于在绿化园林中水面或浅水沼泽地栽培的观赏植物是（ ）。答案：荷花
85. [S] 蔬菜定植后蹲苗的时间一般为（ ）。答案：10 ~15 天
86. [S] 疏花疏果的作用不包括（ ）。答案：提高坐果率
87. [S] 属于加温温室的是（ ）。答案：北京改良温室
88. [W] 为让瓜叶菊等长日照植物花期提前，常采用（ ）措施。答案：补光
89. [W] 为让菊花元旦开放，需采用（ ）措施。答案：补光
90. [W] 为迅速打开产品销路，扩大销售量，通常采用（ ）。答案：低价策略
91. [W] 无土栽培中营养液的酸碱度一般在（ ）。答案：5.5~6.5
92. [W] 物理和化学性质最好的土壤是（ ）。答案：壤土
93. [W] 物理性质和化学性质最好的土壤是（ ）。答案：壤土
94. [X] 下列变态器官中，（ ）是地上茎变态。答案：球茎甘蓝
95. [X] 下列观赏植物中，（ ）属于地中海气候型。答案：郁金香
96. [X] 下列观赏植物中，（ ）属于观芽类。答案：银芽柳
97. [X] 下列果树在我国的种植面积居世界第一位的是（ ）。答案：梨
98. [X] 下列果园中，生产的果品品质最好是（ ）。答案：山地果园
99. [X] 下列类型的根中，（ ）不会发生变态。答案：须根
100. [X] 下列蔬菜中，（ ）不属于茎类。答案：芹菜
101. [X] 下列蔬菜中，（ ）淀粉含量最高。答案：山药
102. [X] 下列蔬菜中，（ ）属于根菜类。答案：牛蒡
103. [X] 下列属于用块根繁殖的是（ ）。答案：大丽花
104. [X] 下列属于用球茎繁殖的是（ ）。答案：唐菖蒲
105. [X] 下列选项中，不属于果实采前管理的是（ ）。答案：追肥
106. [X] 下列选项中，不属于果实套袋的作用的是（ ）。答案：增加含糖量
107. [X] 下列选项中，（ ）不属于植株调整内容。答案：定植
108. [X] 下列选项中，（ ）常被用于密植果园。答案：细长纺锤形
109. [X] 下列选项中，属于用球茎繁殖的是（ ）。答案：唐菖蒲
110. [X] 下列元素中，属于大量元素的是（ ）。答案：钾
111. [X] 下列元素中，属于微量元素的是（ ）。答案：锌
112. [X] 现代果园采取较多的土壤管理方法是（ ）。答案：生草法
113. [Y] 一、二年生花卉分期播种，分批开花的控花法属于（ ）。答案：栽培管理控花法
114. [Y] 一般春季硬枝扦插时上顶芽要

( )。答案：与地面平齐

115. [Y]一般热水浸种的温度是( )。答案：70~75 °C

116. [Y]一般蔬菜定植缓苗后应( )。答案：控制浇水

117. [Y]一般小粒种子采用的播种方法是( )。答案：撒播

118. [Y]一般硬枝春插时顶芽要( )。答案：与地面平齐

119. [ ]( )用于能自叶上发生不定芽及不定根的园艺植物种类。答案：叶插

120. [Y]育苗条件最好的设施是( )。答案：温室

121. [Y]育苗条件最好的设施是( )。答案：温床

122. [Y]月季的花芽分化属于( )。答案：多次分化型

123. [Z]在观赏植物消费中，( )产品的消费比例最大。答案：鲜切花

124. [Z]在露地生产中很少搭架栽培的蔬菜是( )。答案：西瓜

125. [Z]在适度荫蔽下方能生长良好的植物叫做( )。答案：阴性植物

126. [Z]在我国，生产种植区域最广的果树是( )。答案：葡萄

127. [Z]在我国，种植区域最广的果树是( )。答案：葡萄

128. [Z]在植物必需的营养元素中，( )属于微量元素。答案：铁

129. [Z]在植物对温度的基本要求中，( )不属于三基点温度。答案：生长积温

130. [Z]枝接一般在( )进行。答案：春季

131. [Z]植物组织培养的营养液成分中，属于无机物的是( )。答案：水

132. [Z]紫藤的茎属于( )。答案：缠绕茎

133. [Z]最理想最节水的灌溉方法是( )。答案：地下灌溉

134. [Z]最适宜安排相邻种植的茬口是( )。答案：西瓜-大葱

135. [Z]作为大果型的富士苹果，留果时参考的枝果比为( )。答案：5~6 : 1

多选题(15)微信号: zydz\_9527

1. [D]对于多数园艺植物种子来说，发芽条件中( )是必须的。答案：温度;水分;氧气

2. [H]花期调控的主要技术有( )。答案：光照处理;温度处理;种植期调节;药剂调控;

3. [L]落叶果树中，属于浆果类的果树有( )。答案：草莓;猕猴桃

4. [P]胚的形态结构包括( )。答案：胚芽;胚根;子叶

5. [S]设施栽培中需辅助授粉的是( )。答案：草莓;西瓜

6. [S]生产者直接将产品销售给消费者而无任何中间商介入的销售属于( )。答案：短渠道;直接渠道

7. [S]属于分株育苗的是( )。答案：利用块根;利用走茎;利用珠芽

8. [S]属于根菜类的是( )。答案：胡萝卜;牛蒡

9. [S]属于耐热植物的有( )。答案：冬瓜;西瓜

10. [X]下列变态器官中，( )是地上茎变( )。答案：球茎甘蓝;茭白

11. [X]下列类型的根中，( )不属于变态根。答案：根瘤;菌根

12. [X]下列选项中，( )常被用于密植果园。答案：圆柱形;细长纺锤形

13. [X]下列选项中，用鳞茎繁殖的是( )。答案：水仙;郁金香

14. [Y]有机食品允许使用( )。答案：

生物菌肥;绿肥;生物农药

15. [Z]在扦插繁殖中，茎插包括( )。答案：芽叶插;嫩枝扦插;硬枝扦插

判断题(122)微信号: zydz\_9527

1. [0]二年生园艺植物幼苗期的生长发育特点和一年生植物的幼苗期是一样的。( )

答案：否

2. [2]2,4-二氯苯氧乙酸(简称2,4-D) 常用于防止茄果类蔬菜落花落果。( )

答案：√

3. [A]安全级别最高的食品是绿色食品。( )

答案：否

4. [A]按果树栽培学分类，草莓属于仁果类果树。( )

答案：否

5. [A]按果树栽培学分类，杧果属于核果类果树。( )

答案：√

6. [A]按生态适应性分类，柑橘类属于亚热带果树。( )

答案：是

7. [A]按生态适应性分类，荔枝属于亚热带果树。( )

答案：否

8. [A]按生长习性分类，柿子属于灌木果树。( )

答案：×

9. [A]按生长习性分类，柿子属于灌木果树。( )

答案：是

10. [B]播种深度一般为种子横径的2~5倍。( )

答案：是

11. [B]不定期分化型每年只分化一次花芽。( )

答案：√

12. [B]不定期分化型每年只分化一次花芽。( )

答案：×

13. [B]不允许使用化肥和化学合成农药的食品是无公害食品。( )

答案：否

14. [B]不允许使用化肥和化学合成农药的食品是无公害食品。( )

答案：×

15. [C]草本植物扦插的插条长度一般大于20cm。( )

答案：否

16. [C]草莓、苹果果实食用的主要部分是花托。( )

答案：是

17. [C]草莓、苹果果实食用的主要部分是花托。( )

答案：√

18. [C]常见的果树修剪方法不包括拉枝。( )

答案：×

19. [C]常见的整形修剪技术不包括拉枝。( )

答案：否

20. [C]赤霉素常在设施栽培中用于防止蔬菜落果。( )

答案：否

21. [D]大白菜属于普通叶菜类。( )

答案：是

22. [D]大蒜、马铃薯的休眠属于芽休眠。( )

答案：是

23. [D]地理标志产品是具有地域专利保护的产品。( )

答案：√

24. [D]冬季修剪中的短截可以改善通风透光条件。( )

答案：√

25. [D]对控制土传病害最有效的轮作方式是粮菜轮作。( )

答案：是

26. [D]对控制土传病害最有效的轮作方式是粮菜轮作。( )

答案：√

27. [D]对于多数园艺植物种子来说，发芽条件中光照不是必需的。( )

答案：是

28. [D]对于干旱地块或栽培较深的植物，适宜做成高畦。( )

答案：否

29. [D]对于干旱地块或栽培较深的植物，适宜做成高畦。( )

答案：×

30. [F]肥效发挥最快的施肥方法是叶面喷施。( )

答案：是

31. [F]肥效发挥最快的施肥方法是叶面喷施。( )

答案：√

32. [G]钙属于大量元素。( )

答案：否

33. [G]柑橘类果树、兰科花卉等喜欢微碱性土壤。( )

答案：×

34. [G]钢材或钢管结构大棚可以没有立柱。( )

答案：是

35. [G]给果实贴字属于果实采前管理的范畴。( )

答案：是

36. [G]给果实贴字属于果实采前管理的范畴。 ( ) 答案: √
37. [G]果实套袋可以增加含糖量。 ( ) 答案: 否
38. [G]果实套袋可以增加含糖量。 ( ) 答案: ×
39. [G]果实套袋一般在谢花后进行。 ( ) 答案: ×
40. [G]果树或观赏树木的定植穴深度和直径一般要求达到80 cm。 ( ) 答案: 是
41. [G]果树或观赏树木的定植穴深度和直径一般要求达到80 cm。 ( ) 答案: √
42. [G]果树施基肥的最佳时期是秋季。 ( ) 答案: 是
43. [G]果树施基肥的最佳时期是秋季。 ( ) 答案: √
44. [G]果树枝接一般在夏季进行。 ( ) 答案: 否
45. [H]荷花适于水面绿化或浅水沼泽地栽培。 ( ) 答案: 是
46. [H]胡萝卜是主根发生变态的结果。 ( ) 答案: 是
47. [H]胡萝卜是主根发生变态的结果。 ( ) 答案: √
48. [J]茄果类、瓜类、豆类等,在发棵期(抽蔓期)进行花芽分化。 ( ) 答案: 否
49. [J]较为理想的土壤组成为固相占75%。 ( ) 答案: 否
50. [J]较为理想的土壤组成为固相占75%。 ( ) 答案: ×
51. [J]解决连作障碍最有效的方法是轮作。 ( ) 答案: 是
52. [J]解决连作障碍最有效的方法是轮作。 ( ) 答案: √
53. [K]控水也可以达到植株调整的目的。 ( ) 答案: 是
54. [L]辣椒的分枝方式属于合轴分枝。 ( ) 答案: 否
55. [L]辣椒的分枝方式属于合轴分枝。 ( ) 答案: ×
56. [L]梨在我国的种植面积居世界第一位。 ( ) 答案: 是
57. [L]梨在我国的种植面积居世界第一位。 ( ) 答案: √
58. [L]利用块根、块茎进行繁殖属于分株育苗。 ( ) 答案: 是
59. [L]鳞茎菜类属于叶菜类蔬菜。 ( ) 答案: √
60. [L]硫属于微量元素。 ( ) 答案: 否
61. [L]绿色食品不允许使用任何人工合成的化学肥料和化学农药。 ( ) 答案: 否
62. [M]马铃薯是地上茎变态。 ( ) 答案: 否
63. [M]美人蕉是用球茎繁殖的。 ( ) 答案: 否
64. [N]南瓜、西瓜是典型的耐旱植物。 ( ) 答案: 是
65. [N]南瓜、西瓜是典型的耐旱植物。 ( ) 答案: √
66. [N]能自叶上发生不定芽及不定根的园艺植物繁殖方式是叶插。 ( ) 答案: 是
67. [N]年平均温度是影响园艺植物分布的主要因子。 ( ) 答案: √
68. [N]牛蒡属于根菜类。 ( ) 答案: 是
69. [P]胚是植物的原始体。 ( ) 答案: √
70. [P]棚架形常被用于密植果园。 ( ) 答案: 否
71. [P]葡萄的茎属于缠绕茎。 ( ) 答案: 否
72. [P]葡萄分枝属于单轴分枝。 ( ) 答案: 否
73. [Q]芹菜属于茎菜类。 ( ) 答案: 否
74. [R]人工点授最节省花粉用量。 ( ) 答案: 是
75. [R]人工点授最节省花粉用量。 ( ) 答案: √
76. [R]仁果类和核果类果树的四次落果中,第三次落果也叫6月落果。 ( ) 答案: 是
77. [S]芍药是木本花卉。 ( ) 答案: 否
78. [S]设施栽培中西瓜需要人工辅助授粉。 ( ) 答案: 是
79. [S]设施栽培中西瓜需要人工辅助授粉。 ( ) 答案: √
80. [S]生长季内多次浅耕耘,松土除草的土壤管理方法称为生草法。 ( ) 答案: 否
81. [S]蔬菜定植后蹲苗的时间一般为10~15天。 ( ) 答案: 是
82. [S]蔬菜定植后蹲苗的时间一般为10~15天。 ( ) 答案: √
83. [S]疏花疏果可以提高坐果率。 ( ) 答案: 否
84. [S]所有灌溉方法中喷灌是用水量最多的。 ( ) 答案: 否
85. [S]所有灌溉方法中喷灌是用水量最多的。 ( ) 答案: ×
86. [T]桃树比较适合自然开心形的树形。 ( ) 答案: 是
87. [T]桃树比较适合自然开心形的树形。 ( ) 答案: √
88. [T]套作可以充分利用生长季节,提高复种指数。 ( ) 答案: √
89. [T]土壤含水量为田间最大持水量的60%~80%时,最适宜园艺植物根系生长。 ( ) 答案: √
90. [W]为让菊花元旦开放,需采用补光措施。 ( ) 答案: 是
91. [W]为让菊花元旦开放,需采用补光措施。 ( ) 答案: √
92. [W]无土栽培中营养液的pH一般为5.5~6.5。 ( ) 答案: 是
93. [W]无土栽培中营养液的pH一般为5.5~6.5。 ( ) 答案: √
94. [W]物理和化学性质最好的土壤是黏土。 ( ) 答案: 否
95. [X]西瓜在露地栽培中很少搭架。 ( ) 答案: √
96. [X]细胞数量的多少是果实增大的基础。 ( ) 答案: √
97. [X]现代果园采用较多的土壤管理方法是深耕法。 ( ) 答案: 否
98. [X]现代果园采用较多的土壤管理方法是深耕法。 ( ) 答案: ×
99. [X]修剪方法中,拉枝有利于树体通风透光。 ( ) 答案: √
100. [Y]芽菜类都是植物种子萌发长出的嫩芽。 ( ) 答案: ×
101. [Y]以色列是花卉种植面积排名在前五位的国家。 ( ) 答案: 否
102. [Y]以色列是花卉种植面积排名在前五位的国家。 ( ) 答案: ×
103. [Y]一般春季硬枝扦插时顶芽要露出地表。 ( ) 答案: 否
104. [Y]一般露地春季硬枝扦插时顶芽要露出地表。 ( ) 答案: ×
105. [Y]一般热水浸种的温度是80~85℃。 ( ) 答案: 否
106. [Y]一般蔬菜定植缓苗后应控制浇水。 ( ) 答案: 是
107. [Y]吲哚乙酸、萘乙酸等可以促进园艺植物扦插生根。 ( ) 答案: √
108. [Y]郁金香属于中国气候型。 ( ) 答案: 否
109. [Y]育苗条件最好的设施是温室。 ( ) 答案: 是
110. [Y]园艺植物栽培中上下茬口不能为同科植物。 ( ) 答案: 是
111. [Y]园艺植物栽培中上下茬口最好不是同科植物。 ( ) 答案: √
112. [Y]月季的花芽分化属于不定期分化型。 ( ) 答案: 否

113. [Y]月季的花芽分化属于夏秋分化型。

( ) 答案: 否

114. [Z]在观赏植物消费中, 观叶植物产品的消费比例最大。 ( ) 答案: 否

115. [Z]在观赏植物消费中, 观叶植物产品的消费比例最大。 ( ) 答案: ×

116. [Z]在我国, 种植区域最广的果树是葡萄。 ( ) 答案: 是

117. [Z]在园艺植物组织培养中, 继代培养主要是为了增加数量。 ( ) 答案: ✓

118. [Z]在植物的营养成分中, 硫属于微量元素。 ( ) 答案: ×

119. [Z]在植物组织培养中, 继代培养的主要目的是增加数量。 ( ) 答案: ✓

120. [Z]遮光处理可促进长日照植物的花芽分化。 ( ) 答案: ×

121. [Z]植物连作可以减轻病虫害的发生。  
( ) 答案: ×

122. [Z]作为大果型的富士苹果, 留果时参考的枝果比为7~8:1。 ( ) 答案: 否