

【题目】患者，26岁。瘦高体型，突发胸痛，深呼吸时加重，伴呼吸困难，无发热，无咳嗽、咳痰，该患者的诊断可能为

【答案】A. 自发性气胸

【题目】男性，29岁。持续发热两周，食欲减退，腹胀，尿少、色黄。查体：巩膜轻度黄染，肺有少许湿啰音，肝肋下1cm，脾肋下1.5cm。血常规：WBC $2.8 \times 10^9/L$ ，N40%，L60%。ALT 180U/L，TBil $34.2 \mu\text{mol/L}$ ，HBsAg（-）。肥达反应：O 抗体1：80，H 抗体1：160。该患者最可能的诊断是

【答案】B. 伤寒

【题目】男性，56岁。有高血压病史10年，急起言语不清，口角歪斜，左侧肢体活动障碍3小时。为明确诊断，首选辅助检查中的

【答案】A. 头部CT扫描

【题目】患者，男，49岁，间断上腹疼痛2年，疼痛发作与情绪、饮食有关。查体：上腹部轻压痛。胃镜：胃窦皱襞平坦，黏膜粗糙无光泽，黏膜下血管透见。此病例首先考虑诊断为

【答案】D. 慢性萎缩性胃炎

【题目】女性患者，2岁。法洛四联症患者，查体：口唇发绀，该患者的发绀属于

【答案】B. 心性混合性发绀

【题目】男性患者。突发腹痛，剧烈难忍，查体发现肝浊音界消失，该患者的诊断可能是

【答案】A. 急性胃肠穿孔

【题目】女性，58岁，近20天出现经常饥饿、多食，口渴、多尿、夜尿增多，体重下降。查体无特殊阳性发现。化验：空腹血糖8mmol/L，餐后2小时血糖12mmol/L，尿糖+。诊断考虑

【答案】A. 糖尿病

【题目】女性，26岁。胸廓视诊见患侧胸部饱满，其可能的诊断是

【答案】A. 气胸

【题目】Ⅲ度房室传导阻滞及病窦的患者，最好的治疗是

【答案】D. 心脏起搏

【题目】女性，20岁。淋雨后出现发热伴寒战、左侧胸痛、咳嗽伴铁锈色痰，胸片示

左肺下叶大片状致密影。可能的病因为

【答案】B. 肺炎球菌肺炎

【题目】男性，67岁。慢性萎缩性胃炎病史30年，近半年出现不规律上腹痛，食欲差，消瘦，黑便。查体：贫血貌，上腹压痛。该患者可能的诊断是

【答案】A. 胃癌

【题目】女性，25岁。反复少量咯血伴低热、乏力、盗汗3个月。咯血加重3天来诊。1小时前咯鲜血一次约300ml，无胸痛、气短。该患者潜在最危险的并发症是

【答案】A. 窒息

【题目】某男，60岁。突发胸前后压榨性剧痛，呈持续性伴窒息感，大汗淋漓，面色苍白，恶心、呕吐。最可能的诊断是

【答案】A. 心肌梗死

【题目】患者男，64岁。上腹隐痛不适1年，无规律，服抗酸药无效。3天前解黑便1次。近半年来体重下降6kg。目前，首先要做的检查是

【答案】B. 胃镜

【题目】经化验证实为甲型流感病毒感染，首选药物是

【答案】B. 奥司他韦

【题目】一早产儿胎龄33周，娩出过程顺利。因早产送新生儿病房监护下列哪种情况不易发生

【答案】D. 红细胞增多症

【题目】患儿，3岁。既往体健，住进食来冻过程中突然出现呼吸困难，口唇发绀，现场应首先采取的急救措施是

【答案】D. 海姆立克急救法

【题目】成人心肺复苏中，关于胸外心脏按压技术，叙述错误的是

【答案】C. 按压、放松的时间比为2：1

【题目】16岁少女，骑自行车时不慎摔伤，自觉外阴部胀痛难忍，最可能的诊断是

【答案】B. 大阴唇血肿

【题目】近预产期孕妇患急性肾盂肾炎治疗措施不包括

【答案】D. 体温降至正常后3天停药

【题目】35岁，因接触性出血就诊，查宫颈中度糜烂，刮片有核异质，进一步检查为

【答案】B. 阴道镜指导下活检

【题目】女性，25岁。29周妊娠，阴道突然大量流血、休克，疑为前置胎盘，以下检查最合适的是

【答案】D. B型超声检查

【题目】孕妇，37岁，G_P1。已婚，孕14周，曾生育过唐氏儿，现来我院行遗传咨询。该患者目前应行的最佳检查是

【答案】B. 羊水穿刺+胎儿染色体核型分析

【题目】男，50岁，突起呼吸困难，咳粉红色泡沫痰，血压190/100 mmHg 该患者的最佳治疗药物是

【答案】C. 硝普钠

【题目】男性，57岁，胸闷伴下肢水肿2个月，心电图V₁~V₄导联Qs波，最迫切的辅助检查是

【答案】C. 超声心动图

【题目】患者女，72岁。出现黑便。查体见蜘蛛痣及肝掌。该患者的黑便是由于

【答案】D. 肝硬化

【题目】患者男，20岁。低热、盗汗、咳嗽、血痰一月。胸片示右上肺小片状浸润影，密度不均。确诊应选择的检查是

【答案】D. 痰检抗酸杆菌

【题目】心肌梗死患者运动试验中有q波的寻联出现sT段抬高常提示

【答案】C. 室壁运动异常

【题目】女性，育龄期，一年来渐进性面色苍白、乏力，实验室检查:

HGB 52 g/L,WBC 4.0x10¹²/L,加清铁 5.76 mmol/L，转铁蛋白饱和度 8%，HGBA22.0%。最可能的诊断是

【答案】D. 缺铁性贫血

【题目】一老年女性，昏迷原因待查。血压12/8 kPa(90/60mmHg)，血糖4.1mmol/L，FT₃: 1.2 ng/L,TSH:2.14mU/L。该患者昏迷最可能的原因是

【答案】B. 甲状腺功能减退危象

【题目】10个月劳累，突发惊厥，无热，反复发作3次，惊厥后神志清楚活泼如常。

患儿为人工喂养，极少户外活动，未服鱼肝油。查体:出牙延迟，郝氏沟明显，方颅，血钙1.0mmo/L。最确切的诊断为

【答案】D. 维生素D缺乏性手足搐搦症

【题目】男，52岁，高血压史15年，天里饮酒后，出现剧烈头痛，随即转入昏迷。查体:BP180/110mmHg，心率65次/分，眼底检查见视网膜出血，双侧瞳孔不等大，双侧巴氏征阳性，诊断最可能为

【答案】A. 脑出血

【题目】早孕期妇女，无明显不适，来常规产前检查发现:外阴黏膜充血，阴道内大量黄色豆渣样分泌物。下列哪项诊断可能性最大

【答案】B. 念珠菌性阴道炎

【题目】以下描述不正确的是

【答案】B. 弥漫浸润型胃癌可见“火山口”征

【题目】流行性脑脊髓膜炎的综合性预防措施正确的是

【答案】A.早期发现和隔离治疗病人

【题目】男性，34岁，羊病入院，诊断:骨盆骨折及左胫骨开放性骨折。此时患者最容易发生的并发症是

【答案】A. 休克

【题目】女性，52岁，反复中上腹疼痛5年余，多于进餐后30分钟开始，至下一餐前缓解，劳累或季节改变可有疼痛加剧，近2d粪便黑色、成形。粪隐血(+++)，最可能的诊断是

【答案】A. 胃溃疡并出血

【题目】38男性，25岁。尿道流脓伴尿痛2天。起病前3天有冶游史。查体:尿道口轻度红肿，可见中量的黄色分泌物，内裤有污秽。最可能的诊断是

【答案】C. 淋病

【题目】男，16岁。颈部肿大1年，无怕热、多食、易激动。查体:脉率、血压正常，甲状腺弥漫性肿大，质地柔软，未触及结节，表面光滑。采用的最佳治疗措施是

【答案】A. 多吃含碘丰富的食物

【题目】支气管哮喘急性发作患者进行血气分析，其中PaCO₂增高提示

【答案】C. 病情恶化

【题目】女性，60岁。刺激性干咳，持续痰中带血2个月。无发热及咳嗽痰史。查体无发绀，但杵状指（趾）明显。最可能的诊断是

【答案】D. 支气管肺癌

【题目】男性，26岁。酗酒后出现上腹部持续疼痛8小时，阵发加剧，伴恶心呕吐。最可能的诊断为

【答案】D. 急性胰腺炎

【题目】一足月新生儿负压吸引娩出后2小时出现躁动不安，全身肌肉痉挛，继而松弛并出现昏迷，可能的诊断是

【答案】C. 新生儿颅内出血

【题目】6个月的婴儿患化脓性脑膜炎，疑有硬膜下积液。为明确诊断，首先需做下列哪项检查

【答案】D. 颅骨透照检查

【题目】ST段抬高性心肌梗死，其心电图表现不包括

【答案】D. 肺型P波

【题目】体内缺铁性贫血最终阶段的诊断依据是

【答案】D. 典型的小细胞低色素性贫血

【题目】下列哪项不是功能失调性子宫出血的原因

【答案】C. 卵巢囊肿

【题目】乳腺癌患者中Her-2过度表达的比例是

【答案】C. 20%~30%

【题目】根据微循环的变化，可以把休克分为三期，其中不包括

【答案】C. 休克的恢复期

【题目】关于PPD试验方法及结果的判断下列哪项是错误的

【答案】D. 阴性可排除结核

【题目】引起小儿疱疹性口腔炎最常见的病原体是

【答案】C. 单纯疱疹病毒Ⅰ型

【题目】新生儿的特点下列哪项应除外

【答案】C. 液免疫功能较完善

【题目】下列哪项是早产儿肺透明膜病的常见临床表现

【答案】D. 以上都是

【题目】先天性甲状腺功能减退症的主要病因是

【答案】A. 甲状腺不发育或发育不全

【题目】1岁正常男孩进行体格检查，其标准身长约是

【答案】D. 75 cm

【题目】以下哪一年龄段乳牙未萌出可以称为出牙延迟

【答案】A. >13个月

【题目】小儿下呼吸道容易感染的解剖因素中，错误的是

【答案】D. 毛细血管与淋巴组织间隙较成人为窄

【题目】在正常情况下新生儿于生后排出胎便时间为

【答案】A. 50%新生儿12 h内有胎便排出，24 h内几乎全部有胎便排出

【题目】要了解肺内微细结构连续肺小叶时需要哪项检查

【答案】A. 高分辨CT

【题目】调整血脂药物，主要降低血甘油三酯的是

【答案】C. 非诺贝特

【题目】以下原发性醛固酮增多症的临床表现中，何者最具特征性

【答案】C. 高血压同时有低钾血症

【题目】下列哪种情况不导致呼吸功增加

【答案】D. 气管切开

【题目】多发性内分泌腺瘤病2型中最常见并最早出现的病变是

【答案】C. 甲状腺髓样癌

【题目】下列关于糖耐量试验正确的是

【答案】D. 服用葡萄糖后30、60、120分钟分别抽血1次做糖定量测定

【题目】抗休克治疗中纳洛酮发挥作用主要是通过拮抗

【答案】C. β -内啡肽

【题目】与肺水肿诊断无关的是

【答案】D. 特异性的病原体

【题目】在类风湿关节炎的临床特征中，下列哪一项不符合

【答案】A. 远端指间关节肿痛

【题目】MODS 最常见的病因是

【答案】B. 严重感染

【题目】类风湿关节炎的主要临床表现是

【答案】C. 对称性小关节肿痛伴晨僵

【题目】符合右心室肥大的心电图表现是

【答案】C. $R_{aVR} > 0.5mV$ ， $R_{V1} > 1.0mV$ ， $V1$ 导联 QRS 波群呈 R_s 型

【题目】诊断 GH 缺乏性侏儒症时，身高的年均生长率应小于

【答案】C. 4 cm

【题目】糖尿病的诊断是糖尿病症状加上随机血糖

【答案】D. 11.1 mmol/L

【题目】移植肾发生急性排斥反应时，最明显的征象是

【答案】A. 移植肾体积迅速增大

【题目】急性胰腺炎患者如果呕吐频繁可引起

【答案】A. 代谢性碱中毒

【题目】慢性胃炎最可靠的诊断方法是

【答案】D. 胃镜+活组织病理检查

【题目】关于咳嗽，描述正确的是

【答案】D. 支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重，并伴咳嗽

【题目】常用于内分泌功能减退的动态功能试验是

【答案】A. 兴奋试验

【题目】监控糖尿病患者血糖控制水平的最佳指标是

【答案】B. 糖化血红蛋白

【题目】儿童特有的骨折类型是

【答案】C. 青枝骨折

【题目】下列不是引起下消化道出血的病因的是

【答案】D. 消化性溃疡

【题目】进行直流电除颤的能量是

【答案】D. 200 J

【题目】流行性出血热进入多尿期的指征

【答案】C. 尿量 24 小时大于 500ml

【题目】霍奇金病最常见的首发症状是

【答案】A. 颈部和锁骨上淋巴结肿大

【题目】胸腔积液较多时，首次抽液量般不超过

【答案】C. 600ml

【题目】急性胰腺炎诊断中，不正确的是

【答案】D. 血清淀粉酶值高低与病情轻重成正比

【题目】下列哪项不是引起肝硬化患者贫血的原因

【答案】C. 雌激素增多

【题目】下列有关伤寒临床表现的叙述不典型的是

【答案】D. 腹泻

【题目】关于造血干细胞的描述，正确的是

【答案】B. 造血干细胞具有自我更新和增殖分化的能力

【题目】典型的原发型肺结核，x 线胸片表现为

【答案】A. 哑铃状阴影

【题目】鼠疫的基本病理改变为

【答案】C. 淋巴管、血管内皮细胞损害和急性出血坏死性炎症

【题目】关于心底的描述，正确的是

【答案】B. 朝向右后上方，由大部分左心房及小部分右心房组成

【题目】肺结核最重要的传播方式

【答案】D. 飞沫传播

【题目】结核杆菌是需氧菌，在缺氧环境中

【答案】C. 不能繁殖，但仍能生存很长时间

【题目】体层摄影最常用于

【答案】D. 气管、支气管、肺

【题目】属于支气管扩张特异性的临床表现为

【答案】D. X线胸片显示左下肺纹理紊乱，多个不规则环状透光区伴卷发状阴影

【题目】下列关于十二指肠球后溃疡说法中错误的是

【答案】D. 对药物治疗反应好

【题目】上消化道大出血出现明显休克失血量常超过循环血量的

【答案】B. 0.2

【题目】判断心力衰竭代偿期的主要指标是

【答案】D. 心排量增加甚至接近正常

【题目】传染性非典型肺炎患者外周血象检查，正确的是

【答案】D. 外周血白细胞计数不升高，或降低，淋巴细胞计数减少

【题目】引起非复杂尿路感染最常见的细菌为

【答案】B. 大肠埃希菌

【题目】皮肤色泽变黑，不常见于

【答案】D. 嗜铬细胞瘤

【题目】下面哪项不属于出血性脑卒中的治疗

【答案】D. 降血压

【题目】血小板减少性紫癜的出血特点是

【答案】A. 反复皮肤瘀点、瘀斑

【题目】原发性醛固酮增多症最常见的病因是

【答案】A. 醛固酮瘤

【题目】急性肺源性心脏病最常见的病因是

【答案】A. 肺动脉栓塞

【题目】诊断缺铁性贫血的必要条件

【答案】B. 小细胞低色素贫血：男性 Hb < 120 g/L，女 Hb < 110 g/L；MCV < 80 fl，

MCH < 27pg，MCHC < 0.32；红细胞形态可有明显低色素表现

【题目】糖尿病代谢紊乱的原因不包括

【答案】D. 肝糖输出减少

【题目】原发性与继发性三叉神经痛的主要鉴别依据是

【答案】C. 有无面部痛觉障碍，角膜反射有无改变

【题目】关于肾癌的流行病学统计，下列正确的是

【答案】C. 高发年龄以 50 ~ 60 岁居多

【题目】关于胰腺 CT 断面解剖论述错误的里肝脏肿大患者，医生用手压迫肝脏时出现颈静脉怒张更明显，称为肝颈静脉回流征阳性，是

【答案】D. 胰颈位于胰头、体之间，肠系膜动脉前方，前缘可见边缘凹入

【题目】下列哪一种疾病的征象

【答案】A. 右心衰竭肝淤血症

【题目】肺癌最常见的类型是

【答案】A. 腺癌

【题目】有关 2 型糖尿病正确的是

【答案】B. 常以慢性并发症为首发症状

【题目】肾囊肿的正确分类方法是

【答案】C. 肾囊肿分为孤立性肾囊肿、多发性肾囊肿和多囊肾三类

【题目】SLE 最常见的致死原因是

【答案】D. 肾衰竭

【题目】发生气管损伤时，首先的处理是

【答案】B. 清除呼吸道积血，保持呼吸道通畅

【题目】颅内压增高的容积代偿主要有赖于

【答案】C. 脑脊液被排出颅外

【题目】人体 MRI 最常用的成像原子核是

【答案】A. 氢原子核

【题目】易发生休克的骨创伤是

【答案】C. 股骨干骨折

【题目】在我国，肝硬化最常见的原因是

【答案】A. 病毒性肝炎后肝硬化

【题目】胆囊切除术的手术指征不包括

【答案】D. 无症状的单发胆囊结石

【题目】有关肝内胆管结石的描述中恰当的是

【答案】C. 一侧肝管阻塞可不出现黄疸

【题目】低钾血症可引起

【答案】B. 碱中毒

【题目】关于脑脓肿下面哪项说法不正确

【答案】D. 如在脑脓肿的脓汁中查细菌一定能查到

【题目】肾积脓又称脓肾，是指

【答案】A. 肾严重感染所致广泛的化脓性病变，肾实质全部破坏形成一个积聚脓液的囊腔

【题目】早期胃癌的概念是

【答案】B. 局限于黏膜或黏膜下层管内

【题目】纤维胃镜可应用于以下疾病，除了

【答案】A. 胃切除

简述生理性黄疸和病理性黄疸的区别。

【参考作答】生理性黄疸的特点:①一般情况良好;②黄疸持续时间短,足月儿<2周,早产儿<4周;③每日血清胆红素升高<85umol/L(5mg/dl)或每小时<0.85umol/L(0.5mg/dl)。而病理性黄疸的特点为:①生后24h内出现黄疸;②血清总胆红素已达到相应光疗干预标准或每日上升>85umol/L(5mg/d)或每小时>0.85umol/L(0.5mg/d);③黄疸持续时间长,足月儿>2周,早产儿>4周;④黄疸很而复现;⑤血清结合胆红素>34umol/L(2mg/dl)。

乳腺癌皮肤改变的特征有哪些?

【参考作答】1)“酒窝征”:随着肿瘤增大,可引起乳房局部隆起,若累及Cooper韧带,使其收缩而致肿瘤表面皮肤凹陷,称为“酒窝征”,是乳腺癌早期征象;(2)“橘皮样”改变:若癌细胞阻塞皮下淋巴管,引起淋巴回流障碍,出现真皮水肿,皮肤呈“橘皮样”改

变;(3)卫星结节:乳腺癌晚期,癌细胞沿淋巴管、腺管或纤维组织浸润到皮内并生长,在主癌灶周围的皮肤形成散在分布的质硬结节,即“皮肤卫星结节”;(4)溃疡形成:有时皮肤可破溃形成溃疡,伴有恶臭、出血。

昏迷按程度可分为哪几个阶段?

【参考作答】昏迷按程度可分为三个阶段:(1)轻度昏迷:意识大部分丧失,无自主运动,对声、光刺激无反应,对疼痛刺激尚可出现痛苦表情或肢体退缩等防御反应(2)中度昏迷:对周围事物及各种刺激均无反应,对剧烈刺激可出现防御反射。角膜反射减弱,瞳孔对光反射迟钝,眼球无转动。(3)深度昏迷:全身肌肉松弛,对各种刺激均无反应。深、浅反射全部消失。

试述支气管哮喘典型发作的表现?

【参考作答】(1)症状:典型的表现是发作性伴有哮鸣音的呼气性呼吸困难。严重者被迫采取坐位或呈端坐呼吸,干咳或咯大量白色泡沫痰甚至出现发绀等。哮喘症状可在数分钟内发作,经数小时至数天,用支气管扩张药或自行缓解。在夜间及凌晨发作或加重是哮喘的特征之一。(2)体征:发作时可呈肺气肿征、有广泛的哮鸣音、呼气音延长、可闻及湿啰音。

简述肺结核的分型。

【参考作答】(1)原发型肺结核。(2)血行播散型肺结核。(3)继发型肺结核:①浸润型肺结核;②空洞型肺结核;③结核球;④干酪样肺炎;⑤纤维空洞型肺结核。(4)结核性胸膜炎。(5)其他肺外结核;(6)菌阴肺结核。

简述2型糖尿病的诊断标准。

【参考作答】(1)有糖尿病症状,并且任意血糖>11.1mmol/L。(2)空腹血糖≥7.0mmol/L。(3)糖耐量试验2h血糖≥211.1mmol/L。OGTT仍按世界卫生组织的要求进行。符合上述标准之一的患者,在另一天重复上述检查,若仍符合条标准之一者即诊断为糖尿病。休克的概念及分类。简答题易休克(shock)是由多种原因所引起机体有效循环血量减少、组织灌注不足、导致细胞缺氧、代谢紊乱和功能受损为主要病理生理改变的临床综合征,有效循环血量是锐减是其共同特点。按病因将休克分为低血容量性、心源性、感染性、过敏性、神经性休克等。

外科常见的是低血容量性和感染性休克。简述传染病的预防措施。

【参考作答】传染病的预防措施包括下列三项:①管理传染源:对患者及病原体携带者实施管理:要求早发现,早诊断,早报告、早隔离、早治疗。②切断传播途径:针对传染病的不同传播途径采取不同的措施。③保护易感人群:提高人群非特异性免疫力;通过疫苗、菌苗预防接种,提高人群的特异性主动免疫力;通过接受注射抗毒素、丙种球蛋白或高滴度免疫球蛋白提高人群的特异性被动免疫力。

试述肝癌的诊断标准。

【参考作答】国际上广泛使用的肝癌诊断标准，满足下列三项中的任一项，即可诊断为肝癌。①具有两种典型的肝癌影像学(超声、增强 CT、MRI 或选择性肝动脉造影)表现，病灶>2cm。②肝脏活检阳性。③一项典型的肝癌影像学表现，病灶>2cm，AFP>400ng/ml。

简述我国慢性肾衰竭的分期。

【参考作答】根据肾小球功能降低的程度，将慢性肾衰竭分为 4 期:(1)肾功能不全代偿期，肾单位受损未超过正常的 50%，肾小球滤过率(GFR)为 50~80ml/min，肌酐能维持正常的水平，一般为 133~177μmol/L，临床上无症状;(2)肾功能不全失代偿期及氮质血症期，GFR 为 20~50ml/min，肌酐升高，一般为 178~442μmol/L，临床上出现乏力、轻度贫血、食欲减退等症状;(3)肾衰竭期，GFR 下降至 10~20ml/min，肌酐显著升高，为 443~707μmol/L，患者出现贫血、代谢性酸中毒、钙磷代谢紊乱、水、电解质紊乱，并可有轻度胃肠道、心血管、中枢神经系统症状(4)尿毒症期血肌酐>442μmol/L 血尿素氮>21.4mmol/L.常出现各种尿毒症症状，如明显贫血、严重恶心、呕吐以及各种神经系统并发症，甚至昏迷，明显水盐代谢和酸碱平衡紊乱。当每分钟 C_{cr} <10ml，血肌酐>707μmol/L 称终末期，也称尿毒症晚期。

1.强直性脊柱炎临床诊断标准之一为腰痛、晨僵 2 个月以上，活动改善，休息无改善。

答案：B.错误

2.乙型肝炎有三对抗原抗体系统，即血中 HBSAG 和抗-HBS，HBeAG 和抗-HBe、HBCAG 和抗-HBC。

答案：A.正确

3.干啰音为一种持续时间较长带乐性的呼吸附加音，音调较高，持续时间较长，吸气及呼气时均可听及。

答案：A.正确

4.甲亢多见于女性.临床主要表现为甲状腺毒症、弥漫性甲状腺肿、眼征、胫前黏液性水肿;实验室检查可见 T3、T4 升高，TSH 降低。

答案：A.正确

5.呼吸衰竭按照动脉血气分析分为Ⅰ型呼吸衰竭(缺氧型呼吸衰竭)和Ⅱ型呼吸衰竭(高碳酸型呼吸衰竭)。

答案：A.正确

6.NICU 中出生体重 <1500g 或胎龄不足 32 周的早产儿，易发生何种类型颅内出血

答案：D..脑室周围-脑室内出血

7.小儿下呼吸道容易感染的解剖因素中，错误的是

答案：D.毛细血管与淋巴组织间隙较成人窄

8.关于骨盆狭窄正确的是

答案：D..骨盆狭窄是导致正常足月胎儿分娩异常的重要因素

9.水和钠虽同时缺失，但缺水多于缺钠，称为

答案：B.高渗性缺水

10.急性脊髓炎最常见的自主神经紊乱症状是

答案：A.尿潴留和便秘

11.男性，57 岁，胸闷伴下肢水肿 2 个月，心电图 V1~V4 导联 QS 波，最迫切的辅助检查是

答案：C.超声心动图

12.子宫内膜癌侵犯宫颈首选的治疗

答案：B.广泛性子官切除及盆腔淋巴结清除术

13.男性，25 岁。尿道流脓伴尿痛 2 天。起病前 3 天有冶游史。查体：尿道口轻度红肿，可见中量的黄色分泌物，内裤有污秽。最可能的诊断是

答案：C.淋病

14.脾静脉血流占门静脉血流的

答案：B.0.2

15.关于胎心音正确的是

答案：A.妊娠 18~20 周用一般听筒可经孕妇腹壁听到

16.急性心肌梗死（AMI）的一般治疗包括下述几方面，除了

答案：D.功能锻炼

17.下列对 HP（幽门螺杆菌）的描述错误的是

答案：D.HP 可以人畜共患

18.MRI 检查的禁忌证为

答案：D.以上都是

19.典型肠梗阻有腹痛、呕吐、腹胀及肛门停止排气排便四大症状。

答案: A.正确

20.下列不是引起下消化道出血的病因的是

答案: D.消化性溃疡

21.小儿最容易发生哪种类型肺结核

答案: A.原发性肺结核

22.产后出血是指

答案: A.胎儿娩出后 24h 内阴道流血量超过 500ml

23.皮肤色泽变黑，不常见于

答案: D.嗜铬细胞瘤

24.10 个月男婴，突发惊厥，无热，反复发作 3 次，惊厥后神志清楚，活泼如常。患儿为人工喂养，极少户外活动，未服鱼肝油。查体：出牙延迟，郝氏沟明显，方颅，血钙 1.0mmol/L。最确切的诊断为

答案: D.维生素 D 缺乏性手足搐搦症

25.对于 HIV，用目前试剂检测平均"窗口期"为

答案: B.22 天

26.法洛四联症最重要的畸形是

答案: A..肺动脉狭窄

27.III 度子宫脱垂是指

答案: D.子宫颈与子宫体完全脱出于阴道口外

28.慢性胃炎最可靠的诊断方法是

答案: D.胃镜+活组织病理检查

1.肾结石主要的临床表现为腰痛和血尿，手术取石是治疗首选方法。

答案: B.错误

2.甲状腺癌中乳头状癌最常见，该类型分化好，生长缓慢，恶性程度低，较早出现颈部淋巴结转移。

答案: A.正确

3.甲亢多见于女性,临床主要表现为甲状腺毒症、弥漫性甲状腺肿、眼征、胫前黏液性

水肿;实验室检查可见 T3、T4 升高，TSH 降低。

答案: A.正确

4.肾病综合征实验室诊断要点为 24h 尿蛋白定量大于 3.5g;血浆白蛋白小于 30g/L。

答案: A.正确

5.类风湿性关节炎的典型表现为对称性关节炎，常累及小关节，为多个关节受累。具体表现为关节晨僵、疼痛与压痛、肿胀、畸形和功能障碍。

答案: A.正确

6.盆腔炎症性疾病多发生在

答案: C.性活跃期妇女

7.下列有关伤寒临床表现的叙述，不典型的是

答案: D.腹泻

8.在正常情况下新生儿于生后排出胎便时间为

答案: A.50%新生儿 12h 内有胎便排出，24h 内几乎全部有胎便排出

9.痢疾的传染源是以下哪项

答案: D.慢性病人及带菌者如从事饮食、供水工作，有可能引起暴发流行

10.不是阴道正常微生物群的微生物是

答案: D.衣原体

11.男性，57 岁，胸闷伴下肢水肿 2 个月，心电图 V1～V4 导联 QS 波，最迫切的辅助检查是

答案: C.超声心动图

12.干啰音为一种持续时间较长带乐性的呼吸附加音，音调较高;，持续时间较长，吸气及呼气时均可听及。

答案: A.正确

13.类风湿关节炎的主要临床表现是

答案: C.对称性小关节肿痛伴晨僵

14.胸外按压的正确位置是

答案: D.两乳头连线中点

15.35 岁，因接触性出血就诊，查宫颈中度糜烂，刮片有核异质，进一步检查为

答案: B.阴道镜指导下活检

16.结核杆菌是需氧菌，在缺氧环境中

答案: C.不能繁殖，但仍能生存很长时间

17.目前多数人同意的围生期概念是

答案: C.妊娠 28 周～产后 7 天

18.小儿发热最常见的原因

答案: D.感染

19.低钾血症可引起

答案: B.碱中毒

20.脑脓肿的形成是一个连续的过程，它可划分为几个阶段

答案: B.3

21.高尖而对称的、基底部较窄的所谓"帐篷 T"，见于

答案: D.高血钾

22.女性，60 岁。刺激性干咳，持续痰中带血 2 个月。无发热及咳脓痰史。查体无发绀，但杵状指（趾）明显。最可能的诊断是

答案: D.支气管肺癌

23.血尿伴排尿时痛，尿流中断或排尿困难见于

答案: B.膀胱结石

24.关于孕妇体内代谢改变，下列哪项正确

答案: B.基础代谢率于孕晚期增加 15%～20%

25.下列各项，与妊娠剧吐有关的激素是

答案: C.绒毛膜促性腺激素

26.上消化道大出血出现明显休克，失血量常超过循环血量的

答案: B.0.2

27.男，16 岁。颈部肿大 1 年，无怕热、多食、易激动。查体：脉率、血压正常，甲状腺弥漫性肿大，质地柔软，未触及结节，表面光滑。采用的最佳治疗措施是

答案: A.多吃含碘丰富的食物

28.抗休克治疗中纳洛酮发挥作用主要是通过拮抗

答案: C.β-内啡肽

1.肾母细胞瘤主要见于青少年，临床表现以腹部肿块最常见。

答案: B.错误

2.类风湿性关节炎的典型表现为对称性关节炎，常累及小关节，为多个关节受累。具体表现为关节晨僵、疼痛与压痛、肿胀、畸形和功能障碍。

答案: A.正确

3.肺结核化学治疗的原则是早期、规律、全程、适量、联合。

答案: A.正确

4.甲状腺癌中滤泡状腺癌占成人甲状腺癌 60%和儿童甲状腺癌的全部

答案: B.错误

5."橘皮样"改变是乳腺癌的早期征象。

答案: B.错误

6.关于无排卵性异常子宫出血的病理改变，错误的是

答案: D.月经第 5 天诊刮可见到增生期及分泌期混合的子宫内膜

7.患者出现持续性的肌无力，对骨骼肌进行肌电图检查的主要目的是

答案: B.确定骨骼肌病变是神经源性还是肌源性

8.慢性胃炎最可靠的诊断方法是

答案: D.胃镜+活组织病理检查

9.佝偻病性手足搐搦症主要由于

答案: D.维生素 D 缺乏而甲状旁腺反应迟钝

10.1 岁正常男孩进行体格检查，其标准身长约是

答案: D.75cm

11.女性，26 岁。胸廓视诊见患侧胸部饱满，其可能的诊断是

答案: A.气胸

12.干啰音为一种持续时间较长带乐性的呼吸附加音，音调较高，持续时间较长，吸气及呼气时均可听及。

答案：A.正确

13..葡萄胎处理后应避孕几年

答案：A.1 年

14.淋病的临床表现， 正确的是

答案：D..急性淋菌性盆腔炎多在月经期或经后 1 周内发病

15.男，16 岁。颈部肿大 1 年，无怕热、多食、易激动。查体：脉率、血压正常，甲状腺弥漫性肿大，质地柔软，未触及结节，表面光滑。采用的最佳治疗措施是

答案：A.多吃含碘丰富的食物

16.下列关于十二指肠球后溃疡说法中错误的是

答案：D.对药物治疗反应好

17.胆囊切除术的手术指征不包括

答案：D.无症状的单发胆囊结石

18.小儿下呼吸道容易感染的解剖因素中， 错误的是

答案：D.毛细血管与淋巴组织间隙较成人为窄

19.下列最不可能为肾盂肾炎复发原因的是

答案：D.喝水减少

20.子宫肌瘤的症状与下述何项关系密切

答案：D.肌瘤与肌层的关系（黏膜下、浆膜下、壁间）

21.对于 HIV，用目前试剂检测平均"窗口期"为

答案：B.22 天

22.哪些检查可确诊先天愚型

答案：B.染色体检查

23.下列关于发热的叙述， 错误的是

答案：B.发热的寒战期体温低于正常

24.下列各项， 与妊娠剧吐有关的激素是

答案：C.绒毛膜促性腺激素

25.纤维胃镜可应用于以下疾病，除了

答案：A.胃切除

26.小儿发热最常见的原因因为

答案：D..感染

27.羊水过多合并正常胎儿时

答案：D.羊水量多而无明显症状时为增加胎龄可以观察

28.男性，29 岁。持续发热两周，食欲减退，腹胀，尿少、色黄。查体：巩膜轻度黄染，肺有少许湿啰音，肝肋下 1cm，脾肋下 1.5cm。血常规：WBC2.8×10⁹/L，N40%，L60%。ALT180U/L，TBiL34.2μmol/L，HBsAg（-）。肥达反应：O 抗体 1：80，H 抗体 1：160。该患者最可能的诊断是

答案：B.伤寒

1.急性乳腺炎的全身临床表现寒战、高热，脉率加快，白细胞计数增高。

答案：A.正确

2.腹泻病是由单病原、单因素引起的以大便次数增多和大便性状改变为特点的消化道综合征。

答案：B.错误

3.肾结石主要的临床表现为腰痛和血尿，手术取石是治疗首选方法。

答案：B.错误

4.呼吸衰竭按照动脉血气分析分为Ⅰ型呼吸衰竭(缺氧型呼吸衰竭)和Ⅱ型呼吸衰竭(高碳酸型呼吸衰竭)。

答案：A.正确

5.肾病综合征实验室诊断要点为 24h 尿蛋白定量大于 3.5g;血浆白蛋白小于 30g/L。

答案：A.正确

6.心肺复苏时，胸外按压的最佳频率为

答案：A.每分钟 120 次

7.引起子宫脱垂最常见的原因应为

答案：D.产伤

8.出生体重 1000 克的早产儿.在生后 10 天内保暖箱温度（中性温度）以下列哪一项为最适合

答案：D..35℃

9.属于支气管扩张特异性的临床表现为

答案：D.X线胸片显示左下肺纹理紊乱，多个不规则环状透光区伴卷发状阴影

10.典型的原发型肺结核，X线胸片表现为

答案：A.哑铃状阴影

11.关于双胎妊娠，以下哪项正确

答案：C.容易并发前置胎盘和胎盘早剥

12.一足月新生儿负压吸引娩出后 2 小时出现躁动不安，全身肌肉痉挛，继而松弛并出现昏迷，可能的诊断是

答案：C..新生儿颅内出血

13.有关恶性高热的描述，不正确的是

答案：B.为免疫缺陷性疾病

14.下列不属于初步病情评估目的是

答案：B.指导用药原则

15.女性患者，2 岁。法洛四联症患者，查体：口唇发绀，该患者的发绀属于

答案：B.心性混合性发绀

16.关于造血干细胞的描述，正确的是

答案：B.造血干细胞具有自我更新和增殖分化的能力

17.妊娠图不包括

答案：C.心率

18..妊娠晚期合并急性病毒性肝炎者，应给予重视和积极治疗，主要是因为

答案：B.容易发展为重症肝炎，孕产妇死亡率增高

19.子宫肌瘤临床分类标准为

答案：D.按肌瘤与子宫肌层的关系分类

20.急性脊髓炎最常见的自主神经紊乱症状是

答案：A.尿潴留和便秘

21.III度房室传导阻滞及病窦的患者，最好的治疗是

答案：D.心脏起搏

22.患者男，64 岁。上腹隐痛不适 1 年，无规律，服抗酸药无效。3 天前解黑便 1 次。近半年来体重下降 6kg。目前，首先要做的检查是

答案：B.胃镜

23.发生气管损伤时，首先的处理是

答案：B.清除呼吸道积血，保持呼吸道通畅

24.以下实验室检查哪项不支持 AIDS 诊断

答案：D..CD4/CD8 > 1.0

25.DIC 时发生的贫血是

答案：D.溶血性贫血

26.关于艾滋病，以下错误的是

答案：A.HIV 感染到发病呈急性过程

27.患者，女性，51 岁，肺结核伴咯血，最危险的并发症是

答案：A.窒息

28.无排卵性异常子宫出血临床上最常见的症状是子宫不规则出血，表现为月经周期紊乱，经期长短不一，经量多少不定或增多，甚至大量出血。

答案：A.正确