

2. 癌症患者中度疼痛，可选用（（2））。

3. 癌症患者重度疼痛，首选（...阿片类药物，并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物

C. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物，并可联合应用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物;1答案：C

3. [1]1. 癌症患者轻度疼痛，可选用（（1））。

2. 癌症患者中度疼痛，可选用（（2））。

3. 癌症患者重度疼痛，首选（...阿片类药物，并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物

C. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物，并可联合应用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物;2答案：A\$~~\$B

4. [1]1. 奥美拉唑属于（（1））

2. 枸橼酸铋钾属于（（2））

3. 雷尼替丁属于（（3））

4. 甲氧氯普胺属于（（4））

A. H⁺-K⁺-ATP酶抑制药

B. H₂受体抑制剂

C. 促胃肠动力药

D. 胃黏膜保护药;0答案：A

5. [1]1. 奥美拉唑属于（（1））

2. 枸橼酸铋钾属于（（2））

3. 雷尼替丁属于（（3））

4. 甲氧氯普胺属于（（4））

A. H⁺-K⁺-ATP酶抑制药

B. H₂受体抑制剂

C. 促胃肠动力药

D. 胃黏膜保护药;1答案：D

6. [1]1. 奥美拉唑属于（（1））

2. 枸橼酸铋钾属于（（2））

3. 雷尼替丁属于（（3））

4. 甲氧氯普胺属于（（4））

A. H⁺-K⁺-ATP酶抑制药

B. H₂受体抑制剂

C. 促胃肠动力药

D. 胃黏膜保护药;2答案：B

7. [1]1. 奥美拉唑属于（（1））

2. 枸橼酸铋钾属于（（2））

3. 雷尼替丁属于（（3））

4. 甲氧氯普胺属于（（4））

A. H⁺-K⁺-ATP酶抑制药

B. H₂受体抑制剂

C. 促胃肠动力药

D. 胃黏膜保护药;3答案：B\$~~\$C

8. [1]1. 不良反应为胃肠道反应、头晕、乏力、泌尿生殖系统减弱的是（（1））

2. 不良反应为肝肾毒性、高尿酸血症、多毛及牙龈增生的是（...4. 不良反应为严重贫血和伴肾功能损伤者应用后出现感染的是（（4））

A. 环孢素A

B. 他克莫司

C. 烷化剂

D. 吗替麦考酚酯;0答案：C

9. [1]1. 不良反应为胃肠道反应、头晕、乏力、泌尿生殖系统减弱的是（（1））

2. 不良反应为肝肾毒性、高尿酸血症、多毛及牙龈增生的是（...4. 不良反应为严重贫血和伴肾功能损伤者应用后出现感染的是（（4））

A. 环孢素A

B. 他克莫司

C. 烷化剂

D. 吗替麦考酚酯;1答案：A

10. [1]1. 不良反应为胃肠道反应、头晕、乏力、泌尿生殖系统减弱的是（（1））

2. 不良反应为肝肾毒性、高尿酸血症、多毛及牙龈增生的是（...4. 不良反应为严重贫血和伴肾功能损伤者应用后出现感染的是（（4））

A. 环孢素A

B. 他克莫司

C. 烷化剂

D. 吗替麦考酚酯;2答案：B

11. [1]1. 不良反应为胃肠道反应、头晕、乏力、泌尿生殖系统减弱的是（（1））

2. 不良反应为肝肾毒性、高尿酸血症、多毛及牙龈增生的是（...4. 不良反应为严重贫血和伴肾功能损伤者应用后出现感染的是（（4））

A. 环孢素A

B. 他克莫司

C. 烷化剂

D. 吗替麦考酚酯;3答案：D

12. [1]1. 刺激胰岛素的早期分泌降低餐后血糖（（1））

2. 直接作用糖的代谢过程，促进糖的无氧解酵，增加葡萄糖的利用（（2））...外源性给与GLP-1，加强葡萄糖依赖性促胰岛素分泌的特性（（4））

A. 二甲双胍

B. 吡格列酮

C. 瑞格列奈

D. 西格列汀;0答案：C

13. [1]1. 刺激胰岛素的早期分泌降低餐后血糖（（1））

2. 直接作用糖的代谢过程，促进糖的无氧解酵，增加葡萄糖的利用（（2））...外源性给与GLP-1，加强葡萄糖依赖性促胰岛素分泌的特性（（4））

A. 二甲双胍

B. 吡格列酮

C. 瑞格列奈

D. 西格列汀;1答案：A

14. [1]1. 刺激胰岛素的早期分泌降低餐后血糖（（1））

2. 直接作用糖的代谢过程，促进糖的无氧解酵，增加葡萄糖的利用（（2））...外源性给与GLP-1，加强葡萄糖依赖性促胰岛素分泌的特性（（4））

A. 二甲双胍

国开电大 2025《11475 7056 7407 药物治疗学》期末考试题库小抄（按字母排版）

总题量（787）:单选题(643)判断题(10)填空题(67)主观题(67)

单选题(643)微信号: zydz_9527

1. [1]1. 癌症患者轻度疼痛，可选用（（1））。

2. 癌症患者中度疼痛，可选用（（2））。

3. 癌症患者重度疼痛，首选（...阿片类药物，并可合用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物

C. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药物，并可联合应用非甾体类抗炎药物以及辅助镇痛药物;0答案：A\$~~\$B

2. [1]1. 癌症患者轻度疼痛，可选用（（1））。

- B. 吡格列酮
C. 瑞格列奈
D. 西格列汀;2答案: B

15. [1]1. 刺激胰岛素的早期分泌降低餐后血糖 (1)
2. 直接作用糖的代谢过程, 促进糖的无氧酵解, 增加葡萄糖的利用 (2) 外源性给与GLP-1, 加强葡萄糖依赖性促胰岛素分泌的特性 (4)
A. 二甲双胍
B. 吡格列酮
C. 瑞格列奈
D. 西格列汀;3答案: D

16. [1]1. 促凝血因子活性药物 (1)
2. 提供凝血因子的药物 (2)
3. 抗纤溶药物 (3)
4. 促血小板生成药物 (4)
A. 凝血酶原复合物
B. 重组人血小板生成素
C. 维生素K
D. 氨甲环酸;0答案: C

17. [1]1. 促凝血因子活性药物 (1)
2. 提供凝血因子的药物 (2)
3. 抗纤溶药物 (3)
4. 促血小板生成药物 (4)
A. 凝血酶原复合物
B. 重组人血小板生成素
C. 维生素K
D. 氨甲环酸;1答案: A

18. [1]1. 促凝血因子活性药物 (1)
2. 提供凝血因子的药物 (2)
3. 抗纤溶药物 (3)
4. 促血小板生成药物 (4)
A. 凝血酶原复合物
B. 重组人血小板生成素
C. 维生素K
D. 氨甲环酸;2答案: D

19. [1]1. 促凝血因子活性药物 (1)
2. 提供凝血因子的药物 (2)

3. 抗纤溶药物 (3)
4. 促血小板生成药物 (4)
A. 凝血酶原复合物
B. 重组人血小板生成素
C. 维生素K
D. 氨甲环酸;3答案: B

20. [1]1. 糖尿病病理性增多常见于 (1)
2. 蛋白尿生理性增多常见于 (2)
3. 尿糖增多常见于 (3)
4. 尿pH值大于正常值多见于 (4)
A碱中毒
B剧烈运动后 C糖尿病 D急性肾小球肾炎
;0答案: D

21. [1]1. 糖尿病病理性增多常见于 (1)
2. 蛋白尿生理性增多常见于 (2)
3. 尿糖增多常见于 (3)
4. 尿pH值大于正常值多见于 (4)
A碱中毒
B剧烈运动后 C糖尿病 D急性肾小球肾炎
;1答案: B

22. [1]1. 糖尿病病理性增多常见于 (1)
2. 蛋白尿生理性增多常见于 (2)
3. 尿糖增多常见于 (3)
4. 尿pH值大于正常值多见于 (4)
A碱中毒
B剧烈运动后 C糖尿病 D急性肾小球肾炎
;2答案: C

23. [1]1. 糖尿病病理性增多常见于 (1)
2. 蛋白尿生理性增多常见于 (2)
3. 尿糖增多常见于 (3)
4. 尿pH值大于正常值多见于 (4)
A碱中毒
B剧烈运动后 C糖尿病 D急性肾小球肾炎
;3答案: A

24. [1]1. 短效抗胆碱能药物, 可阻断M胆碱受体 (1)
2. 可解除气道平滑肌痉挛, 改善心排量, 舒张血管 (2)
3. 提...)

4. 阻断组胺受体抑制血管扩张, 降低血管通透性 (4)
A. 异丙托溴铵
B. 氨溴素
C. 氨茶碱
D. 氯雷他定
;0答案: A

25. [1]1. 短效抗胆碱能药物, 可阻断M胆碱受体 (1)
2. 可解除气道平滑肌痉挛, 改善心排量, 舒张血管 (2)
3. 提...)
4. 阻断组胺受体抑制血管扩张, 降低血管通透性 (4)
A. 异丙托溴铵
B. 氨溴素
C. 氨茶碱
D. 氯雷他定
;1答案: C

26. [1]1. 短效抗胆碱能药物, 可阻断M胆碱受体 (1)
2. 可解除气道平滑肌痉挛, 改善心排量, 舒张血管 (2)
3. 提...)
4. 阻断组胺受体抑制血管扩张, 降低血管通透性 (4)
A. 异丙托溴铵
B. 氨溴素
C. 氨茶碱
D. 氯雷他定
;2答案: B

27. [1]1. 短效抗胆碱能药物, 可阻断M胆碱受体 (1)
2. 可解除气道平滑肌痉挛, 改善心排量, 舒张血管 (2)
3. 提...)
4. 阻断组胺受体抑制血管扩张, 降低血管通透性 (4)
A. 异丙托溴铵

B. 氨溴素
C. 氨茶碱
D. 氯雷他定
;3答案: D

28. [1]1. 对多种受体5-HT_{2A}、5-HT_{2B}、α-肾上腺素能和胆碱能受体有亲和性, 对多巴胺受体亲和性相对较低的是 (1)
2. 有很强的中枢5-HT, 尤其是5-HT_{2A}和多巴胺受体的拮抗作用的是 (2)
3. 通过稳定DA系统和拮抗5-HT_{2A}受体产生抗精神病作用的是 (3)
A. 氯氮平
B. 利培酮
C. 氨磺必利
D. 阿立哌唑;0答案: A

29. [1]1. 对多种受体5-HT_{2A}、5-HT_{2B}、α-肾上腺素能和胆碱能受体有亲和性, 对多巴胺受体亲和性相对较低的是 (1)
2. 有很强的中枢5-HT, 尤其是5-HT_{2A}和多巴胺受体的拮抗作用的是 (2)
3. 通过稳定DA系统和拮抗5-HT_{2A}受体产生抗精神病作用的是 (3)
A. 氯氮平
B. 利培酮
C. 氨磺必利
D. 阿立哌唑;1答案: B

30. [1]1. 对多种受体5-HT_{2A}、5-HT_{2B}、α-肾上腺素能和胆碱能受体有亲和性, 对多巴胺受体亲和性相对较低的是 (1)
2. 有很强的中枢5-HT, 尤其是5-HT_{2A}和多巴胺受体的拮抗作用的是 (2)
3. 通过稳定DA系统和拮抗5-HT_{2A}受体产生抗精神病作用的是 (3)
A. 氯氮平
B. 利培酮
C. 氨磺必利
D. 阿立哌唑;2答案: D

31. [1]1. 高脂血症治疗对象为临床上未发现冠心病或其他部位动脉粥样硬化性疾病者, 属于
- 2 / 23

(1))。

2. 高血脂治疗对象为临床上已发现冠心病或其他部位动脉粥样硬化性疾病者, 属于 (2))。

A. 二级预防
B. 一级预防;0答案: B

32. [1]1. 高血脂治疗对象为临床上未发现冠心病或其他部位动脉粥样硬化性疾病者, 属于 (1))。

2. 高血脂治疗对象为临床上已发现冠心病或其他部位动脉粥样硬化性疾病者, 属于 (2))。

A. 二级预防
B. 一级预防;1答案: A

33. [1]1. 具有成瘾性的镇咳药是 (1))。

2. 具有黏痰溶解作用的药物是 (2))。

3. 解除气道平滑肌痉挛, 舒张全身血管 (3))。

4. 缓解轻至中度哮喘急性症状的首选药物 (4))。

A. 沙丁胺醇
B. N-乙酰半胱氨酸
C. 氨茶碱
D. 可待因;1答案: A\$~~\$B

34. [1]1. 具有成瘾性的镇咳药是 (1))。

2. 具有黏痰溶解作用的药物是 (2))。

3. 解除气道平滑肌痉挛, 舒张全身血管 (3))。

4. 缓解轻至中度哮喘急性症状的首选药物 (4))。

A. 沙丁胺醇
B. N-乙酰半胱氨酸
C. 氨茶碱
D. 可待因;2答案: C

35. [1]1. 具有成瘾性的镇咳药是

(1))。

2. 具有黏痰溶解作用的药物是 (2))。

3. 解除气道平滑肌痉挛, 舒张全身血管 (3))。

4. 缓解轻至中度哮喘急性症状的首选药物 (4))。

A. 沙丁胺醇
B. N-乙酰半胱氨酸
C. 氨茶碱
D. 可待因;3答案: A

36. [1]1. 前列腺增生患者在服用α受体阻断剂首剂或增加剂量12h内, 或在停药时应 (1))。

2. 前列腺增生患者在服用5α还原酶抑制剂时...使用度他雄胺, 建议 (3))。

A. 维持用药的时间宜较长
B. 避免驾驶或机械操作
C. 使用本品前应作直肠检查或其他前列腺检查;0答案: A\$~~\$B

37. [1]1. 前列腺增生患者在服用α受体阻断剂首剂或增加剂量12h内, 或在停药时应 (1))。

2. 前列腺增生患者在服用5α还原酶抑制剂时...使用度他雄胺, 建议 (3))。

A. 维持用药的时间宜较长
B. 避免驾驶或机械操作
C. 使用本品前应作直肠检查或其他前列腺检查;1答案: A\$~~\$C

38. [1]1. 前列腺增生患者在服用α受体阻断剂首剂或增加剂量12h内, 或在停药时应 (1))。

2. 前列腺增生患者在服用5α还原酶抑制剂时...使用度他雄胺, 建议 (3))。

A. 维持用药的时间宜较长
B. 避免驾驶或机械操作
C. 使用本品前应作直肠检查或其他前列腺检查;2答案: B\$~~\$C

39. [1]1. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 确

苯地平用于 (1))。

2. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硫酸镁用于 (2))。

3. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 地西泮用于 (3))。

A. 降压治疗
B. 镇静
C. 防治子痫;0答案: A

40. [1]1. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硝苯地平用于 (1))。

2. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硫酸镁用于 (2))。

3. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 地西泮用于 (3))。

A. 降压治疗
B. 镇静
C. 防治子痫;1答案: C

41. [1]1. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硝苯地平用于 (1))。

2. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硫酸镁用于 (2))。

3. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 地西泮用于 (3))。

A. 降压治疗
B. 镇静
C. 防治子痫;2答案: B

42. [1]1. 湿疹急性期有大量渗出时选择 (1))。

2. 湿疹亚急性期应 (2))。

3. 湿疹慢性期应 (3))。...可合用保湿剂及角质松解剂

B. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
C. 冷湿敷, 如3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等;0答案: B\$~~\$C

43. [1]1. 湿疹急性期有大量渗出时选择 (1))。

2. 湿疹亚急性期应 (2))。

3. 湿疹慢性期应 (3))。...可合用保湿剂及角质松解剂

B. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
C. 冷湿敷, 如3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等;1答案: A\$~~\$B\$~~\$C

44. [1]1. 湿疹急性期有大量渗出时选择 (1))。

2. 湿疹亚急性期应 (2))。

3. 湿疹慢性期应 (3))。...可合用保湿剂及角质松解剂

B. 外用氧化锌糊剂、糖皮质激素乳膏
C. 冷湿敷, 如3%硼酸溶液、0.1%盐酸小檗碱溶液、0.1%依沙吖啶溶液等;2答案: A

45. [1]1. 属于保钾利尿药的是 (1))。

2. 属于噻嗪类利尿药的是 (2))。

3. 属于渗透性利尿药的是 (3))。

4. 属于袢利尿药的是 (4))。

A. 氢氯噻嗪
B. 羟乙基淀粉
C. 呋塞米
D. 氨苯喋啶;0答案: D

46. [1]1. 属于保钾利尿药的是 (1))。

2. 属于噻嗪类利尿药的是 (2))。

3. 属于渗透性利尿药的是 (3))。

4. 属于袢利尿药的是 (4))。

A. 氢氯噻嗪
B. 羟乙基淀粉
C. 呋塞米
D. 氨苯喋啶;1答案: A

47. [1]1. 属于保钾利尿药的是 (1))。

2. 属于噻嗪类利尿药的是 (2))。

3. 属于渗透性利尿药的是 (3))。

4. 属于袢利尿药的是 (4))。

A. 氢氯噻嗪
B. 羟乙基淀粉
C. 呋塞米
D. 氨苯喋啶;2答案: B

48. [1]1. 属于保钾利尿药的是 (1))。

2. 属于噻嗪类利尿药的是 (2))。

3. 属于渗透性利尿药的是 (3))。

4. 属于袢利尿药的是 (4))。

- A. 氢氯噻嗪

B. 羟乙基淀粉

C. 呋塞米

D. 氨苯喋啶;3答案：C

49. [1]1. 属于贝特类药物的是

(1) 。

2. 属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是

(2) 。

A. 洛伐他汀

B. 吉非贝齐

C. 依折麦布

D. 考来烯胺

;0答案：B

50. [1]1. 属于贝特类药物的是

(1) 。

2. 属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是

(2) 。

A. 洛伐他汀

B. 吉非贝齐

C. 依折麦布

D. 考来烯胺

;1答案：A

51. [1]1. 属于渗透性泻剂的是 (1))

2. 属于刺激性泻剂的是 (2))

3. 属于促动力剂的是 (3))

4. 属于肛门用泻剂的是 (4))

A. 比沙可啶

B. 乳果糖

C. 开塞露

D. 普芦卡必利;0答案：B

52. [1]1. 属于渗透性泻剂的是 (1))

2. 属于刺激性泻剂的是 (2))

3. 属于促动力剂的是 (3))

4. 属于肛门用泻剂的是 (4))

A. 比沙可啶

B. 乳果糖

C. 开塞露

D. 普芦卡必利;1答案：A

53. [1]1. 属于渗透性泻剂的是 (1))

2. 属于刺激性泻剂的是 (2))

3. 属于促动力剂的是 (3))

4. 属于肛门用泻剂的是 (4))

A. 比沙可啶

B. 乳果糖

C. 开塞露

D. 普芦卡必利;2答案：D

54. [1]1. 属于渗透性泻剂的是 (1))

2. 属于刺激性泻剂的是 (2))

3. 属于促动力剂的是 (3))

4. 属于肛门用泻剂的是 (4))

A. 比沙可啶

B. 乳果糖

C. 开塞露

D. 普芦卡必利;3答案：C

55. [1]1. 胃肠道不良反应少，性功能障碍少

(1))

2. 药物镇静作用较强 (2))

3. 重度抑郁疗效好，药物相互作用少

(3))

A. 帕罗西汀

B. 文拉法辛

C. 西酞普兰

D. 米氮平;0答案：D

56. [1]1. 胃肠道不良反应少，性功能障碍少

(1))

2. 药物镇静作用较强 (2))

3. 重度抑郁疗效好，药物相互作用少

(3))

A. 帕罗西汀

B. 文拉法辛

C. 西酞普兰

D. 米氮平;1答案：A

57. [1]1. 胃肠道不良反应少，性功能障碍少

(1))

2. 药物镇静作用较强 (2))

3. 重度抑郁疗效好，药物相互作用少

(3))

A. 帕罗西汀

B. 文拉法辛

C. 西酞普兰

D. 米氮平;2答案：B

58. [1]1. 一般注射后0. 5h起效，2-8h达到高峰

(1))

2. 饭前15min皮下注射 (2))

3. 注射该胰岛素30分...

4. 注射后1. 5h起效，最大浓度为4-12h

(4))

A. 速效胰岛素

B. 短效胰岛素

C. 中效胰岛素

D. 预混胰岛素;0答案：D

59. [1]1. 一般注射后0. 5h起效，2-8h达到高峰

(1))

2. 饭前15min皮下注射 (2))

3. 注射该胰岛素30分...

4. 注射后1. 5h起效，最大浓度为4-12h

(4))

A. 速效胰岛素

B. 短效胰岛素

C. 中效胰岛素

D. 预混胰岛素;1答案：A

60. [1]1. 一般注射后0. 5h起效，2-8h达到高峰

(1))

2. 饭前15min皮下注射 (2))

3. 注射该胰岛素30分...

4. 注射后1. 5h起效，最大浓度为4-12h

(4))

A. 速效胰岛素

B. 短效胰岛素

C. 中效胰岛素

D. 预混胰岛素;2答案：B

61. [1]1. 一般注射后0. 5h起效，2-8h达到高峰

(1))

2. 饭前15min皮下注射 (2))

3. 注射该胰岛素30分...

4. 注射后1. 5h起效，最大浓度为4-12h

(4))

A. 速效胰岛素

B. 短效胰岛素

C. 中效胰岛素

D. 预混胰岛素;3答案：C

62. [1]1. 用于慢性肾功能不全贫血治疗的是

(1))

2. 用于缺铁性贫血治疗的是 (2))

3. 用于再生障碍性贫血治疗的是 (3))

4. 用于维生素B₁₂缺乏贫血治疗的是

(4))

A. 硫酸亚铁

B. 维生素B₁₂

C. 司坦唑醇

D. 重组人红细胞生成素;0答案：D

63. [1]1. 用于慢性肾功能不全贫血治疗的是

(1))

2. 用于缺铁性贫血治疗的是 (2))

3. 用于再生障碍性贫血治疗的是 (3))

4. 用于维生素B₁₂缺乏贫血治疗的是

(4))

A. 硫酸亚铁

B. 维生素B₁₂

C. 司坦唑醇

D. 重组人红细胞生成素;1答案：A

64. [1]1. 用于慢性肾功能不全贫血治疗的是

(1))

2. 用于缺铁性贫血治疗的是 (2))

3. 用于再生障碍性贫血治疗的是 (3))

4. 用于维生素B₁₂缺乏贫血治疗的是

(4))

A. 硫酸亚铁

B. 维生素B₁₂

C. 司坦唑醇

D. 重组人红细胞生成素;2答案：C

65. [1]1. 用于慢性肾功能不全贫血治疗的是

(1))

2. 用于缺铁性贫血治疗的是 (2))

3. 用于再生障碍性贫血治疗的是 (3))

4. 用于维生素B₁₂缺乏贫血治疗的是

(4))

A. 硫酸亚铁

B. 维生素B₁₂

C. 司坦唑醇

D. 重组人红细胞生成素;3答案：C

D. 重组人红细胞生成素;3答案: B

66. [1]1. 有收敛、吸附、保护粘黏膜作用的药物是 (1)

2. 有抑制肠道过度分泌作用的药物是 (2)

3. 有改善肠道菌群作用的药物是 (3)

4. 有治疗肠道感染作用的药物是 (4)

A. 盐酸小檗碱

B. 蒙脱石

C. 消旋卡多曲

D. 地衣芽孢杆菌;0答案: B

67. [1]1. 有收敛、吸附、保护粘黏膜作用的药物是 (1)

2. 有抑制肠道过度分泌作用的药物是 (2)

3. 有改善肠道菌群作用的药物是 (3)

4. 有治疗肠道感染作用的药物是 (4)

A. 盐酸小檗碱

B. 蒙脱石

C. 消旋卡多曲

D. 地衣芽孢杆菌;1答案: C

68. [1]1. 有收敛、吸附、保护粘黏膜作用的药物是 (1)

2. 有抑制肠道过度分泌作用的药物是 (2)

3. 有改善肠道菌群作用的药物是 (3)

4. 有治疗肠道感染作用的药物是 (4)

A. 盐酸小檗碱

B. 蒙脱石

C. 消旋卡多曲

D. 地衣芽孢杆菌;2答案: D

69. [1]1. 有收敛、吸附、保护粘黏膜作用的药物是 (1)

2. 有抑制肠道过度分泌作用的药物是 (2)

3. 有改善肠道菌群作用的药物是 (3)

4. 有治疗肠道感染作用的药物是 (4)

A. 盐酸小檗碱

B. 蒙脱石

C. 消旋卡多曲

D. 地衣芽孢杆菌;3答案: A

70. [1]1. 治疗过敏性鼻炎的药物4%色甘酸钠属于 (1)

2. 治疗过敏性鼻炎的药物孟鲁司特钠属于 (2)

3. 治疗过...性鼻炎的药物0.03%异丙托溴铵鼻溶液属于 (4)

A. 肥大细胞膜稳定剂

B. 减充血剂

C. 抗白三烯药

D. 抗胆碱药

;0答案: A\$~~\$C

71. [1]1. 治疗过敏性鼻炎的药物4%色甘酸钠属于 (1)

2. 治疗过敏性鼻炎的药物孟鲁司特钠属于 (2)

3. 治疗过...性鼻炎的药物0.03%异丙托溴铵鼻溶液属于 (4)

A. 肥大细胞膜稳定剂

B. 减充血剂

C. 抗白三烯药

D. 抗胆碱药

;1答案: A\$~~\$C

72. [1]1. 治疗过敏性鼻炎的药物4%色甘酸钠属于 (1)

2. 治疗过敏性鼻炎的药物孟鲁司特钠属于 (2)

3. 治疗过...性鼻炎的药物0.03%异丙托溴铵

鼻溶液属于 (4)

A. 肥大细胞膜稳定剂

B. 减充血剂

C. 抗白三烯药

D. 抗胆碱药

;2答案: B\$~~\$D

73. [1]1. 治疗过敏性鼻炎的药物4%色甘酸钠属于 (1)

2. 治疗过敏性鼻炎的药物孟鲁司特钠属于 (2)

3. 治疗过...性鼻炎的药物0.03%异丙托溴铵鼻溶液属于 (4)

A. 肥大细胞膜稳定剂

B. 减充血剂

C. 抗白三烯药

D. 抗胆碱药

;3答案: B\$~~\$D

74. [1]1. 治疗和预防骨质疏松症的药物中,抑制骨吸收的药物有 (1)

2. 促进骨形成的药物有 (2)

3. 作用于骨矿化的药物有 (3)

A. 氟化物

B. 雌激素和孕激素

C. 活性维生素D₃;0答案: B\$~~\$C

75. [1]1. 治疗和预防骨质疏松症的药物中,抑制骨吸收的药物有 (1)

2. 促进骨形成的药物有 (2)

3. 作用于骨矿化的药物有 (3)

A. 氟化物

B. 雌激素和孕激素

C. 活性维生素D₃;1答案: A

76. [1]1. 治疗和预防骨质疏松症的药物中,抑制骨吸收的药物有 (1)

2. 促进骨形成的药物有 (2)

3. 作用于骨矿化的药物有 (3)

A. 氟化物

B. 雌激素和孕激素

C. 活性维生素D₃;2答案: B\$~~\$C

77. [1]1. 治疗急性通风性关节炎的一线药物是 (1)

2. 增加尿酸排泄的药物是 (2)

3. 抑制尿酸合成的药物是 (3)

4. 当高尿酸血症患者尿pH值小于6.0时,需碱化尿液,可服用 (4)

A. 苯溴马隆B. 别嘌呤C. 秋水仙碱D. 碳酸氢钠

;0答案: C

78. [1]1. 治疗急性通风性关节炎的一线药物是 (1)

2. 增加尿酸排泄的药物是 (2)

3. 抑制尿酸合成的药物是 (3)

4. 当高尿酸血症患者尿pH值小于6.0时,需碱化尿液,可服用 (4)

A. 苯溴马隆B. 别嘌呤C. 秋水仙碱D. 碳酸氢钠

;1答案: A

79. [1]1. 治疗急性通风性关节炎的一线药物是 (1)

2. 增加尿酸排泄的药物是 (2)

3. 抑制尿酸合成的药物是 (3)

4. 当高尿酸血症患者尿pH值小于6.0时,需碱化尿液,可服用 (4)

A. 苯溴马隆B. 别嘌呤C. 秋水仙碱D. 碳酸氢钠

;2答案: B

80. [1]1. 治疗急性通风性关节炎的一线药物是 (1)

2. 增加尿酸排泄的药物是 (2)

3. 抑制尿酸合成的药物是 (3)

4. 当高尿酸血症患者尿pH值小于6.0时,需碱化尿液,可服用 (4)

A. 苯溴马隆B. 别嘌呤C. 秋水仙碱D. 碳酸氢钠

;3答案: D

81. [5]5. 常见不良反应为出血、腹泻、胃溃疡的药物为 (1) A

6. 常见不良反应为出血、白细胞减少的药物为（ （2） ） B

7. 常见不良反应为出血、高尿酸血症的药物为（ （3） ） C

A. 阿司匹林

B. 氯吡格雷

C. 替格瑞洛

D. 双嘧达莫

;0答案： A

82. [5]5. 常见不良反应为出血、腹泻、胃溃疡的药物为（ （1） ） A

6. 常见不良反应为出血、白细胞减少的药物为（ （2） ） B

7. 常见不良反应为出血、高尿酸血症的药物为（ （3） ） C

A. 阿司匹林

B. 氯吡格雷

C. 替格瑞洛

D. 双嘧达莫

;1答案： B

83. [5]5. 常见不良反应为出血、腹泻、胃溃疡的药物为（ （1） ） A

6. 常见不良反应为出血、白细胞减少的药物为（ （2） ） B

7. 常见不良反应为出血、高尿酸血症的药物为（ （3） ） C

A. 阿司匹林

B. 氯吡格雷

C. 替格瑞洛

D. 双嘧达莫

;2答案： C

84. AD患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状, 可以选用的药物是（ ） 答案： 奥氮平

85. AD患者在治疗过程中出现幻觉、妄想等精神症状, 可以选用的治疗药物是（ ）。 答案： 氯硝西泮

86. AED的作用机制不包括（ ）。 答案： 增加脑内5-HT的水平

87. A干预措施在严格控制的情况下对患者产生的治疗效果B干预措施在自然状态下对患者长生的治疗结果C用货币单位对健康产出的量化测量D患者或社会对于某种干预措施所带来的健康结果的一种偏好1. 效果是指 （1） 2. 疗效是指 （2） 3. 效用是指 （3） 4. 作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;0答案： B

88. A干预措施在严格控制的情况下对患者产生的治疗效果B干预措施在自然状态下对患者长生的治疗结果C用货币单位对健康产出的量化测量D患者或社会对于某种干预措施所带来的健康结果的一种偏好1. 效果是指 （1） 2. 疗效是指 （2） 3. 效用是指 （3） 4. 作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;2答案： D

89. A干预措施在严格控制的情况下对患者产生的治疗效果B干预措施在自然状态下对患者长生的治疗结果C用货币单位对健康产出的量化测量D患者或社会对于某种干预措施所带来的健康结果的一种偏好1. 效果是指 （1） 2. 疗效是指 （2） 3. 效用是指 （3） 4. 作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;3答案： C

90. A干预措施在严格控制的情况下对患者产生的治疗效果B干预措施在自然状态下对患者长生的治疗结果C用货币单位对健康产出的量化测量D患者或社会对于某种干预措施所带来的健康结果的一种偏好1. 效果是指 （1） 2. 疗效是指 （2） 3. 效用是指 （3） 4. 作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;0答案： B

91. A进入体内的药物随血液分布到各器官、组织, 到达病变部位, 使该部位的药物浓度达到能发挥治疗作用的水平并能维持一定的作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;0答案： B

92. A进入体内的药物随血液分布到各器官、组织, 到达病变部位, 使该部位的药物浓度达到能发挥治疗作用的水平并能维持一定的作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;3答案： A

是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;1答案： A

93. A进入体内的药物随血液分布到各器官、组织, 到达病变部位, 使该部位的药物浓度达到能发挥治疗作用的水平并能维持一定的作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;2答案： D

94. A进入体内的药物随血液分布到各器官、组织, 到达病变部位, 使该部位的药物浓度达到能发挥治疗作用的水平并能维持一定的作用时间。B药物以不同制剂的... 学阶段是指 （2） 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 （3） 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 （4） ;3答案： C

95. A替代指标B终点指标1. 降压药对心血管事件发生率和死亡率的影响属于 （1） 2. 降糖药对糖尿病大血管并发症发生率的影响属于 （2） 3. 降压药对血压的影响属于 （3） 4. 降脂药对血脂的影响属于 （4） ;0答案： B

96. A替代指标B终点指标1. 降压药对心血管事件发生率和死亡率的影响属于 （1） 2. 降糖药对糖尿病大血管并发症发生率的影响属于 （2） 3. 降压药对血压的影响属于 （3） 4. 降脂药对血脂的影响属于 （4） ;1答案： B

97. A替代指标B终点指标1. 降压药对心血管事件发生率和死亡率的影响属于 （1） 2. 降糖药对糖尿病大血管并发症发生率的影响属于 （2） 3. 降压药对血压的影响属于 （3） 4. 降脂药对血脂的影响属于 （4） ;2答案： A

98. A替代指标B终点指标1. 降压药对心血管事件发生率和死亡率的影响属于 （1） 2. 降糖药对糖尿病大血管并发症发生率的影响属于 （2） 3. 降压药对血压的影响属于 （3） 4. 降脂药对血脂的影响属于 （4） ;3答案： A

99. A. 原始研究证据

B. 二次研究证据1. 循证医学及循证药学的证据中, 随机对照试验属于 （1）

2. 循证医学及循证药学的证据中... 证药学的证据中, 系统评价/Meta分析属于 （3）

4. 循证医学及循证药学的证据中, 临床实践指南属于 （4） ;0答案： A

100. A. 原始研究证据

B. 二次研究证据1. 循证医学及循证药学的证据中, 随机对照试验属于 （1）

2. 循证医学及循证药学的证据中... 证药学的证据中, 系统评价/Meta分析属于 （3）

4. 循证医学及循证药学的证据中, 临床实践指南属于 （4） ;1答案： A

101. A. 原始研究证据

B. 二次研究证据1. 循证医学及循证药学的证据中, 随机对照试验属于 （1）

2. 循证医学及循证药学的证据中... 证药学的证据中, 系统评价/Meta分析属于 （3）

4. 循证医学及循证药学的证据中, 临床实践指南属于 （4） ;2答案： B

102. A. 原始研究证据

B. 二次研究证据1. 循证医学及循证药学的证据中, 随机对照试验属于 （1）

2. 循证医学及循证药学的证据中... 证药学的证据中, 系统评价/Meta分析属于 （3）

4. 循证医学及循证药学的证据中, 临床实践指南属于 （4） ;3答案： B

103. A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究

B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究

C. 将系统评价中的多个不同结果... 试验是指 （1） 2. 荟萃分析是指 （2） 3. 替代指标是指 （3） 4. 观察性研究是指 （4） ;0答案： A

104. A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估

医学干预措施效果的实验性对照研究

B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究

C. 将系统评价中的多个不同结果... 试验是指

(1) 2. 荟萃分析是指 (2) 3. 替代指

标是指 (3) 4. 观察性研究是指

(4) ;1答案: C

105. A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究

B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究

C. 将系统评价中的多个不同结果... 试验是指

(1) 2. 荟萃分析是指 (2) 3. 替代指

标是指 (3) 4. 观察性研究是指

(4) ;2答案: D

106. A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实验性对照研究

B. 队列研究、病例对照研究和横断面研究

C. 将系统评价中的多个不同结果... 试验是指

(1) 2. 荟萃分析是指 (2) 3. 替代指

标是指 (3) 4. 观察性研究是指

(4) ;3答案: B

107. HDL是指()。答案: 高密度脂蛋白

108. IgA肾病应评估肾脏疾病进展的风险, 治疗上以降蛋白尿和降压为主, 如尿蛋白>0.5g/d时, 推荐的药物治疗是()。答案: ACEI或ARB

109. IgA肾病治疗上以降蛋白尿和降压为主, 如尿蛋白>0.5g/d时, 推荐()。答案: ACEI或ARB治疗

110. LDL是指()。答案: 低密度脂蛋白

111. MDR-TB化疗方案中肯定不含有()。答案: 异烟肼

112. RCT的含义是()。答案: 随机对照试验

113. [A]阿尔茨海默病的危险因素, 不包括()。答案: 血液病

114. [A]阿尔茨海默病患者的首发症状是()。答案: 记忆减退

115. [A]阿尔茨海默症患者的首发症状是()。答案: 记忆障碍

116. [A]阿片类药物的特点, 正确的是()。

答案: 使用时应遵循在不产生难以忍受的不良反应的前提下充分镇痛的原则

117. [A]阿片类镇痛药的特点, 不正确的是()。答案: 具有封顶效应

118. [A]阿片受体激动剂不包括()。答案: 纳洛酮

119. [A]癌症患者长期使用阿片类止痛药时, 首选的给药途径是()。答案: 口服给药

120. [A]癌症患者长期使用阿片类止痛药时, 首选的给药途径是()。答案: 口服给药

121. [A]氨溴索属于()。答案: 祛痰药

122. [A]按照GRADE证据质量分级标准, 证据质量共被分为()。答案: 4级

123. [A]奥美拉唑的作用机制正确的是()。答案: 抑制H⁺, K⁺-ATP酶的活性

124. [B]白细胞计数病理性增多常见于()。答案: 细菌感染

125. [B]白细胞计数减少常见于()。答案: 病毒感染

126. [B]被列为第五大生命体征是()。答案: 疼痛

127. [B]苯二氮卓类药物的不良反应不包括()。答案: 口苦、口干、肌无力等。

128. [B]苯妥英钠服用时的注意事项错误的是()。答案: 可引起淋巴结肿大, 如出现可继续服药。

129. [B]避免吸入激素后的口咽部不良反应的方式中, 不正确的表述是()。答案: 选用普通定量气雾剂

130. [B]避免吸入糖皮质激素后口咽部发生不良反应, 可采用的方式不包括()。答案: 选用普通定量气雾剂

131. [B]变态反应性皮炎为典型的()超敏反应。答案: IV型

132. [B]变应性鼻炎中, 中度至重度间歇性和持续性鼻炎的首选药物是()。答案: 鼻内用糖皮质激素

133. [B]变应性鼻炎中, 中重度间歇性和持续性鼻炎的首选药物是()。答案: 鼻内用糖皮质激素

134. [B]丙硫氧嘧啶抗甲状腺药起效慢的主要原因是()。答案: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效

135. [B]丙戊酸有效血药浓度正确的是()。答案: 50~100 mg/L

136. [B]不会引起直立性低血压的药物是()。答案: 非那雄胺

137. [B]不符合癌痛三阶梯止痛治疗方案用药原则的是()。答案: 疼痛时给药

138. [B]不符合三阶梯止痛治疗方案用药原则的是()。答案: 疼痛时给药

139. [B]不良反应为胃肠道不适、眩晕、嗜睡、梦境怪异、失眠、紧张视觉异常的药物是()。答案: 文拉法辛

140. [B]布洛芬为常用的非甾体抗炎药, 用于镇痛时每日最大剂量可达()。答案: 2400mg-3600mg

141. [B]不属于阿尔茨海默病的危险因素是()。答案: 血液病

142. [B]不属于促白细胞生成的药物是()。答案: 维生素K

143. [B]不属于促白细胞生成的药物是()。答案: 维生素K

144. [B]不属于促胰岛素分泌剂的是()。答案: 二甲双胍

145. [B]不属于胆碱酯酶抑制剂的是()。答案: 美金刚

146. [B]不属于非促胰岛素分泌剂的是()。答案: 格列奈类

147. [B]不属于肝功能检查的指标是()。答案: 血清肌酐

148. [B]不属于冠心病危险因素的是()。答案: HDL-C水平增高

149. [B]不属于冠心病危险因素的是()。答案: 高密度脂蛋白胆固醇增高

150. [B]不属于冠心病危险因素的是()。答案: 高密度脂蛋白胆固醇增高

151. [B]不属于急性化脓性中耳炎常见致病菌的是()。答案: 大肠埃希菌

152. [B]不属于甲氧氯普胺禁忌证的是()。答案: 恶心、呕吐

153. [B]不属于抗心律失常药物治疗的目的及原则的是()。答案: 选择抗心律失常药物时, 优先考虑有效性而不是安全性

154. [B]不属于临床研究的是()。答案: 专家会诊

155. [B]不属于前列腺增生药物治疗选择的是()。答案: 丙酸睾酮

156. [B]不属于双重抗血小板治疗的首选指征的是()。答案: 心源性栓塞导致的脑卒中

157. [B]不属于双重抗血小板治疗首选指征的是()。答案: 心源性栓塞导致的脑卒中

158. [B]不属于心力衰竭治疗基本药物的是()。答案: 维拉帕米

159. [B]不属于心衰治疗基本药物的是()。答案: 维拉帕米

160. [B]不属于炎症性肠病维持期药物治疗选择的是()。答案: 糖皮质激素

161. [B]不属于炎症性肠病维持期药物治疗选择的药物是()。答案: 糖皮质激素

162. [B]不属于炎症性肠病维持期药物治疗选择的药物是()。答案: 糖皮质激素

163. [B]不属于医疗机构药学信息服务的核心的是()。答案: 药品生产

164. [B]不属于治疗轻中度AD的一线药物是()。答案: 美金刚联合多奈哌齐

165. [B]不宜处方用于泌尿系统感染的抗菌药物是()。答案: 莫西沙星

166. [B]不宜用于泌尿系统感染的抗菌药物是()。答案: 莫西沙星

167. [C]长期口服抗真菌药应注意()。答案: 监测肝肾功能

168. [C]长期治疗持续性哮喘的首选药物为

()。答案:布地奈德干粉吸入剂(都保)

169. [C]常引起亚急性细菌性心内膜炎的细菌是()。答案:草绿色链球菌

170. [C]常用的减充血剂不包括()。答案:氯雷他定

171. [C]成年男性贫血的诊断标准是()。答案:血红蛋白<120 g/L

172. [C]成年男性贫血的诊断标准是()。答案:血红蛋白<120g/L

173. [C]成人正常血小板计数参考范围为()。答案:(100~300)×10⁹/L

174. [C]成人正常血小板计数参考范围为()。答案:(100~300)×10⁹/L

175. [C]雌激素预防和治疗骨质疏松的主要作用机制是()。答案:雌激素与骨细胞上雌激素受体结合,抑制破骨细胞的骨吸收作用,使骨基质形成增加

176. [C]促进骨形成的药物是()。答案:活性维生素D₃

177. [C]催眠药物换药指征不包括()。答案:使用超过1个月

178. [C]痤疮的治疗包括局部治疗和系统治疗。下列关于痤疮治疗描述不正确的是()。答案:全反式维A酸霜是炎性痤疮的首选外用药物之一

179. [D]大剂量应用可产生抑制骨矿化不良反应的双膦酸盐类药物是()。答案:依替磷酸二钠

180. [D]单纯性尿路感染病因主要为? 答案:大肠埃希氏菌

181. [D]单独使用治疗骨质疏松症可引起低血钙及低血钙所致的继发性甲状旁腺功能亢进,最后导致骨质吸收增加和骨丢失的药物是()。答案:降钙素

182. [D]蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过()。答案:150 mg/24 h

183. [D]蛋白尿指尿液中蛋白质含量超过答案:150mg/24h

184. [D]导致心源性栓塞,最常见的原因是()。答案:房颤

185. [D]滴虫性阴道炎的典型白带为()。答案:稀薄、黄绿色、泡沫状

186. [D]滴虫性阴道炎的治疗药物首选()。答案:甲硝唑

187. [D]滴虫性阴道炎治疗药首选()。答案:甲硝唑

188. [D]低密度脂蛋白的简称是()。答案:LDL

189. [D]第二代抗精神病药物的特点错误的是()。答案:作用机制为单一阻断多巴胺受体,故称为典型抗精神病药物

190. [D]第五生命体征是()。答案:疼痛

191. [D]癫痫持续状态的首选药物为()。答案:静注地西泮

192. [D]对IgA肾病患者,应评估肾脏疾病进展的风险,治疗上以降蛋白尿和降压为主,尿蛋白>0.5 g/d时,推荐使用()。答案:ACEI或ARB治疗

193. [D]对氨基糖苷类药物过敏的患者应禁用()。答案:新霉素

194. [D]对孟鲁司特的药理作用叙述正确的是()。答案:阻断半胱氨酰白三烯受体

195. [D]对帕金森病药物治疗原则的叙述,错误的是()。答案:使用左旋多巴可突然停药

196. [D]对肾病综合征临床特征的描述,错误的是()。答案:高蛋白血症

197. [D]对肾病综合征临床特征的描述,错误的是()。答案:高蛋白血症

198. [D]对疼痛的定义,正确的表述是()。答案:疼痛是组织损伤或类似潜在的组织损伤所引起的不愉快的感觉和情感体验

199. [D]对细菌性阴道病的治疗,错误的是()。答案:甲硝唑2g,单次顿服

200. [D]对细菌性阴道病的治疗,下列哪项是错误的? () 答案:推荐甲硝唑2 g顿服治疗

201. [D]对消化道出血的诊断有重要价值,常作为消化道恶性肿瘤早期诊断的筛选指标的是()。答案:粪便隐血阳性

202. [D]对乙酰氨基酚(扑热息痛)属于()。答案:解热镇痛药

203. [D]对乙酰氨基酚(扑热息痛)属于()。答案:解热镇痛药

204. [D]对影响药物治疗的病理因素的叙述,不正确的是()。答案:以肾排泄为主的药物,在肾衰竭时T_{1/2}明显缩短

205. [D]对影响药物治疗的病理因素的叙述,不正确的是() 答案:心力衰竭可导致全身脏器淤血,使药物的T_{1/2}明显延长

206. [D]对于癌症疼痛按阶梯给药的叙述,不正确的是() 答案:在使用阿片类药物治疗的同时,联合应用NSAID可减弱阿片类药物止痛效果

207. [D]对于复杂性尿路感染,宜选药物不包括()。答案:头孢他啶

208. [D]对于基础合并心血管疾病的糖尿病患者,有降低心血管事件风险的是()。答案:恩格列净

209. [D]对于急性膀胱炎、尿道炎患者,宜选用的药物是()。答案:呋喃妥因

210. [D]对于口服华法林的非瓣膜性房颤患者,应调整药物剂量使INR保持在()。答案:2~3

211. [D]对于慢性胃炎治疗的叙述,不正确的是()。答案:使用NSAID

212. [D]对于门诊就诊的急性肾盂肾炎患者,宜选用的药物是() 答案:阿莫西林/克拉维酸

213. [D]对于门诊就诊的急性肾盂肾炎患者,宜选用的药物是()。答案:阿莫西林/克拉维酸

214. [D]对于肾小球肾炎临床表现的描述,不正确的是()。答案:肾功能不全和尿毒症是

所有肾小球肾炎患者都有的表现

215. [D]对于痛风患者降尿酸时,应使血尿酸水平低于尿酸溶解度的饱和点。因此血尿酸应低于()。答案:357umol/L

216. [D]对于脱髓鞘性视神经炎患者,在病情需要时可予大剂量糖皮质激素冲击治疗,治疗方案是()。答案:甲泼尼龙1 g/d静脉滴注

217. [D]对于中、重度间歇性和持续性变应性鼻炎,首选药物是()。答案:鼻内用糖皮质激素

218. [D]对正在发作的哮喘无效的药物是()。答案:色甘酸钠

219. [D]对支气管炎症过程有显著抑制作用的平喘药是()。答案:倍氯米松

220. [D]多吃新鲜水果和蔬菜即可补充摄入不足的是()。答案:叶酸缺乏性贫血

221. [D]多潘立酮发挥止吐作用的机制是()。答案:阻断外周多巴胺受体

222. [F]反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是()。答案:糖化血红蛋白

223. [F]反映糖尿病较长时间血糖控制水平的“金指标”是()。答案:糖化血红蛋白

224. [F]非选择性COX-2抑制剂,对胃肠道的不良反应有所减轻,但可能加重()。答案:心肌缺血

225. [F]肺结核初治的疗程为()。答案:强化期2个月/巩固期4个月

226. [F]肺结核初治的疗程为() 答案:强化期2个月/巩固期4个月

227. [F]肺结核初治的治疗疗程为()。答案:强化期2个月 / 巩固期4个月

228. [F]肺结核的传播途径,最常见的是()。答案:经呼吸道

229. [F]费用不包括()。答案:直接效益

230. [F]符合三阶梯止痛治疗方案的用药原则的是()。答案:个体化给药

231. [G]高血压的治疗原则是()。答案:个体化阶梯治疗?

232. [G]高血压患者伴蛋白尿患者,首选的降压

- 药物是（）。答案：ACEI
233. [G]根除幽门螺杆菌的三联疗法中不合理的是（）。答案：硫糖铝+阿莫西林+替硝唑
234. [G]根据对阿片受体的作用，阿片类镇痛药分为阿片受体激动剂、阿片受体拮抗剂和部分激动剂，下列属于部分激动剂的药物是（）。答案：丁丙诺啡
235. [G]根据美国FDA对于妊娠用药安全性的分类，甲硝唑属于（）妊娠用内药，可用于孕期。答案：B类
236. [G]根据镇痛强度不同阿片类镇痛药可分为强阿片药和弱阿片药。属于弱阿片药的是（）。答案：可待因
237. [G]骨关节炎的主要病变是（）。答案：关节软骨退变和继发性骨质增生
238. [G]骨关节炎的主要特征是（）。答案：关节软骨退变和继发性骨质增生
239. [G]关节炎患者关节内注射透明质酸钠连续（）为一个疗程。答案：5周
240. [G]关于阿仑膦酸钠的叙述，错误的是（）。答案：服药后30min内可躺卧
241. [G]关于贝特类药物说法错误的是（）。答案：对TG无降低作用甚至稍有升高
242. [G]关于成本效果分析的表述不正确的是（）。答案：效果指标优先推荐使用终点指标
243. [G]关于第二代抗精神病药物的描述，不正确的是（）。答案：氯丙嗪和氟哌啶醇是常用第二代抗精神病药
244. [G]关于对治疗骨关节炎的NSAID的描述，错误的是（）。答案：可同时使用两种或两种以上的NSAID
245. [G]关于二甲双胍的说法不正确的是（）。答案：本品不可与磺脲类口服降糖药合用，合用时低血糖风险增加
246. [G]关于二甲双胍的说法，正确的是（）。答案：二甲双胍是2型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
247. [G]关于非甾体抗炎药的叙述，错误的是（）。答案：多可同时使用两种药物
248. [G]关于骨质疏松，说法不正确的是（）。答案：不同类型的骨质疏松，其治疗和预防的原则是相同的
249. [G]关于华法林的使用，不正确的是（）。答案：食物对华法林的作用影响小
250. [G]关于华法林的说法，不正确的是（）。答案：食物对华法林的作用影响小
251. [G]关于华法林药物的叙述，不正确的是（）。答案：食物对华法林的作用影响小
252. [G]关于降尿酸治疗错误的观点是（）。答案：服用促尿酸排泄的药物别嘌醇导致重度过敏患者可能有生命危险
253. [G]关于降尿酸治疗的叙述正确的是（）。答案：降尿酸治疗的目标是促进晶体溶解和防止晶体形成
254. [G]关于结膜炎的药物治疗，不正确的是（）。答案：主要采用局部给药（眼用制剂），严重结膜炎不必全身给药
255. [G]关于抗甲状腺药物的叙述，不正确的是（）。答案：停药后的复发率较低
256. [G]关于抗甲状腺药物说法不正确的是（）。答案：抗甲状腺药物导致的过敏反应可用抗组胺药物治疗，不能停药
257. [G]关于抗甲状腺药物叙述，不正确的是（）。答案：因治疗需要，抗甲状腺药物导致的皮疹加重可用抗组胺药物治疗，不能停药
258. [G]关于抗心律失常药物用于房颤，不正确的是（）。答案：选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性
259. [G]关于抗心律失常药物治疗的目的和原则，不正确的是（）。答案：选择抗心律失常药物时，优先考虑有效性
260. [G]关于抗抑郁药物治疗原则，不恰当的是（）。答案：尽可能多种药物协同使用
261. [G]关于利尿剂的叙述，错误的是（）。答案：螺内酯是排钾利尿药
262. [G]关于利尿剂的叙述，错误的是（）。答案：螺内酯是排钾利尿药
263. [G]关于利尿药的叙述错误的是（）。答案：痛风者及肾功能不全者禁用
264. [G]关于肾上腺素受体阻滞剂的叙述，正确的是（）。答案： β 受体阻滞剂尤其适用于心率较快的中青年患者或合并心绞痛患者
265. [G]关于失眠治疗的叙述，错误的是（）。答案：对于急性失眠，不应使用药物治疗，以免形成药物依赖
266. [G]关于使用非甾体抗炎药治疗骨关节炎的叙述，正确的是（）。答案：足量使用一种非甾体抗炎药2~3周后仍无效，可更换另一种，待有效后逐渐减量
267. [G]关于双膦酸盐的使用，不正确的是（）。答案：服药后宜采取卧位
268. [G]关于他汀类说法错误的是（）。答案：临床常用的有：洛伐他汀、辛伐他汀、普伐他汀、氟伐他汀、阿托伐他汀以及主要成分为洛伐他汀的血脂康
269. [G]关于他汀类药物说法错误的是（）。答案：最严重的不良反应是粒细胞减少及肾功能受损
270. [G]关于糖尿病的综合防治，正确的是（）。答案：糖尿病教育、医学营养治疗、运动治疗、药物治疗、血糖监测
271. [G]关于糖尿病的综合防治，正确的是（）。答案：医学营养治疗、防止发生糖尿病急性代谢紊乱
272. [G]关于体股癣的药物治疗，不正确的是（）。答案：通常均应联合外用糖皮质激素
273. [G]关于外阴阴道假丝酵母菌病的临床分类，下列哪项是正确的？（）答案：单纯性VVC宿主免疫功能正常
274. [G]关于微生态制剂的描述，错误的是（）。答案：安全性高，不会发生过敏反应
275. [G]关于胃黏膜保护因素，错误的是（）。答案：胃泌素
276. [G]关于消化性溃疡的发病机制的叙述较全面的是（）。答案：致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
277. [G]关于洋地黄毒苷类药物说法错误的是（）。答案：适用于心肌梗死急性期的心力衰竭患者
278. [G]关于药品说明书，下列说法不正确的是（）。答案：药品说明书包含价格等数据和信息
279. [G]关于药品说明书，下列说法正确的是（）。答案：药品说明书具有法律效力
280. [G]关于药物蒙脱石的描述，错误的是（）。答案：不适用于儿童腹泻
281. [G]关于止泻药蒙脱石的叙述，错误的是（）。答案：不适用于儿童腹泻
282. [G]关于止泻药蒙脱石的叙述，错误的是（）。答案：不适用于儿童腹泻
283. [G]关于治疗COPD的支气管扩张剂的叙述，不正确的是（）。答案：可使所有患者的FEV₁得到改善
284. [G]关于治疗甲亢药物的说法，不正确的是（）。答案：易导致永久性甲减
285. [G]关于治疗甲亢药物的说法，正确的是（）。答案：以上说法都正确
286. [G]关于左甲状腺素钠片的说法，不正确的是（）。答案：因为左甲状腺素钠片的半衰期较长，每天什么时候服用都可以
287. [G]关于左甲状腺素钠片的叙述，不正确的是（）。答案：因其半衰期较长，每天什么时候服用都可以
288. [G]关于左旋多巴不良反应的错误说法是（）。答案：肝性脑病
289. [G]国际疼痛学会关于疼痛的定义，正确的是（）。答案：是组织损伤或类似潜在的组织损伤所引起的不愉快的感觉和情感体验
290. [G]过敏性结膜炎可选用（）。答案：普拉洛芬滴眼液

291. [G] 过敏性结膜炎可选用的药物是 ()。答案: 2%色甘酸钠滴眼液
292. [H] 合理用药的5R原则不包括 ()。答案: 正确的护理
293. [H] 合理用药的基本原则不包括 ()。答案: 质量合格
294. [H] 和抑郁症药物治疗相关的神经递质不包括 ()。答案: 多巴胺
295. [H] 红细胞计数减少常见于 ()。答案: 贫血
296. [H] 化脓性中耳炎的抗感染治疗, 不可选择的抗菌药物是 ()。答案: 氨基糖苷类
297. [H] 化脓性中耳炎的治疗原则为积极控制感染、通畅引流, 不可选择的抗菌药物是 ()。答案: 氨基糖苷类
298. [H] 患者骨肿瘤, 疼痛评分7分, 单独应用疗效欠佳的镇痛药物是 ()。答案: 塞来昔布
299. [H] 患者男, 16岁, 诊断为抑郁症, 应用氟西汀3个月, 抑郁症状完全消失, 下一步处理是 ()。答案: 继续原方案治疗
300. [H] 患者, 男, 72岁, 主因“血压升高6个月”入院。患者既往不规律服药, 血压控制不佳。3个月前患者将降压药物调整为氨氯地平, 血压波动于160~170/90~100 mmHg。该患者目前血压控制不佳, 需联合降压药物, 不适合的是 ()。答案: 硝苯地平
301. [J] 肌肉注射时的量应控制在 ()。答案: 5ml
302. [J] 急性鼻炎的最常见致病种类为 ()。答案: 鼻病毒
303. [J] 急性鼻炎最常见的致病病毒是 ()。答案: 鼻病毒
304. [J] 急性扁桃体炎最主要的致病菌为 ()。答案: 乙型溶血链球菌
305. [J] 急性膀胱炎的患者, 宜选用的药物是? 答案: 呋喃妥因
306. [J] 急性肾盂肾炎住院患者宜选用的药物是? 答案: 头孢曲松
307. [J] 甲氧西林敏感金葡菌感染的肺炎, 宜选用的抗菌药物是 ()。答案: 苯唑西林
308. [J] 甲氧西林敏感金葡菌感染的肺炎, 宜选用的抗菌药物是 ()。答案: 利奈唑胺
309. [J] 甲氧西林耐药金葡菌感染的肺炎, 宜选用的抗菌药物是 ()。答案: 糖肽类
310. [J] 结膜类根病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 药物治疗不建议 ()。答案: 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
311. [J] 结膜炎的药物治疗方法中, 不建议采用的是 ()。答案: 长期联用多种抗菌药物滴眼液
312. [J] 结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 药物治疗不建议 ()。答案: 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
313. [J] 结膜炎根据病因可分为细菌性、病毒性、免疫性, 以下药物治疗方法中, 不建议采用的是 ()。答案: 长期混合几种抗菌药物滴眼液联合滴眼
314. [J] 进入中枢神经系统转变为多巴胺起作用的抗帕金森病药是 ()。答案: 左旋多巴
315. [J] 精神分裂症稳定期的治疗错误的是 ()。答案: 应住院治疗
316. [J] 精神分裂症药物治疗原则的叙述, 不正确的是 ()。答案: 复发患者应换用之前未使用过的药物
317. [J] 精神分裂症最主要、最本质的症状是 ()。答案: 思维障碍
318. [J] 局部使用滴耳剂时, 在使用前应用手适当加温, 以免因药液过凉滴入耳内 ()。答案: 诱发患者眩晕
319. [J] 具有抗幽门螺杆菌作用的药物是 ()。答案: 甲硝唑
320. [J] 具有平喘、强心、利尿作用的药物是 ()。答案: 氨茶碱
321. [K] 抗癫痫药对于肝药酶代谢有自身诱导作用的是 ()。答案: 卡马西平
322. [K] 抗癫痫药的作用机制不包括 ()。答案: 增加脑内5-HT的水平
323. [K] 抗癫痫药对于肝药酶代谢有自身诱导作用的是 ()。答案: 卡马西平
324. [K] 抗甲状腺药物适用于甲亢患者的初始治疗, 其特点为 ()。答案: 可能导致永久性甲减。
325. [K] 抗帕金森病药包括哪类 ()。答案: 胆碱受体阻断药
326. [K] 抗帕金森病药物中单用无效的是 ()。答案: 卡比多巴
327. [K] 抗帕金森病药物中单用无效的是 ()。答案: 卡比多巴
328. [K] 抗帕金森病药中, 通过在脑内转变为多巴胺起作用的是 ()。答案: 左旋多巴
329. [K] 抗炎作用强, 药物直接作用于呼吸道, 所需剂量小, 全身不良反应小的药物是 ()。答案: 吸入性糖皮质激素
330. [K] 抗幽门螺杆菌的药物不包括 ()。答案: 雷尼替丁
331. [K] 可促进铁剂吸收的维生素是 ()。答案: 维生素C
332. [K] 可估计肝脏疾病的病情及预后的检测指标, 不包括 ()。答案: 血红蛋白
333. [K] 可能出现口内氨味, 并可使舌苔及大便呈灰黑色, 偶见恶心、便秘的抗酸剂是 ()。答案: 枸橼酸铋钾
334. [L] 老年人缺乏维生素D3的主要影响因素是 ()。答案: 户外活动减少
335. [L] 雷洛昔芬属于 ()。答案: 选择性雌激素受体调节剂
336. [L] 雷尼替丁治疗消化性溃疡的主要作用机制是 ()。答案: 阻断H⁺受体, 减少胃酸分泌
337. [L] 利尿剂的主要不良反应是 ()。答案: 大剂量使用会导致低血钾症和影响血脂、血糖和尿酸代谢
338. [L] 良性前列腺增生的发病率随年龄增长而增加。最初通常发生在? 答案: 40岁以后
339. [L] 良性前列腺增生缩写正确的是? 答案: BPH
340. [L] 临床上最常用的抗抑郁药是 ()。答案: 选择性5-HT再摄取抑制剂
341. [L] 临床上作为解热、镇痛抗炎的首选药不包括 ()。答案: 吲哚美辛
342. [L] 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是 ()。答案: 待已合成的甲状腺激素耗竭后才能生效
343. [L] 硫脲类抗甲状腺药起效慢的主要原因是 ()。答案: 待已合成的甲状腺素耗竭后才能生效
344. [L] 留置针一般可留置的时间是 ()。答案: 72~96h
345. [M] 慢性疼痛患者长期服用NSAID的不良反应有 ()。答案: 以上都对
346. [M] 梅尼埃病的治疗药物包括 ()。答案: 前庭神经抑制剂
347. [M] 美国风湿病协会因类风湿性关节炎影响生活的程度分为4四级。下列描述正确的是 ()。答案: III可进行一般的日常生活, 但从事某种职业的工作或参加其他项目活动受限。
348. [M] 美金刚治疗中, 重度AD的日最大使用剂量是 ()。答案: 20 mg/d
349. [M] 泌尿系统由输尿管、膀胱尿道和 () 组成。答案: 肾脏
350. [N] 哪项不是常用的祛痰药 ()。答案: 福莫特罗
351. [N] 哪项不是祛痰药的作用机制 ()。答案: 减少前列腺素的合成
352. [N] 哪种腹泻药禁用于半乳糖血症患者 ()。答案: 乳果糖
353. [N] 男性患者, 72岁, 因左膝关节行走远距离后疼痛5年就诊, 正侧位X线显示左膝内侧间隙变窄, 边缘骨质增生, 软骨下骨硬化, 患者首选的药物治疗是 ()。答案: 短期口服NSAID

354. [N]脑出血最常见的病因是（ ）。答案：高血压和动脉硬化
355. [N]脑血栓形成最常见的病因是（ ）。答案：脑动脉粥样硬化
356. [N]能提高左旋多巴疗效的药物是（ ）。答案：卡比多巴
357. [N]尿路感染是仅次于（ ）和消化道的感染性疾病。答案：呼吸道
358. [N]尿路感染治疗时治疗原则不正确的是？答案：获知病原菌后按药敏试验结果和治疗反应调整用药
359. [N]尿路感染最常见的细菌为（ ）。答案：大肠埃希氏菌
360. [N]尿路感染最常见的细菌为（ ）。答案：大肠埃希菌
361. [N]尿酸在酸碱值是多少的尿液中溶解度最高？()答案：pH在6.2~6.8
362. [N]尿酸增高常见于（ ）。答案：痛风
363. [N]女性患者在性生活后导致尿路感染反复发作的，可在性生活后服用一剂？答案：呋喃妥因
364. [P]皮肤出现红斑、水肿、糜烂、渗液时，外用药首选（ ）。答案：溶液湿敷
365. [P]皮内注射的量应控制在（ ）。答案：0.2ml
366. [Q]轻度癌痛可选用的药物是（ ）。答案：阿司匹林
367. [Q]轻度癌痛可选用的药物是（ ）。答案：对乙酰氨基酚
368. [Q]青光眼是一组以视神经萎缩和视野缺损为共同特征的疾病，主要临床表现有（ ）。答案：眼压升高或正常
369. [Q]青霉素最理想的溶剂是（ ）。答案：0.9%生理盐水
370. [Q]轻型狼疮的治疗药物不包括（ ）。答案：环磷酰胺
371. [Q]轻型狼疮的治疗药物不包括（ ）答案：环磷酰胺
372. [Q]秋水仙碱是治疗急性痛风性关节炎的传统药物。24小时剂量最大不应超过（ ）。答案：1.5mg
373. [Q]全部为促进骨形成的一组药物是（ ）。答案：氟化物、甲状旁腺激素、维生素K
374. [Q]全部为抑制骨吸收的药物是（ ）。答案：双膦酸盐类、降钙素、选择性雌激素受体调节剂
375. [Q]全部为抑制骨吸收的一组药物是（ ）。答案：双膦酸盐类、降钙素、雌激素受体调节剂
376. [R]溶血性贫血及葡萄糖6-磷酸脱氢酶缺乏症者禁用的药物是（ ）。答案：盐酸小檗碱
377. [S]三阶梯止痛治疗方案的代表药物是（ ）。答案：阿司匹林、可待因、吗啡
378. [S]肾病综合征的特征性表现是（ ）。答案：大量蛋白尿
379. [S]肾病综合征最主要的诊断依据是（ ）。答案：大量蛋白尿
380. [S]肾盂肾炎在门诊治疗宜选用的药物是？答案：氨苄西林/舒巴坦
381. [S]失眠的首选药物，不包括（ ）。答案：氯硝西泮
382. [S]失眠的药物治疗原则，不正确的是（ ）。答案：对于睡眠维持障碍者，可使用中、长效抗失眠药物
383. [S]失眠根据病程的分类不正确的是（ ）。答案：障碍性失眠
384. [S]失神发作不宜选择的药物是（ ）。答案：卡马西平
385. [S]湿疹按皮损表现分为（ ）。答案：急性、亚急性和慢性
386. [S]湿疹的病因及发病机制尚不明确，关于导致湿疹可能的因素描述不正确的是（ ）。答案：心血管疾病
387. [S]使用阿片类镇静药物可能发生呼吸抑制。发生呼吸抑制多见于（ ）。答案：老年
388. [S]使用期间应密切关注血糖的药物是（ ）。答案：吗替麦考酚酯
389. [S]使用期间应密切关注血糖水平的药物是（ ）。答案：他克莫司
390. [S]使用时需注意低血钾的药物是（ ）。答案：螺内酯
391. [S]使用雄激素治疗的是（ ）。答案：再生障碍性贫血
392. [（ ）]（ ）是衡量类风湿性关节炎活动程度的指标之一，主观性较强。答案：晨僵
393. [（ ）]（ ）是减轻并消除骨关节炎所致疼痛的重要方法。答案：非甾体抗炎药
394. [S]世界卫生组织在（ ）年明确慢性疼痛是一类疾病。答案：2000年
395. [（ ）]（ ）是一种注射给药的双膦酸盐药物。答案：唑来膦酸钠
396. [S]适用于由毛细血管损伤及通透性增加所致的出血的药物是（ ）。答案：卡巴克洛
397. [S]适用于治疗肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压患者，同时伴有刺激性干咳等不良反应的药物是（ ）。答案：血管紧张素转换酶抑制剂（卡托普利）
398. [S]属于H₂受体阻滞剂的药物是（ ）。答案：雷尼替丁
399. [S]属于阿片受体拮抗剂的药物是（ ）。答案：纳洛酮
400. [S]属于短效BZDs类的是（ ）。答案：咪达唑仑
401. [S]属于短效BZDs类的药物是（ ）。答案：咪达唑仑
402. [S]属于短效NSAID的是（ ）。答案：布洛芬
403. [S]属于短效胰岛素的是（ ）。答案：生物合成人胰岛素
404. [S]属于间接成本的是指患者（ ）。答案：伤残造成的误工损失
405. [S]属于抗纤维蛋白溶解的药物是（ ）。答案：氨甲苯酸
406. [S]属于抗纤维蛋白溶解药的是（ ）。答案：氨苯环酸
407. [S]属于强阿片药物的是（ ）答案：芬太尼
408. [S]属于弱阿片药物的是（ ）答案：可待因
409. [S]属于杀菌药的是（ ）。答案：青霉素类
410. [S]属于长效NSAID的是（ ）。答案：塞来昔布
411. [S]属于长效NSAID的是（ ）答案：塞来昔布
412. [S]属于治疗急性痛风性关节炎的一线药物是（ ）。答案：非甾体抗炎药
413. [S]双膦酸盐类的主要不良反应是（ ）。答案：上消化道紊乱和对食管的刺激
414. [S]双膦酸盐类的主要不良反应是（ ）。答案：上消化道紊乱和对食管的刺激
415. [T]他汀类药物对缺血性脑卒中患者的作用不包括（ ）。答案：预防脑血管痉挛
416. [T]糖尿病综合管理的基本原则,错误的是（ ）答案：短期治疗
417. [T]糖皮质激素类药治疗哮喘的药理作用不包括（ ）。答案：收缩支气管血管的作用
418. [T]特应性皮炎控制病情的主要药物是（ ）。答案：糖皮质激素
419. [T]通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是（ ）。答案：硝苯地平
420. [T]通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是（ ）。答案：硝苯地平
421. [T]通常用于妊娠高血压患者紧急降压的药物是（ ）答案：硝苯地平
422. [T]通过选择性阻滞突触间隙5-HT再摄取而发挥抗抑郁作用的药物是（ ）。答案：帕罗西汀
423. [T]头癣内服药治疗首选（ ）。答案：灰黄霉素
424. [T]推荐在给药前进行HLA-B*1502基因筛查

- 的药品是（）。答案：卡马西平
425. [W] 维生素K1的作用是（）。答案：治疗由抗凝药使用过量引起的出血
426. [W] 维生素K₁的作用是答案：治疗抗凝药过量引起的出血
427. [W] 为减少不良反应，倍氯米松常采用（）。答案：气雾吸入
428. [W] 胃黏膜的保护因素，不包括（）。答案：胃泌素
429. [W] 无论是初发还是复发的儿童激素敏感型肾病综合征均首选的药物是（）。答案：糖皮质激素
430. [W] 无肾毒性的头孢菌素类药物是（）。答案：头孢匹罗
431. [X] 吸入性糖皮质激素（ICS）之外唯一可单独应用的长期控制药物，可作为轻度哮喘的替代治疗药物和中度哮喘的联合用药大的药物是（）。答案：白三烯调节剂
432. [X] 细菌性阴道病最常见的病原体是（）。答案：加德纳菌
433. [X] 系统性红斑狼疮患者在应用糖皮质激素治疗的同时需加用（）。答案：免疫抑制剂
434. [X] 系统治疗银屑病的一线药物是（）。答案：氨甲蝶呤
435. [X] 系统治疗银屑病的一线药物是（）。答案：氨甲蝶呤
436. [X] 下列不属于Graves病临床表现的是（）。答案：食欲减退
437. [X] 下列不属于促进白细胞生成药物的是（）。答案：重组人粒细胞集落刺激因子
438. [X] 下列不属于促凝血因子活性药物的是（）。答案：氨甲环酸
439. [X] 下列不属于第二代抗精神病药物的是（）。答案：氯丙嗪
440. [X] 下列不属于肝功能检查的指标是（）。答案：血清肌酐
441. [X] 下列不属于功能性便秘的是（）。答案：机械性肠梗阻，肠肿瘤等。
442. [X] 下列不属于甲减临床表现的是（）。答案：双手向前平举时有细颤，腱反射活跃。
443. [X] 下列不属于贫血临床表现的是（）。答案：面色红润，肌肉充实有力
444. [X] 下列不属于贫血原因的是（）。答案：维生素K缺乏
445. [X] 下列不属于渗透性泻剂的是（）。答案：普芦卡必利
446. [X] 下列不属于失眠变更药物的指征的是（）。答案：无或轻度不良反应
447. [X] 下列不属于失眠停药的原则的是（）。答案：睡眠无障碍时，可即刻停药，以减少不良反应。
448. [X] 下列不属于使用胰岛素后出现的不良反应的是（）。答案：高血糖
449. [X] 下列不属于影响药物治疗的主要因素的是（）。答案：天气
450. [X] 下列不属于治疗慢性胃炎药物的是（）。答案：头孢地尼
451. [X] 下列关于NSAID的描述，错误的是（）。答案：对腰椎间盘突出症而言，使用NSAID可以防止疾病的发展及合并症的发生
452. [X] 下列关于PPI治疗食管反流病治疗失败原因不正确的是（）。答案：未联合用药。
453. [X] 下列关于阿尔茨海默病（AD）早期的说法不正确的是（）。答案：完全不能学习和回忆新信息。
454. [X] 下列关于氨甲蝶呤不良反应说法错误的是（）。答案：妊娠患者可以用药。
455. [X] 下列关于滴虫性阴道炎描述不正确的是（）。答案：对于不能耐受局部用药的患者，可选择口服用药，但疗效低于局部用药
456. [X] 下列关于非甾体抗炎药的特点，叙述正确的是（）。答案：同类药物中一种药物效果不佳，换用另一种药物，仍有较好作用
457. [X] 下列关于非甾体抗炎药治疗类风湿关节炎，使用注意中不正确的是（）。答案：可同时服用两种或两种以上非甾体抗炎药
458. [X] 下列关于格列奈类药物说法不正确的是（）。答案：服用药物时间在餐后15min
459. [X] 下列关于骨关节炎的治疗原则说法正确的是（）。答案：关节炎与体重无关，因此不需要管理体重
460. [X] 下列关于骨质疏松描述正确的是（）。答案：只有原发性的骨质疏松的病理特征是全身骨量减少
461. [X] 下列关于过敏性鼻炎的治疗说法正确的是（）。答案：局部抗阻胺药有氮卓斯汀、卡巴斯汀
462. [X] 下列关于急性化脓性中耳炎治疗药物说法正确的是（）。答案：改善咽鼓管通畅度、减轻局部炎症，可以用二丙酸倍氯米松鼻喷剂
463. [X] 下列关于甲减的说法不正确的是（）。答案：继发性甲减是最常见的类别
464. [X] 下列关于甲减的说法正确的是（）。答案：继发性甲减是最常见的类别
465. [X] 下列关于甲亢的疗法，错误的是（）。答案：左甲状腺素钠片
466. [X] 下列关于角膜炎的治疗说法不正确的是（）。答案：糖皮质激素原则上只能用于溃疡性角膜基质炎
467. [X] 下列关于接触性皮炎描述不正确的是（）。答案：接触性皮炎分为三类
468. [X] 下列关于接触性皮炎治疗说法不正确的是（）。答案：为防止病情加重，应尽快静脉注射糖皮质激素
469. [X] 下列关于结核杆菌描述不正确的是（）。答案：对外界的抵抗力较强，在阴湿处可生存3个月
470. [X] 下列关于精神分裂症的说法不正确的是（）。答案：意志与行为障碍是最主要、最本质的症状
471. [X] 下列关于抗癫痫药物治疗原则不正
- 确的是（）。答案：癫痫患者减药或停药，可根据症状轻重，无需脑电图检查。
472. [X] 下列关于良性前列腺增生说法不正确的是？答案：是引起中老年女性排尿障碍原因中最常见的一种良性疾病
473. [X] 下列关于尿路感染的治疗原则不正确的是？答案：急性非复杂性下尿路感染初发病例，宜用静脉注射的疗法见效快。
474. [X] 下列关于凝血因子缺乏引起的出血属于重型的是（）。答案：有肌肉出血、关节出血、关节畸形、骨假囊肿
475. [X] 下列关于帕金森病运动症状描述错误的是（）。答案：被动运动关节时阻力增高，又称“铅管样强直”，常为首发症状。
476. [X] 下列关于妊娠高血压病描述不正确的是（）。答案：妊娠高血压病是造成我国孕产妇死亡的第一大原因
477. [X] 下列关于妊娠高血压描述不正确的是（）。答案：于产后4周内血压恢复正常
478. [X] 下列关于妊娠期高血压病治疗原则描述不正确的是（）。答案：子痫期应控制抽搐，尽量保证胎儿安全，尽量延长孕期
479. [X] 下列关于社区获得性肺炎描述不正确的是（）。答案：对于住院患者应快速应用抗生素，不必等细菌培养结果
480. [X] 下列关于肾病综合征用药注意事项说法不正确的是（）。答案：少尿患者也可以放心使用渗透性利尿药，不需要监测电解质水平。
481. [X] 下列关于肾上腺素受体阻滞剂说法，错误的是（）。答案： α 受体阻滞剂常作为一般高血压治疗的首选
482. [X] 下列关于肾小球肾炎临床表现说法不正确的是（）。答案：所有肾小球肾炎患者终末期都会出现肾功能不全或尿毒症。
483. [X] 下列关于失眠首选药物的说法错误的是（）。答案：氯硝西泮
484. [X] 下列关于失眠原因的说法错误的是（）。答案：抗抑郁药不会引起失眠

485. [X] 下列关于失眠治疗的说法错误的是（ ）。答案：对于急性失眠，不应使用药物治疗，以免形成药物依赖
486. [X] 下列关于湿疹治疗描述不正确的是（ ）。答案：应尽快常规、长期使用糖皮质激素
487. [X] 下列关于湿疹治疗描述正确的是（ ）。答案：以上均正确
488. [X] 下列关于手足癣的药物治疗描述不正确的是（ ）。答案：无论外用药物治疗效果如何均应口服抗真菌药
489. [X] 下列关于双膦酸盐的使用叙述正确的是（ ）。答案：口服双膦酸盐类的主要不良反应是上消化道紊乱和对食管的刺激
490. [X] 下列关于糖尿病的说法不正确的是（ ）。答案：糖尿病一般不引起其他脏器的损害。
491. [X] 下列关于外阴阴道假丝酵母菌病描述不正确的是（ ）。答案：外阴阴道假丝酵母菌占微生物所致阴道炎的1/3-1/2
492. [X] 下列关于外阴阴道假丝酵母菌病治疗描述不正确的是（ ）。答案：重度外阴阴道假丝酵母菌应在治疗单纯性方案基础上延长疗程，巩固治疗至半年
493. [X] 下列关于外阴阴道假丝酵母菌病治疗描述不正确的是（ ）。答案：应积极去除诱因，规范化应用抗感染药物
494. [X] 下列关于微生态制剂的描述，不正确的是（ ）。答案：活菌制剂可以与抗菌药物同服
495. [X] 下列关于胃食管反流病的临床表现说法不正确的是（ ）。答案：吞咽困难。
496. [X] 下列关于胃食管反流病的一般治疗原则不正确的是（ ）。答案：抽烟、喝酒对该疾病无显著影响。
497. [X] 下列关于选择性5-HT再摄取抑制剂（SSRIs）说法不正确的是（ ）。答案：疗效已经超过三环或四环类抗抑郁药。
498. [X] 下列关于药物治疗作用的描述，错误的是（ ）。答案：磺脲类药物是通过作用于胰岛A细胞表面的受体促进胰岛素分泌
499. [X] 下列关于医院获得性肺炎描述不正确的是（ ）。答案：重视病原学检查，没有痰培养结果，坚决不能使用抗生素治疗
500. [X] 下列关于银屑病临床表现描述不正确的是（ ）。答案：脓疱型银屑病分为掌跖型和红皮病型
501. [X] 下列关于治疗单纯性外阴阴道假丝酵母菌病，治疗方案正确的是（ ）。答案：咪康唑栓400mg，每晚1次，共3天
502. [X] 下列关于治疗青光眼的药物作用机理描述不正确的是（ ）。答案：20%的甘露醇静点可以减少防水生成
503. [X] 下列疾病通过多吃新鲜水果和蔬菜即可取得治疗效果的是答案：叶酸缺乏性贫血
504. [X] 下列精神分裂症药物治疗原则错误的是（ ）。答案：复发患者应换用之前未使用过的药物
505. [X] 下列抗帕金森药物作用机制为选择性激动D3受体，单独应用对早期帕金森病有改善的是（ ）。答案：普拉克索
506. [X] 下列抗抑郁药不属于选择性5-HT再摄取抑制剂的是（ ）。答案：氯丙咪嗪
507. [X] 下列可选用单硝酸异山梨酯治疗的疾病是（ ）。答案：不稳定性心绞痛
508. [X] 下列哪项不是常用的减充血剂？（ ）。答案：氯雷他定
509. [X] 下列哪项不是癫痫服用苯巴比妥后可能产生的不良反应（ ）。答案：最常见的不良反应为兴奋
510. [X] 下列哪项不是青光眼降眼压的常用药物？（ ）。答案：氟米龙
511. [X] 下列哪项是导致急性腹泻的原因（ ）。答案：伤寒或副伤寒
512. [X] 下列哪项在治疗寻常型银屑病时不正确？（ ）。答案：首选口服糖皮质激素
513. [X] 下列哪种AED对于肝药酶代谢有自身诱导作用（ ）。答案：卡马西平
514. [X] 下列哪种抗抑郁药物的半衰期较长，为2-4天（ ）。答案：氟西汀
515. [X] 下列哪种药物有明显的镇静催眠作用，能缩短入睡时间，延长睡眠持续时间（主要是2期睡眠）（ ）。答案：艾司唑仑
516. [X] 下列哪些药物不是助消化药物（ ）。答案：西咪替丁
517. [X] 下列是SLE的基础治疗药物，并应长期维持使用的是（ ）。答案：羟氯喹
518. [X] 下列是系统性红斑狼疮的基础治疗药物，可控制皮疹和减轻光过敏的是（ ）。答案：羟氯喹
519. [X] 下列属于间接成本的是（ ）。答案：伤残造成的误工损失
520. [X] 下列属于肾功能检查指标的是（ ）。答案：血清肌酐
521. [X] 下列属于糖尿病临床表现的是（ ）。答案：以上都是
522. [X] 下列属于胃肠动力药的是（ ）。答案：多潘立酮
523. [X] 下列说法不正确的是（ ）。答案：以肾排泄为主的药物，在肾衰竭时t_{1/2}明显缩短
524. [X] 下列说法不正确的是（ ）。答案：不同类型的骨质疏松，其治疗和预防的原则是不同的
525. [X] 下列说法不正确的是（ ）。答案：滴虫性阴道炎是妊娠或非妊娠女性阴道炎最常见的原因
526. [X] 下列药品不属于阿片受体激动剂的是（ ）。答案：纳洛酮
527. [X] 下列药物单用抗帕金森病无效的是（ ）。答案：卡比多巴
528. [X] 下列药物对甲状腺功能减低有疗效的是（ ）。答案：左甲状腺素钠片
529. [X] 下列药物能抑制胃酸分泌的是（ ）。答案：哌仑西平
530. [X] 下列药物使用时应注意监测患者体重、血压、外周性水肿、血脂、糖尿病、青光眼、骨折风险的药物是（ ）。答案：糖皮质激素
531. [X] 下列药物属于抗纤溶药物的是（ ）。答案：氨甲环酸
532. [X] 下列药物中常与他汀类联用的是（ ）。答案：抗真菌药
533. [X] 下列药物中常与他汀类联用的是（ ）。答案：依折麦布
534. [X] 下列药物作用机制属于渗透性利尿的是（ ）。答案：羟乙基淀粉
535. [X] 下列证据类型中，不属于二次研究的是（ ）。答案：前瞻性队列研究
536. [X] 下列证据类型中，不属于原始研究的是（ ）。答案：系统评价
537. [X] 下列作为治疗和预防子痫发作的药物是（ ）。答案：硫酸镁
538. [X] 下述说法中不正确的是（ ）。答案：因为维生素D3是维生素类药物，故可安全放心地服用
539. [X] 哮喘的控制药物不包括（ ）。答案：短效口服β₂受体激动剂
540. [X] 哮喘给药途径以吸入疗法为优，以下表述不正确的是（ ）。答案：血药浓度高
541. [X] 哮喘给药途径以吸入疗法为优，以下表述不正确的是（ ）。答案：血药浓度高
542. [X] 哮喘给药途径以吸入疗法为优，以下关于吸入疗法的表述不正确的是（ ）。答案：血药浓度高
543. [X] 消化性溃疡的发病机制，叙述较全面的是（ ）。答案：致溃疡的攻击因素和人体对胃黏膜的保护因素失去平衡
544. [X] 血红蛋白生理性增加常见于（ ）。答案：高原居民
545. [X] 血红蛋白增加常见于（ ）。答案：新生儿
546. [X] 血清总蛋白增高常见于（ ）。答案：腹

泻

547. [X]血小板计数增多常见于（）。答案：急性感染

548. [X]循证医学定义的核心内容，不包括（）。答案：规章制度

549. [Y]盐酸坦索罗辛属于哪类治疗良性前列腺增生的药物？答案：肾上腺素能 α 受体激动剂

550. [Y]眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用，关于升高眼压效力说法正确的是（）。答案：地塞米松>泼尼松龙>氟米龙>氢化可的松

551. [Y]眼用糖皮质激素可起到抗炎、抗过敏的治疗作用，下列说法正确的是（）。答案：抗炎效力：地塞米松>氟米龙>泼尼松龙>氢化可的松

552. [Y]洋地黄类药物的禁忌证不包括（）。答案：心动过速

553. [Y]洋地黄类药物的禁忌证不包括（）。答案：心动过速

554. [Y]药物不良反应报告表填写需用（）。答案：黑色笔

555. [Y]药物排泄的主要器官是（）。答案：肾

556. [Y]药物在肝内的转化的第一阶段与药物的（）。答案：药物的活性有关

557. [Y]药物治疗过程不包括（）。答案：药物检验阶段

558. [Y]药物治疗最初阶段，药物以不同制剂的形式，通过不同给药途径，从给药部位进入患者体内的过程，称为（）。答案：药剂学阶段

559. [Y]药学信息服务不包括（）。答案：处方审查

560. [Y]药学信息服务不包括（）。答案：进行新药的研究和开发

561. [Y]药疹治疗的首要措施是（）。答案：停用致敏药物

562. [Y]药疹治疗的首要措施是（）。答案：停用致敏药物

563. [Y]依立雄胺属于哪类治疗良性前列腺增生的药物？答案：5 α 还原酶抑制剂

564. [Y]医疗机构药学信息服务的核心，不包括（）。答案：药品生产

565. [Y]医师开具处方不应当遵循的原则是（）。答案：选用患者指定的药物

566. [Y]医师开具处方应当遵循的原则是（）。答案：选用安全、有效、经济的药物

567. [Y]一位患者的HLA-B*5801基因检测结果为阳性，如果他需要进行降尿酸的药物治

568. [Y]以货币计量的产出是（）。答案：效益

569. [Y]以下不属于循证医学定义的核心内容的是（）。答案：规章制度

570. [Y]以下抗抑郁药物治疗原则不恰当的是（）。答案：如仍无效，可考虑换药，但不能换用同类另外一种药

571. [Y]以下哪项不属于急性化脓性中耳炎常见致病菌？（）答案：大肠埃细菌

572. [Y]以下哪项属于A型药品不良反应（）。答案：与剂量有关

573. [Y]以下哪项属于费用（）。答案：隐形成本

574. [Y]以下哪种疾病不适合外用糖皮质激素治疗？（）答案：体股癣

575. [Y]以下属于肝药酶诱导剂的是（）。答案：苯巴比妥

576. [Y]以下药物不属于苯二氮卓类药物的是（）。答案：佐匹克隆

577. [Y]抑制骨矿化不良反应最严重的双膦酸盐类药物是（）。答案：依替膦酸二钠

578. [Y]抑制尿酸合成的药物是（）。答案：别嘌醇

579. [Y]银屑病的治疗目的在于控制病情，延缓全身发展，减轻症状，避免复发，提高患

者生存质量。下列药物属于治疗银屑病一线药物的是（）。答案：氨甲蝶呤

580. [Y]银屑病临床上可分为（）。答案：寻常型、脓疱型、关节病型、红皮病型

581. [Y]引起消化性溃疡的攻击因素，错误的是（）。答案：米索前列醇

582. [Y]影响药物作用的药物因素不包括（）。答案：精神因素

583. [Y]用糖皮质激素治疗肾病综合征的描述中，错误的是（）。答案：用药后尿中蛋白减少即减量

584. [Y]用于青光眼降眼压的常用药物，不包括（）。答案：氟米龙

585. [Y]有关吸入型短效 β_2 受体激动剂的叙述，不正确的是（）。答案：是长期治疗持续性哮喘的首选药物

586. [Y]有关吸入型短效 β_2 受体激动剂的说法中，不正确的是（）。答案：为长期治疗持续性哮喘的首选药物

587. [Y]右美沙芬属于下述何种药物（）。答案：非成瘾性中枢性镇咳药

588. [Y]与他汀类药物同时使用无不良药物相互作用的是（）。答案：氯吡格雷

589. [Y]与伪麻黄碱合用可能造成“重复用药”的是（）。答案：泰诺

590. [Y]与伪麻黄碱可能造成“重复用药”的药物是（）。答案：泰诺

591. [Y]与伪麻黄碱合用可能造成“重复用药”的是（）。答案：泰诺

592. [Y]与药物剂量无关的药物不良反应是（）。答案：过敏反应

593. [Y]原发性骨质疏松最常见的症状是（）。答案：疼痛，以腰背痛多见。

594. [Y]原发性和继发性骨质疏松最重要的影响因素是（）。答案：激素调控

595. [Z]在甲亢时升高，最常见和最有诊断意义的是（）。答案：FT3

596. [Z]在甲亢时升高，最常见和最有诊断

意义的是（）。答案：FT3

597. [Z]在溃疡面形成黏胶保护层的药物是（）。答案：胶体果胶铋

598. [Z]在使用阿片或非阿片镇痛药治疗慢性疼痛时，需要合理使用的辅助药物包括（）。答案：以上都对

599. [Z]在使用利尿药时需注意引起高血钾的是（）。答案：螺内酯

600. [Z]在治疗类风湿性关节炎（）是临床常用的缓解症状的药物，在控制病情方面作用有限的是？答案：非甾体抗炎药

601. [Z]增加尿酸排泄的药物是（）。答案：苯溴马隆

602. [Z]诊断患者为重度子痫前期，血压持续升高为（）答案：收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$

603. [Z]诊断患者为重度子痫前期，血压持续升高为（）答案：收缩压 $\geq 160\text{mmHg}$ 和(或)舒张压 $\geq 110\text{mmHg}$

604. [Z]治疗COPD的支气管扩张剂不包括（）。答案：糖皮质激素

605. [Z]治疗COPD的支气管扩张剂不包括（）。答案：茶碱类药物

606. [Z]治疗COPD急性加重期的药物中，不正确的是（）。答案：吸入糖皮质激素

607. [Z]治疗RA的药物中，每周给药一次的是（）。答案：氨甲蝶呤

608. [Z]治疗癫痫持续状态的首选是（）。答案：静脉注射地西泮

609. [Z]治疗肺结核的一线药物不包括（）。答案：氨茶碱

610. [Z]治疗肺结核的一线药物不包括（）。答案：链霉素

611. [Z]治疗急性湿疹，无水肿、糜烂、渗液，外用药首选（）。答案：炉甘石洗剂

612. [Z]治疗抗帕金森病的药物，单用无效的是（）。答案：卡比多巴

613. [Z]治疗类风湿关节炎的首选药物是（）。

答案：氨甲蝶呤

614. [Z]治疗类风湿关节炎的药物中，给药频率为每周1次的是（ ）。答案：甲氨蝶呤

615. [Z]治疗类风湿关节炎的药物中，甲氨给药频率为（ ）答案：每周1次

616. [Z]治疗类风湿关节炎的药物中，每周给药一次的是（ ）。答案：氨甲蝶呤

617. [Z]治疗类风湿性关节炎，对磺胺过敏者、肠梗阻或泌尿系梗阻者禁用的药物是（ ）。答案：柳氮磺胺吡啶

618. [Z]治疗类风湿性关节炎期间应补充叶酸药物是（ ）。答案：氨甲蝶呤

619. [Z]治疗良性前列腺增生，对前列腺素内双氢睾酮抑制率最高的药物是？答案：非那雄胺

620. [Z]治疗良性前列腺增生起效缓慢，见效时间为3-6个月的药物是？答案：A非那雄胺

621. [Z]治疗良性前列腺增生，由于作用是可逆的，停药后血浆双氢睾酮和前列腺体积可以复旧，因此维持用药时间宜较长的药物是？答案：依立雄胺

622. [Z]治疗耐甲氧西林金黄色葡萄球菌感染的肺炎宜选用（ ）。答案：万古霉素

623. [Z]治疗皮肤型红斑狼疮非常有效，但机制尚不明确的药是（ ）。答案：沙利度胺

624. [Z]治疗前列腺增生，不引起低血压的药物是（ ）。答案：非那雄胺

625. [Z]治疗轻、中度阿尔茨海默病的一线药物，不包括（ ）。答案：美金刚联合多奈哌齐

626. [Z]治疗妊娠高血压的药物，不包括（ ）。答案：硫酸镁

627. [Z]治疗糖尿病高血压的药物中能延缓糖尿病肾病的进展，减少尿蛋白产生的是（ ）。答案：血管紧张素II受体阻滞剂（氯沙坦）

628. [Z]治疗心力衰竭的基本药物，不包括（ ）。答案：维拉帕米

629. [Z]治疗炎症性肠病有效的一线药物是

（ ）。答案：柳氮磺吡啶

630. [Z]治疗衣原体感染所致的结膜炎最好选用的药物是（ ）。答案：利福平

631. [Z]治疗中重度炎症性肠炎急性发作最常用的药物是（ ）。答案：布地奈德肠溶衣片

632. [Z]治疗重度外阴阴道假丝酵母菌病服用氟康唑，方案正确的是（ ）。答案：氟康唑150mg，顿服，第1天和第4天

633. [Z]终点指标不包括（ ）。答案：血糖水平

634. [Z]重度子痫前期患者，血压应高于或等于（ ）。答案：160/110 mmHg

635. [Z]重型药疹应及早应用（ ）。答案：糖皮质激素

636. [Z]周于短效BZDs类的药物是答案：氟西泮

637. [Z]阻断延髓催吐化学感受区的多巴胺受体，具有止吐作用的药物是（ ）。答案：甲氧氯普胺

638. [Z]最适宜治疗巨幼细胞贫血患者的是（ ）。答案：叶酸及维生素B12

639. [Z]最适宜治疗巨幼细胞性贫血的药物是（ ）。答案：铁剂及维生素B₁₂

640. [Z]最适宜治疗巨幼细胞性贫血患者的药物是（ ）。答案：叶酸及维生素B₁₂

641. [Z]左旋多巴治疗帕金森病的机制是（ ）。答案：左旋多巴在脑内转变为DA，补充纹状体内DA的不足

642. [Z]作为SLE的基础治疗药物，应长期使用使用的是（ ）。答案：羟氯喹

643. [Z]作用机制为大剂量使用，激动黑质-纹状体通路的D2受体的抗帕金森药物是（ ）。答案：溴隐亭

判断题(10)微信号：zydz_9527

1. [C]长期应用皮质激素后，可导致肾上腺分泌功能增强。（ ）答案：错误

2. [D]大量使用糖皮质激素可引起皮肤变薄、

肌萎缩、儿童骨骼发育停滞。（ ）答案：正确

3. [G]肛门栓不可避免肝首关效应。（ ）答案：错误

4. [G]广谱抗生素大量长期应用可引起二重感染但不会造成维生素的缺乏。（ ）答案：错误

5. [H]环丙沙星与含钙或镁离子的抗酸药同服可降低环丙沙星的吸收。（ ）答案：正确

6. [K]抗心律失常药物易引起心律失常。（ ）答案：正确

7. [M]某人服用抗结核药异烟肼后出现多发性神经炎为特异质反应。（ ）答案：正确

8. [T]糖皮质激素在应用生理剂量替代治疗时可出现明显的不良反应。（ ）答案：错误

9. [T]头孢他啶注射液可与葡萄糖酸钙合用。（ ）答案：错误

10. [Y]阴道栓不可避免肝首关效应。（ ）答案：错误

填空题(67)微信号：zydz_9527

- 1. A. 洛伐他汀
- B. 吉非贝齐
- C. 依折麦布
- D. 考来烯胺

- 1. 属于贝特类药物的是（ ）
- 2. 属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是（ ）。答案：1B2A

- 2. A. 凝血酶原复合物
- B. 维生素K
- C. 抑肽酶
- D. 卡巴克络

- 1. 促凝血因子活性的药物是（ ）。
- 2. 提供凝血因子的药物是（ ）。答案：促凝血因子活性的药物是（B）提供凝血因子的药物是（A）

3. A. 强阿片类药，并可合用非甾体类抗炎药以及辅助镇痛药

B. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药，并可联合应用非甾体类抗炎药以及辅助镇. 痛药

C. ... 轻度疼痛，可选用（ ）。

2. 癌症患者中度疼痛，可选用（ ）。

3. 癌症患者重度疼痛，首选（ ）。

4. 癌症患者由骨转移引起的疼痛，选用（ ）。答案：1C

2B

3A

4D

4. A. 西咪替丁

B. 氢氧化镁

C. 米索前列醇

D. 莫沙必利

1. 保护胃黏膜的药物是（ ）。

2. 中和胃酸的药物是（ ）。

3. 抑制胃酸分泌的药物是（ ）。

4. 促胃动力药物是（ ）答案：1C

2B

3A

4D

5. [B]半衰期长的抗菌药首次应用时应_____。答案：加倍

6. [C]肠溶片、缓控释片不可_____, _____, _____。答案：随意分剂量;研碎;咀嚼

7. [C]肠溶片、缓控释片应_____, 不可_____或_____。答案：整片吞服;掰开;研碎

8. [D]单纯下尿路感染，抗菌药物剂量可应用较_____。答案：小

9. [D]对于治疗指数小，个体差异大及有非线性动力学特征的药物应控制静脉滴注速度，如滴注速度过快可造成_____, 过慢会造成_____。答案：中毒;有效浓度不够

10. [F]腹泻治疗的药物分为

_____、_____、
_____等。答案：微生物制剂；
抗菌药物；肠粘膜保护剂

11. [G]肝药酶答案：催化药物结构发生变化的
酶，主要是肝微粒体混合功能氧化酶系统。

12. [G]冠心病的类型有_____、
_____、_____。答
案：稳定型心绞痛；不稳定型心绞痛；心肌梗死

13. [J]甲减的治疗主要是
_____，代表药是
_____。答案：甲状腺激素代替
治疗；左甲状腺素

14. [J]简述婴幼儿用药护理要点。答案：密
切观察，剂量正确，适当途径，适当剂型。

15. [J]降糖药分为_____、
_____、_____。答
案：口服降糖药；胰岛素；胰岛素类似物

16. [K]抗生素后效应答案：指细菌与抗生素
短暂接触，当抗生素浓度下降，低于最低抑菌
浓度或消失后，细菌生长仍受到持续抑制的效
应。

17. [K]控制甲亢症候群的方法有
_____、_____、
_____。答案：应用抗甲状腺药物；应用
放射性同位素碘；手术治疗

18. [L]留置针分为_____、
_____、_____三
种类型。答案：开放式留置针；密闭式留置针；
密闭式防刺伤安全型留置针

19. [L]氯化钾注射液禁用于
_____、_____。
答案：高钾血症；急性肾功能不全

20. [M]慢性疼痛分为_____和
_____两种。答案：慢性恶性疼痛
（癌痛）；慢性非恶性疼痛

21. [P]配伍禁忌分为_____和
_____配伍禁忌。答案：物理；
化学

22. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. H^+-K^+ -ATP酶抑制药
B. H_2 受体抑制剂
C. 促胃肠动力药
D. 胃黏膜保护药

1. 奥美拉唑属于（ 1 ）
2. 枸橼酸铋钾属于（ 2 ）
3. 雷尼替丁属于（ 3 ）
4. 甲氧氯普胺属于（ 4 ）答案：
A;D;B;C

23. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 阿司匹林
B. 氯吡格雷
C. 替格瑞洛 ...

2. 常见不良反应为出血、白细胞减少的药物
为（ 2 ）
3. 常见不良反应为出血、高尿酸血症的药物
为（ 3 ）答案：A;B;C

24. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 苯妥英钠
B. 苯巴比妥
C. 氯硝西泮 ... 对大发作、局限性发作及
癫痫持续状态效果好的是（ 3 ）
4. 对失神发作和肌阵挛发作有较好的疗效的
是（ 4 ）答案：A;D;B;C

25. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 苯溴马隆

B. 别嘌醇
C. 秋水仙碱
D. 碳酸氢钠

1. 治疗急性...)。
3. 抑制尿酸合成的药物是（ 3 ）。
4. 当高尿酸血症患者尿pH值小于6.0时，需碱
化尿液，可服用（ 4 ）。答案：
C;A;B;D

26. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 比沙可啶
B. 乳果糖
C. 开塞露
D. 普芦卡必利
1... 属于刺激性泻剂的是（ 2 ）
3. 属于促动力剂的是（ 3 ）
4. 属于肛门用泻剂的是（ 4 ）答
案：B;A;D;C

27. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 二级预防
B. 一级预防
1. 高血脂治疗对象为临床上未发现冠心病或
其他部位动脉粥样硬化性疾病者，属于
（ 1 ）。
2. 高血脂治疗对象为临床上已发现冠心病或
其他部位动脉粥样硬化性疾病者，属于
（ 2 ）。答案：B;A

28. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 二甲双胍
B. 吡格列酮
C. 瑞格列奈

D. 西格列汀
1... 胰岛素作用的敏感性而降低血糖
（ 3 ）
4. 外源性给与GLP-1，加强葡萄糖依赖性促胰岛
素分泌的特性（ 4 ）答案：C;A;B;D
29. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 非甾体类抗炎药物(NSAIDs)
B. 强阿片类药，并可... 者轻度疼痛，可选用
（ 1 ）。
2. 癌症患者中度疼痛，可选用（ 2 ）。
3. 癌症患者重度疼痛，首选（ 3 ）。答
案：A;C;B

30. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 肥大细胞膜稳定剂
B. 减充血剂
C. 抗白三烯药
D. 抗... 治疗过敏性鼻炎的药物1%麻黄碱溶液
属于（ 3 ）。
4. 治疗过敏性鼻炎的药物0.03%异丙托溴铵鼻
溶液属于（ 4 ）。答案：A;C;B;D

31. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳
答案。）

- A. 氟化物
B. 雌激素和孕激素
C. 活性维生素D₃ 1. 治疗和预防骨质疏松症的
药物中，抑制骨吸收的药物有（ 1 ）。
2. 促进骨形成的药物有（ 2 ）。
3. 作用于骨矿化的药物有（ 3 ）。答案：
B;A;C

32. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可
重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答

案。)

A干预措施在严格控制的情况下对患者产生的治疗效果

B干预措... 偏好

- 1. 效果是指 (1)。
- 2. 疗效是指 (2)。
- 3. 效用是指 (3)。
- 4. 效益是指 (4)。答案: B;A;D;C

33. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 环孢素A
- B. 他克莫司
- C. 烷化剂
- D. 吗替麦考酚酯

- 1. ... 恶心、糖耐量减低、肾功能减退的是 (3)
- 4. 不良反应为严重贫血和伴肾功能损伤者应用后出现感染的是 (4) 答案: C;A;B;D

34. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A碱中毒
- B剧烈运动后
- C糖尿病
- D急性肾小球肾炎

- 1. 蛋...。
- 2. 蛋白尿生理性增多常见于 (2)。
- 3. 尿糖增多常见于 (3)。
- 4. 尿pH值大于正常值多见于 (4)。答案: D;B;C;A

35. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 降压治疗

- B. 镇静
- C. 防治子痫

- 1. 妊娠高血压疾...)。
- 2. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 硫酸镁用于 (2)。
- 3. 妊娠高血压疾病的药物治疗中, 地西洋用于 (3)。答案: A;C;B

36. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A进入体内的药物随血液分布到各器官、组织, 到达病变部位, 使... 学阶段是指 (2)
- 3. 药物治疗过程中的药效学阶段是指 (3)
- 4. 药物治疗过程中的药物治疗学阶段是指 (4) 答案: B;A;D;C

37. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 硫酸亚铁
- B. 维生素B₁₂
- C. 司坦唑醇
- D. 重组人红细胞生成素
- 1. 用于慢性肾功能不全贫血治疗的是 (1)
- 2. 用于缺铁性贫血治疗的是 (2)
- 3. 用于再生障碍性贫血治疗的是 (3)
- 4. 用于维生素B₁₂缺乏贫血治疗的是 (4) 答案: D;A;C;B

38. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 洛伐他汀
- B. 吉非贝齐
- C. 依折麦布

D. 考来烯胺

- 1. 属于贝特类药物的是 (1)。
- 2. 属于羟甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是 (2)。答案: B;A

39. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 氯氮平
- B. 利培酮
- C. 氨磺必利
- D. 阿立哌唑

- 1. 对多种受体5-HT_{2A}、5-HT_{2B}、α-肾上腺素能和胆碱能受体有亲和性, 对多巴胺受体亲和性相对较低的是 (1)
- 2. 有很强的中枢5-HT, 尤其是5-HT_{2A}和多巴胺受体的拮抗作用的是 (2)
- 3. 通过稳定DA系统和拮抗5-HT_{2A}受体产生抗精神病作用的是 (3) 答案: A;B;D

40. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 凝血酶原复合物
- B. 重组人血小板生成素
- C. 维生素K

- ...。
- 2. 提供凝血因子的药物 (2)
- 3. 抗纤溶药物 (3)
- 4. 促血小板生成药物 (4) 答案: C;A;D;B

41. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 帕罗西汀
- B. 文拉法辛
- C. 西酞普兰
- D. 米氮平

1. 胃肠道不良反应少, 性功能障碍少 (1)

- 2. 药物镇静作用较强 (2)
- 3. 重度抑郁疗效好, 药物相互作用少 (3) 答案: D;A;B

42. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A哌唑嗪
- B依那普利
- C氯沙坦

- D氢氯噻嗪
- 1. 大剂量使用... 药物是 (3)。
- 4. 适用于治疗肥胖、糖尿病和心脏、肾脏靶器官受损的高血压患者, 不良反应没有刺激性干咳的药物是 (4)。答案: D;A;B;C

43. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 氢氯噻嗪
- B. 卡托普利
- C. 氨... (2)。
- 3. 属于血管紧张素转换酶抑制药的是 (3)。
- 4. 属于血管紧张素 II 受体阻滞剂的是 (4)。答案: A;C;B;D

44. [P]配伍选择题 (请填大写字母, 选项可重复选用, 也可不选用。每题只有一个最佳答案。)

- A. 氢氯噻嗪
- B. 羟乙基淀粉
- C. 呋塞米
- D. 氨苯喋啶
- ... 噻嗪类利尿药的是 (2)
- 3. 属于渗透性利尿药的是 (3)
- 4. 属于袢利尿药的是 (4) 答案:

D;A;B;C

45. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

- A. 沙丁胺醇
- B. N-乙酰半胱氨酸
- C. 氨茶碱
- D. ... 2)

3. 解除气道平滑肌痉挛，舒张全身血管（ 3 ）

4. 缓解轻至中度哮喘急性症状的首选药物（ 4 ）答案：D;B;C;A

46. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

- A. 舍曲林
- B. 帕罗西汀
- C. 氟西汀
- D. 西普酞兰

1. ... 心、汗出增多、流涎减少、头痛、睡眠时间减少的药物是（ 3 ）

4. 不良反应为腹泻、震颤、口干的药物是（ 4 ）答案：C;B;D;A

47. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

- A. 速效胰岛素
- B. 短效胰岛素
- C. 中效胰岛素
- D. 预混胰... 射该胰岛素30分钟内必须进食含糖类的正餐（ 3 ）

4. 注射后1.5h起效，最大浓度为4-12h（ 4 ）答案：D;A;B;C

48. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

A替代指标
B终点指标

1. 降压药对心血管事件发生率和死亡... 发生率的影响属于（ 2 ）。

3. 降压药对血压的影响属于（ 3 ）。

4. 降脂药对血脂的影响属于（ 4 ）。

答案：B;B;A;A

49. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

A. 外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等，可合用保湿剂及角质... 溶液等

1. 湿疹急性期有大量渗出时选择（ 1 ）。

2. 湿疹亚急性期应（ 2 ）。

3. 湿疹慢性期应（ 3 ）。

答案：C;B;A
50. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

A. 维持用药的时间宜较长

B. 避免驾驶或机械操作

C. 使用... 2h内，或在停药时应（ 1 ）。

2. 前列腺增生患者在服用5α还原酶抑制剂时，（ 2 ）。

3. 前列腺增生患者使用度他雄胺，建议（ 3 ）。

答案：B;A;C
51. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

A. 盐酸小檗碱

B. 蒙脱石

C. 消旋卡多曲

D. 地衣芽孢杆菌... （ 2 ）

3. 有改善肠道菌群作用的药物是（ 3 ）

4. 有治疗肠道感染作用的药物是（ 4 ）答案：B;C;D;A

52. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

- A. 异丙托溴铵
- B. 氨溴索
- C. 氨茶碱
- D. 氯雷他...)

3. 提高咳嗽对气道分泌物的清除率（ 3 ）

4. 阻断组胺受体抑制血小管扩张，降低血管通透性（ 4 ）答案：A;C;B;D

53. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

- A. 原始研究证据
- B. 二次研究证据

1. 循证医学... 循证医学及循证药学的证据中，系统评价/Meta分析属于（ 3 ）。

4. 循证医学及循证药学的证据中，临床实践指南属于（ 4 ）。

答案：A;A;B;B
54. [P]配伍选择题（请填大写字母，选项可重复选用，也可不选用。每题只有一个最佳答案。）

A. 在人群中进行的、前瞻性的、用于评估医学干预措施效果的实... 变化

1. 随机对照试验是指（ 1 ）。

2. 荟萃分析是指（ 2 ）。

3. 替代指标是指（ 3 ）。

4. 观察性研究是指（ 4 ）。

答案：A;C;D;B
55. [R]妊娠期用药分为____级，其中对胎儿影响甚微的为____级。答案：5;A

56. [S]水溶性大分子或离子型药物难以透过细胞膜，提升血液pH可使____药物向细胞内转移。答案：弱碱性

57. [T]糖皮质激素在临床主要用于

____、____、____。
答案：严重急性细菌感染;自身免疫性疾病;器官移植排斥反应、变态反应性疾病

58. [W]胃肠道给药的方式有

____、____、____等。
答案：口服;舌下含服;直肠给药

59. [X]细菌的基本结构有____、____、____。
答案：细胞壁;细胞膜;细胞质;核质

60. [X]细菌的特殊结构有____、____、____。
答案：荚膜;鞭毛;芽孢;菌毛

61. [X]新型给药系统有____、____、____。
答案：口服缓控释制剂;靶向给药系统;脂质体

62. [Y]药物不良反应监测的意义____、____、____。
答案：弥补药品上市前研究不足;减少药物不良反应的危害;促进新药的研制开发;促进临床合理用药

63. [Y]药物进行生物转化的主要器官为____、催化转化的酶简称____。
答案：肝;旺药酶

64. [Y]药物经济学答案：是药理学与经济学相结合的一门边缘学科。

65. [Y]药物经济学研究的方法有____、____、____。
答案：最小成本分析;成本-效益分析;成本-效果分析;成本-效用分析

66. [Y]药物治疗学是在____、____的基础上，以

_____为系统的一门学科。**答案: 药理学;临床药理学;临床疾病**

67. [Y]影响药物作用的机体方面的因素有_____、_____、_____、_____。**答案: 年龄;性别;精神因素与病理状况;遗传因素**

主观题 (67) 微信号: zydz_9527

- 1. A. 苯海索B. 恩他卡朋C. 普拉克索D. 溴隐亭47. 抗帕金森病...
- 2. A. 地西泮 B. 多塞平C. 唑吡坦D. 艾司唑仑1. 治疗失眠的药...
- 3. A. 氟化物B. 雌激素和孕激素C. 活性维生素D3D. 非甾体抗炎...
- 4. A. 冷湿敷, 如3%硼酸溶液、0. 1%盐酸小檗碱溶液、0. 1%...
- 5. A. 利尿药B. 钙通道阻滞剂C. 血管紧张素转换酶抑制剂D. 血管...
- 6. A、洛伐他汀 B. 吉非贝齐 C. 依折麦布...
- 7. A. 强阿片类药, 并可合用非体类抗炎药以及辅助镇痛药 B...
- 8. A. 伪麻黄碱 B. 氢溴索C. 马来酸氯苯那敏 D. 对乙酰氨基酚...
- 9. A. 西咪替丁 B. 氢氧化镁 C. 米索前列醇D. 莫...
- 10. A. 消旋卡多曲B. 蒙脱石C. 盐酸小檗碱D. 地衣芽孢杆菌活菌1...
- 11. A. 以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者B. 2型糖尿病患者...
- 12. A. 有助于缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状B. 有助于消除...
- 13. A. 阿司匹林哮喘
- 14. 巴比妥类药物注射液的pH值均较高, 如将它们与酸性药物混合, 可...
- 15. 靶向给药系统
- 16. 肠内营养
- 17. 肠外营养

- 18. 撤药综合症
- 19. 服用哪些药物的患者有必要进行血药浓度监测?
- 20. 剂型
- 21. 简述靶向制剂的分类
- 22. 简述汞及其化合物中毒机制和解毒药物。
- 23. 简述骨质疏松症的治疗原则
- 24. 简述骨质疏松症的治疗原则与抗骨质疏松症药物的分类。
- 25. 简述冠状动脉粥样硬化性心脏病的治疗原则。
- 26. 简述合理用药的5R原则。
- 27. 简述急性上呼吸道感染的治疗药物。
- 28. 简述剂型的重要性。
- 29. 简述抗骨质疏松症药物的分类。
- 30. 简述老年人用药护理要点。
- 31. 简述临床常用中心静脉输液工具。
- 32. 简述铅及其化合物中毒机制和解毒药物。
- 33. 简述糖尿病的治疗原则与控制目标。
- 34. 简述药物不良反应的处理原则。
- 35. 简述药物不良反应的诊断标准。
- 36. 简述药物经济学的研究方法有哪些?
- 37. 简述药物经济学的研究意义。
- 38. 菌血症
- 39. 联合用药
- 40. 论述冠心病的治疗原则。
- 41. 论述卡托普利不良反应及用药护理要点。
- 42. 论述抗菌药物治疗方案制订原则。
- 43. 论述抗菌药物治疗性应用的基本原则。
- 44. 论述如何预防药物不良反应的发生。
- 45. 论述手术后疼痛的治疗方法。
- 46. 论述硝酸甘油的不良反应及用药护理要点。
- 47. 慢性阻塞性肺疾病 (COPD)
- 48. 耐药性
- 49. 潜溶
- 50. 潜溶剂
- 51. 瑞氏综合征
- 52. 糖尿病
- 53. 微生态制剂

- 54. 下列为全面强直阵挛发作的一线治疗药物的是 ()。2. 对精神运动...
- 55. 效用
- 56. 叙述肺炎的治疗原则。
- 57. 叙述服用哪些药物的患者有必要进行血药浓度监测。
- 58. 叙述甘露醇的静脉用药护理要点。
- 59. 叙述冠状动脉粥样硬化性心脏病的治疗原则。
- 60. 叙述抗菌药物治疗方案制订原则。
- 61. 叙述抗菌药物治疗性应用的基本原则。
- 62. 叙述老年人用药护理要点。
- 63. 叙述如何预防药物不良反应的发生。
- 64. 药物的肠-肝循环
- 65. 药物的体内过程
- 66. 药物治疗学
- 67. 脂质体
- 1. A. 苯海索
- B. 恩他卡朋C. 普拉克索
- D. 溴隐亭
- 47. 抗帕金森病的机制是大剂量可激动黑质-纹状体通路的D2受体 ()。
- 48. 抗帕金森病的机制是选择性激动D3受体 ()。
- 3. 抗帕金森病的机制是阻断中枢胆碱受体 ()。
- 4. 抗帕金森病的机制是抑制外周的COMT, 增加左旋多巴生物利用度 ()。
- 答案: 1D**
- 2C**
- 3A**
- 4B**
- 2. A. 地西泮 B. 多塞平**
- C. 唑吡坦D. 艾司唑仑**

- 药物的是 ()。
- 2. 治疗失眠的药物中...)。
- 3. FDA批准的唯一一种可用于治疗失眠的抗抑郁药是 ()。
- 4. 治疗失眠的药物中, 属于中效苯二氮 类药物的是 ()。
- 答案: 1. A 2. C 3. B 4. D**
- 3. A. 氟化物**
- B. 雌激素和孕激素**
- C. 活性维生素D₃D. 非甾体抗炎药**

- 1. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 抑制骨吸收的药物是 ()。
- 2. 治疗和预防骨质疏松症的药物中, 促进骨形成的药物是 ()。
- 答案: 1. B**
- 2. A**
- 4. A. 冷湿敷, 如3%硼酸溶液、0. 1%盐酸小檗碱溶液、0. 1%依沙吖啶溶液等**
- B. 外用糖皮质激素软膏、乳剂或酊剂等, 可合用保湿剂及角质松解剂**
- ... 疹急性期有大量渗出时, 药物治疗选择 ()。**
- 3. 湿疹亚急性期药物治疗选择 ()。
- 4. 湿疹慢性期药物治疗选择 ()。
- 答案: 1. D**
- 2. A**
- 3. C**
- 4. B**
- 5. A. 利尿药**
- B. 钙通道阻滞剂**
- C. 血管紧张素转换酶抑制剂**
- D. 血管紧张素 II 受体拮抗剂**

- 1. 氢氯噻嗪属于 ()。
- 2. 卡托普利属于 ()。
- 3. 氨氯地平属于 ()。
- 4. 氯沙坦属于 ()。

- 1. 治疗失眠的药物中, 属于长效苯二氮革类

答案：1. A
2. C
3. B
4. D
6. A、洛伐他汀 B. 吉非贝齐 C. 依折麦布 D. 考来烯胺
属于贝特类药物的是（ ）
属于经甲基戊二酰辅酶A还原酶抑制剂的是（ ）

答案：1. B
2. A
7. A. 强阿片类药，并可合用非体类抗炎药以及辅助镇痛药
B. 弱阿片类药物或低剂量的强阿片类药，并可联合应用非留体类抗炎药以及辅助镇痛药
...症患者轻度疼痛，可选用（ ）。

2. 癌症患者中度疼痛，可选用（ ）。
3. 癌症患者重度疼痛，首选（ ）。
4. 癌症患者由骨转移引起的疼痛，选用。
答案：1. C

2. B
3. A
4. D
8. A. 伪麻黄碱 B. 氢溴索
C. 马来酸氯苯那敏 D. 对乙酰氨基酚

1. 能选择性收缩上呼吸道血管，用于缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状... 分泌物的排出，用于治疗感冒引起的痰多、咳嗽的祛痰药是（ ）。
4. 用于治疗感冒引起的发热、咽痛和全身痛等
症状的解热镇痛药是（ ）。

答案：1. A 2. C 3. B 4. D
9. A. 西咪替丁 B. 氢氧化镁 C. 米索前列醇
D. 莫沙必利
1. 保护胃黏膜的药物是（ ）
2. 中和胃酸的药物是（ ）。
3. 抑制胃酸分泌的药物是（ ）

4. 促胃动力药物是（ ）
答案：1. C
2. B
3. A
4. D
10. A. 消旋卡多曲
B. 蒙脱石
C. 盐酸小檗碱
D. 地衣芽孢杆菌活菌
1. 止泻机制是收敛、吸附、保护黏膜（ ）。
2. 止泻机制是抑制肠道过度分泌（ ）。
答案：1B

2A
11. A. 以糖类为主要食物成分和餐后血糖升高的患者
B. 2型糖尿病患者控制高血糖的一线用药和联合用药中的基础用药
C. 降低具有心血管高危风险的2型...
D. 通过刺激胰岛素的早期分泌而降低餐后血糖

1. 二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为（ ）。
2. α-糖苷酶抑制剂适用于（ ）。
答案：1. B 2. A
12. A. 有助于缓解感冒引起的鼻塞、流涕和打喷嚏等症状
B. 有助于消除或减轻普通感冒患者的打喷嚏和流涕等症状
C. 针对普通感冒患者的发热、咽痛和全身... 风险
D. 通过刺激胰岛素的早期分泌而降低餐后血糖
49. 二甲双胍在糖尿病指南中推荐作为（ ）
50. α-糖苷酶抑制剂适用于（ ）
答案：

41. A42. B43. A44. C45. B46. D47. C48. B49. B50. A
13. [A]阿司匹林哮喘
答案：阿司匹林哮喘 服用阿司匹林后引起的呼吸困难、喘息。
14. [B]巴比妥类药物注射液的pH值均较高，如将它们与酸性药物混合，可能会出现_____。

答案：析出沉淀
15. [B]靶向给药系统
答案：又称靶向制剂，是指药物通过与载体结合或被载体包埋，能主动或被动地选择性浓集定位于病变部位的给药系统。
16. [C]肠内营养
答案：是经胃肠道提供代谢需要的营养物质及其它各种营养素的营养支持方式。

17. [C]肠外营养
答案：是从静脉内供给营养作为手术前后及危重患者的营养支持的方法，肠外营养的途径有周围静脉营养和中心静脉营养。
18. [C]撤药综合征
答案：长期用药突然停药后出现的各种症状。

19. [F]服用哪些药物的患者有必要进行血药浓度监测？
答案：（1）治疗窗窄的药物。
（2）药动学呈非线性特征的药物。
（3）临床应用有严重药品不良反应的药物。
（4）药物相互作用具有显著临床意义的相关药物。
（5）有必要明确所期望治疗效果的药物。
（6）某一药物的目标浓度将决定临床治疗和预后情况。

20. [J]剂型
答案：临床应用前制成适于临床用途、与一定给药途径相适应的给药形式。
21. [J]简述靶向制剂的分类
答案：答：按药物分布程度分为4级：一级是将药物输送至特定组织或器官（肝）；二级

是将药物输送至特定组织的特定部位（肝中的肝癌部位）；三级是将药物输送至病变部位的细胞内，即细胞靶向；四级是将药物输送至病变细胞的特定细胞器中（如细胞核）。

22. [J]简述汞及其化合物中毒机制和解毒药物。
答案：中毒机制：汞进入机体后与体内的巯基、羧基、羟基、氨基、磷酸基等结合，造成细胞结构功能损伤，导致肾、中枢神经系统胃肠道、呼吸系统发生病变。
解毒药物：二巯基络合物：二巯丙醇、二巯丙磺钠、二巯二钠、二巯丁二酸

23. [J]简述骨质疏松症的治疗原则
答案：答：（1）治疗原则：抑制骨转换率；使用促进骨形成药物；使用骨矿化促进剂；其他治疗（日照、体力活动）。

24. [J]简述骨质疏松症的治疗原则与抗骨质疏松症药物的分类。
答案：治疗原则：抑制骨转换率；使用促进骨形成药物；使用骨矿化促进剂；其他治疗（日照、体力活动）
抗骨质疏松症药物的分类：抗骨吸收药物、促进骨形成药物。

25. [J]简述冠状动脉粥样硬化性心脏病的治疗原则。
答案：稳定型心绞痛：减轻心肌耗氧量；防治血小板凝集；改善冠脉血供；治疗动脉粥样硬化。
不稳定型心绞痛：及时住院治疗，增加抗凝溶栓治疗。
心肌梗死：尽快恢复心肌血供；解除疼痛，抗血小板，再灌注心肌，消除心律失常，控制休克，和心力衰竭。
26. [J]简述合理用药的5R原则。
答案：正确的药物，正确的患者，正确的给药途径，正确的给药时间，正确的剂量。
27. [J]简述急性上呼吸道感染的治疗药物。
答案：答：对症治疗药物：抗组织胺药；局部控制症状药；复方制剂。

抗菌治疗药物：头孢、红霉素、磺胺等
抗病毒治疗药物：利巴韦林。

28. [J]简述剂型的重要性。

答案：答：调节药物作用速率，如注射剂、吸入气雾剂、舌下含片剂型起效快为速效剂，缓、控制剂起效慢；改变药物作用性质，如25%硫酸镁注射剂静滴产生中枢抑制作用，50%硫酸镁溶液口服则产生导泄作用；降低药物不良反应；定位和靶向作用；改变药物稳定性；影响药效。

29. [J]简述抗骨质疏松症药物的分类。

答案：答：抗骨吸收药物、促进骨形成药物。

30. [J]简述老年人用药护理要点。

答案：严格按医嘱给药，用药后注意观察，注意药物的相互作用，选择适宜的剂型和给药方法，选择合适的用药时间。

31. [J]简述临床常用中心静脉输液工具。

答案：答：中心静脉输液工具：外周置入中心静脉导管；中心静脉导管；隧道式导管与埋藏式输液港。

32. [J]简述铅及其化合物中毒机制和解毒药物。

答案：答：中毒机制：抑制含巯基的酶，对造血、神经、肝、肾造成损害。
解毒药物：金属络合物：依地酸钙钠、喷替酸钙钠。

巯基化合物：二巯丙醇、二巯丁二酸。

33. [J]简述糖尿病的治疗原则与控制目标。

答案：答：综合性治疗，非药物治疗：饮食、不良生活习惯、自我教育，药物治疗：降糖、降脂、降压。
空腹血糖：4.1-6.1mmol/L；糖化血红蛋白 < 6.5%；
血压小于130/80mmHg；BMI男 < 25，女 < 24；
总胆固醇（TC） < 4.5mmol/L；HDL-C > 1.1mmol/L；甘油三酯（TG） < 1.5mmol/L；
LDL-C < 2.6mmol/L。

34. [J]简述药物不良反应的处理原则。

答案：答：如由药物引起，首先可疑停药，不

能确定是哪种药的话，应停所有药；如致病药物已很明确，可选用特异性拮抗剂；如引起的变态反应，应抗过敏治疗；不良反应严重者，应采用支持疗法，并给予对症治疗。

35. [J]简述药物不良反应的诊断标准。

答案：用药时间与不良反应出现的时间有无合理的先后关系，可疑的不良反应是否符合药物已知的不良反应类型，所怀疑的不良反应是否可用患者的病理状态、并用药、并用疗法的影响来解释，停药或减少剂量后，可疑不良反应是否减轻或消失，再次接触可疑药物是否再次出现同样反应。

36. [J]简述药物经济学的研究方法有哪些？

答案：答：最小成本分析；成本-效益分析；成本-效果分析；成本-效用分析。

37. [J]简述药物经济学的意义。

答案：答：促进临床合理用药，控制药品费用的不合理增长；指导制药企业制订生产和销售计划；为新药或者新治疗方案的评价提供科学依据。

38. [J]菌血症

答案：病原菌由局部侵入血液，未在其中大量繁殖，引起的症状轻微。

39. [L]联合用药

答案：两种或两种以上药物同时使用。

40. [L]论述冠心病的治疗原则。

答案：答：（1）稳定型心绞痛 减轻心肌耗氧量，防治血小板凝集，改善冠状动脉的血供，治疗动脉粥样硬化。可用硝酸酯类、β受体阻断剂、钙通道阻滞剂、抗血小板药物、调脂药。

（2）不稳定型心绞痛 住院治疗，增加抗凝溶血栓治疗，防止血栓形成，阻止发生心肌梗死。

（3）心肌梗死 尽快恢复心肌的血液灌流，及时处理心律失常、泵衰竭和各种并发症。治疗包括解除疼痛、抗血小板、再灌注心肌、消除心律失常，控制休克和心力衰竭。

41. [L]论述卡托普利不良反应及用药护理要

点。

答案：不良反应：皮疹、瘙痒、嗜酸性粒细胞增多；心悸、心动过速、胸痛、味觉缺乏，血管神经性水肿、蛋白尿。

用药护理要点：

用法用量：口服：12.5mg/次。

静脉给药：一次25mg溶于10%葡萄糖溶液20ml，缓慢静脉注射（10min），随后用50mg溶于10%葡萄糖溶液500ml，静脉滴注（1小时）。不良反应防治：

血管神经性水肿发生时可皮下注射1：1000肾上腺素0.3-0.5ml。出现蛋白尿应停药。

心力衰竭者应避免过量体力活动；肾功能差者，应采用小剂量。注意事项：

过敏、双侧肾动脉狭窄、孕妇禁用；

宜餐前1小时服用，与降压药同用，可加强降压效果；与保钾药物使用可引起高钾血症，用药期间随时检查白细胞计数和尿蛋白等。

42. [L]论述抗菌药物治疗方案制订原则。

答案：品种选择：依据病原菌种类和药敏试验结果选药。

给药剂量：重症感染及药物不易达到的部位感染，剂量应大；单纯下尿道感染，可应用较小剂量。

给药途径：重症或全身感染，应静脉给药；轻症感染，可口服。

给药次数：根据药动学和药效学特征给药。

疗程：一般用至体温正常，症状消退后72-96小时。

联合用药应有明确指征。

43. [L]论述抗菌药物治疗性应用的基本原则。

答案：答：（1）只有诊断为细菌性感染者，才有指征应用抗菌药物

除确诊为细菌性感染可用抗菌药物外，由真菌、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等所致的感染亦有用药指征。

（2）要尽早查明感染病原，根据病原种类及

细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物

在条件允许的情况下，应在开始抗菌治疗前进行细菌药物敏感试验（以下简称药敏），根据药敏结果确定选用合适的药物。危重患者在未获知病原菌及药敏结果前，可根据患者的发病情况、发病场所、原发病灶、基础疾病等推断最可能的病原菌，先经验性给予抗菌药物，在细菌培养及药敏结果出来之后，对疗效不佳的患者调整给药方案。

（3）要按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药

各种抗菌药物的药效学（抗菌谱和抗菌活性）和人体药代动力学（吸收、分布、代谢和排泄过程）特点不同，因此各有不同的临床适应证。可按临床适应证正确选用抗菌药物。

（4）应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订抗菌药物治疗方案

在制订治疗方案时应注意遵循规定的品种选择、给药剂量、给药途径、给药次数、疗程、抗菌药物的联合应用要有明确指征的原则。

44. [L]论述如何预防药物不良反应的发生。

答案：答：了解过敏史；

注意特殊人群用药；

合理用药；

应用新药时慎重并进行严密观察；

应用对器官有损害的药物时，定期检查器官功能；

用药期间注意观察不良反应早期症状；注意药物的迟发反应。

45. [L]论述手术后疼痛的治疗方法。

答案：答：（1）口服；方便。适合术后不必禁食的小手术。

（2）肌肉注射；比口服快，不能维持稳定的血药浓度，需反复肌注。

（3）静脉镇痛；可快速达到稳定的血药浓度，达到长时间镇痛。

（4）硬膜外腔镇痛；一般使用阿片类药物，与局麻药复合应用，可减少用量和不良反应。可产生并发症感染、血肿、尿潴留、呼吸抑制

等。

(5) 蛛网膜下腔镇痛：镇痛时间长，效果好，必须做蛛网膜下腔穿刺，恶心呕吐发生率高，有中枢神经感染的危险。

(6) 病人自控镇痛：病人自己控制给药泵，按自己需要控制注射止痛药的时机和剂量。

46. [L] 论述硝酸甘油的不良反应及用药护理要点。

答案：答：不良反应：主要由血管舒张引起，有头痛、皮肤潮红、眼压升高、直立性低血压、诱发心绞痛等；易产生耐药性。

用药护理要点：

用法用量：口服：0.25-0.5mg；舌下含服：每5分钟可重复0.5mg，15分钟总量达1.5mg，应立即就医；活动或排便之前5-10分钟预防使用，可避免诱发心绞痛。

静脉滴注：无固定适合剂量，应根据个体情况调整，使用时，用0.9%氯化钠注射液，5%葡萄糖注射液稀释。

不良反应防治：

改变体位或其他促进静脉回流的方法，缓解硝酸甘油的昏厥：服药期间避免饮酒；小剂量开始，间歇用药（不少于8小时）可减少产生耐药性。

注意事项：

慎重用于血容量不足或血压低者；可加重肥厚梗阻型心肌病引起的心绞痛；出现视物模糊或口干，应停药；应用玻璃输液瓶；避光；与降压药或血管扩张药合用可增强直立性低血压发生。

47. [M] 慢性阻塞性肺疾病（COPD）

答案：慢性阻塞性肺疾病（COPD）是一种具有气流受限特征的肺部疾病。

48. [N] 耐药性

答案：长期应用化疗药物后，病原体包括微生物，寄生虫等，甚至肿瘤细胞对化疗药物产生的耐受性。

49. [Q] 潜溶

答案：在混合溶剂中各溶剂达到某一比例时，药物的溶解度出现极大值，这种现象为潜溶。

50. [Q] 潜溶剂

答案：在混合溶剂中各溶剂达到某一比例时，药物的溶解度出现极大值，这种溶剂称为潜溶剂潜溶剂。

51. [R] 瑞氏综合征

答案：以脑水肿和肝功能障碍为特征的一组症候群。特别是病毒感染伴有发热的儿童服用阿司匹林后发生

52. [T] 糖尿病

答案：体内胰岛素分泌或胰岛素作用绝对或相对不足引起的以血糖水平升高为主要特征的代谢性疾病群。

53. [W] 微生态制剂

答案：调整宿主微生物失调，促进有益的正常微生物生长，抑制致病菌生长的制剂。

54. [X] 下列为全面强直阵挛发作的一线治疗药物的是（）。

2. 对精神运动性发作癫痫最有效（）。

A. 苯妥英钠

B. 丙戊酸钠

C. 卡马西平

D. 氯硝西泮

答案：1B

2C

55. [X] 效用

答案：指实施某种药物治疗方案所获得的身心健康的满意度。

56. [X] 叙述肺炎的治疗原则。

答案：答：尽早开始抗菌药物的经验治疗，明确病原菌后，根据药敏试验结果调整用药；重视病原学检查；抗感染2-3日后，临床症状无改善或加重，应调换抗生素2分，轻者口服，重者静脉滴注；疗程应根据病原菌、病变程度来定；对症支持疗法。

57. [X] 叙述服用哪些药物的患者有必要进行

血药浓度监测。

答案：答：1) 治疗窗窄的药物。

2) 药动学呈非线性特征的药物

3) 临床应用有严重药物不良反应的药物

4) 药物相互作用具有显著临床意义的相关药物

5) 有必要明确所期望治疗效果的药物

6) 某一药物的目标浓度将决定临床治疗和预后情况

58. [X] 叙述甘露醇的静脉用药护理要点。

答案：答：用法用量：125-250ml快速静脉滴注，每6-8小时一次，一日3-4次。

不良反应防治：警惕血浆渗透压升高；尿量少于1500ml时慎用；适当补充水和电解质，注意及时调整滴速；注意防止血栓性静脉炎和药物外流引起的组织水肿和皮肤坏死，如外漏可热敷消肿。

注意事项：

配制浓度15-25%，于30-60分钟内滴注，5次/天以内。易结晶，应用前注意检查，如有结晶可置于热水中，不可使用有未溶解结晶的注射液，可增加洋地黄毒性作用。

59. [X] 叙述冠状动脉粥样硬化性心脏病的治疗原则。

答案：答：稳定型心绞痛：减轻心肌耗氧量；防治血小板凝集；改善冠脉血供；治疗动脉粥样硬化。

不稳定型心绞痛：及时住院治疗，增加抗凝溶栓治疗。

心肌梗死：尽快恢复心肌血供；解除疼痛，抗血小板，再灌注心肌，消除心律失常，控制休克，和心力衰竭。

60. [X] 叙述抗菌药物治疗方案制订原则。

答案：答：（1）品种选择：依据病原菌种类和药敏试验结果选药。

（2）给药剂量：重症感染及药物不易达到的部位感染，剂量应大；单纯下尿道感染，可应用较小剂量。

（3）给药途径：重症或全身感染，应静脉给药；轻症感染，可口服。

（4）给药次数：根据药动学和药效学特征给药。

（5）疗程：一般用至体温正常，症状消退后72-96小时。

（6）联合用药应有明确指征。

61. [X] 叙述抗菌药物治疗性应用的基本原则。

答案：答：（1）只有诊断为细菌性感染者，才有指征应用抗菌药物

除确诊为细菌性感染可用抗菌药物外，由真菌、结核分枝杆菌、非结核分枝杆菌、支原体、衣原体、螺旋体、立克次体及部分原虫等所致的感染亦有用药指征。

（2）要尽早查明感染病原，根据病原种类及细菌药物敏感试验结果选用抗菌药物

在条件允许的情况下，应在开始抗菌治疗前进行细菌药物敏感试验（以下简称药敏），根据药敏结果确定选用合适的药物。危重患者在未获知病原菌及药敏结果前，可根据患者的发病情况、发病场所、原发病灶、基础疾病等推断最可能的病原菌，先经验性给予抗菌药物，在细菌培养及药敏结果出来之后，对疗效不佳的患者调整给药方案。

（3）要按照药物的抗菌作用特点及其体内过程特点选择用药

各种抗菌药物的药效学（抗菌谱和抗菌活性）和人体药代动力学（吸收、分布、代谢和排泄过程）特点不同，因此各有不同的临床适应证。可按临床适应证正确选用抗菌药物。

（4）应综合患者病情、病原菌种类及抗菌药物特点制订抗菌药物治疗方案

在制订治疗方案时应注意遵循规定的品种选择、给药剂量、给药途径、给药次数、疗程、抗菌药物的联合应用要有明确指征的原则。

62. [X] 叙述老年人用药护理要点。

答案：答：严格按医嘱给药，用药后注意观察，注意药物的相互作用，选择适宜的剂型和给药方法，选择合适的用药时间。

63. [X] 叙述如何预防药物不良反应的发生。

答案：答：（1）了解过敏史；
（2）注意特殊人群用药；
（3）合理用药；
（4）应用新药时慎重并进行严密观察；
（5）应用对器官有损害的药物时，定期检查器官功能；
（6）用药期间注意观察不良反应早期症状；
（7）注意药物的迟发反应。

64. [Y]药物的肠-肝循环

答案：指药物在肝、胆、肠和血液之间的往返循环

65. [Y]药物的体内过程

答案：是指药物在体内的吸收、分布、代谢和排泄过程。

66. [Y]药物治疗学

答案：是以临床疾病为系统，在药理学，临床药理学的基础上，根据患者的特征，制定和实施个体化的药物治疗方案，减少和避免药物不良反应的发生，取得最佳治疗效果。

67. [Z]脂质体

答案：由磷脂双分子层及胆固醇组成的内部为水相的闭合囊泡称脂质体。