С. Цуглуулагч

Хугацаа: 1 сек

Санах ой: 64 мб

Тоглоомон робот цуглуулагч цуврал роботын цуглуулгатай болохоор худалдаж авч байгаа. Тэрээр хамгийн хямд худалдан авалт хийхийг ихээр хүсэж байгаа тул өдөр бүр тус тоглоомон роботын үнийг хянаж байв. Түүний тэмдэглэсэн үнийн жагсаалт нь сүүлийн N өдрийн роботын үнэ бөгөөд a_i нь i хоногийн өмнөх роботын үнийг илэрхийлнэ.

Тэрээр дараалсан өдрүүдийн тоглоомон роботын дундаж үнийн дараалал болон дараагийн өдрийн роботын үнэ хооронд уялдаа холбоо байгааг анзаарсан. Энэ нь "Сүүлийн N өдрийн үнийг дараалал дотор роботын дундаж үнэ нь өгсөн P-ээс их буюу тэнцүү байсан хэдэн өөр дараалсан дэд дараалал байх вэ?" гэсэн асуултын хариултыг олсноор дээрх хамаарлыг тодорхойлж болно гэж үзэж байгаа. Түүнд тусална уу.

Дараалсан хоёр дэд дараллын эхлэл эсвэл төгсгөл өөр байвал өөр гэж үзнэ.

Оролт:

Оролтын эхний мөрөнд дараллын урт N бүхэл тоо ($1 \le N \le 1\,000\,000$) байна. Оролтын хоёр дахь мөрөнд N үнийг агуулна a_i ($0 \le a_i \le 1\,000\,000\,000$). Оролтын гурав дахь мөрөнд бүхэл тоо P ($0 \le P \le 1\,000\,000\,000$) байна.

Гаралт:

Гаралтын цорын ганц мөрөнд өгөгдсөн бодлогод өгсөн асуултын хариулт байна.

Оноо:

Нийт тестийн 30% тестэд дараллын урт N нь 10 000-аас хэтрэхгүй ($N \le 10\,000$) байна.

Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт	Оролт	Гаралт
3 1 2 3 3	1	3 1 3 2 2	5	3 1 3 2 3	1

Эхний жишээний тайлбар: Дундаж нь 3-аас хэтрэхгүй ганц дэд дараалал нь {3}.

Хоёр дахь жишээний тайлбар: Дундаж нь 2-оос хэтрэхгүй дэд дараалал нь {1, 3}, {1, 3, 2}, {3}, {3, 2}, {2}.