

# Modelos estadísticos

Técnicas estadísticas avanzadas para la conservación de la biodiversidad - Universidad de Huelva

---

David García Callejas

01/2021

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental
- Sabemos cómo comparar dos muestras

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental
- Sabemos cómo comparar dos muestras
- Pero aun queda todo un mundo de preguntas que podemos resolver:

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental
- Sabemos cómo comparar dos muestras
- Pero aun queda todo un mundo de preguntas que podemos resolver:
  - ¿Cómo afecta una variable independiente a una respuesta?

Hasta ahora:

- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental
- Sabemos cómo comparar dos muestras
- Pero aun queda todo un mundo de preguntas que podemos resolver:
  - ¿Cómo afecta una variable independiente a una respuesta?
  - ¿Podemos predecir una variable en función de otras?

Hasta ahora:


- Sabemos cómo cuantificar una muestra o una población
- Sabemos los fundamentos del diseño experimental
- Sabemos cómo comparar dos muestras
- Pero aun queda todo un mundo de preguntas que podemos resolver:
  - ¿Cómo afecta una variable independiente a una respuesta?
  - ¿Podemos predecir una variable en función de otras?
  - ¿Qué ocurre cuando tenemos más de dos tratamientos en una población?



# Regresión estadística

$$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$



## Data

$y$  = response variable

$x$  = predictor

## Parameters


$a$  = intercept

$b$  = slope

$\sigma$  = residual variation

$\varepsilon$  = residuals


# Regresión estadística



# Regresión estadística

Regresión lineal:


- Relación lineal entre las variables



# Regresión estadística


Regresión lineal:

- Minimiza el *error residual*



# Regresión estadística

- ¿Cómo calcular la recta con menor error residual? **Método de mínimos cuadrados**



$$b = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2} \quad (1)$$


$$a = \bar{y} - b\bar{x} \quad (2)$$

- Residuos: diferencia entre valor observado y predicho
- Recuerda:

$$y_i = a + bx_i + \varepsilon_i$$


$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

- Residuos: diferencia entre valor observado y predicho



# Regresión estadística


- Para que la estimación sea correcta, la distribución de residuos debe ser normal
- y la varianza debe ser homogénea





# Regresión estadística

- **Again:** Para que la estimación sea correcta, la distribución de residuos debe ser normal y la varianza residual, homogénea



*Importante:* Esto no implica que la variable respuesta, o la variable independiente, deban tener una distribución normal!


¿Podemos predecir la altura de un árbol a partir de su *dbh*?

```
trees <- read.csv(here::here("datasets", "trees.csv"))  
head(trees)
```

##	site	dbh	height	sex	dead
## 1	4	29.68	36.1	male	0
## 2	5	33.29	42.3	male	0
## 3	2	28.03	41.9	female	0
## 4	5	39.86	46.5	female	0
## 5	1	47.94	43.9	female	0
## 6	1	10.82	26.2	male	0

**Siempre**


Visualiza los datos como primer paso



# Regresión estadística

¿Hay outliers en los datos?


```
ggplot(trees, aes(dbh, height)) +  
  geom_point()
```



# Regresión estadística


¿Cómo están distribuidas las variables independientes y respuesta?

```
hist(trees$height)
```



¿Cómo están distribuidas las variables independientes y respuesta?

```
hist(trees$dbh)
```



Después del análisis exploratorio, si no hay nada raro, ajustamos el modelo:

```
m1 <- lm(height ~ dbh, data = trees)
```

que se corresponde con:

$$height_i = a + b \cdot DBH_i + \varepsilon_i$$

$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$



¿Y ahora?

```
m1
```

```
##
```

```
## Call:
```

```
## lm(formula = height ~ dbh, data = trees)
```

```
##
```

```
## Coefficients:
```

```
## (Intercept)          dbh
```

```
##      19.3392      0.6157
```

# Regresión estadística


```
summary(m1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ dbh, data = trees)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -13.3270  -2.8978   0.1057   2.7924  12.9511
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  19.33920    0.31064   62.26  <2e-16 ***
## dbh          0.61570    0.01013   60.79  <2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 4.093 on 998 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.7874, Adjusted R-squared:  0.7871
```

# Regresión estadística


Antes de interpretar el resultado, comprobamos que los residuos se ajustan a una distribución normal

```
res <- resid(m1)  
hist(res)
```




# Regresión estadística

```
plot(m1)
```




```
plot(m1)
```




# Regresión estadística

```
plot(m1)
```



# Regresión estadística

```
plot(m1)
```



# Regresión estadística

Una vez comprobamos que el modelo ajusta bien, interpretamos los resultados

```
summary(m1)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ dbh, data = trees)
##
## Residuals:
```

	Min	1Q	Median	3Q	Max
	-13.3270	-2.8978	0.1057	2.7924	12.9511

```
##
## Coefficients:
```

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t )
(Intercept)	19.33920	0.31064	62.26	<2e-16 ***
dbh	0.61570	0.01013	60.79	<2e-16 ***

```
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

26



# Regresión estadística

```
library(broom)
tidy(m1)
```

```
## # A tibble: 2 x 5
##   term          estimate std.error statistic p.value
##   <chr>          <dbl>     <dbl>     <dbl>   <dbl>
## 1 (Intercept)    19.3       0.311      62.3     0
## 2 dbh            0.616     0.0101     60.8     0
```

Cada coeficiente tiene un valor estimado, el error asociado a ese valor (recordad el error estándar asociado a una muestra), y un p-valor.

Podemos recuperar los coeficientes directamente con

```
coef(m1)
```

```
## (Intercept)          dbh
## 19.3391968    0.6157036
```

Nuestro modelo es:

$$height_i = 19.3392 + 0.6 \cdot dbh_i$$

Y los intervalos de confianza (al 95%) para los coeficientes son

```
confint(m1)
```

```
##                2.5 %    97.5 %  
## (Intercept) 18.7296053 19.948788  
## dbh         0.5958282  0.635579
```


Recordad que un intervalo al 95% es, aproximadamente,  $\mu \pm 2\sigma$ . La desviación típica asociada a cada coeficiente es su error estándar. Así pues, para la pendiente de la recta (el coeficiente asociado a la DBH),  $0.61 \pm 2 \cdot 0.01$  nos da los valores del intervalo.

¿Cómo interpretar el p-valor asociado a un coeficiente?

Generalmente, se dice que si  $p < 0.05$ , la variable independiente tiene una relación significativa (diferente de cero) con la respuesta. Esto no es necesariamente así. Ya sabemos que 0.05 es un valor arbitrario, y que las relaciones entre variables no son dicotómicas.

## BEWARE FALSE CONCLUSIONS

Studies currently dubbed 'statistically significant' and 'statistically non-significant' need not be contradictory, and such designations might cause genuine effects to be dismissed.



Ver: <https://doi.org/10.1038/d41586-019-00857-9>

¿Cómo interpretar el p-valor asociado a un coeficiente?

Es mucho más informativo comunicar el efecto asociado a una variable (e.g. aumentar una unidad de DBH implica aumentar en 0.6 unidades la altura de un árbol) y su incertidumbre asociada (su intervalo de confianza o su error estándar).

We found a ~~significant~~ positive relationship between tree DBH and height  
( ~~$p < 0.05$~~ ) ( $b = 0.61$ ,  $SE = 0.01$ )

# Regresión estadística

El último parámetro de interés es el “coeficiente de determinación”,  $R^2$ . Nos informa de cómo de bueno es el ajuste de nuestro modelo. Literalmente, nos dice qué proporción de la varianza en los datos viene explicada por nuestro modelo. En nuestro caso,

```
summary(m1)$adj.r.squared
```

```
## [1] 0.7871477
```


La variación en altura entre los árboles de nuestra muestra viene explicada en un 79% por su variación en DBH. Existe un 21% de variación en altura que responde potencialmente a otros factores, sean estocásticos, errores muestrales, o ecológicos.

- nota: un  $R^2$  de 0.79 es *realmente alto* para los estándares de estudios en ecología...

# Regresión estadística

Visualización del modelo:

```
library(visreg)  
visreg(m1)
```






# Regresión estadística

Visualización del modelo:

```
ggplot(trees, aes(x = dbh, y = height)) +  
  geom_smooth(method = "lm") +  
  geom_point()
```



# Regresión estadística

¿Podemos predecir la altura de un árbol nuevo, en función de su DBH?

$$height_i = 19.3392 + 0.6 \cdot dbh_i$$

```
new.dbh <-data.frame(dbh =c(12))  
predict(m1, new.dbh,se.fit =TRUE)
```

```
## $fit  
##      1  
## 26.72764  
##  
## $se.fit  
## [1] 0.2064598  
##  
## $df  
## [1] 998  
##  
## $residual.scale  
## [1] 4.092629
```

¿Podemos predecir la altura de un árbol nuevo, en función de su DBH?

$$height_i = 19.3392 + 0.6 \cdot dbh_i$$

```
predict(m1, new.dbh,interval ="confidence")
```

```
##          fit          lwr          upr  
## 1 26.72764 26.32249 27.13279
```

```
predict(m1, new.dbh,interval ="prediction")
```

```
##          fit          lwr          upr  
## 1 26.72764 18.68628 34.769
```

Estos intervalos nos ayudan a entender los dos tipos de predicciones asociadas a un modelo de regresión:

- Predecir el valor medio de la variable respuesta para un valor determinado de la variable predictora
- Predecir el valor concreto de la variable respuesta para un valor determinado de la variable predictora

En nuestro ejemplo, esto se traduce en dos cuestiones:

- Predecir la altura *media* de los árboles con una DBH determinada
- Predecir la altura *de un individuo* con una DBH determinada


Aunque el valor predicho será el mismo en ambos casos, la incertidumbre asociada a las predicciones es diferente. La primera predicción tiene asociado un intervalo de confianza, la segunda predicción tiene asociado un intervalo de predicción.

# Regresión estadística

Ejemplo con otros datos (en los datos de árboles el intervalo de confianza es muy pequeño)

```
# 0. datos y modelo
data("cars", package = "datasets")
model <- lm(dist ~ speed, data = cars)
# predicciones
pred.int <- predict(model, interval = "prediction")
mydata <- cbind(cars, pred.int)
# visualizar recta de regresión e intervalos
library("ggplot2")
p <- ggplot(mydata, aes(speed, dist)) +
  geom_point() +
  stat_smooth(method = lm) +
  # intervalos de predicción
  geom_line(aes(y = lwr), color = "red", linetype = "dashed") +
  geom_line(aes(y = upr), color = "red", linetype = "dashed")
```

# Regresión estadística



Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo



## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo
- Interpretar resultados

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo
- Interpretar resultados
- Predicción

Otros casos:

- variable independiente categórica


Otros casos:

- variable independiente categórica
- múltiples variables independientes

Otros casos:

- variable independiente categórica
- múltiples variables independientes
- datos más complejos: residuos no normales, variable respuesta discreta. . .

# Regresión estadística





- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?


```
head(trees)
```

##	site	dbh	height	sex	dead
## 1	4	29.68	36.1	male	0
## 2	5	33.29	42.3	male	0
## 3	2	28.03	41.9	female	0
## 4	5	39.86	46.5	female	0
## 5	1	47.94	43.9	female	0
## 6	1	10.82	26.2	male	0

# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
  - Visualización

```
ggplot(trees, aes(x = sex, y = height)) +  
  geom_point(position = position_jitter()) +  
  geom_boxplot(alpha = 0.5)
```



- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
  - Ajustar modelo

```
m2 <- lm(height ~ sex, data = trees)
```

que se corresponde con

$$\begin{aligned} height_i &= a + b_{male} + \varepsilon_i \\ \varepsilon_i &\sim N(0, \sigma^2) \end{aligned}$$


# Regresión estadística

```
summary(m2)
```


```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ sex, data = trees)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -22.6881  -6.7881  -0.0097   6.7261  22.3687
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   36.9312     0.3981  92.778  <2e-16 ***
## sexmale       -0.8432     0.5607  -1.504   0.133
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.865 on 998 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.002261,    Adjusted R-squared:  0.001261
```

# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
- Comprobar residuos




- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
- Comprobar residuos



# Regresión estadística


- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
- Comprobar residuos



# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
  - Visualizar modelo

```
visreg(m2)
```





- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del sexo?
  - Interpretar resultados

```
confint(m2)
```

```
##                2.5 %      97.5 %  
## (Intercept) 36.150120 37.7123803  
## sexmale     -1.943447  0.2571379
```

```
summary(m2)$adj.r.squared
```

```
## [1] 0.001260919
```

- Un predictor categórico con varias categorías: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?


```
head(trees)
```

##	site	dbh	height	sex	dead
## 1	4	29.68	36.1	male	0
## 2	5	33.29	42.3	male	0
## 3	2	28.03	41.9	female	0
## 4	5	39.86	46.5	female	0
## 5	1	47.94	43.9	female	0
## 6	1	10.82	26.2	male	0

# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Visualización

```
ggplot(trees, aes(x = site, y = height)) +  
  geom_point(position = position_jitter()) +  
  geom_boxplot(alpha = 0.5)
```



- ¿Qué ocurre?

```
str(trees)
```

```
## 'data.frame':    1000 obs. of  5 variables:
## $ site   : int  4 5 2 5 1 1 2 2 2 1 ...
## $ dbh    : num  29.7 33.3 28 39.9 47.9 ...
## $ height: num  36.1 42.3 41.9 46.5 43.9 26.2 29.8 35.6 42.1 36.5 ..
## $ sex    : chr  "male" "male" "female" "female" ...
## $ dead   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

- “Site” es una variable numérica... debería ser categórica!

```
str(trees)
```


```
## 'data.frame':    1000 obs. of  5 variables:
## $ site   : int  4 5 2 5 1 1 2 2 2 1 ...
## $ dbh    : num  29.7 33.3 28 39.9 47.9 ...
## $ height: num  36.1 42.3 41.9 46.5 43.9 26.2 29.8 35.6 42.1 36.5 ..
## $ sex    : chr  "male" "male" "female" "female" ...
## $ dead   : int  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ...
```

- “Site” es una variable numérica... debería ser categórica!

```
trees$site <- as.factor(trees$site)
```

# Regresión estadística

```
ggplot(trees, aes(x = site, y = height)) +  
  geom_point(position = position_jitter()) +  
  geom_boxplot(alpha = 0.5)
```



- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Ajustar modelo

```
m3 <- lm(height ~ site, data = trees)
```

que se corresponde con

$$height_i = a + b_{site2} + c_{site3} + d_{site4} + \dots + \varepsilon_i$$
$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$

# Regresión estadística


```
summary(m3)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ site, data = trees)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -20.4416  -6.9004   0.0379   6.3051  19.7584
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)  33.8416     0.4266   79.329 < 2e-16 ***
## site2         6.3411     0.7126    8.899 < 2e-16 ***
## site3         4.9991     0.9828    5.086 4.36e-07 ***
## site4         0.5329     0.9872    0.540 0.58949
## site5         4.3723     0.9425    4.639 3.97e-06 ***
## site6         4.7601     1.1709    4.065 5.18e-05 ***
## site7        -0.7416     1.8506   -0.401 0.68871
## site8        -0.6832     2.4753   -0.276 0.78258
## site9         9.1709     3.0165    3.040 0.00243 **
## site10        -0.5816     3.8013   -0.153 0.87843
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 8.446 on 990 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1016, Adjusted R-squared:  0.09344
## F-statistic: 12.44 on 9 and 990 DF,  p-value: < 2.2e-16
```




# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
- Comprobar residuos




# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Comprobar residuos




- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Comprobar residuos



# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Visualizar modelo

```
visreg(m3)
```



- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Visualizar modelo


```
library(effects)  
allEffects(m3)
```

```
## model: height ~ site  
##  
## site effect  
## site  
##      1      2      3      4      5      6      7      8  
## 33.84158 40.18265 38.84066 34.37444 38.21386 38.60167 33.10000 33.15833  
##      9     10  
## 43.01250 33.26000
```

# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Visualizar modelo

```
library(effects)  
plot(allEffects(m3))
```



# Regresión estadística

- Un predictor categórico: ¿Varía la altura de los árboles en función del lugar de muestreo?
  - Interpretar resultados

```
confint(m3)
```

```
##              2.5 %    97.5 %  
## (Intercept) 33.004441 34.678723  
## site2       4.942777  7.739357  
## site3       3.070436  6.927719  
## site4      -1.404455  2.470181  
## site5       2.522750  6.221810  
## site6       2.462391  7.057779  
## site7      -4.373093  2.889930  
## site8      -5.540590  4.174094  
## site9       3.251437 15.090399  
## site10     -8.041067  6.877904
```

```
summary(m3)$adj.r.squared
```

```
## [1] 0.09343655
```

- Combinando predictores categóricos y numéricos: ¿Varía la altura de los árboles en función de su DBH y el lugar de muestreo?

```
m4 <- lm(height ~ site + dbh, data = trees)
```

que se corresponde con

$$\text{height}_i = a + b_{\text{site2}} + c_{\text{site3}} + d_{\text{site4}} + \dots + k \cdot \text{DBH}_i + \varepsilon_i$$
$$\varepsilon_i \sim N(0, \sigma^2)$$




# Regresión estadística

```
summary(m4)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ site + dbh, data = trees)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.1130  -1.9885   0.0582   2.0314  11.3320
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 16.699037   0.260565  64.088 < 2e-16 ***
## site2        6.504303   0.256730  25.335 < 2e-16 ***
## site3        4.357457   0.354181  12.303 < 2e-16 ***
## site4        1.934650   0.356102   5.433 6.98e-08 ***
## site5        3.637432   0.339688  10.708 < 2e-16 ***
## site6        4.204511   0.421906   9.966 < 2e-16 ***
## site7       -0.176193   0.666772  -0.264  0.7916
## site8       -5.312648   0.893603  -5.945 3.82e-09 ***
## site9        5.437049   1.087766   4.998 6.84e-07 ***
## site10       2.263338   1.369986   1.652  0.0988 .
## dbh          0.617075   0.007574  81.473 < 2e-16 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 3.043 on 989 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.8835, Adjusted R-squared:  0.8823
## F-statistic: 750 on 10 and 989 DF, p-value: < 2.2e-16
```


# Regresión estadística

```
plot(allEffects(m4))
```



# Regresión estadística

- Hemos ajustado un modelo con diferentes puntos de corte (uno por cada *site*) y una sola pendiente (DBH)



- Hemos ajustado un modelo con diferentes puntos de corte (uno por cada *site*) y una sola pendiente (DBH)
- ¿varía la relación altura-DBH ( = la pendiente) entre diferentes lugares de muestreo?

- Interacciones entre predictores: ¿Varía la relación altura-DBH en función del lugar de muestreo?

```
m5 <- lm(height ~ site * dbh, data = trees)
```

que se corresponde con

$$\begin{aligned} height_i &= a + b_{site2} + c_{site3} + d_{site4} + \dots + \\ &k \cdot DBH + l \cdot DBH_{i,site2} + m \cdot DBH_{i,site3} + \dots + \varepsilon_i \\ \varepsilon_i &\sim N(0, \sigma^2) \end{aligned} \tag{3}$$


# Regresión estadística

```
summary(m5)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = height ~ site * dbh, data = trees)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -10.1017  -1.9839   0.0645   2.0486  11.1789
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept) 16.359437   0.360054  45.436 < 2e-16 ***
## site2        7.684781   0.609657  12.605 < 2e-16 ***
## site3        4.518568   0.867008   5.212 2.28e-07 ***
## site4        2.769336   0.813259   3.405 0.000688 ***
## site5        3.917607   0.870983   4.498 7.68e-06 ***
## site6        4.155161   1.009379   4.117 4.17e-05 ***
## site7       -2.306799   1.551303  -1.487 0.137334
## site8       -2.616095   4.090671  -0.640 0.522630
## site9        2.621560   5.073794   0.517 0.605492
## site10       4.662340   2.991072   1.559 0.119378
## dbh          0.629299   0.011722  53.685 < 2e-16 ***
## site2:dbh    -0.042784   0.020033  -2.136 0.032950 *
## site3:dbh    -0.006031   0.027640  -0.218 0.827312
## site4:dbh    -0.031633   0.028225  -1.121 0.262677
## site5:dbh    -0.010173   0.027887  -0.365 0.715334
## site6:dbh     0.001337   0.032109   0.042 0.966797
## site7:dbh     0.079728   0.052056   1.532 0.125951
## site8:dbh    -0.079027   0.113386  -0.697 0.485984
## site9:dbh     0.081035   0.146649   0.553 0.580679
## site10:dbh   -0.101107   0.114520  -0.883 0.377522
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
```

# Regresión estadística

```
visreg(m5, xvar = "dbh", by = "site")
```



## Resumen de modelos lineales

- permiten predecir una variable respuesta en función de otras independientes



## Resumen de modelos lineales

- permiten predecir una variable respuesta en función de otras independientes
- modelan *relaciones lineales*

## Resumen de modelos lineales

- permiten predecir una variable respuesta en función de otras independientes
- modelan *relaciones lineales*
- son la base para muchas de las técnicas estadísticas que trabajaréis

Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo
- Interpretar resultados

## Pasos en la elaboración de modelos estadísticos

- Análisis exploratorio y visualización
- Ajustar modelo
- Comprobar residuos
- Visualizar modelo
- Interpretar resultados
- Predicción



## Recetario de R

- Ajustar un modelo: `modelo <- lm(respuesta ~ predictores, data = datos)`
- comprobar residuos: `plot(modelo), resid(modelo)`
- visualizar modelo: `visreg(modelo), allEffects(modelo)`
- coeficientes: `coef(modelo), tidy(modelo)`
- intervalos de confianza: `confint(modelo)`
- coeficiente de determinación: `summary(modelo)$adj.r.squared`

Otros recursos:

- <https://bookdown.org/spegled/foundations-of-statistics/>
- <https://bookdown.org/egarpor/PM-UC3M/>