


Fluniplex

Antiinflamatorio, antipirético, analgésico no esteroidal. REG: SAGARPA Q 0694-025



Fluniplex

REG: SAGARPA Q 0694-025

Es un antiinflamatorio, antipirético, analgésico no esteroidal, no abortivo. Su mecanismo de acción se considera como el resultado de la disminución de la síntesis de prostaglandinas mediadoras de la respuesta inflamatoria y del complejo químico del dolor.

Puede administrarse en animales de cualquier edad, estado fisiológico e incluso en hembras gestantes. Bovinos tratamiento en soporte de infecciones, diarreas neonatales del ternero, tratamiento del dolor agudo causado por cirugía, heridas, lesiones del aparato locomotor y cólicos, cuadros de shock endotóxico producidos por procesos infecciosos virales o bacterianos. Coadyuvante en el tratamiento de la pavorosis canina.



Cada 1 ml contiene: Meglumina de flunixin: 50 mg Excipiente c.b.p.: 1 ml

Dosis:

Bovinos: 1 a 2 ml por cada 45 kg. Terneros: 2 a 3 ml dosis única.

Cerdos: 2 ml/45 kg. Equinos: 1 ml/45 kg.

Aplicar hasta 3 tratamientos considerando los intervalos

recomendados.

Administración: Intramuscular profunda. Usos:

Bovinos, Equinos y Porcinos.

Presentación: 100 ml y 250 ml.

Advertencias:

No se ha determinado el efecto sobre la gestación. No administrar en animales de menos de 3 días de edad. No consumir la carne de animales tratados hasta 24 horas después en bovinos y 21 días en porcinos, después de la última aplicación. No consumir la leche de los animales tratados hasta 12 horas después de la última aplicación.









