Floxaplex 20% Soluble REC

REG. SAGARPA: Q-0694-036



Enrofloxacina 20%

Antibiótico de amplio espectro en solución.









Enrofloxacina 20 g Vehículo c.b.p. 100 ml

DESCRIPCIÓN:

FLOXAPLEX SOLUBLE 20% es un excelente antimicrobiano soluble de amplio espectro, útil en el tratamiento de las enfermedades bacterianas y micoplásmicas de los bovinos, ovinos, porcinos y aves, que viene listo para administrarse en el agua de bebida.

INDICACIONES:

FLOXAPLEX SOLUBLE 20% está indicado en el tratamiento de los principales agentes productores de enfermedades en Aves, como bacterias Gram (-): E.coli, Haemophillus paragallinarum, Pasteurella multocida, Salmonella typhymurium, Pasteurella aureoginosa, Salmonella arizonae, Proteus spp., Salmonella enteritidis. Gram (+): Corynebacterium pyogenes, Staphylococcus aureus, Erysipelotrix rhusiopatiae, Streptococcus spp., Clostridium perfringens. Mycoplasmas: M. gallisepticum, M. sinoviae, M. meleagridis, M. iowae, que producen en las aves las siguientes enfermedades:

Sistema Respiratorio: Coriza infecciosa, enfermedad respiratoria crónica, Cólera aviar, Enfermedad Crónica Respiratoria Complicada, Infección de sacos aéreos, Colisepticemia.

Sistema Digestivo: Colibacilosis, Tifoidea, Paratifoidea.

Genital: Pulorosis, Salpingitis Septicemicas, Colisepticemia, Cólera Aviar, Tifoidea.

FLOXAPLEX SOLUBLE 20% está indicado en bovinos para tratar infecciones respiratorias causadas por Mannhemia hemolítica, Pasteurella multocida, Haemophillus somnus. Infecciones digestivas producidas por E.coli, Salmonella spp.

Infecciones del tracto genitourinario: E.coli, Corynebacterium spp., Mycoplasma, Ureaplasma spp. Infecciones de la glándula mamaria producidas por E.coli, Staphylococcus aureus, Streptococcus spp.

Infecciones septicémicas producidas por Listeria monocytogenes, E.coli, Haemophilus somnus, Salmonella spp. Infecciones purulentas (gabarro, abscesos), causados por Fusobacterium necrophorum, E.coli, Pseudomonas spp., Bacteroides melaninogenicus, Proteus spp.

USOS EN: Aves, bovinos, ovinos y porcinos

DOSIS:

Aves: 300 a 600 ml por cada 1000 litros de agua, lo que representa 10 a 15 mg por kilogramo de peso.

Bovinos: 2.5 a 5 mg por kilogramo de peso.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN: Oral, disuelto en el agua de bebida.

PRESENTACIÓN: Envase de 5 y 20 litros.



Comercializadora Pecuaria de México, S.A. de C.V.

C. Indé No. 824, 4a. Etapa Parque Industrial C.P. 35078 Gómez Palacio, Dgo, México Tels: (871) 714 4343, 714 3065, 714 8399 y 715 3737 Lada Sin Costo: 01 (800) 5900112



Mediker Professional Health

www.medikercpm.com