

Betaplex MDKR

Penicilina G procaínica. REGISTRO Q-0694-040



Betaplex MDKR

REGISTRO Q-0694-040

Es útil en padecimientos causados por bacterias susceptibles a la penicilina, como: queratoconjuntivitis infecciosa bovina, neumonía bacteriana, mastitis, metritis, pasteurolosis neumónica, carbón sintomático, edema maligno, entre otros.

Fórmula:

Cada 1 ml contiene:

Penicilina G procaínica: 300,000 U.I.

Vehículo c.b.p.: 1 ml

Dosis:

Bovinos, Ovinos y Caprinos: de 7 ml a 11 ml por cada 50 kg de peso (equivalente a 44,000 a 66,000 Ul/Kg de peso) cada 24 horas.

Porcinos: 6.5 ml por cada 50 kg de peso (equivalente a 40,000 UI/Kg de peso) cada 24 horas.

Equinos: de 3.5 ml a 7 ml por cada 50 kg de peso (equivalente a 22,000 a 44,000 Ul/kg de peso) cada 12 horas.

Caninos domésticos: de 0.5 ml a 1.0 ml por cada 10 kgs de peso (equivalente a 20,000 a 40,000 Ul/kg de peso) cada 12-24 horas. Administrar de 3 a 5 días. No administrar más de 10 ml en el mismo sitio de aplicación.

Administración:

Intramuscular profunda exclusivamente.

Presentación:

100 y 500 ml.

I Isos

Bovinos, Porcinos, Equinos, Caninos, Ovinos y Caprinos.

Advertencias:

No consumir la came (bovino) hasta 10 días después de la última aplicación. La leche para consumo humano podrá ser utilizada 72 horas después de la última aplicación. No consumir la came (ovinos y caprinos) hasta 8 días después de la última aplicación. No consumir la came (cerdos) hasta 6 días después de la última administración. No administrar en equinos destinados para consumo. No aplicar por vía intravenosa. Contraindicado en casos de hipersensibilidad de la penicilina y/o cefalosporinas. La administración de este producto puede causar ocasionalmente en cerdos lactantes y de engorda efectos secundarios. No se recomienda su manejo si es sensible a las penicilinas y cefalosporinas. Agítar antes de usarse para homogenizar suspensión.









