

Ampliación de Matemáticas 2: Formulario*

Sergio García Prado

sergio@garciparedes.me

13 de diciembre de 2017

1. Cambio de Variable

Jacobiano

$$J(T) = \det \begin{pmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} & \frac{\partial y}{\partial w} \\ \frac{\partial z}{\partial u} & \frac{\partial z}{\partial v} & \frac{\partial z}{\partial w} \end{pmatrix}$$

Coordenadas Esféricas

$$T : \begin{cases} x &= r \cdot \sin(\alpha) \cdot \cos(\beta) \\ y &= r \cdot \sin(\alpha) \cdot \sin(\beta) \\ z &= r \cdot \cos(\alpha) \end{cases}$$

$$J(T) = r^2 \cdot \sin(\alpha)$$

$$r > 0 \quad \alpha \in [0, \pi] \quad \beta \in [0, 2\pi]$$

Coordenadas Cilíndricas

$$T : \begin{cases} x &= r \cdot \cos(\alpha) \\ y &= r \cdot \sin(\alpha) \\ z &= z \end{cases}$$

$$J(T) = r$$

$$r \geq 0 \quad \alpha \in [0, 2\pi] \quad z \in \mathbb{R}$$

2. Integral Impropia

Criterios de Comparación

$B :=$ Interior de bola de radio 1 centrada en 0

$B^* :=$ Exterior de bola de radio 1 centrada en 0

$$r = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

$$\int_B r^{-\alpha} dx_1 \dots dx_n \begin{cases} \alpha < n & \text{convergente} \\ \alpha \geq n & \text{divergente} \end{cases}$$

$$\int_{B^*} r^{-\alpha} dx_1 \dots dx_n \begin{cases} \alpha > n & \text{convergente} \\ \alpha \leq n & \text{divergente} \end{cases}$$

3. Ecuación en Diferencias

Solución Particular del problema homogéneo

$$\{k^n r^k\} = \{k^n \rho^k \cos(\theta k)\}$$

$$\{k^n \bar{r}^k\} = \{k^n \rho^k \sin(\theta k)\}$$

Solución Particular del problema no homogéneo

$$b_k = \rho^k (P_p(k) \cos(\theta k) + Q_q(k) \sin(\theta k))$$

$$z_k = k^s \rho^k (P_m^*(k) \cos(\theta k) + Q_m^*(k) \sin(\theta k))$$

b_k	z_k
C	A
k^t	$A_t k^t + \dots + A_1 k^1 + A_0$
C^k	AC^k
$k^t C^k$	$C^k (A_t k^t + \dots + A_1 k^1 + A_0)$
$\sin(\theta k)$	$A \cos(\theta k) + B \sin(\theta k)$
$\cos(\theta k)$	$A \cos(\theta k) + B \sin(\theta k)$

4. Métodos Numéricos

Integración Numérica [TODO]

Derivación Numérica [TODO]

A. Trigonometría

Valores de Referencia

$$\sin(0) = 0 \quad \sin\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

$$\cos(0) = 1 \quad \cos\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \cos\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$$

Igualdades Trigonométricas

$$\sin(a+b) = \sin(a)\cos(b) + \sin(b)\cos(a)$$

$$\cos(a+b) = \cos(a)\cos(b) - \sin(b)\sin(a)$$

*<https://github.com/garciparedes/amat2-cheatsheet>