

Localización de Servicios

García Prado, Sergio

13 de marzo de 2017

Resumen

Problemas de Localización de servicios <https://github.com/garciparedes/mosel-examples/tree/master/service-location-examples> [2]

I. SET COVERING PROBLEM: DISTANCIAS

El problema de *set covering* o *cubrimiento de conjuntos* consiste en la asignación de un conjunto de recursos n recursos x_j cuyo uso tiene un coste de c_j para cumplir m necesidades. Las necesidades que cubre cada recurso se representan a través de a_{ij} . La modelización matemática de este problema se muestra en la ecuación (1).

$$\begin{aligned} \text{Minimizar} \quad & \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{sujeto a} \quad & \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j \geq 1, \quad i = 1, \dots, m \\ & x_j \in \{0, 1\}, \quad j = 1, \dots, n \end{aligned} \tag{1}$$

Equation 1: *Formulación del Problema de Cubrimiento Total.*

I. A) Distancia de cubrimiento inferior a 50km

En este caso se ha propuesto resolver el problema de cubrimiento máximo para la asignación de los lugares donde situar los puntos de servicio de entre 30 ciudades (por tanto $m = n = 30$) para poder abastecer a todos ellos en una distancia inferior a 50 km. Puesto que todos los recursos presentan el mismo coste, en este caso $\forall j \ c_j = 1$.

La solución a este problema se muestra en la ecuación (2), la cual requiere de **18** recursos

$$x_j = \begin{cases} 1 & j \in S = \{2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 27, 28, 29, 30\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \tag{2}$$

I. B) Distancia de cubrimiento desde 1 a 250km

En este caso, se ha resuelto el mismo problema que en el apartado anterior, pero esta vez de manera iterativa conforme a las distancias necesarias mínimas de cubrimiento en el intervalo $dc \in [1, 250]$. Dichos resultados se muestran en la figura 1. Los resultados completos de todas las iteraciones pueden obtenerse ejecutando el correspondiente fichero `mosel[2]` y examinando el fichero CSV resultante.




Figura 1: Relación entre la distancia mínima de para que una ciudad se considere cubierta y el número de recursos necesarios para dicha tarea.

II. SET COVERING PROBLEM: DATOS DISPERSOS

En este caso, el problema posee las mismas características que el descrito en la sección I, cuya modelización matemática se muestra en la ecuación (1). Sin embargo, la novedad que tiene este respecto del anterior es que en este caso los datos son suministrados en forma una matriz dispersa, lo que reduce el tamaño del fichero de datos por lo que se prescinde de las entradas cuyo valor es 0.

II. A) Localización de centros de Ambulancias

En este caso se pide resolver el problema de cubrir $m = 20$ distritos a partir de $n = 10$ centros de ambulancias. Para conocer en qué distritos son cubiertos por qué puntos de servicio se suministra además la matriz dispersa a codificada tal y como se indica en la (3). Tal y como ocurre en el apartado anterior, los costes también son constantes por lo que $\forall j \ c_j = 1$

$$a_{ij} = \begin{cases} 1 & \text{El distrito } i \text{ es cubierto por el centro de ambulancias } j \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (3)$$

Los puntos de asignación óptimos para este problema se muestran en la ecuación (4), es decir, para cubrir las necesidades de todos los distritos se han de colocar 6 centros de ambulancias.

$$x_j = \begin{cases} 1 & j \in S = \{2, 3, 4, 6, 8, 10\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (4)$$

II. B) Planificación de Viajes en Empresa de aviación American Airlines

Este problema se basa en la planificación acerca de la tripulación de una empresa de aviación, de tal manera que se aproveche lo más posible la jornada laboral de sus trabajadores. En este caso, se

trata de planificar la tripulación que formará parte de $m = 12$ vuelos, que se compone de un total de $n = 15$ trabajadores. En este caso la codificación de la matriz a sigue la misma distribución que el ejercicio A, por lo que la descripción de la ecuación (3) sigue siendo válida. La principal novedad con respecto a los casos anteriores es que el vector de costes c_j en este caso ya no toma el valor unidad, sino que se refiere al sueldo de cada uno de los trabajadores, es decir, $c_j = \text{Sueldo del trabajador } j$.

La asignación óptima se muestra en la ecuación (5) y presenta un coste total de $9100 = 2900 + 2600 + 3600$.

$$x_j = \begin{cases} 1 & j \in S = \{1, 9, 12\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (5)$$

III. SET COVERING PROBLEM: SAYRE-PRIORS

El ejercicio de *Sayre-Priors* presenta el mismo planteamiento que el anterior del apartado B, por tanto la descripción que se ha realizado en el anterior caso es válida para este. Los únicos cambios son los datos de entrada, que en este caso tienen la siguiente dimensionalidad: Se debe encontrar el resultado óptimo para $m = 10$ vuelos y una tripulación de $n = 37$ trabajadores.

La asignación óptima se muestra en la ecuación (6) y genera un coste de $2 + 2 + 3 + 3 = 10$ mil dolares.

$$x_j = \begin{cases} 1 & j \in S = \{12, 24, 29, 32\} \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad (6)$$

IV. MAX COVERING PROBLEM

En esta sección se trata el *problema de cubrimiento máximo* o *max covering problem*. El problema consiste en lo siguiente: Sea m el número de puntos de demandas y n el de puntos de servicio. El objetivo se trata de maximizar el beneficio h_i obtenido de cubrir el i -ésimo punto de demanda. Para modelizar dicho cubrimiento se utiliza la variable binaria z_i . Para representar los puntos de servicio utilizados se utiliza la variable de tipo binario x_j . La motivación del problema consiste en encontrar el conjunto de variables x_j con cardinalidad máxima denominada por p y prefijada previamente, que maximice la ganancia debida al cubrimiento de los puntos de servicio z_i .

$$\begin{aligned} &\text{Maximizar} && \sum_{i=1}^m h_i z_i \\ &\text{sujeto a} && \sum_{\substack{j \in N_i \\ n}} x_j \geq z_i, && i = 1, \dots, m \\ &&& \sum_{j=1}^n x_j \leq p, \\ &&& x_j \in \{0, 1\}, && j = 1, \dots, n \\ &&& z_i \in \{0, 1\}, && i = 1, \dots, m \end{aligned} \quad (7)$$

Equation 7: *Formulación del Problema de Cubrimiento Máximo.*

En esta sección se proponen tres ejercicios para resolver este problema, los cuales han sido resueltos para distintos valores de p .

IV. A) Usuarios Alcanzados a partir de anuncios en p Revistas

En este problema se trata de encontrar el máximo número de personas cubiertas a partir de la publicación de anuncios en revistas. Los datos de entrada están formados por $n = 10$ revistas que pueden ser alcanzadas por $m = 50$ personas. Para ello se proporciona la matriz a de carácter binario representando la posición a_{ij} que la revista j es leída por la persona i . Se pide resolver el problema para los valores de $p = [1, 10] \in N$. Los resultados se muestran en la tabla 1.

p	% Cubierto	Puntos Abiertos
1	32 %	{5}
2	48 %	{5, 6}
3	64 %	{2, 3, 5}
4	76 %	{3, 5, 6, 7}
5	84 %	{3, 5, 6, 7, 8}
6	90 %	{1, 3, 5, 6, 7, 8}
7	94 %	{1, 3, 5, 6, 7, 8, 10}
8	96 %	{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10}
9	98 %	{1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}
10	98 %	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}

Tabla 1: Resultados del ejercicio IV.A.

IV. B) Zonas Cubiertas a partir de p de centros de Ambulancias

En este ejercicio se pide resolver el problema de máximo cubrimiento para los valores de $p = [1, 10] \in N$ al igual que en la sección anterior. En este caso el problema se refiere al cubrimiento de $m = 20$ zonas geográficas a partir de $n = 10$ ambulancias, por tanto se trata de encontrar el máximo número de zonas cubiertas con la utilización de p ambulancias.

En este caso, además de la matriz a que codifica de manera binaria en a_{ij} que la zona i es cubierta por la variable j , se proporciona el vector h , que representa en la componente h_i el beneficio obtenido por cubrir la zona i . Esto podría interpretarse como el número de personas que se abarcan en dicha zona.

Los resultados de en este caso se muestran en la tabla 2. Tras analizar los resultados obtenidos se puede obtener como conclusión que el valor óptimo es $p = 6$, es decir, con la utilización de 6 ambulancias se cubren las 20 zonas.

IV. C) Zonas Cubiertas a partir de p centros de Servicio Sanitario

Este ejercicio se refiere a la resolución dos problemas de cubrimiento máximo de gran tamaño. Se pide resolver para los valores de $p = [1, 10] \in N$ en ambos casos. Debido al tamaño del problema, en este caso se considera que una zona de demanda i ha sido cubierta si existe una zona de servicio j a una distancia $dc \leq 250$ kilómetros. Al igual que en el caso anterior, también se proporciona un vector h , que en la posición h_i representa la demanda en la zona i . El objetivo a maximizar por tanto es la demanda cubierta total. En este caso, la matriz a no es de carácter binario, sino que se

p	% Cubierto	Puntos Abiertos	f.objetivo
1	44,18 %	{4}	115,8
2	63,94 %	{4, 6}	156,9
3	77,59 %	{4, 5, 9}	190,4
4	83,63 %	{3, 4, 5, 9}	212,6
5	93,76 %	{3, 4, 6, 8, 10}	230,4
6	100 %	{2, 3, 4, 6, 8, 10}	245,4
7	100 %	{1, 2, 3, 5, 6, 8, 10}	245,4
8	100 %	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10}	245,4
9	100 %	{2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}	245,4
10	100 %	{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}	245,4

Tabla 2: Resultados del ejercicio IV.B.

compone de atributos reales, positivos, almacenando la posición a_{ij} la distancia en hectómetros de la zona de demanda i al punto de servicio j . Por lo tanto, para utilizar la misma unidad de medida para todas las variables, se transforma la variable $dc = 250 * 10 = 2500$ hectómetros.

[TODO terminar ejercicio con NEOS server]

En el caso del primer fichero de datos de entrada denominado **aint1.dat** se recogen un total de $m = 356$ puntos de demanda y $n = 22$ puntos de servicio. La solución para los distintos valores de p se recogen en la tabla 3.

p	% Cubierto	Puntos Abiertos	f.objetivo
1	0 %	{}	0
2	0 %	{}	0
3	0 %	{}	0
4	0 %	{}	0
5	0 %	{}	0
6	0 %	{}	0
7	0 %	{}	0
8	0 %	{}	0
9	0 %	{}	0
10	0 %	{}	0

Tabla 3: Resultados del ejercicio IV.C.a.

En el caso del segundo fichero de datos de entrada denominado **aint5.dat** se recogen un total de $m = 328$ puntos de demanda y $n = 19$ puntos de servicio. La solución para los distintos valores de p se recogen en la tabla 4.

V. P-MEDIAN PROBLEM Y P-CENTER PROBLEM

Prueba.

p	% Cubierto	Puntos Abiertos	f.objetivo
1	0 %	{}	0
2	0 %	{}	0
3	0 %	{}	0
4	0 %	{}	0
5	0 %	{}	0
6	0 %	{}	0
7	0 %	{}	0
8	0 %	{}	0
9	0 %	{}	0
10	0 %	{}	0

Tabla 4: Resultados del ejercicio IV.C.b.

$$\begin{aligned}
& \text{Minimizar} && \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n h_i d_{ij} y_{ij} \\
& \text{sujeto a} && \sum_{j=1}^n y_{ij} = 1, && i = 1, \dots, m \\
& && y_{ij} \leq x_j, && i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \\
& && \sum_{j=1}^n x_j = p, \\
& && x_j \in \{0, 1\}, && j = 1, \dots, n \\
& && y_{ij} \in \{0, 1\}, && i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n
\end{aligned} \tag{8}$$

Equation 8: Formulación del Problema de la P-mediana.

V. A) [Ejercicio 5.1]

V. B) [Ejercicio 5.2]

V. C) [Ejercicio 5.3]

REFERENCIAS

- [1] AGUADO, J. S. Modelos de Investigación Operativa, 2016/17.
- [2] GARCÍA PRADO, S. Mosel Examples. <https://github.com/garciparedes/mosel-examples>.

$$\begin{aligned}
 &\text{Minimizar} && w \\
 \text{sujeto a} &&& \sum_{j=1}^n y_{ij} = 1, && i = 1, \dots, m \\
 &&& \sum_{j=1}^n t_{ij} y_{ij} \leq w, && i = 1, \dots, m \\
 &&& y_{ij} \leq x_j, && i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n \\
 &&& \sum_{j=1}^n x_j = p, \\
 &&& x_j \in \{0, 1\}, && j = 1, \dots, n \\
 &&& y_{ij} \in \{0, 1\}, && i = 1, \dots, m, j = 1, \dots, n
 \end{aligned} \tag{9}$$

Equation 9: *Formulación del Problema del P-Centro.*