Probabilidad: Tipificación de la Distribución

 $Normal(\mu,\sigma^2)$ *

García Prado, Sergio sergio@garciparedes.me

24 de septiembre de 2017

1. Demostración

Demostración de equivalencia en la tipificación de una distribución normal arbitraria $(N(\mu, \sigma^2))$ con la distribución Normal estándar (N(0, 1))

$$X \sim N(\mu, \sigma^2)$$
 $f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ (1)

$$Z \sim N(0,1)$$
 $f_Z(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ (2)

$$Y = \frac{X - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \qquad f_Y(y) = ? \tag{3}$$

$$g(y) = \frac{y - \mu}{\sqrt{\sigma^2}} \qquad \qquad g^{-1}(y) = \mu \sqrt{\sigma^2} + y \qquad \qquad \left| \frac{\partial}{\partial y} g^{-1}(y) \right| = 1 \tag{4}$$

$$f_Y(y) = f_X\left(g^{-1}(y)\right) \left| \frac{\partial}{\partial y} g^{-1}(y) \right| \tag{5}$$

$$= f\left(\frac{\sqrt{\sigma^2}}{y-\mu}\right) \left| \frac{\partial}{\partial y} g^{-1}(y) \right| \tag{6}$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}}e^{-\frac{(\mu\sqrt{\sigma^2}+y)-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$
 (7)

$$= \dots (8)$$

$$=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{-\frac{y^2}{2}}\tag{9}$$

$$= f_Z(y) \tag{10}$$

$$Y = Z \sim N(0, 1) \tag{11}$$

Referencias

[RdT18] María Pilar Rodríguez del Tío. Probabilidad, 2017/18.

 $^{^*\}mathrm{URL}$: https://github.com/garciparedes/probability-normal-standardization