

Procesos Estocásticos: Ejercicios de Poisson

Gabriel Rodríguez Canal

Marcos Ventura Conde Osorio

Sergio García Prado

25 de noviembre de 2018

a) Ejercicio 2.37 - Durrett

El enunciado del ejercicio se indica a continuación:

“As a community service members of the Mu Alpha Theta fraternity are going to pick up cans from along a roadway. A Poisson mean 60 members show up for work. Two-third of the workers are enthusiastic and will pick up a mean of ten cans with a standard deviation of 5. One-third of the workers are lazy and will only pick up an average of three cans with a standard deviation of 2. Find the mean and standard deviation of the the number of cans collected.”

Lo primero es indicar la notación que utilizaremos para plantear el problema:

$M \equiv$ Número de miembros que van a recoger latas en cada excursión.

$p \equiv$ Proporción de miembros entusiastas respecto del total.

$M_E \equiv$ Número de miembros entusiastas que van a recoger latas.

$M_L \equiv$ Número de miembros perezosos que van a recoger latas.

$E_i \equiv$ Número de latas recogidas por el miembro entusiastas i-ésimo

$L_j \equiv$ Número de latas recogidas por el miembro perezoso j-ésimo

$S \equiv$ Número de latas recogidas en total.

$S_E \equiv$ Número de latas recogidas por miembros entusiastas en total.

$S_L \equiv$ Número de latas recogidas por miembros perezos en total.

Además, el enunciado indica las siguientes propiedades acerca de estas variables aleatorias:

$$\lambda = 60$$

$$p = \frac{2}{3}$$

$$M \sim \text{Poisson}(\lambda) \equiv \text{Poisson}(60)$$

$$E[E_i] = 10$$

$$\text{Var}[E_i] = 5^2 = 25$$

$$E[L_j] = 3$$

$$\text{Var}[L_j] = 2^2 = 4$$

Aplicando la propiedad de *thinning* sobre el número de miembros de cada tipo tenemos que:

$$M_E \sim \text{Poisson}(p \cdot \lambda) \equiv \text{Poisson}(40)$$

$$M_L \sim \text{Poisson}((1 - p) \cdot \lambda) \equiv \text{Poisson}(20)$$

Además M_E y M_L son independientes entre si. Por tanto, podemos descomponer la suma de latas recogidas en dos subgrupos que podemos calcular por separado:

$$S = S_E + S_L$$

Para el cálculo de esperanzas aplicamos la propiedad de la suma de N variables X_i *i.i.d.*, que indica que $E[X_1 + \dots + X_N] = E[X_i] \cdot E[N]$. A continuación se muestran los cálculos pertinentes:

$$\begin{aligned} E[S_E] &= E[E_i] \cdot E[M_E] \\ &= 10 \cdot 40 \\ &= 400 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[S_L] &= E[L_j] \cdot E[M_L] \\ &= 3 \cdot 20 \\ &= 60 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} E[S] &= E[S_E] + E[S_L] \\ &= 400 + 60 \\ &= 460 \end{aligned}$$

Para el cálculo de varianzas aplicamos la propiedad de la suma de N variables X_i *i.i.d.*, que indica que $Var[X_1 + \dots + X_N] = E[N] \cdot Var[X_i] + Var[N] \cdot E[X_i]^2$. A continuación se muestran los cálculos pertinentes:

$$\begin{aligned} Var[S_E] &= E[M_E] \cdot Var[E_i] + Var[M_E] \cdot (E[E_i])^2 \\ &= 40 \cdot 25 + 40 \cdot 10^2 \\ &= 5000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var[S_L] &= E[M_L] \cdot Var[L_j] + Var[M_L] \cdot (E[L_j])^2 \\ &= 20 \cdot 4 + 20 \cdot 3^2 \\ &= 260 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} Var[S] &= Var[S_E] + Var[S_L] \\ &= 5000 + 260 \\ &= 5260 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SD[S] &= \sqrt{Var[S]} \\ &= \sqrt{5260} \\ &\approx 72,5 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución al ejercicio es la siguiente: **En promedio, se recogen 460 latas, con una desviación estándar de 72,5 latas aproximadamente.**

b) Ejercicio 2

[TODO]

c) Ejercicio 2.60 - Durrett

El enunciado del ejercicio se indica a continuación:

“Suppose that the number of calls per hour to an answering service follows a Poisson process with rate 4. Suppose that 3/4s of the calls are made by men, 1/4 by women, and the sex of the caller is independent of the time of the call. (a) What is the probability that in 1 h exactly two men and three women will call the answering service? (b) What is the probability three men will make phone calls before three women do?”

Lo primero es indicar la notación que utilizaremos para plantear el problema:

$C \equiv$ Número de llamadas por hora.
 $p \equiv$ Proporción de hombres respecto del total.
 $C_H \equiv$ Número de miembros entusiastas que van a recoger latas.
 $C_M \equiv$ Número de miembros perezosos que van a recoger latas.

Además, el enunciado indica las siguientes propiedades acerca de estas variables aleatorias:

$$\begin{aligned}
 \lambda &= 4 \\
 p &= \frac{3}{4} \\
 C &\sim \text{Poisson}(\lambda) \equiv \text{Poisson}(4)
 \end{aligned}$$

Aplicando la propiedad de *thinning* sobre el número de miembros de cada tipo tenemos que:

$$\begin{aligned}
 C_H &\sim \text{Poisson}(p \cdot \lambda) \equiv \text{Poisson}(3) \\
 C_M &\sim \text{Poisson}((1 - p) \cdot \lambda) \equiv \text{Poisson}(1)
 \end{aligned}$$

Aplicando la propiedad de independencia $P(A, B) = P(A) \cdot P(B)$ calculamos la probabilidad conjunta de que llamen exactamente 2 hombres y 3 mujeres. Los cálculos se muestran a continuación:

$$\begin{aligned}
 P(C_H = 2, C_M = 3) &= P(C_H = 2) \cdot P(C_M = 3) \\
 &= \frac{e^{-3} \cdot 3^2}{2!} \cdot \frac{e^{-1} \cdot 1^3}{3!} \\
 &\approx 0,0137
 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución al apartado (a) del ejercicio es la siguiente: **La probabilidad de que en una hora llamen exactamente 2 hombres y 3 mujeres es de 0,0137 aproximadamente.**

Para el apartado (b), vamos a aplicar la propiedad que indica que cuando se fija el número de sucesos posibles en un proceso de Poisson, entonces el número de casos favorables se puede probabilizar a partir de la distribución Binomial. La justificación es la siguiente:

Si estudiamos 2 procesos $N_1 \sim \text{Poisson}(\lambda_1)$, $N_2 \sim \text{Poisson}(\lambda_2)$ independientes, considerando N_1 como casos favorables y N_2 como casos desfavorables, al fijar el número de casos totales en n , entonces la distribución $Y \sim \text{Bin}\left(n, \frac{\lambda_1}{\lambda_1 + \lambda_2}\right)$ permite estudiar el número de casos favorables obtenidos.

Por tanto, para nuestro caso particular definimos $X \sim \text{Bin}\left(5, \frac{3}{4}\right)$ dado que el suceso de que llamen 3 hombres antes que 3 mujeres se da estudiando 5 llamadas consecutivas y la proporción de llamadas realizadas por hombres es de $\frac{3}{4}$.

$$\begin{aligned}
 P(X \geq 3) &= \sum_{i=3}^6 \binom{6}{i} \cdot \left(\frac{3}{4}\right)^i \cdot \left(1 - \frac{3}{4}\right)^{6-i} \\
 &\approx 0,633
 \end{aligned}$$

Por tanto, la solución al apartado (b) del ejercicio es la siguiente: **La probabilidad de que lleguen 3 llamadas realizadas por hombres antes que 3 llamadas realizadas por mujeres es de 0,633 aproximadamente.**