

UNIVERZA V LJUBLJANI, FAKULTETA ZA
MATEMATIKO IN FIZIKO

SEMINARSKA NALOGA

Verižni ulomki

Gašper Urh

Mentor: dr. David Dolžan

24. maj 2018

Kazalo

1	Uvod	2
2	Osnovni pojmi	2
3	Konvergenti	3
3.1	Konvergenca enostavnega verižnega ulomka	5
4	Evklidov algoritem in verižni ulomki racionalnih števil	6
4.1	Enoličnost končnega enostavnega verižnega ulomka	7
5	Postopek za iskanje verižnega ulomka realnega števila	8
6	Verižni ulomek števila e	11
7	Kvadratne iracionalne in periodični verižni ulomki	12
8	Zaključek	13
	Literatura	14

1 Uvod

Verižni ulomki so za decimalnim zapisom manj uporabljana predstavitev realnih števil, a so kljub temu zelo koristni tako za reševanje nekaterih problemov teorije števil kot tudi za iskanje racionalnih približkov realnih (predvsem iracionalnih) števil. Z njimi se da na matematično lep način karakterizirati kvadratne iracionalne, iskati rešitve diofantske enačbe in dokazati nekatere zelo pomembne izreke iz teorije števil.

V svoji seminarski nalogi sem se poglobil predvsem v teoretično ozadje zapisa števila z verižnim ulomkom, mestoma pa sem podal nekaj primerov praktične uporabe le-tega.

V poglavju 2 bomo definirali verižni ulomek in nekatere osnovne pojme, ki jih bomo uporabljali v nadaljevanju, ter se seznanili z izgledom verižnega ulomka. Poglavje 3 je posvečeno pojmu konvergenta, nekaterim formulam in pojmom, ki jih bomo v nadaljevanju uporabljali, in konvergenči enostavnega verižnega ulomka. S poglavjem 4 si bomo ob racionalnih številih ogledali postopek iskanja verižnega ulomka, kar bomo v poglavju 5 razširili na iskanje verižnih ulomkov za poljubna realna števila. V poglavju 6 bomo izpeljali verižni ulomek za Eulerjevo število e in v poglavju 7 pokazali povezavo med periodičnimi verižnimi ulomki in kvadratnimi iracionalami.

2 Osnovni pojmi

Definicija 2.1. *Verižni ulomek* je izraz oblike

$$a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2 + \frac{1}{a_3 + \frac{1}{\dots}}}}$$

pri čemer privzemimo, da so a_n realna števila, ki so za $n \geq 1$ tudi pozitivna. Verižni ulomek je lahko bodisi končen, bodisi neskončen.

Zapišemo ga lahko tudi kot $[a_0, a_1, a_2, a_3, \dots]$.

Iz definicije in oblike zapisa verižnega ulomka neposredno sledi naslednja ugotovitev:

$$[a_0, a_1, \dots, a_n, [a_{n+1}, \dots]] = \left[a_0, a_1, \dots, a_n + \frac{1}{[a_{n+1}, \dots]} \right] \quad (1)$$

V literaturi pogosto obravnavajo samo posebno lepe verižne ulomke. Take bomo v tem besedilu imenovali *enostavni verižni ulomki*. Večinoma se bomo ukvarjali le s takimi.

Definicija 2.2. $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ je *enostaven*, če $a_0 \in \mathbb{Z}$ ter $a_1, a_2, \dots \in \mathbb{N}$

Da dobimo občutek, kako je videti racionalno število, zapisano z verižnim ulomkom, izračunajmo

$$[3, 6, 4] = 3 + \frac{1}{6 + \frac{1}{4}} = \frac{79}{25}$$

Vidimo, da je za racionalna števila relativno enostavno najti vrednost verižnega ulomka. Kasneje bomo pokazali, da je tak verižni ulomek vedno končen.

Veliko zanimivejše je iskanje verižnega ulomka iracionalnega števila. Število π lahko zapišemo kot neskončen verižni ulomek

$$\pi = 3 + \frac{1}{7 + \frac{1}{15 + \frac{1}{1 + \frac{1}{292 + \frac{1}{\dots}}}}}$$

Kako priti do takega zapisa, bomo videli v poglavju 5.

3 Konvergenti

V tem poglavju bomo opazovali, ali lahko nek neskončen verižni ulomek, za katerega velja $a_n \in \mathbb{Z}$ za vsak $n = 0, 1, 2, 3, \dots$, predstavlja neko število. V ta namen si bomo ogledali zaporedje njegovih *delnih konvergentov*.

Definicija 3.1. Naj bo $0 \leq n \leq m$. Število c_n je *n-ti konvergent* verižnega ulomka $[a_0, a_1, \dots, a_m]$, če je $c_n = [a_0, a_1, \dots, a_n]$. Za $n < m$ je to *delni konvergent*.

Izračunajmo nekaj delnih konvergentov verižnega ulomka $[a_0, a_1, a_2, \dots]$:

$$\begin{aligned} c_0 &= a_0, \\ c_1 &= a_0 + \frac{1}{a_1} = \frac{a_1 a_0 + 1}{a_1} \end{aligned} \tag{2}$$

$$c_2 = a_0 + \frac{1}{a_1 + \frac{1}{a_2}} = \frac{a_0 a_1 a_2 + a_0 + a_2}{a_1 a_2 + 1}$$

Definirajmo dve zaporedji za $-2 \leq n \leq m$:

$$\begin{aligned} p_{-2} = 0, \quad p_{-1} = 1, \quad p_0 = a_0, \quad \dots, \quad p_n &= a_n p_{n-1} + p_{n-2}, \quad \dots \\ q_{-2} = 1, \quad q_{-1} = 0, \quad q_0 = 1, \quad \dots, \quad q_n &= a_n q_{n-1} + q_{n-2}, \quad \dots \end{aligned}$$

Trditev 3.1. *Naj bo $0 \leq n \leq m$. Tedaj:*

$$c_n = [a_0, \dots, a_n] = \frac{p_n}{q_n} = \frac{a_n p_{n-1} + p_{n-2}}{a_n q_{n-1} + q_{n-2}} \quad (3)$$

Opomba. *Vemo, da je $a_1 \geq 1$, torej je $q_1 \geq 1$. Induktivno dobimo*

$$q_n \geq n \quad (4)$$

Dokaz. Dokazujemo z indukcijo. Za a_0, a_1 vidimo resničnost trditve s pomočjo zgoraj izračunanih konvergentov (2). Privzemimo, da trditev velja za verižne ulomke dolžine n . Tedaj:

$$\begin{aligned} c_{n+1} &= [a_0, \dots, a_n, a_{n+1}] = \left[a_0, \dots, a_n + \frac{1}{a_{n+1}} \right] = \\ &= \frac{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}} \right) p_{n-1} + p_{n-2}}{\left(a_n + \frac{1}{a_{n+1}} \right) q_{n-1} + q_{n-2}} = \frac{a_{n+1}(a_n p_{n-1} + p_{n-2}) + p_{n-1}}{a_{n+1}(a_n q_{n-1} + q_{n-2}) + q_{n-1}} = \\ &= \frac{a_{n+1} p_n + p_{n-1}}{a_{n+1} q_n + q_{n-1}} = \frac{p_{n+1}}{q_{n+1}} \end{aligned}$$

Drugi enačaj sledi iz (1). □

Iz zgornje rekurzije sledita še dve formuli:

$$p_n q_{n-1} - q_n p_{n-1} = (-1)^{n-1} \quad (5)$$

$$p_n q_{n-2} - q_n p_{n-2} = (-1)^n a_n, \quad (6)$$

ki sta ekvivalentni formulama

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-1}}{q_{n-1}} = (-1)^{n-1} \frac{1}{q_n q_{n-1}} \quad (7)$$

$$\frac{p_n}{q_n} - \frac{p_{n-2}}{q_{n-2}} = (-1)^n \frac{a_n}{q_n q_{n-2}} \quad (8)$$

Dokaz. Dokazali bomo samo formulo (5). Na podoben način dokažemo (6), formuli (7) in (8) pa dobimo iz (5) in (6) s primernim deljenjem enačbe. Bazo indukcije za (5) dokažemo brez težav, le z vstavljanjem ustreznih vrednosti. Privzemimo sedaj, da formula velja za $n - 1$, torej

$$\begin{aligned} p_{n-1}q_{n-2} - q_{n-1}p_{n-2} &= (-1)^{n-2} \\ p_nq_{n-1} - q_np_{n-1} &= (a_np_{n-1} + p_{n-2})q_{n-1} - (a_nq_{n-1} + q_{n-2})p_{n-1} = \\ &= a_np_{n-1}q_{n-1} + p_{n-2}q_{n-1} - a_nq_{n-1}p_{n-1} - q_{n-2}p_{n-1} = \\ &= p_{n-2}q_{n-1} - q_{n-2}p_{n-1} = \\ &= -(-1)^{n-2} = (-1)^{n-1} \end{aligned}$$

□

Oglejmo si ulomek $\frac{p_n}{q_n}$. Naj bo x največji skupni delitelj števil p_n in q_n . Tedaj x deli $p_nq_{n-1} - q_np_{n-1}$ in po (5) deli $(-1)^{n-1}$. Torej $x = \pm 1$ in števili sta si tuji. Torej je c_n pridobljen s (3) vedno okrajšan ulomek.

3.1 Konvergenca enostavnega verižnega ulomka

Izračunajmo nekaj konvergentov verižnega ulomka za π .

$$\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, \dots]$$

Konvergenti so:

- $c_0 = 3$
- $c_1 = \frac{22}{7} = 3,1428571$
- $c_2 = \frac{333}{106} = 3,141509434$
- $c_3 = \frac{355}{113} = 3,14159292$
- $c_4 = \frac{103993}{33102} = 3,141592653$
- $c_5 = \frac{104348}{33215} = 3,141592654$
- ...

Vidimo, da zaporedje prvih nekaj sodih konvergentov narašča, lihih pa pada.

Trditev 3.2. *Zaporedje sodih konvergentov je strogo naraščajoče, zaporedje lihih pa strogo padajoče. Za vsak $n, m \in \mathbb{N}$ je $c_{2n} < c_{2m+1}$.*

Dokaz. Po formuli (8) je razvidno, da je zaporedje c_{2n} naraščajoče, c_{2n-1} pa padajoče.

Privzemimo, da obstajata n, m , da je $c_{2n} > c_{2m+1}$. Iz (7) sledi $c_{2r} < c_{2r+1} \forall r \in \mathbb{N}$. Torej $n \neq m$. Denimo, da je $n < m$. Tedaj je $c_{2m+1} < c_{2n} < c_{2m}$, kar je protislovje, saj dobimo $c_{2m+1} < c_{2m}$. Podobno, če $n > m$, je $c_{2n+1} < c_{2m+1} < c_{2n}$, kar zopet vodi v protislovje. \square

Izrek 3.1. *Naj bo $[a_0, a_1, \dots]$ enostaven verižni ulomek in naj bo za vsak n $c_n = [a_0, a_1, \dots, a_n]$ konvergent. Tedaj obstaja*

$$\lim_{n \rightarrow \infty} c_n$$

Dokaz. Videli smo, da je zaporedje sodih konvergentov strogo naraščajoče in zaporedje lihih strogo padajoče. Za obe zaporedji velja, da sta omejeni, saj je vsak sodi konvergent spodnja meja za zaporedje lihih in obratno. Torej obstajata $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n}$ in $\lim_{n \rightarrow \infty} c_{2n-1}$. Pokažimo, da sta enaki. To sledi iz (7) in (4):

$$|c_{2n} - c_{2n-1}| = \frac{1}{q_{2n}q_{2n-1}} \leq \frac{1}{2n(2n-1)} \rightarrow 0$$

\square

Pokazali smo, da za vsak enostaven verižni ulomek obstaja limita zaporedja njegovih delnih konvergentov. Vsak enostaven verižni ulomek torej natanko določa neko število.

4 Evklidov algoritem in verižni ulomki racionalnih števil

Racionalna števila so razmeroma enostavna za zapisovanje z verižnim ulomkom, saj je njihov zapis vedno končen, kar nam zagotovi naslednja trditev.

Trditev 4.1. *Neko število je racionalno \Leftrightarrow njegov zapis z verižnim ulomkom obstaja in je končen.*

Dokaz. (\Leftarrow) Očitno je vsak končen verižni ulomek z nekaj dela mogoče zapisati kot enostaven ulomek, kar pomeni, da predstavlja racionalno število. Uporabimo (3).

(\Rightarrow) Uporabimo Evklidov algoritem. Naj bo $\frac{a}{b}$ nek okrajšan ulomek (torej je največji skupni delitelj a in b enak 1).

Zapišimo

$$\begin{aligned}
a &= a_0b + r_1 \\
b &= a_1r_1 + r_2 \\
r_1 &= a_2r_2 + r_3 \\
&\vdots \\
r_{n-2} &= a_{n-1}r_{n-1} + 1 \\
r_{n-1} &= a_n + 0
\end{aligned}$$

S primernim deljenjem enačb dobimo

$$\begin{aligned}
a/b &= a_0 + \frac{1}{b/r_1} \\
b/r_1 &= a_1 + \frac{1}{r_1/r_2} \\
r_1/r_2 &= a_2 + \frac{1}{r_2/r_3} \\
&\vdots \\
r_{n-2}/r_{n-1} &= a_{n-1} + \frac{1}{r_{n-1}}
\end{aligned}$$

pri čemer operiramo zgolj s celimi števili. Dobimo ravno zapis $\frac{a}{b}$ s končnim enostavnim verižnim ulomkom \square

4.1 Enoličnost končnega enostavnega verižnega ulomka

Lema 4.1. *Naj bo $[a_0, a_1, \dots, a_m]$ enostaven verižni ulomek in naj bo $a_m \neq 1$, $m \geq 1$. Teda velja $0 < x - a_0 < 1$.*

Dokaz. Velja $\frac{1}{x-a_0} = [a_1, \dots, a_m]$. Ker so $a_n \geq 1$ za pozitivne n , je $x - a_0 > 0$. Če je $m = 1$, je $a_1 \geq 2$ in $\frac{1}{x-a_0} \leq \frac{1}{2}$, torej trditev velja. Če je $m \geq 2$, pa je $[a_1, \dots, a_m] > 0$ in velja $\frac{1}{x-a_0} = [a_1, \dots, a_m] > a_1 \geq 1$, zato je $x - a_0 < 1$. \square

Trditev 4.2. *Če lahko x zapišemo s končnim enostavnim verižnim ulomkom, je ta pri pogoju $a_m \neq 1$ enolično določen.*

Dokaz. Naj bo $x = [a_0, a_1, \dots, a_m] = [b_0, b_1, \dots, b_p]$. Brez škode za splošnost je $m \leq p$. Za $m > 0$ velja $0 < x - a_0 < 1$ in $0 < x - b_0 < 1$ po Lemi

4.1, torej sta a_0 in b_0 enaka celemu delu x . Tedaj s primernim odštevanjem in invertiranjem zgornje enačbe dobimo $[a_1, a_2, \dots, a_m] = [b_1, b_2, \dots, b_p]$. Postopek ponavljamo in dobimo $a_m = [b_m, b_{m+1}, \dots, b_p]$. Če $m \neq p$, pridemo v protislovje z dejstvom, da je $a_m \in \mathbb{Z}$.

Če je $m = 0$, je x celo število in velja $x - b_0 \in \mathbb{Z}$. Če $p \geq 1$, je $0 < x - b_0 < 1$, kar vodi v protislovje. Torej $x = a_0 = b_0$. \square

5 Postopek za iskanje verižnega ulomka realnega števila

Oglejmo si primer, ko moramo z verižnim ulomkom zapisati poljubno realno število. V tem primeru Evklidov algoritem seveda ne deluje. Opisati želimo najbolj intuitiven postopek za zapis takega števila.

Naj bo $x \in \mathbb{R}$.

$$x = a_0 + t_0,$$

kjer je $a_0 \in \mathbb{Z}$ ter $t_0 \in [0, 1)$.

Če $t_0 \neq 0$, zapišemo

$$\frac{1}{t_0} = a_1 + t_1$$

Postopek z $a_n \in \mathbb{N}$ za $n \geq 1$ ponavljamo, dokler $t_n \neq 0$ (zapis je lahko neskončen).

$$\frac{1}{t_n} = a_{n+1} + t_{n+1}$$

Zgled. Vsem gotovo zelo znan je verižni ulomek, ki predstavlja razmerje zlatega reza, torej

$$x = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}$$

Po zgornjem postopku zapišemo to kot celi del in ostanek

$$x = 1 + \frac{-1 + \sqrt{5}}{2}$$

Ostanek $t_0 \neq 0$ invertiramo in racionaliziramo imenovalce. Dobimo

$$\frac{1}{t_0} = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} = x$$

Torej velja

$$x = 1 + t_0 = 1 + \frac{1}{x} = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{1 + \dots}}}$$

Za x iz zgornjega postopka velja tudi naslednja lema.

Lema 5.1. *Za vsak n , za katerega je $t_n \neq 0$ velja*

$$x = [a_0, a_1, \dots, a_n, \frac{1}{t_n}]$$

Dokaz. Dokazujemo z indukcijo. Za $n = 0, 1$ trditev očitno velja. Naj trditev velja za $n - 1$. Tedaj je

$$\begin{aligned} x &= [a_0, \dots, a_{n-1}, \frac{1}{t_{n-1}}] \\ &= [a_0, \dots, a_{n-1}, a_n + t_n] \\ &= [a_0, \dots, a_{n-1}, a_n, \frac{1}{t_n}] \end{aligned} \tag{9}$$

□

Pokazali smo torej postopek, s katerim s pomočjo x zapišemo nek verižni ulomek. Intuitivno se nam zdi, da ta ulomek tudi resnično konvergira k x .

Izrek 5.1. *Naj bo $x \in \mathbb{R}$. Tedaj je x vrednost verižnega ulomka, ki ga dobimo z opisanim postopkom.*

Dokaz. Uporavimo Lemo 5.1 in zapišimo

$$x = [a_0, \dots, a_n, \frac{1}{t_n}]$$

Sedaj uporabimo (3), kjer upoštevamo njeno veljavnost ne glede na pogoj, da so vsi a_n cela števila.

$$x = \frac{\left(\frac{1}{t_n}\right)p_n + p_{n-1}}{\left(\frac{1}{t_n}\right)q_n + q_{n-1}}$$

Sedaj izračunajmo razliko delnega konvergenta c_n in vrednosti x . Dobimo

$$\begin{aligned}
|x - c_n| &= \left| \frac{\left(\frac{1}{t_n}\right)p_n + p_{n-1}}{\left(\frac{1}{t_n}\right)q_n + q_{n-1}} - \frac{p_n}{q_n} \right| \\
&= \left| \frac{\frac{1}{t_n}p_nq_n + p_{n-1}q_n - \frac{1}{t_n}q_n p_n - q_{n-1}p_n}{\left(\frac{1}{t_n}q_n + q_{n-1}\right)q_n} \right| \\
&= \left| \frac{p_{n-1}q_n - q_{n-1}p_n}{\left(\frac{1}{t_n}q_n + q_{n-1}\right)q_n} \right| \\
&\stackrel{*}{=} \frac{1}{\left(\frac{1}{t_n}q_n + q_{n-1}\right)q_n} \\
&\leq \frac{1}{\left(a_{n+1}q_n + q_{n-1}\right)q_n} \\
&= \frac{1}{q_{n+1}q_n} \\
&\leq \frac{1}{(n+1)n} \longrightarrow 0
\end{aligned}$$

V prvem neenačaju smo uporabili, da je $\frac{1}{t_n} = a_{n+1} + t_{n+1}$, torej je $a_{n+1} \leq \frac{1}{t_n}$. V (*) smo uporabili formulo (5). \square

Z zgoraj opisanim postopkom torej dobimo enostaven (morda neskončen) verižni ulomek. V poglavju 3.1 smo dokazali, da tak ulomek konvergira, zdaj pa smo dokazali, da vedno konvergira k številu, ki smo si ga izbrali za začetek izvajanja našega postopka za iskanje verižnega ulomka realnega števila. Neenostavni ulomki lahko tudi divergirajo. Za ugotovitev, ali taki ulomki konvergirajo, uporabimo naslednjo trditev.

Trditev 5.1. *Naj bo a_0, a_1, a_2, \dots zaporedje realnih števil, pri čemer je $a_n > 0$ za $n \geq 1$. Naj bo $c_n = [a_0, a_1, a_2, \dots, a_n]$. Tedaj obstaja $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n \Leftrightarrow \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ divergira.*

Dokaz. Dokaz najdemo v [1], str. 105. \square

Ta trditev je posplošitev izreka o konvergenci enostavnega verižnega ulomka, saj vrsta $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$, kjer so a_n naravna števila za $n \geq 1$ vedno divergira (členi te vrste se namreč ne približujejo 0).

6 Verižni ulomek števila e

V tem poglavju si bomo ogledali posebno zaporedje a_0, a_1, \dots , ki tvori verižni ulomek števila e . Izračunajmo prvih nekaj členov tega zaporedja:

$$e = [2, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots] = [1, 0, 1, 1, 2, 1, 1, 4, 1, 1, 6, 1, 1, 8, \dots]$$

Zaradi lažje razpoznavnega zaporedja bomo tokrat uporabili $a_1 = 0$ in svojo naslednjo domnevo naslonili na drugo zaporedje. Dobimo tri podzaporedja:

$$\begin{aligned} a_{3n} &= 1 & \Rightarrow & p_{3n} = p_{3n-1} + p_{3n-2} \\ a_{3n-1} &= 1 & \Rightarrow & p_{3n-1} = p_{3n-2} + p_{3n-3} \\ a_{3n-2} &= 2(n-1) & \Rightarrow & p_{3n-2} = 2(n-1)p_{3n-3} + p_{3n-4} \end{aligned}$$

Enaka rekurzija velja tudi za zaporedje $\{q_n\}$.

Za tako zaporedje $\{a_n\}$ želimo dokazati, da je verižni ulomek $[a_0, a_1, \dots]$ enak e .

Vse tri rekurzije želimo zmanjšati na eno samo rekurzijo, ki bo vključevala le člene p_{3n} , p_{3n-3} in p_{3n-6} . Z nekaj substitucij dobimo rekurzijo

$$\begin{aligned} p_{3n} &= 2(2n-1)p_{3n-3} + p_{3n-6} \\ q_{3n} &= 2(2n-1)q_{3n-3} + q_{3n-6} \end{aligned}$$

Vemo, da obstaja limita delnih konvergentov tega verižnega ulomka, saj je enostaven. Dovolj je pokazati, da k e konvergira podzaporedje $\{c_{3n}\}$, saj s tem dobimo stekališče konvergentnega zaporedja, ki je hkrati tudi limita tega zaporedja. Uvedemo torej $x_n = p_{3n}$ in $y_n = q_{3n}$. Velja:

$$\begin{aligned} x_n &= 2(2n-1)p_{n-1} + p_{n-2} \\ y_n &= 2(2n-1)q_{n-1} + q_{n-2} \end{aligned}$$

Iz zapisa prvih nekaj členov verižnega ulomka za e pa tudi izračunamo:

$$x_0 = 1, \quad y_0 = 1, \quad x_1 = 3, \quad y_1 = 1$$

Sedaj vpeljemo zaporedje integralov

$$T_n = \int_0^1 \frac{t^n(t-1)^n}{n!} e^t dt$$

Izračunamo:

$$\begin{aligned} T_0 &= \int_0^1 e^t dt = e - 1 \\ T_1 &= \int_0^1 t(t-1)e^t dt = e - 3 \end{aligned}$$

Lema 6.1. Naj bo T_n , x_n in y_n kot zgoraj. Tedaj velja $T_n = y_n e - x_n$.

Dokaz. Za $n = 0, 1$ vidimo resničnost leme zgoraj. Predpostavimo, da lema velja za T_{n-1} . Z integracijo po delih integrala T_n dobimo

$$\begin{aligned} T_n &= 2(2n-1)T_{n-1} + T_n - 2 \\ &= 2(2n-1)(ey_{n-1} - x_{n-1}) + ey_{n-2} - x_{n-2} \\ &= (2(2n-1)y_{n-1} + y_{n-2})e - (2(2n-1)x_{n-1} + x_{n-2}) \\ &= y_n e - x_n \end{aligned}$$

□

Očitno velja $\lim_{n \rightarrow \infty} T_n = 0$, torej je po Lemi 6.1:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} (y_n e - x_n) = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(e - \frac{T_n}{y_n} \right) = e$$

Naš verižni ulomek je torej res število e . V nasprotju s tem število

$$\pi = [3, 7, 15, 1, 292, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 14, 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2, \dots]$$

nima znanega posebno lepega zaporedja $\{a_n\}$, čeprav je izračunanih mnogo členov. Zanimivo pa je, da imata denimo $\frac{4}{\pi}$ in $\frac{\pi}{2}$ zelo očitne vzorce v posplošenih verižnih ulomkih.

7 Kvadratne iracionalne in periodični verižni ulomki

Najprej definirajmo pojma, ki jih bomo spoznavali in povezali v tem poglavju.

Definicija 7.1. Realno število α je *kvadratna iracionala*, če je iracionalno in rešitev neke kvadratne enačbe s koeficienti iz \mathbb{Q} .

Definicija 7.2. Verižni ulomek $[a_0, a_1, a_2, \dots]$ je *periodičen*, če obstaja tak h , da je

$$a_n = a_{n+h}$$

za vse dovolj velike n .

Primer periodičnega verižnega ulomka je denimo $x = [\overline{2}] = [2, 2, 2, 2, \dots]$. Zanj velja

$$\begin{aligned}x &= 2 + \frac{1}{x} \\x &= \frac{2x + 1}{x} \\x^2 &= 2x + 1 \\0 &= x^2 - 2x - 1 \\x &= \frac{2 + \sqrt{4 + 4}}{2} \\x &= 1 + \sqrt{2}\end{aligned}$$

Vidimo, da je ta verižni ulomek kvadratna iracionala, kar nas napelje na idejo, da je vsak periodičen verižni ulomek možno zapisati s kvadratno iracionalo.

Izrek 7.1. *Karakterizacija periodičnega verižnega ulomka: Realno število α je kvadratna iracionala \Leftrightarrow njegov zapis z verižnim ulomkom je periodičen.*

Dokaz. (\Leftarrow) Brez škode za splošnost lahko predpostavimo $\alpha = [\overline{a_0, a_1, \dots, a_n}]$. Teda je $\alpha = [a_0, a_1, \dots, a_n, \alpha]$. Po (3) velja

$$\alpha = \frac{\alpha p_{n-1} + p_{n-2}}{\alpha q_{n-1} + q_{n-2}}$$

S poenostavitvijo te enačbe pokažemo, da α zadostuje kvadratni enačbi z racionalnimi koeficienti. Ker je ulomek neskončen, α ne more biti racionalno število. Zato je α kvadratna iracionala. (\Rightarrow) gl. [1], str. 113 \square

Smiselno se nam porodi vprašanje, kakšni so verižni ulomki algebraičnih števil višje stopnje, denimo

$$\sqrt[3]{2} = [1, 3, 1, 5, 1, 1, 4, 1, 1, 8, 1, 14, 1, 10, 2, 1, 4, 12, 2, 3, 2, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 14, 3, 12, 1, 15, 3, 1, 4, 534, 1,$$

kjer ni vidnega nobenega očitnega zaporedja. Povezava med algebraičnimi števili višje stopnje in verižnimi ulomki je odprt problem in predmet različnih razprav.

8 Zaključek

V svoji seminarski nalogi sem v grobem zajel vse osnovne izreke in trditve teorije verižnih ulomkov, ki so se izkazali kot uspešen način za predstavitev

realnih števil. Težava pri uporabi verižnih ulomkov so seveda računske operacije, saj je seštevanje zelo dolgih verižnih ulomkov dolgotrajno, prav tako množenje.

Literatura

- [1] *William Stein: Elementary Number Theory: Primes, Congruences, and Secrets*, UC San Diego, Harvard, University of Washington, 2017
- [2] *Henry Cohn: A Short Proof of the Simple Continued Fraction Expansion of e* , The American Mathematical Monthly, Vol. 113, No. 1 (Jan., 2006), pp. 57-62
- [3] *Michel Waldschmidt: Continued fractions: introduction and applications*, The Ninth International Conference on Science and Mathematics Education in Developing Countries (predstavitev), Mandalay University, 2016