

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS

NEMAPLUS L 50 SL®

NEMATICIDA - ORGANICO, BOTANICO
EXTRACTO VEGETAL DE QUILLAJA SAPONARIA

PRECAUCION

ANTIDOTO: NO TIENE
DENSIDAD: 1,1 g/mL 25°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y LA PIEL POR EXPOSICION.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMESTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONOMICO:

MODO DE ACCION: Nemaplus L 50 SL es un producto derivado de aminoácidos y saponinas, específicamente del Acido Glutámico, una fracción derivada de este ácido, produce efectos tóxicos a los nematodos por acción directa, afectando el sistema neurotransmisor, que actúan básicamente a nivel del aparato digestivo, por lo tanto, el nematodo, no se alimenta, no se reproduce, llegando a morir durante el periodo de exposición.

EQUIPO DE APLICACION: se puede aplicar con equipo manual o con bombas a motor o por medio de aplicación aérea. En todos los casos procurar que la película de aplicación sea lo más homogénea posible. **Este producto es de aplicación exclusiva para suelo no aplicar foliar ya que podría tener problemas de toxicidad debido a lo concentrado del producto.**



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA:

Llene el recipiente en que va a preparar la mezcla hasta la mitad de agua y agregue la totalidad del Nemaplus L 50 SL (antes debe de agitarse el recipiente que lo contiene) agite y aplique luego el resto de agua o mezcle con algún otro agroquímico. Es importante que se realice primero la solución con Nemaplus L 50 SL y el agua para que no tenga problemas de incompatibilidad.



RECOMENDACIONES DE USO: Para Panamá

| CULTIVOS | PLAGAS A CONTROLAR | DOSIS RECOMENDADAS | FRECUENCIA Y EPOCA DE APLICACIÓN |
|--------------------------------------|---|------------------------|---|
| Arroz <i>Oryza sativa</i> | Nematodo del nudo <i>Meloidogyne</i> sp. | 5 l/ha | Dependiendo del nivel de infestación, debe ser aplicado al sistema radicular por goteo o en "drench" y puede aplicarse las veces que sean necesarias ya que el producto es orgánico, aun con fructificación y cosecha |
| Banano y Plátano <i>Musa</i> spp. | Nematodo minador <i>Radopholus similis</i> | 5-7 l/ha | |
| Café <i>Coffea arabica</i> | <i>Meloidogyne</i> sp. | 3-5 l/ha | |
| Maní <i>Arachis hypogaea</i> | <i>Meloidogyne</i> sp. y <i>Pratylenchus</i> sp. | 5-7 mL/ha | |
| Melón <i>Cucumis melo</i> | <i>Meloidogyne</i> sp. y <i>Pratylenchus</i> sp. | 5 l/ha | |
| Ornamentales y Flores | <i>Meloidogyne</i> sp. <i>Pratylenchus</i> sp. | 5-7 l/ha | |
| Vegetales (Hortalizas) | <i>Meloidogyne</i> sp. y <i>Pratylenchus</i> sp. | 3-5 mL / litro de agua | |

INTERVALO ENTRE ULTIMA APLICACIÓN Y COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL AREA TRATADA: De inmediato, si se requiere ya que el producto no es tóxico.

FITOTOXICIDAD: El producto no presenta fitotoxicidad alguna a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de fertilizantes y plaguicidas del mercado, sin embargo la recomendación de fabrica es aplicarlo solo.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacénese solamente en el contenedor original. No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, utensilios de cocina. Almacene en un lugar fresco aireado, alejado del calor y lejos del alcance de los niños o personas discapacitadas. Este producto no es inflamable. No es corrosivo.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION.

MANTENGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO, BAÑESE DESPUES DE TRABAJAR Y PONGASE ROPA LIMPIA.



SINTOMAS DE INTOXICACION: Dolor de estomago, diarrea y leve malestar gastrointestinal. En contacto directo con organos sensibles del cuerpo puede causar irritación.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTION: Coloque a la persona en un lugar ventilado, dé a beber suficiente agua y leche para neutralizar la acidez del producto. En caso necesario lleve la persona al Médico.

POR INHALACION: No representa peligro de intoxicación por inhalación.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar con abundante agua potable por lo menos 15 minutos.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Lave con abundante agua y jabón o detergente, por espacio de 15 minutos. Si aparece irritación consulte al médico.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VOMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONCIENCIA

TRATAMIENTO MEDICO: Dar tratamiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACION:

PAIS

PANAMA

INSTITUCION

Centro de Investigación e Información
de Medicamentos y Tóxicos

TELEFONO

(507) 523-4948/4968

MEDIDAS PARA LA PROTECCION DEL AMBIENTE:

NO CONTAMINE RIOS, LAGOS, ESTANQUES O FUENTES DE AGUA SUBTERRANEA CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACIOS.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES.

Después de vaciar todo el producto del envase, enjuáguelo tres veces y vierta el líquido en el tanque de aplicación, para aprovechar mejor el contenido y reducir los remanentes. En caso de derrames, se recogerá el producto con un material absorbente (arena, tierra o aserrín) y se depositará en un recipiente. Los sobrantes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en sus envases originales debidamente etiquetados, con su panfleto y cerrados.

Los envases vacíos deben ser perforados y enviados a los centros de acopio que estén disponibles para recibir este tipo de material, si no los hay, elimínelos junto con los embalajes, empaques, derrames y demás desechos, de acuerdo a lo estipulado por la autoridad competente en la materia. En caso de remanentes o sobrantes de mezcla, aplicarlos en los bordes del cultivo.

EL USO DE LOS ENVASES Y EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTIA:

El Fabricante y el distribuidor garantizan la cantidad del producto en su envase original cerrado herméticamente. El Fabricante y distribuidor rechazan cualquier responsabilidad por daños en la cosecha, los cuales estén fuera del control del fabricante y el distribuidor. El usuario debe asumir dichos riesgos.

FABRICADO Y FORMULADO POR:

IN VETISA
Industrial Vetsi Internacional S.A.

Cerro Verde 443. San Ignacio
Monterrico. Surco. Lima 33
Lima - Perú
(51) (1) 275-0515
infopana@invetisa.com

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:



Vía Principal Volcán, 50 mts. Suroeste
de la Estación de combustible Texaco.
Volcan – Chiriqui - Panamá
Telefax: (507) 7715197
agrosoluciones@gmail.com

PAIS

COSTA RICA
GUATEMALA
PANAMA
EL SALVADOR

NUMERO DE REGISTRO

5234
5234

FECHA DE REGISTRO

10 de Junio 2010
28 de Agosto 2012