

Interrogación 3 - Pauta

Pregunta 1

Sea X el tiempo que le toma a Usted leer la prueba antes de comenzar e Y el tiempo que le tomará en responder esta pregunta.

Si $X \sim \text{Gamma}(k, \nu)$ e $Y | X = x \sim \text{Exponencial}(1/x)$, calcule la correlación entre estos tiempos si $k = 14$ y $\nu = 0.6$.

Solución

Se pide

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \cdot \sigma_Y} = \frac{E(X \cdot Y) - \mu_X \cdot \mu_Y}{\sigma_X \cdot \sigma_Y}$$

Del formulario se tiene que

$$\mu_X = \frac{k}{\nu} \quad \text{y} \quad \sigma_X = \frac{\sqrt{k}}{\nu}$$

Aplicando teorema de esperanzas iteradas (teorema de probabilidades totales) tenemos que

$$\mu_Y = E[E(Y | X)] = E(X) = \frac{k}{\nu}, \quad \text{[0.2 Ptos.]}$$

$$\sigma_Y^2 = \text{Var}[E(Y | X)] + E[\text{Var}(Y | X)] = \text{Var}(X) + E(X^2) = \frac{k}{\nu^2} + \frac{k(k+1)}{\nu^2} \quad \text{[0.2 Ptos.]}$$

y

$$E(X \cdot Y) = E[E(X \cdot Y | X)] = E(X^2) = \frac{k(k+1)}{\nu^2} \quad \text{[0.2 Ptos.]}$$

Reemplazando

$$\text{Corr}(X, Y) = \frac{1}{\sqrt{k+2}} = \frac{1}{\sqrt{14+2}} = \frac{1}{4} \quad \text{[0.4 Ptos.]}$$

Pregunta 2

El puntaje ponderado para ingresar a ingeniería, considerando únicamente la PTU está dado por:

Prueba de Comprensión Lectora: 17%

Prueba de Matemática: 58%

Prueba de Ciencias: 25%

Un análisis del rendimiento de todos los postulantes a ING-UC determina que:

	C. Lectora	Matemáticas	Ciencia
mean	[mu1]	[mu2]	[mu3]
sd	[s1]	[s2]	[s3]

Correlación

	C. Lectora	Matemáticas	Ciencia
C. Lectora	1.00		
Matemáticas	0.15	1.00	
Ciencia	0.08	0.78	1.00

Asumiendo que cada prueba se comporta como una distribución normal, determine la probabilidad que el puntaje ponderado (considerando únicamente las componentes de la PTU) sea superior a 700 puntos.

Nota: En su respuesta considere todo el soporte de la distribución Normal. (No trunque en 850).

Solución

Definamos como X_1 al puntaje C. Lectora, X_2 al puntaje Matemáticas y X_3 al puntaje Ciencia.

Bajo Normalidad se tiene que

$$Z = 0.17 \cdot X_1 + 0.58 \cdot X_2 + 0.25 \cdot X_3 \sim \text{Normal}(\mu, \sigma)$$

con

$$\mu = 0.17 \cdot [\text{mu1}] + 0.58 \cdot [\text{mu2}] + 0.25 \cdot [\text{mu3}]$$

y

$$\sigma = \sqrt{0.17^2 \cdot [s1]^2 + 0.58^2 \cdot [s2]^2 + 0.25^2 \cdot [s3]^2 + 2 \cdot 0.17 \cdot 0.58 \cdot 0.15 \cdot [s1] \cdot [s2] + 2 \cdot 0.17 \cdot 0.25 \cdot 0.08 \cdot [s1] \cdot [s3] + 2 \cdot 0.25 \cdot 0.58 \cdot 0.78 \cdot [s2] \cdot [s3]}$$

Se pide

$$P(Z > 700) = 1 - \text{pnorm}(700, \text{mean} = \mu, \text{sd} = \sigma) \quad \text{[1.0 Ptos.]}$$

Ejemplo

a1 = 0.17

a2 = 0.58

a3 = 0.25

mu1 = 615

mu2 = 665

mu3 = 645

s1 = 58

s2 = 63

s3 = 32

mu = a1*mu1+a2*mu2+a3*mu3

sqrt(a1^2*s1^2+a2^2*s2^2+a3^2*s3^2+2*a1*a2*0.15*s1*s2+2*a1*a3*0.08*s1*s3+2*a2*a3*0.78*s2*s3)

1-pnorm(700, mu, sigma)

[1] 0.1433934

Nota: Si el alumnos calcula correctamente la probabilidad solicitada con σ bajo independencia [0.5 Ptos.]

Pregunta 3

Suponga que el número de clientes que llegan a un local comercial durante un día cualquiera tiene distribución Poisson con tasa esperada igual a $[\text{lambda}]$ clientes por día.

Además cada cliente que llega realiza una compra con probabilidad $[p]$.

Calcule aproximadamente la probabilidad de que el número promedio de clientes que compran durante $[t]$ días sea mayor a $[x]$ personas.

Solución

Definamos como $X_1, \dots, X_{[t]}$ el número de clientes que comprarán diariamente en $[t]$ días.

$$X_i \stackrel{\text{iid}}{\sim} \text{Poisson}([\text{lambda}] \cdot [p])$$

Aplicando Teorema del Limite Central y corrección por continuidad de se tiene que:

$$P(\bar{X} > [x]) = P\left(\sum_{i=1}^{[t]} X_i > [t] \cdot x\right) = 1 - P\left(\sum_{i=1}^{[t]} X_i \leq [t] \cdot x\right) \\ \approx 1 - \text{pnorm}(x * t + 0.5, \text{mean} = \text{lambda} * p * t, \text{sd} = \text{sqrt}(t * \text{lambda} * p)) \quad [1.0 \text{ Ptos.}]$$

```
## Ejemplo ##
lambda = 100
p = 0.20
t = 30
x = 21
1 - pnorm(x * t + 0.5, mean = lambda * p * t, sd = sqrt(t * lambda * p))
[1] 0.106537
```

Nota: No descontar puntaje si el alumno contesta correctamente no aplicando corrección por continuidad. Si el alumno contesta el complemento asignar [0.5 Ptos].

Pregunta 4

Sea X una variable aleatoria con distribución $\text{Gamma}(k, \nu)$ y defina $Y = 1/X$.

Obtenga el valor esperado de Y aproximado de 2do orden y su varianza aproximada de 1er orden.

Para $k = [k]$ y $\nu = [\nu]$ evalúe el coeficiente de variación aproximado:

Solución

La aproximación de 2do orden de Y está dada por:

$$Y = g(X) \approx \frac{1}{\mu_X} + (X - \mu_X) \cdot \left(-\frac{1}{\mu_X^2} \right) + \frac{(X - \mu_X)^2}{2} \cdot \left(\frac{2}{\mu_X^3} \right).$$

Valor esperado de 2do orden:

$$\mu_Y \approx \frac{\nu}{k} + \frac{k}{\nu^2} \cdot \frac{\nu^3}{k^3} = \frac{\nu(k+1)}{k^2}. \quad \text{[0.3 Ptos.]}$$

Varianza de 1er orden:

$$\sigma_Y^2 \approx \frac{k}{\nu^2} \cdot \frac{\nu^4}{k^4} = \frac{\nu^2}{k^3}. \quad \text{[0.3 Ptos.]}$$

Se pide

$$\delta_Y \approx \frac{\sigma_Y}{\mu_Y} = \frac{\sqrt{k}}{(k+1)} \quad \text{[0.4 Ptos.]}$$

```
## Ejemplo ##
k = 100
nu = 0.6
sqrt(k)/(k+1)
[1] 0.0990099
```

Pregunta 5

Considere una muestra aleatoria X_1, \dots, X_n proveniente de una distribución Exponencial (ν). Determine al valor absoluto del sesgo del siguiente estimador de ν :

$$\hat{\nu} = \frac{1}{\bar{X}}$$

Evalúe para $n = [n]$ y $\nu = [nu]$.

Solución

Dado que X_1, \dots, X_n iid $\text{Exp}(\nu)$, entonces $\bar{X} \sim \text{Gamma}(n, n \cdot \nu)$.

Se pide

$$E(\hat{\nu}) = \int_0^\infty \frac{1}{y} \cdot \frac{(n \cdot \nu)^n}{\Gamma(n)} y^{n-1} e^{-n \cdot \nu y} dy = \frac{n \cdot \nu}{n-1} \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

Por lo tanto

$$|\text{Sesgo}| = |E(\hat{\nu}) - \nu| = \frac{\nu}{n-1} \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

Ejemplo

n = 20

nu = 0.3

nu/(n-1)

[1] 0.01578947

Suponga que X es una variable aleatoria discreta con función de probabilidad dada por:

$$p_X(x) = \begin{cases} \theta^2 & , \text{ si } x = -1 \\ 2\theta(1-\theta) & , \text{ si } x = 0 \\ (1-\theta)^2 & , \text{ si } x = +1 \end{cases}$$

con $0 < \theta < 1$.

A continuación responda las siguientes preguntas:

Pregunta 6.1

A partir de la siguiente muestra aleatoria: +1, +1 y 0, calcule y evalúe el estimador de momentos de θ .

Solución

Tenemos que

$$E(X) = (-1) \cdot \theta^2 + 0 \cdot 2\theta(1-\theta) + (+1) \cdot (1-\theta)^2 = 1 - 2\theta = \bar{X} \rightarrow \hat{\theta} = \frac{1 - \bar{X}}{2} = \frac{1}{6} \quad \text{[1.0 Ptos.]}$$

Pregunta 6.2

A partir de la siguiente muestra aleatoria: +1, -1 y -1, calcule y evalúe el estimador de momentos de θ .

Solución

Tenemos que

$$E(X) = (-1) \cdot \theta^2 + 0 \cdot 2\theta(1-\theta) + (+1) \cdot (1-\theta)^2 = 1 - 2\theta = \bar{X} \rightarrow \hat{\theta} = \frac{1 - \bar{X}}{2} = \frac{2}{3} \quad \text{[1.0 Ptos.]}$$

Pregunta 7.1

A partir de la siguiente muestra aleatoria: -1, +1 y -1, calcule y evalúe el estimador máximo de verosimilitud de θ .

Solución

Tenemos que

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \theta^2 \cdot (1 - \theta)^2 \cdot \theta^2 \rightarrow \ln L(\theta) = 4 \ln(\theta) + 2 \ln(1 - \theta) \\ &\rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = \frac{4}{\theta} - \frac{2}{1 - \theta} \quad [0.5 \text{ Ptos.}] \end{aligned}$$

Igualando a cero y despejando se tiene que

$$\hat{\theta} = \frac{2}{3} \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

Pregunta 7.2

A partir de la siguiente muestra aleatoria: 0, +1 y -1, calcule y evalúe el estimador máximo de verosimilitud de θ .

Solución

Tenemos que

$$\begin{aligned} L(\theta) &= \theta^2 \cdot 2\theta(1 - \theta) \cdot (1 - \theta)^2 \rightarrow \ln L(\theta) = \ln(2) + 3 \ln(\theta) + 3 \ln(1 - \theta) \\ &\rightarrow \frac{\partial}{\partial \theta} \ln L(\theta) = \frac{3}{\theta} - \frac{3}{1 - \theta} \quad [0.5 \text{ Ptos.}] \end{aligned}$$

Igualando a cero y despejando se tiene que

$$\hat{\theta} = \frac{1}{2} \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

Pregunta 8

Un fabricante de fibras textiles afirma que la nueva fibra para tapicería que están utilizando presenta una resistencia media superior a `[mu0]` kg, cuando estira.

Una muestra aleatoria de tamaño `[n]`, muestra una resistencia media de `[prom]` kg con una desviación estándar de `[s]` kg.

Realice la prueba de hipótesis correspondiente bajo el supuesto que los datos distribuyen Normal y entregue el valor-p

Solución

Tenemos las siguientes hipótesis

$$H_0 = \mu = \mu_0 \quad \text{vs} \quad H_a : \mu > \mu_0$$

Bajo H_0

$$T_0 = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim \text{t-Student}(n - 1).$$

Para $H_a : \mu > \mu_0$, el valor p se calcula como `1 - pt(T0, df = n-1)`. **[1.0 Ptos.]**

```
## Ejemplo ##
mu0 = 12
n = 20
prom = 12.5
s = 0.9
T0 = (prom-mu0)/(s/sqrt(n))
1-pt(T0, df = n-1)
[1] 0.01123042
```


Pregunta 9

En la elección presidencial de 1ra vuelta, se registraron los tiempos (en minutos) que les tomó a $[n]$ votantes, escogidos al azar, para cumplir su deber cívico desde que entrega al presidente de mesa su CI y luego la retira.

```
mean(X) = [prom]
sd(X)   = [s]
```

Al analizar el error de estimación, con un 95 % de confianza, se determina que es demasiado grande y que en el próximo estudio debe ser reducido a la mitad.

Haciendo uso de la información disponible, ¿cuál es el tamaño muestral necesario?

Solución

Tenemos que el error de estimación de la muestra es

$$e.e = t_{0.975}([n] - 1) \cdot \frac{[s]}{\sqrt{[n]}} \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

y se quiere en el próximo estudio reducir e.e a la mitad.

El nuevo tamaño muestral es:

$$m = \left(\frac{k_{0.975} \cdot [s]}{e.e/2} \right)^2 \quad [0.5 \text{ Ptos.}]$$

```
## Ejemplo ##
n = 100
prom = 5.1
s = 1.1
ee = qt(0.975, df = n-1)*s/sqrt(n)
m = (qnorm(0.975)*s/(ee/2))^2
trunc(m)+1
[1] 391
```

Nota: Si el alumno calcula el error de estimación con $qnorm()$ en vez de $qt()$ no descontar puntaje.

La base de datos [Películas.xlsx] contiene la siguiente información de 7.661 películas: Nombre, Categoría, Género, Año, Fecha estreno, Puntuación, Votos, Director, Escritor, Protagonista, País, Presupuesto, Ganancia, Compañía y Duración.

A continuación responda las siguientes tres preguntas:

Pregunta 10

Ajuste una distribución Gamma y Log-Normal por el método de momentos a los tiempo de duración (en min) de las películas animadas (Genero Animación) y responda:

Log-Normal($\lambda = 4.5159139$, $\zeta = 0.1272098$) [0.4 Ptos.]

Gamma($k = 61.2971127$, $\nu = 0.6647978$) [0.4 Ptos.]

¿Cuál de estos dos modelos ajusta mejor la proporción de películas cuya duración es superior a las 2 horas?

Log-Normal [0.2 Ptos.]

```
Base <- rio::import("Películas.xlsx")
X <- dplyr::filter(Base, Género == "Animación")$"Duración"
mme_ln <- fitdistrplus::fitdist(data = X, distr = "lnorm", method = "mme")
mme_ln$estimate
  meanlog    sdlog
4.5159139 0.1272098
mme_gamma <- fitdistrplus::fitdist(data = X, distr = "gamma", method = "mme")
mme_gamma$estimate
  shape    rate
61.2971127 0.6647978
mean(X>120)
[1] 0.01775148
pgamma(120, shape = mme_gamma$estimate[1], rate = mme_gamma$estimate[2], lower.tail = F)
[1] 0.01393085
plnorm(120, meanlog = mme_ln$estimate[1], sdlog = mme_ln$estimate[2], lower.tail = F)
[1] 0.01638536
```

Pregunta 11.1

Existe evidencia para afirmar que los tiempos de duración medios de las películas de terror (Genero Terror) son menores a 97 min. Asumiendo Normalidad, realice la prueba de hipótesis correspondiente con un 5 % de significancia y responda:

Estadístico de Prueba = **-1.205007** [0.4 Ptos.]

Valor-p = **0.1145441** [0.4 Ptos.]

¿Existe evidencia? **NO** [0.2 Ptos.]

```
X <- dplyr::filter(Base, Género=="Terror")$"Duración"
mu0 = 97
t.test(x = X, mu = mu0, alternative = "less")$statistic
      t
-1.205007
t.test(x = X, mu = mu0, alternative = "less")$p.value
[1] 0.1145441
```

Pregunta 11.2

Existe evidencia para afirmar que los tiempos de duración medios de las películas de terror (Genero Terror) son superiores a 95 min. Asumiendo Normalidad, realice la prueba de hipótesis correspondiente con un 5 % de significancia y responda:

Estadístico de Prueba = **2.259388** [0.4 Ptos.]

Valor-p = **0.01226478** [0.4 Ptos.]

¿Existe evidencia? **SI** [0.2 Ptos.]

```
X <- dplyr::filter(Base, Género=="Terror")$"Duración"
mu0 = 95
t.test(x = X, mu = mu0, alternative = "greater")$statistic
      t
2.259388
t.test(x = X, mu = mu0, alternative = "greater")$p.value
[1] 0.01226478
```

Pregunta 12

¿Existe evidencia que permita afirmar que la desviación estándar de la puntuación de las películas de acción (Genero Acción) desde el año 2002 es inferior a 1 punto? Asumiendo que las puntuaciones provienen de una distribución Normal y un nivel de significancia del 2 %, realice la prueba de hipótesis correspondiente y responda:

Estadístico de Prueba = 1038.498 [0.4 Ptos.]

Valor-p = 0.04787016 [0.4 Ptos.]

¿Existe evidencia? NO [0.2 Ptos.]

```
X <- dplyr::filter(Base, Género=="Acción", Año>2001)$"Puntuación"
TeachingDemos::sigma.test(X, sigma = 1, alternative="less")$statistic
X-squared
1038.498
TeachingDemos::sigma.test(X, sigma = 1, alternative="less")$p.value
[1] 0.04787016
```