

14.12.2012

Willkommen zur neunten Übung zur Vorlesung

Grundbegriffe der Informatik



Matthias Janke

email: matthias.janke@kit.edu

- ▶ Anmeldung für den Übungsschein nicht vergessen!
- ▶ Gestern waren 534 Personen angemeldet
- ▶ Da fehlen evtl immer noch ein paar Anmeldungen...
- ▶ Anmeldung über Studierendenportal:
<http://www.studium.kit.edu>

- ▶ Im Tutorium nicht abgeholte Übungsblätter
- ▶ liegen in Gebäude 50.21, erster Stock, im Flur

- ▶ Wie gehts weiter nach Weihnachten?
- ▶ Abgabe neuntes Übungsblatt: 21.12.2012 oder früher
- ▶ Abgabe zehntes Übungsblatt: 11.1.2013 oder früher
- ▶ Übungen 10 und 11 an o.g. Terminen ... wenn die Welt nicht untergeht

Aufwandsabschätzung, O-Kalkül

Scheinbar gern benutzter Merksatz:

- ▶ $g(n) \in O(f(n))$ bedeutet, dass $f(n)$ schneller wächst als $g(n)$.

Scheinbar gern benutzter Merksatz:

- ▶ $g(n) \in O(f(n))$ bedeutet, dass $f(n)$ schneller wächst als $g(n)$.
- ▶ Dies führt zu Überlegungen wie:
 n^2 wächst langsamer als $100n^2$, also gilt $100n^2 \notin O(n^2)$

Scheinbar gern benutzter Merksatz:

- ▶ $g(n) \in O(f(n))$ bedeutet, dass $f(n)$ schneller wächst als $g(n)$.
- ▶ Dies führt zu Überlegungen wie:
 n^2 wächst langsamer als $100n^2$, also gilt $100n^2 \notin O(n^2)$
- ▶ Das. Ist. **Falsch**.

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

- ▶ Was muss für c gelten?

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

- ▶ Was muss für c gelten?
- ▶ Für welche n soll die Aussage gelten?

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

- ▶ Was muss für c gelten? $c > 0$
- ▶ Für welche n soll die Aussage gelten? $\forall n \geq n_0$

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

- ▶ Was muss für c gelten? $c > 0$
- ▶ Für welche n soll die Aussage gelten? Für “hinreichend große” n .

Besser: $f(n) \in O(g(n))$ bedeutet, dass es eine Konstante c gibt, so dass $f(n)$ höchstens so schnell wächst wie $cg(n)$.

- ▶ Was muss für c gelten? $c > 0$
- ▶ Für welche n soll die Aussage gelten? Für “hinreichend große” n .

Nochmal die Definition:

$$O(g) = \{f \mid \exists c \in \mathbb{R}_+ : \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : \forall n \geq n_0 : f(n) \leq cg(n)\}$$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

- ▶ Sei $g(n) \in O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n))$
 $\Rightarrow \exists g_1(n) \in O(f_1(n)) : \exists g_2(n) \in O(f_2(n)) :$
 $g(n) = g_1(n) \cdot g_2(n)$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

- ▶ Sei $g(n) \in O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n))$
 $\Rightarrow \exists g_1(n) \in O(f_1(n)) : \exists g_2(n) \in O(f_2(n)) :$
 $g(n) = g_1(n) \cdot g_2(n)$
- ▶ $\exists c_1, c_2 > 0 : \exists n_{01}, n_{02} \in \mathbb{N}_0 :$
 $\forall i \in \{1, 2\} : \forall n \geq n_{0i} : g_i(n) \leq c_i f_i(n)$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

- ▶ Sei $g(n) \in O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n))$
 $\Rightarrow \exists g_1(n) \in O(f_1(n)) : \exists g_2(n) \in O(f_2(n)) :$
 $g(n) = g_1(n) \cdot g_2(n)$
- ▶ $\exists c_1, c_2 > 0 : \exists n_{01}, n_{02} \in \mathbb{N}_0 :$
 $\forall i \in \{1, 2\} : \forall n \geq n_{0i} : g_i(n) \leq c_i f_i(n)$
- ▶ $\Rightarrow \forall n \geq \max(n_{01}, n_{02}) : g_1(n) \cdot g_2(n) \leq c_1 f_1(n) \cdot c_2 f_2(n)$
 $= (c_1 c_2) f_1(n) \cdot f_2(n),$
da alle vorkommenden Zahlen größer oder gleich 0 sind!

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

- ▶ Sei $g(n) \in O(f_1(n) \cdot f_2(n))$
 $\Rightarrow \exists c > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : \forall n \geq n_0 : g(n) \leq cf_1(n) \cdot f_2(n)$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

► Sei $g(n) \in O(f_1(n) \cdot f_2(n))$

$$\Rightarrow \exists c > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : \forall n \geq n_0 : g(n) \leq cf_1(n) \cdot f_2(n)$$

► Wir setzen

$$g_1(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n < n_0 \\ cf_1(n) & \text{sonst.} \end{cases}$$

$$O(f_1(n)) \cdot O(f_2(n)) = O((f_1 \cdot f_2)(n))$$

- ▶ Sei $g(n) \in O(f_1(n) \cdot f_2(n))$
 $\Rightarrow \exists c > 0 : \exists n_0 \in \mathbb{N}_0 : \forall n \geq n_0 : g(n) \leq cf_1(n) \cdot f_2(n)$
- ▶ Wir setzen

$$g_1(n) = \begin{cases} 1 & \text{falls } n < n_0 \\ cf_1(n) & \text{sonst.} \end{cases}$$

und

$$g_2(n) = \begin{cases} g(n)/g_1(n) & \text{falls } g_1(n) \neq 0 \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

- ▶ Es gilt: $\forall n \geq n_0 : (g_1(n) = 0 \iff cf_1(n) = 0) \wedge (cf_1(n) = 0 \Rightarrow g(n) \leq 0 \Rightarrow g(n) = 0)$

- ▶ Es gilt: $\forall n \geq n_0 : (g_1(n) = 0 \iff cf_1(n) = 0) \wedge (cf_1(n) = 0 \Rightarrow g(n) \leq 0 \Rightarrow g(n) = 0)$
- ▶ Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0 : g_1(n) \cdot g_2(n) = g(n)$

- ▶ Es gilt: $\forall n \geq n_0 : (g_1(n) = 0 \iff cf_1(n) = 0) \wedge (cf_1(n) = 0 \Rightarrow g(n) \leq 0 \Rightarrow g(n) = 0)$
- ▶ Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0 : g_1(n) \cdot g_2(n) = g(n)$
- ▶ Außerdem gilt: $\forall n \geq n_0 : g_1(n) \leq cf_1(n) \Rightarrow g_1 \in O(f_1)$ und $\forall n \geq n_0 : g_2(n) \leq f_2(n)$.

- ▶ Es gilt: $\forall n \geq n_0 : (g_1(n) = 0 \iff cf_1(n) = 0) \wedge (cf_1(n) = 0 \Rightarrow g(n) \leq 0 \Rightarrow g(n) = 0)$
- ▶ Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0 : g_1(n) \cdot g_2(n) = g(n)$
- ▶ Außerdem gilt: $\forall n \geq n_0 : g_1(n) \leq cf_1(n) \Rightarrow g_1 \in O(f_1)$ und $\forall n \geq n_0 : g_2(n) \leq f_2(n)$.
- ▶ $g_2(n) = 0 \Rightarrow g_2(n) \leq f_2(n) \checkmark$

- ▶ Es gilt: $\forall n \geq n_0 : (g_1(n) = 0 \iff cf_1(n) = 0) \wedge (cf_1(n) = 0 \Rightarrow g(n) \leq 0 \Rightarrow g(n) = 0)$
- ▶ Also gilt für alle $n \in \mathbb{N}_0 : g_1(n) \cdot g_2(n) = g(n)$
- ▶ Außerdem gilt: $\forall n \geq n_0 : g_1(n) \leq cf_1(n) \Rightarrow g_1 \in O(f_1)$ und $\forall n \geq n_0 : g_2(n) \leq f_2(n)$.
- ▶ $g_2(n) = 0 \Rightarrow g_2(n) \leq f_2(n) \checkmark$
 $g_2(n) \neq 0 \Rightarrow g_2(n) = g(n)/g_1(n)$
 $\leq cf_1(n)f_2(n)/(cf_1(n)) = f_2(n) \checkmark$.

Zu zeigen: $\frac{n^3+2n}{2n+1} \in O(n^2)$:

Zu zeigen: $\frac{n^3+2n}{2n+1} \in O(n^2)$:

- ▶ $\frac{n^3+2n}{2n+1} \leq \frac{n^3+2n}{2n} = \frac{1}{2}n^2 + 1 \leq \frac{1}{2}n^2 + n^2 = \frac{3}{2}n^2$
- ▶ Das heisst für $c = \frac{3}{2}$ und $n_0 = 42$ gilt: $\forall n \geq n_0 : \frac{n^3+2n}{2n+1} \leq cn^2$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Theta(n^k)$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$ und $f \in \Omega(n^k)$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$:

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \leq \prod_{i=1}^k \frac{n}{1} = n^k$$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \leq \prod_{i=1}^k \frac{n}{1} = n^k$$

$\Rightarrow n_0 = k, c = 1$ funktioniert.

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in O(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \leq \prod_{i=1}^k \frac{n}{1} = n^k$$

$$f \in \{g : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{R}_0^+ \mid \forall n \geq k : g(n) \leq 1 \cdot n^k\}$$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \geq \prod_{i=1}^k \frac{n+1-k}{k} = \frac{1}{k^k} (n+1-k)^k$$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq k$.

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \geq \prod_{i=1}^k \frac{n+1-k}{k} = \frac{1}{k^k} (n+1-k)^k$$

Idee: Wenn n hinreichend groß, lässt sich $(n+1-k)$ durch $\frac{n}{2}$ abschätzen.

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq 2k$.

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq 2k$.

$$\Rightarrow k \leq \frac{n}{2} \Rightarrow n + 1 - k \geq n + 1 - \frac{n}{2} = \frac{n}{2} + 1 \geq \frac{n}{2}.$$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq 2k$.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \geq \prod_{i=1}^k \frac{n+1-k}{k} = \frac{1}{k^k} (n+1-k)^k \\ &\geq \frac{1}{k^k} \left(\frac{n}{2}\right)^k = \frac{1}{(2k)^k} n^k \end{aligned}$$

k fest, $f : \mathbb{N}_0 \rightarrow \mathbb{N}_0$

$$n \mapsto \begin{cases} \binom{n}{k} & \text{falls } n \geq k \\ 0 & \text{sonst} \end{cases}$$

Behauptung: $f \in \Omega(n^k)$:

Sei $n \geq 2k$.

$$\begin{aligned} \binom{n}{k} &= \frac{n!}{(n-k)!k!} = \prod_{i=1}^k \frac{n+1-i}{i} \geq \prod_{i=1}^k \frac{n+1-k}{k} = \frac{1}{k^k} (n+1-k)^k \\ &\geq \frac{1}{k^k} \left(\frac{n}{2}\right)^k = \frac{1}{(2k)^k} n^k \\ \Rightarrow n_0 = 2k \text{ und } c = \frac{1}{(2k)^k} \text{ funktionieren.} \end{aligned}$$

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^3)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Wie groß darf Problem sein?

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^3)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Wie groß darf Problem sein? \rightarrow Unbekannt, m

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^3)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner 8-mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein?

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^3)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner 8-mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein? Ungefähr $2m$

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^d)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner k -mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein?

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(n^d)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner k -mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein? Ungefähr $\sqrt[d]{k} \cdot m$

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(d^n)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner k -mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein?

Algorithmus mit Laufzeit in $\Theta(d^n)$

Jede Woche soll der Algorithmus ein Problem lösen.

Neuer Rechner k -mal so schnell:

Wie groß darf Problem sein? Ungefähr $m + \log_d k$

Wieso muss man bei $O(\log n)$ keine Basis angeben?

Wieso muss man bei $O(\log n)$ keine Basis angeben?

$$\forall a, b > 1 : \log_a n \in \Theta(\log_b(n))$$

Wieso muss man bei $O(\log n)$ keine Basis angeben?

$$\forall a, b > 1 : \log_a n \in \Theta(\log_b(n))$$

$$\log_a(n) = \frac{\log_2 n}{\log_2 a} = \frac{\log_2 b \log_2 n}{\log_2 b \log_2 a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} \log_b n$$

Wieso muss man bei $O(\log n)$ keine Basis angeben?

$$\forall a, b > 1 : \log_a n \in \Theta(\log_b(n))$$

$$\log_a(n) = \frac{\log_2 n}{\log_2 a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 b} \frac{\log_2 n}{\log_2 a} = \frac{\log_2 b}{\log_2 a} \log_b n$$

$$\log_a(n) = \frac{\log_2 n}{\log_2 a} \text{ gilt, weil } \log_a(n) = \frac{\log_2 a \log_a n}{\log_2 a} = \frac{\log_2 a^{\log_a n}}{\log_2 a} = \frac{\log_2 n}{\log_2 a}$$

Themen für das neunte Übungsblatt:

- ▶ O-Kalkül
- ▶ Laufzeiten

Schönes Wochenende!