1 Wörter

- Ist die Definition $\mathbb{G}_n = \{i \in \mathbb{N}_0 \mid 0 \le i \land i < n\}$ klar? Können alle so etwas lesen?
- Ist auch $\mathbb{G}_0 = \{\}$ klar?

1.1 Umständliche formale Definition von "Wort"

- Noch mal deutlich sagen: Zweck der umständlichen formalen Definition von "Wort" ist, an einem einfachen Beispiel ein paar vielleicht noch unvertraute Dinge zu üben wie induktive Definitionen und typische Beweismethoden. Zu letzteren gehört vollständige Induktion, aber auch einfachere Vorgehensweisen. Siehe Skript.
- Beachte: wir lassen nur *surjektive* Abbildungen $w : \mathbb{G}_n \to B$ als Wörter zu. (Ansonsten gäbe es mehrere verschiedene leere Wörter.)
- Nichtsdestotrotz sagen wir, dass $w: \mathbb{G}_n \to B$ ein Wort *über dem Alphabet A* ist, auch wenn A größer ist als B.

1.2 Das leere Wort

- Das leere Wort sollte zumindest informell klar werden.
- An die formalistische Definition $\varepsilon:\{\}\to\{\}$ müssen sich etliche vermutlich erst noch gewöhnen.
- Was für eine Abbildung $\varepsilon: \{\} \to \{\}$ ist, sieht man auf dem Weg, dass das jedenfalls eine Relation $R \subseteq \{\} \times \{\}$ sein muss.
 - klar machen, dass $\{\} \times \{\} = \{\}$
 - damit gibt es für dieses R, also ε nur eine Möglichkeit
- Wichtig: ε hat zwar Länge 0, besteht also "aus keinen Symbolen", ist aber trotzdem "etwas". Die Menge $M = \{\varepsilon\}$, die das leere Wort enthält, ist *nicht* die leere Menge, sondern M enthält genau ein Element. Also $M \neq \emptyset$ und |M| = 1.

1.3 Konkatenation von Wörtern

- jedes Wort kann man auffassen als die Konkatenation seiner Symbole, z. B. hallo = $h \cdot a \cdot 1 \cdot 1 \cdot o$.
- evtl: auf wieviele verschiedene Arten kann man abc als Konkatenation nichtleerer Wörter schreiben?

```
vier: abc, a \cdot bc, ab \cdot c, a \cdot b \cdot c
```

• evtl: auf wieviele verschiedene Arten kann man hallo als Konkatenation nichtleerer Wörter schreiben?

```
das sind 2^{5-1} = 16, oder?
```

 \bullet noch mal ganz klar sagen, dass bei Konkatenation die Reihenfolge wichtig ist. 0TT0 \neq T0T0

1.3.1 Konkatenation mit dem leeren Wort

- Ist $w \cdot \varepsilon = w$ klar?
- und $\varepsilon \cdot \varepsilon \cdot w \cdot \varepsilon \cdot \varepsilon \cdot \varepsilon = w$ auch?

1.3.2 Eigenschaften der Konkatenation

Hier hatten wir in der Vorlesung allgemein Eigenschaften von binären Operationen

- Beispiele für kommutative und nichtkommutative Operationen
- Beispiele für assoziative Operationen

1.3.3 Beispiel: Aufbau von E-Mails

Das ist "natürlich" nicht für die Klausur relevant.

1.3.4 Iterierte Konkatenation

induktive Definitionen

- muss man immer darauf achten, dass
 - "für alle Fälle" etwas definiert wird und
 - und nicht für den gleichen Fall widersprüchliche Dinge festgelegt werden (Gefahr z. B. bei Fallunterscheidungen). Das nennt man auch Wohldefiniertheit.

• Vorläufig kommen wir erst mal mit der einfachen Vorgehensweise aus, dass man sich von n nach n+1 weiterhangelt, wie bei

$$x_0 = 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} = x_n + 2$$

• Solche Definitionen kann man erst mal benutzen, um Werte auszurechnen. Hier also z.B. $x_1 = 2$, $x_2 = 4$, $x_3 = 6$, $x_4 = 8$ usw. Man kommt hoffentlich auf die Hypothese:

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = 2n$$

Potenzen von Wörtern

- klar machen,
 - was ist \mathbf{a}^k , was ist \mathbf{b}^k ?
 - was ist $a^k b^k$?
 - was ist $(ab)^k$?

1.4 Vollständige Induktion

• Mit der Definition

$$x_0 = 0$$

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_{n+1} = x_n + 2$$

kann man die Hypothese

$$\forall n \in \mathbb{N}_0 : x_n = 2n$$

beweisen.

• Tun wir das gaaaanz langsam und ausführlich:

Induktionsanfang: Zeige, dass die Behauptung für n = 0 gilt.

Zu zeigen: $x_0 = 0$

Beweis: für x_0 gilt nach Definition: $x_0 = 0$. fertig

Induktionsvoraussetzung: Für ein beliebiges aber festes n gilt: $x_n = 2n$ Bitte darauf achten, dass hier nicht schon eine Behauptung für alle n hingeschrieben wird.

Induktionsschritt: Zeige: Für das beliebige aber feste n gilt: $x_{n+1} = 2(n+1)$ Beweis:

$$x_{n+1} = x_n + 2$$
 nach Definition
= $2n + 2$ nach Induktionsvoraussetzung
= $2(n+1)$ fertig