

16.11.2012

Willkommen zur fünften Übung zur Vorlesung

Grundbegriffe der Informatik



Matthias Janke

email: matthias.janke@kit.edu

- ▶ Webcast wird demnächst eingestellt
- ▶ Ab heute keine Übertragung in -101, also nur noch -102
- ▶ Vorlesung/Übung dann in einigen Wochen nur direkt im Audimax

kontextfreie Grammatiken

Relationen

Kontextfreie Grammatik $G = (N, T, S, P)$

Kontextfreie Grammatik $G = (N, T, S, P)$

- ▶ N ist ein Alphabet sogenannter *Nichtterminalsymbole*
- ▶ T ist ein Alphabet sogenannter *Terminalsymbole*.
 - ▶ kein Zeichen in beiden Alphabeten: $N \cap T = \{\}$.
- ▶ $S \in N$ ist das sogenannte *Startsymbol*.
- ▶ $P \subseteq N \times V^*$ ist *endliche* Menge von *Produktionen*.
 - ▶ $V = N \cup T$ Menge aller Symbole überhaupt
 - ▶ Schreibweise: $X \rightarrow w$ (statt $(X, w) \in P$)
 - ▶ Bedeutung: man kann X ersetzen durch w

Konventionen (bei uns)

- ▶ Nichtterminalsymbole werden mit Großbuchstaben bezeichnet.
- ▶ Terminalsymbole werden mit Kleinbuchstaben dargestellt.

- ▶ Das Ableiten ist kein *deterministischer*, sondern ein *nichtdeterministischer* Prozess.
- ▶ Zu einem Nichtterminalsymbol kann es keine, eine oder mehrere Ableitungen geben.
- ▶ Beispiel:
 - ▶ Eine Regel ist an zwei verschiedenen Stellen anwendbar.
 - ▶ Zwei verschiedene Regeln sind anwendbar.

- ▶ Blick ins Skript von Herrn Worsch werfen
- ▶ Thomas Worsch (2011).
Skript zur Vorlesung *Grundbegriffe der Informatik*.
Wintersemester 2010/2011, Fakultät für Informatik, KIT.
Download als pdf-Datei von <http://gbi.ira.uka.de>

Ein Wort w , für das gilt $\forall i \in \mathbb{G}_{|w|} : w(i) = w(|w| - 1 - i)$ heißt Palindrom.

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ Z &\rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

1. Vorne und hinten gleiche Zeichen ($X \rightarrow aXa \mid bXb$)
2. (Danach) vorne und hinten verschiedenes Zeichen
($X \rightarrow Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa$)
3. Danach entweder Palindrom ... ($Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid a \mid b \mid \epsilon$)
4. oder aus $L(G)$ ($Z \rightarrow X$)

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ Z &\rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

1. Vorne und hinten gleiche Zeichen ($X \rightarrow aXa \mid bXb$)
2. (Danach) vorne und hinten verschiedenes Zeichen ($X \rightarrow Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa$)
3. Danach entweder Palindrom ... ($Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid a \mid b \mid \epsilon$)
4. oder aus $L(G)$ ($Z \rightarrow X$)

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ Z &\rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

1. Vorne und hinten gleiche Zeichen ($X \rightarrow aXa \mid bXb$)
2. (Danach) vorne und hinten verschiedenes Zeichen ($X \rightarrow Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa$)
3. Danach entweder Palindrom ... ($Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid a \mid b \mid \epsilon$)
4. oder aus $L(G)$ ($Z \rightarrow X$)

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ Z &\rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

1. Vorne und hinten gleiche Zeichen ($X \rightarrow aXa \mid bXb$)
2. (Danach) vorne und hinten verschiedenes Zeichen ($X \rightarrow Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa$)
3. Danach entweder Palindrom ... ($Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid a \mid b \mid \epsilon$)
4. oder aus $L(G)$ ($Z \rightarrow X$)

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Definition: $L(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid X \Rightarrow^* w\}$

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Definition: $L(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid X \Rightarrow^* w\}$

Beschreibung:

$$L(G) = \{w \in \{a, b\}^* \mid \exists i \in \mathbb{G}_{|w|} : w(i) \neq w(|w| - 1 - i)\}$$

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Beweis: Klar: $L(G)$ enthält keine Palindrome. (Irgendwann kommt Y , danach verschiedene Zeichen.)

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Beweis: Nicht-Palindrome in $L(G)$: Induktion über Länge.
(Induktionsvoraussetzung: Für festes, aber beliebiges $n \in \mathbb{N}_0$ gilt:
Alle Wörter der Länge $m \leq n$, die keine Palindrome sind, liegen in $L(G)$.)

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Beweis: Nicht-Palindrome in $L(G)$: Induktion über Länge.

- ▶ IA: $ab, ba \in L(G)$.

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Beweis: Nicht-Palindrome in $L(G)$: Induktion über Länge.

- ▶ IA: $ab, ba \in L(G)$.
- ▶ IS (Fall 1): $w = aw'a \xRightarrow{IV} X \Rightarrow aXa \Rightarrow^* aw'a$

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Beweis: Nicht-Palindrome in $L(G)$: Induktion über Länge.

- ▶ IA: $ab, ba \in L(G)$.
- ▶ IS (Fall 1): $w = aw'a \xRightarrow{IV} X \Rightarrow aXa \Rightarrow^* aw'a$
- ▶ IS (Fall 2): $w = aw'b$: Falls w' Palindrom:
 $X \Rightarrow Y \Rightarrow aZb \Rightarrow^* aw'b$,
sonst $X \Rightarrow Y \Rightarrow aZb \Rightarrow aXb \Rightarrow^* aw'b$ wegen IV.

$$\begin{aligned} N &= \{X, Y, Z\}, T = \{a, b\}, S = X, \\ P &= \{X \rightarrow aXa \mid bXb \mid Y, Y \rightarrow aZb \mid bZa, \\ &Z \rightarrow aZa \mid bZb \mid X \mid a \mid b \mid \epsilon\} \end{aligned}$$

Ableitung von $w = aabaabbbbbaaaa$:

$$\begin{aligned} X &\Rightarrow aXa \Rightarrow aaXaa \Rightarrow aaYaa \Rightarrow aabZaaa \Rightarrow aabXaaa \Rightarrow \\ &aabaXaaaa \Rightarrow aabaYaaaa \Rightarrow aabaaZbaaaa \Rightarrow aabaabZbbbaaaa \Rightarrow \\ &aabaabbbbbaaaa \end{aligned}$$

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$$


Ableitungsbaum von $w = aaabb$:



Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$


Ableitungsbaum von $w = aaabb$:



Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$


Ableitungsbaum von $w = aaabb$:



Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$$


Ableitungsbaum von $w = aaabbb$:



Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$


Ableitungsbaum von $w = aaabb$:



Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

$N = \{S\}, T = \{a, b\}, P = \{S \rightarrow aSb \mid aS \mid Sb \mid \epsilon\}$

Ableitungsbaum von $w = aaabb$:



Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow aAa \mid aAb \mid bAa \mid bAb \mid \epsilon \mid a \mid b\}$

Wie kann man Wörter der Form $a^n b^{2m+1} a^{n+1}$ mit $n, m \geq 1$ ableiten?

Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow aAa \mid aAb \mid bAa \mid bAb \mid \epsilon \mid a \mid b\}$

Wie kann man Wörter der Form $a^n b^{2m+1} a^{n+1}$ mit $n, m \in \mathbb{N}_0$ aus S ableiten?

- ▶ n mal S durch aSa ersetzen.
- ▶ Einmal S durch bAa ersetzen.
- ▶ m mal A durch bAb ersetzen.
- ▶ A durch ϵ ersetzen.

Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow aAa \mid aAb \mid bAa \mid bAb \mid \epsilon \mid a \mid b\}$

Wie kann man Wörter der Form $a^n b^{2m+1} a^{n+1}$ mit $n, m \in \mathbb{N}_0$ aus S ableiten?

- ▶ n mal S durch aSa ersetzen.
- ▶ Einmal S durch bAa ersetzen.
- ▶ m mal A durch bAb ersetzen.
- ▶ A durch ϵ ersetzen.

Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow aAa \mid aAb \mid bAa \mid bAb \mid \epsilon \mid a \mid b\}$

Wie kann man Wörter der Form $a^n b^{2m+1} a^{n+1}$ mit $n, m \in \mathbb{N}_0$ aus S ableiten?

- ▶ n mal S durch aSa ersetzen.
- ▶ Einmal S durch bAa ersetzen.
- ▶ m mal A durch bAb ersetzen.
- ▶ A durch ϵ ersetzen.

Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow aAa \mid aAb \mid bAa \mid bAb \mid \epsilon \mid a \mid b\}$

Wie kann man Wörter der Form $a^n b^{2m+1} a^{n+1}$ mit $n, m \in \mathbb{N}_0$ aus S ableiten?

- ▶ n mal S durch aSa ersetzen.
- ▶ Einmal S durch bAa ersetzen.
- ▶ m mal A durch bAb ersetzen.
- ▶ A durch ϵ ersetzen.

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \epsilon\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow SS \mid a \mid b \mid \epsilon\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1 \mid S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$

Kontextfreie Grammatiken: $G = (N, T, S, P)$

- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \epsilon\} \rightarrow \text{Palindrome}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow SS \mid a \mid b \mid \epsilon\} \rightarrow \{a, b\}^*$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon\} \rightarrow \{a, b\}^*$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\} \rightarrow \{a^n ba^m \mid m \leq n \leq 2m\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1 S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1 \mid S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$

- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid a \mid b \mid \epsilon\} \rightarrow$ Palindrome
- ▶ $P = \{S \rightarrow SS \mid a \mid b \mid \epsilon\} \rightarrow \{a, b\}^*$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aS \mid bS \mid \epsilon\} \rightarrow \{a, b\}^*$
- ▶ $P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\} \rightarrow \{a^n ba^m \mid m \leq n \leq 2m\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1 S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$
 $\rightarrow \{w \mid S_1 \Rightarrow^* w\} \cdot \{w \mid S_2 \Rightarrow^* w\}$
- ▶ $P = \{S \rightarrow S_1 \mid S_2, S_1 \rightarrow \dots, S_2 \rightarrow \dots\}$
 $\rightarrow \{w \mid S_1 \Rightarrow^* w\} \cup \{w \mid S_2 \Rightarrow^* w\}$

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\})$$

Man beweise: Wenn $S \Rightarrow^* a^n X a^m$ gilt, folgt $m \leq n \leq 2m$.

Vollständige Induktion über Ableitungslänge!

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\})$$

Man beweise: Wenn $S \Rightarrow^* a^n Sa^m$ gilt, folgt $m \leq n \leq 2m$.

► IA: $S \Rightarrow^0 a^n Sa^m \Rightarrow n = m = 0 \Rightarrow m \leq n \leq 2m$.

► IV: Für festes, aber beliebiges $i \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow m \leq n \leq 2m.$$

► IS: Zu zeigen: Dann muss auch gelten

$$S \Rightarrow^{i+1} a^{n'} Sa^{m'} \Rightarrow m' \leq n' \leq 2m'.$$

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\})$$

Man beweise: Wenn $S \Rightarrow^* a^n Sa^m$ gilt, folgt $m \leq n \leq 2m$.

► IA: $S \Rightarrow^0 a^n Sa^m \Rightarrow n = m = 0 \Rightarrow m \leq n \leq 2m$.

► IV: Für festes, aber beliebiges $i \in \mathbb{N}_0$ gilt:

$$S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow m \leq n \leq 2m.$$

► IS: Zu zeigen: Dann muss auch gelten

$$S \Rightarrow^{i+1} a^{n'} Sa^{m'} \Rightarrow m' \leq n' \leq 2m'.$$

$$G = (\{S\}, \{a, b\}, S, P = \{S \rightarrow aSa \mid aaSa \mid b\})$$

Man beweise: Wenn $S \Rightarrow^* a^n Sa^m$ gilt, folgt $m \leq n \leq 2m$.

- ▶ IA: $S \Rightarrow^0 a^n Sa^m \Rightarrow n = m = 0 \Rightarrow m \leq n \leq 2m$.
- ▶ IV: Für festes, aber beliebiges $i \in \mathbb{N}_0$ gilt:
 $S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow m \leq n \leq 2m$.
- ▶ IS: Zu zeigen: Dann muss auch gelten
 $S \Rightarrow^{i+1} a^{n'} Sa^{m'} \Rightarrow m' \leq n' \leq 2m'$.

$$(S \Rightarrow^{i+1} a^{n'} Sa^{m'}) \Rightarrow (S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow a^n aSaa^m) \vee \\ (S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow a^n aaSaa^m).$$

- ▶ 1. Fall: $S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow a^n aSaa^m = a^{n+1} Sa^{m+1}$.

Nach IV gilt $m \leq n \leq 2m$, und es folgt

$m+1 \leq n+1 \leq 2m+1 \leq 2(m+1)$, weswegen die Behauptung in diesem Fall korrekt ist.

- ▶ 2. Fall: $S \Rightarrow^i a^n Sa^m \Rightarrow a^n aaSaa^m = a^{n+2} Sa^{m+1}$.

Nach IV gilt $m \leq n \leq 2m$, und es folgt

$m+1 \leq n+2 \leq 2m+2 = 2(m+1)$, weswegen die Behauptung auch in diesem Fall korrekt ist.

Achtung!

Bei Induktionsschritt verwendet:

$$u \Rightarrow^{i+1} v \iff \exists w : u \Rightarrow^i w \Rightarrow v.$$

Nach Definition: $u \Rightarrow^{i+1} v \iff \exists w : u \Rightarrow w \Rightarrow^i v.$

Beide Definitionen sind äquivalent!

Wörter über $\{a, b\}$, die keine Palindrome sind?

Wörter über $\{a, b\}$, die keine Palindrome sind?

Erstes und letztes Zeichen gleich: Wort in Mitte kein Palindrom.

Wörter über $\{a, b\}$, die keine Palindrome sind?

Erstes und letztes Zeichen gleich: Wort in Mitte kein Palindrom.

Erstes und letztes Zeichen verschieden: Beliebiges Wort in Mitte.

Wörter über $A = \{a, b\}$, die keine Palindrome sind?

$$L = \{a\}L\{a\} \cup \{b\}L\{b\} \cup \{a\}A^*\{b\} \cup \{b\}A^*\{a\}$$

Wörter über $A = \{a, b\}$, die keine Palindrome sind?

$$L = \{a\}L\{a\} \cup \{b\}L\{b\} \cup \{a\}A^*\{b\} \cup \{b\}A^*\{a\}$$

Grammatik $G = (N, T, S, P)$ mit $N = \{S, A\}$, $T = \{a, b\}$,
 $P = \{S \rightarrow aSa \mid bSb \mid aAb \mid bAa,$
 $A \rightarrow AA \mid a \mid b \mid \epsilon\}$

kontextfreie Grammatiken

Relationen

Definition: $x(S \circ R)z \iff \exists y : xRy \wedge ySz$.

Beispiel: Funktionen f, g .

$$x(f \circ g)z \iff f(g(x)) = z$$

Mit $g(x) = y$ gilt: $g(x) = y \wedge f(y) = z \Rightarrow xgy \wedge yfz$.

“Verdrehte” Schreibweise von Funktionen \Rightarrow verdrehte Schreibweise für Relationenprodukt.

$$< \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$< \circ < = ?$$

$$< \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$x(< \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z$$

Welches $<$ hinter dem \Rightarrow entspricht welchem $<$ vor dem \Rightarrow ?

$$< \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$x(< \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z$$

$$x(< \circ <)z \iff z \geq x + 2$$

$$< \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$x(< \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z$$

$$x(< \circ <)z \iff z \geq x + 2$$

$$\text{Beweis: } x(< \circ <)z \Rightarrow \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z \Rightarrow$$

$$\exists y \in \mathbb{N}_0 : y - x \geq 1 \wedge z - y \geq 1 \Rightarrow z - x \geq 2 \Rightarrow z \geq x + 2$$

$$< \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$x(< \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z$$

$$x(< \circ <)z \iff z \geq x + 2$$

$$\text{Beweis: } z \geq x + 2 \Rightarrow z - 1 \geq x + 1 \Rightarrow x < z - 1 \wedge z - 1 < z \Rightarrow$$

$$\exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y < z \Rightarrow x(< \circ <)z$$

$$< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

$$< \circ < = ?$$

$$< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

$$< \circ < = <$$

$$< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

$$< \circ < = <$$

$$\text{Beweis: } x(< \circ <)z \Rightarrow \exists y \in \mathbb{R} : x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z.$$

$$< \subseteq \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

$$< \circ < = <$$

$$\text{Beweis: } x(< \circ <)z \Rightarrow \exists y \in \mathbb{R} : x < y \wedge y < z \Rightarrow x < z.$$

$$x < z \Rightarrow x < \frac{x+z}{2} \wedge \frac{x+z}{2} < z$$

$$\Rightarrow \exists y \in \mathbb{R} : x < y \wedge y < z \Rightarrow x(< \circ <)z$$

$$<, > \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$> \circ < = ?$$

$$<, > \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$> \circ < = ?$$

$$x(> \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y > z$$

$$<, > \subseteq \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0.$$

$$> \circ < = \mathbb{N}_0 \times \mathbb{N}_0$$

$$x(> \circ <)z \iff \exists y \in \mathbb{N}_0 : x < y \wedge y > z$$

$$\forall x, z \in \mathbb{N}_0 : x < x + z + 1 \wedge x + z + 1 > z$$

Themen für das fünfte Übungsblatt:

- ▶ kontextfreie Grammatiken
- ▶ Beweisen

Schönes Wochenende!